



Grundriß
der
Integral-Rechnung

von

Dr. Ludwig Kiepert, Dr. Ing.,
Geheimer Regierungsrat,
Professor der Mathematik an der technischen Hochschule zu Hannover.

Zwölfte unveränderte Auflage
des gleichnamigen Leitfadens

von weil. **Dr. Max Stegemann.**
(Manuldruck)

Erster Band.

Hannover 1920.
Helwingsche Verlagsbuchhandlung.

Alle Rechte vorbehalten.

Vorrede zur zwölften Auflage.

Der große Andrang von Studierenden, der sich nach Beendigung des Krieges bei den Technischen Hochschulen und Universitäten eingestellt hat, machte sich auch bei dem Verkauf des vorliegenden Grundrisses der Integral-Rechnung dadurch fühlbar, daß die im Dezember 1917 erschienene 11. Auflage bereits vergriffen ist.

Deshalb sah sich die Verlagsbuchhandlung gezwungen, einen unveränderten Abdruck davon als 12. Auflage herauszugeben.

Damit das Buch, dessen Umfang reichlich groß geworden ist, handlicher wird, ist es in zwei Bände zerlegt worden, von denen der erste die eigentliche Integral-Rechnung umfaßt, während der zweite die Theorie der gewöhnlichen Differential-Gleichungen enthält. Die Formel-Tabelle und das alphabetische Inhalts-Verzeichnis befinden sich am Schlusse des zweiten Bandes.

Möge die neue Auflage dieselbe freundliche Aufnahme finden wie die früheren Auflagen.

Hannover, den 4. Juli 1920.

L. Kiepert.



Inhalts-Verzeichnis.

Erster Teil.

I. Abschnitt.

Allgemeine Begriffe und Fundamentalsätze der Integral-Rechnung.

	Seite
§ 1. Begriff und geometrische Deutung des Integrals.....	1
§ 2. Einführung der Integrationsgrenzen.....	6
§ 3. Einige Hilfssätze für die Ausführung der Integration.....	18
§ 4. Unmittelbare Integration einiger Funktionen.....	19
§ 5. Übungs-Aufgaben.....	24
§ 6. Allgemeine Bemerkungen.....	27

II. Abschnitt.

Integration durch Substitution.

§ 7. Erklärung der Substitutions-Methode.....	28
§ 8. Beispiele für die Substitutions-Methode.....	29
§ 9. Integration von einigen irrationalen Funktionen durch Substitution	32
§ 10. Integrale von der Form $\int \frac{f'(x)dx}{f(x)}$	36
§ 11. Integrale von der Form $\int F'(t)dt$, wenn $t = f(x)$ irgend- eine transzendente Funktion von x ist	40
§ 12. Integration durch Einführung trigonometrischer oder hyper- bolischer Funktionen	53

III. Abschnitt.

Integration durch Zerlegung.

§ 13. Integration von einigen gebrochenen rationalen Funktionen durch Zerlegung	63
--	----

§ 14.	Integration von einigen transzendenten Funktionen durch Zerlegung. Anwendung der <i>Moirreschen</i> Formeln.....	75
-------	--	----

IV. Abschnitt.

Partielle Integration.

§ 15.	Erklärung der partiellen Integration.....	81
§ 16.	Beispiele für die partielle Integration.....	82
§ 17.	Integration von einigen trigonometrischen Funktionen durch partielle Integration.....	85
§ 18.	Integration von einigen irrationalen Funktionen durch partielle Integration.....	98

Anwendungen der Integral-Rechnung.

V. Abschnitt.

Quadratur der Kurven.

§ 19.	Quadratur der Kurven bei Anwendung rechtwinkliger Koordinaten	110
§ 20.	Quadratur der Kurven bei Anwendung schiefwinkliger Koordinaten	126
§ 21.	Quadratur von Figuren, welche oben und unten durch eine Kurve begrenzt sind.....	129
§ 22.	Quadratur der Kurven bei Anwendung von Polarkoordinaten.....	141
§ 23.	Übergang von rechtwinkligen Koordinaten zu Polarkoordinaten.....	148

VI. Abschnitt.

Kubatur der Rotationskörper.

§ 24.	Berechnung des Volumens eines Rotationskörpers.....	155
§ 25.	Übungs-Aufgaben.....	159

VII. Abschnitt.

Rektifikation der ebenen Kurven.

§ 26.	Rektifikation ebener Kurven, deren Gleichung auf ein rechtwinkliges Koordinaten-System bezogen ist.....	176
§ 27.	Übungs-Aufgaben.....	178
§ 28.	Rektifikation ebener Kurven, deren Gleichung auf Polarkoordinaten bezogen ist.....	188
§ 29.	Übungs-Aufgaben.....	189

VIII. Abschnitt.

Komplanation der Rotationsflächen.

§ 30.	Berechnung des Flächen-Elementes bei einer Rotationsfläche.....	195
§ 31.	Übungs-Aufgaben.....	196

IX. Abschnitt.

Rektifikation der Raumkurven.

§ 32.	Berechnung des Bogen-Elementes einer Raumkurve....	208
§ 33.	Übungs-Aufgaben.....	210

Zweiter Teil.

X. Abschnitt.

Integration der gebrochenen rationalen Funktionen.

§ 34.	Echt gebrochene und unecht gebrochene rationale Funktionen.....	213
§ 35.	Zerlegung der echt gebrochenen rationalen Funktionen in Partialbrüche, wenn die Wurzeln der Gleichung $f(x) = 0$ sämtlich voneinander verschieden sind.....	215
§ 36.	Zerlegung der echt gebrochenen rationalen Funktionen in Partialbrüche, wenn die Gleichung $f(x) = 0$ auch gleiche Wurzeln besitzt.....	232
§ 37.	Integration der Funktionen $\frac{A}{x-a} dx$ und $\frac{A}{(x-a)^n} dx$	242
§ 38.	Integration der Funktionen $\frac{dx}{(x-g)^2+h^2}$ und $\frac{dx}{[(x-g)^2+h^2]^n}$	249
§ 39.	Integration der Funktionen $\frac{(Px+Q)dx}{(x-g)^2+h^2}$ und $\frac{(Px+Q)dx}{[(x-g)^2+h^2]^n}$	252
§ 40.	Übungs-Aufgaben.....	253

XI. Abschnitt.

Integration der irrationalen Funktionen.

§ 41.	Allgemeine Bemerkungen.....	264
§ 42.	Integration rationaler Funktionen der Argumente $\frac{m}{x}, \frac{p}{\sqrt{x+\beta}}$, $\frac{p}{\sqrt{x+\delta}}$	265
§ 43.	Übungs-Aufgaben.....	267
§ 44.	Zurückführung der Differential-Funktionen von der Form $F(x, \sqrt{Ax^2+2Bx+C})dx$ auf Differential-Funktionen von der Form $f(y, \sqrt{y^2-a^2})dy$, $f(y, \sqrt{a^2+y^2})dy$, $f(y, \sqrt{a^2-y^2})dy$	272

	Seite
§ 45. Übungs-Aufgaben	273
§ 46. Integration der Differential-Funktion $F(x, \sqrt{Ax^2+2Bx+C})dx$, wenn A positiv ist	276
§ 47. Integration der Differential-Funktion $F(x, \sqrt{Ax^2+2Bx+C})dx$, wenn C positiv ist	284
§ 48. Integration der Differential-Funktion $F(x, \sqrt{Ax^2+2Bx+C})dx$, wenn B^2-AC positiv ist	293
§ 49. Integration der Differential-Funktion $F(x, \sqrt{Ax^2+2Bx+C})dx$, wenn die drei Größen A , C und B^2-AC negativ sind	299
§ 50. Normalintegrale von der Form $\int F(x, \sqrt{Ax^2+2Bx+C})dx$.	300
§ 51. Integration einer Differential-Funktion von der Form $\int F(x, \sqrt{ax+\beta}, \sqrt{\gamma x+\delta})dx$	305

XII. Abschnitt.

Theorie der bestimmten Integrale.

§ 52. Integrale zwischen unendlichen Grenzen	306
§ 53. Integration von Differential-Funktionen, die an den Grenzen des Integrals unstetig werden	310
§ 54. Integration von Differential-Funktionen, die zwischen den Integrations-Grenzen unendlich werden	314
§ 55. Näherungsmethoden durch Einführung einfacherer Funk- tionen	318
§ 56. Mittelwertsätze	322
§ 57. Neuer Beweis des <i>Taylor</i> 'schen Lehrsatzes	326
§ 58. Gliedweise Integration unendlicher Reihen	328
§ 59. Berechnung der elliptischen Normalintegrale erster und zweiter Gattung	334
§ 60. Berechnung der elliptischen Normalintegrale erster und zweiter Gattung durch trigonometrische Reihen	338
§ 61. Vereinfachung der numerischen Rechnung durch die <i>Landensche</i> Transformation	350
§ 62. Differentiation der Integrale	354
§ 63. Berechnung bestimmter Integrale durch Differentiation ..	357
§ 64. Berechnung der Werte von einigen bestimmten Integralen	359
§ 65. Darstellung der Funktionen $\operatorname{tg} x$, $\operatorname{ctg} x$, $\frac{1}{\sin x}$, $\frac{1}{\cos x}$ durch unendliche Partialbruch-Reihen	376
§ 66. Darstellung der Koeffizienten einer trigonometrischen oder <i>Fourier</i> 'schen Reihe	380
§ 67. Übungs-Beispiele	387
§ 68. Berechnung bestimmter Integrale bei Anwendung mehr- dentiger Substitutionen	401
§ 69. Messungsmethoden zur Berechnung bestimmter Integrale	408

	Seite
§ 70. <i>Simpsonsche Regel</i>	412
§ 71. <i>Übungs-Beispiele</i>	422
§ 72. <i>Gaußsche Quadratur</i>	429
§ 73. <i>Amslers Polarplanimeter</i>	438

XIII. Abschnitt.

**Kubatur der Körper und Komplanat ion der krummen
Oberflächen. Mehrfache Integrale.**

§ 74. Kubatur der Körper durch Anwendung einfacher Integrale	445
§ 75. Übungs-Aufgaben	449
§ 76. Einführung mehrfacher Integrale	451
§ 77. Theorie der mehrfachen Integrale	466
§ 78. Einführung von neuen Integrations-Veränderlichen	470
§ 79. Das <i>Gaußsche Fehlerintegral</i>	476
§ 80. Komplanat ion der Flächen	481
§ 81. Übungs-Beispiele	484
§ 82. Einführung zweier variablen Parameter	493
§ 83. Einführung räumlicher Polarkoordinaten	496

XIV. Abschnitt.

**Berechnung der Masse, der statischen Momente, der Trägheits-
Momente und der Schwerpunkts-Koordinaten.**

§ 84. Erklärung und Berechnung der Masse	500
§ 85. Erklärung und Berechnung der statischen Momente	504
§ 86. Erklärung und Berechnung der Trägheits-Momente	507
§ 87. Erklärung des Schwerpunkts und Berechnung seiner Ko- ordinaten	508
§ 88. <i>Guldinsche Regeln</i>	513
§ 89. Übungs-Beispiele	514

XV. Abschnitt.

Theorie der *Eulerschen* Integrale.

§ 90. Erklärung der <i>Eulerschen</i> Integrale erster und zweiter Gattung	546
§ 91. Darstellung der Gammafunktion durch unendliche Produkte	551
§ 92. Eigenschaften der Gammafunktion	554
§ 93. Berechnung von $\ln \Gamma(p)$	557
§ 94. Einige besondere Werte der Gammafunktion und ihre An- wendung auf die Berechnung von bestimmten Integralen	563

XVI. Abschnitt.

**Integration der Differentiale der Funktionen
von mehreren Veränderlichen.**

§ 95. Vollständige Differentiale der Funktionen von zwei Ver- änderlichen	567
--	-----

	Seite
§ 96. Übungs-Beispiele.....	570
§ 97. Vollständige Differentiale der Funktionen von drei Veränderlichen	576
§ 98. Übungs-Beispiele.....	581

XVII. Abschnitt.

Kurven-Integrale.

§ 99. Begriff des Kurven-Integrals.....	585
§ 100. Darstellung eines Doppelintegrals durch ein Kurven-Integral	590
§ 101. Kurven-Integrale von vollständigen Differentialen	596
§ 102. Funktionen einer komplexen Veränderlichen	600
§ 103. Kurven-Integrale komplexer Funktionen.....	602
§ 104. Der Satz von <i>Cauchy</i>	606
§ 105. Verallgemeinerung des <i>Cauchy</i> schen Satzes	608
§ 106. Übungs-Beispiele	609
§ 107. Beweis des Hauptsatzes der Algebra	613

Dritter Teil.

Theorie der gewöhnlichen Differential-Gleichungen.

XVIII. Abschnitt.

**Theorie der gewöhnlichen Differential-Gleichungen
erster Ordnung und ersten Grades.**

§ 108. Begriff und Einteilung der Differential-Gleichungen....	615
§ 109. Auflösbarkeit der Differential-Gleichungen erster Ordnung zwischen zwei Veränderlichen. Integrations-Konstante	619
§ 110. Auflösung der Differential-Gleichungen erster Ordnung mit Hilfe der <i>Taylor</i> schen Reihe.....	629
§ 111. Untersuchung der Konvergenz-Bedingungen	633
§ 112. Zusammenhang zwischen den verschiedenen Lösungen einer Differential-Gleichung erster Ordnung.....	640
§ 113. Trennung der Variablen	643
§ 114. Integration der Differential-Gleichungen von der Form $\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{y}{x}\right)$	651
§ 115. Einige weitere Fälle, in denen man die Trennung der Variablen ausführen kann.....	656
§ 116. Lineare Differential-Gleichungen erster Ordnung.....	661
§ 117. Gleichung von <i>Bernoulli</i>	671
§ 118. Erklärung des integrierenden Faktors	674
§ 119. Beispiele zur Erläuterung.....	679
§ 120. Bestimmung des integrierenden Faktors	681

XIX. Abschnitt.

Differential-Gleichungen erster Ordnung und höheren Grades.

§ 121.	Zurückführung auf Differential-Gleichungen ersten Grades	691
§ 122.	Integration durch Differentiation.....	695
§ 123.	Die singulären Auflösungen der Differential-Gleichungen erster Ordnung.....	705
§ 124.	Ableitung der singulären Lösung aus der Differential-Gleichung selbst	712
§ 125.	Singuläre Lösungen. Übungs-Beispiele	718
§ 126.	Isogonale Trajektorien	724
§ 127.	Übungs-Aufgaben.....	727
§ 128.	Evolventen.....	743
§ 129.	Übungs-Aufgaben.....	744

XX. Abschnitt.

Gewöhnliche Differential-Gleichungen höherer Ordnung.

§ 130.	Auflösbarkeit simultaner Differential-Gleichungen erster Ordnung.....	748
§ 131.	Auflösbarkeit der gewöhnlichen Differential-Gleichungen höherer Ordnung.....	756
§ 132.	Integration der Differential-Gleichung $\frac{d^m y}{dx^m} = \varphi(x)$	757
§ 133.	Differential-Gleichungen von der Form $F\left(\frac{d^m y}{dx^m}, \frac{d^{m-1} y}{dx^{m-1}}\right) = 0$	760
§ 134.	Differential-Gleichungen von der Form $F\left(\frac{d^m y}{dx^m}, \frac{d^{m-2} y}{dx^{m-2}}\right) = 0$	765
§ 135.	Fälle, in denen sich die Ordnung der Differential-Gleichung erniedrigen läßt.....	770

XXI. Abschnitt.

Lineare Differential-Gleichungen m^{ter} Ordnung.

§ 136.	Allgemeine Bemerkungen	786
§ 137.	Homogene lineare Differential-Gleichungen m^{ter} Ordnung	787
§ 138.	Nicht homogene lineare Differential-Gleichungen m^{ter} Ordnung	798
§ 139.	Nicht homogene lineare Differential-Gleichungen m^{ter} Ordnung mit konstanten Koeffizienten	799
§ 140.	Einige Fälle, in denen die erforderlichen Quadraturen ausführbar sind	812
§ 141.	Zurückführung der linearen Differential-Gleichungen m^{ter} Ordnung auf lineare Differential-Gleichungen niedrigerer Ordnung, wenn partikuläre Integrale bekannt sind	835
§ 142.	Ein weiterer Fall, in dem sich die lineare Differential-Gleichung m^{ter} Ordnung integrieren läßt.....	844

XXII. Abschnitt.

Lineare Differential-Gleichungen zweiter Ordnung.

§ 143.	Integration der nicht homogenen linearen Differential-Gleichungen zweiter Ordnung, wenn ein partikuläres Integral der homogenen Differential-Gleichung bekannt ist	851
§ 144.	Zurückführung auf die Normalform. Äquivalenz	854
§ 145.	Einführung einer neuen unabhängigen Veränderlichen..	860
§ 146.	Beziehung zwischen je zwei partikulären Integralen einer linearen homogenen Differential-Gleichung zweiter Ordnung	863
§ 147.	Integration der nicht homogenen linearen Differential-Gleichung zweiter Ordnung durch Variation der Konstanten	865

XXIII. Abschnitt.

Simultane Differential-Gleichungen.

§ 148.	Zurückführung von simultanen Differential-Gleichungen zwischen einer unabhängigen und mehreren abhängigen Veränderlichen auf eine Differential-Gleichung höherer Ordnung zwischen zwei Veränderlichen.....	870
§ 149.	Integration linearer simultaner Differential-Gleichungen erster Ordnung	875

XXIV. Abschnitt.

Integration durch Reihen.

§ 150.	Integration durch Anwendung der <i>Taylor</i> schen und der <i>Mac-Laurin</i> schen Reihe.....	885
§ 151.	Methode der unbestimmten Koeffizienten	891

XXV. Abschnitt.

Näherungsmethoden zur Integration gewöhnlicher Differential-Gleichungen.

§ 152.	Verallgemeinerung der <i>Simpson</i> schen Regel zur Auflösung von Differential-Gleichungen erster Ordnung ...	904
§ 153.	Übungs-Beispiel.....	913
§ 154.	Integration von simultanen Differential-Gleichungen und Differential-Gleichungen höherer Ordnung.....	919
§ 155.	Übungs-Beispiel	924

Tafeln für die elliptischen Integrale erster und zweiter Gattung	935
--	-----

Tabelle der wichtigsten Formeln aus der Integral-Rechnung...	939
--	-----

Alphabetisches Verzeichnis über die Bedeutung der in den Formeln benutzten Buchstaben	1002
---	------

Alphabetisches Inhalts-Verzeichnis	1005
--	------

Erster Teil.

I. Abschnitt.

Allgemeine Begriffe und Fundamentalsätze der Integral-Rechnung.

§ 1.

Begriff und geometrische Deutung des Integrals.

(Vergl. die Formel-Tabelle Nr. 1 und 2.)*)

Die Aufgabe der Integral-Rechnung besteht darin, daß eine Funktion $F(x)$ gesucht wird, deren Ableitung

$$(1.) \quad F'(x) = f(x)$$

gegeben ist.

Da das Differential einer Funktion $F(x)$ gleich ist ihrer Ableitung $F'(x)$, multipliziert mit dem Differential von x , da also

$$(2.) \quad dF(x) = F'(x)dx = f(x)dx,$$

so kann man die gestellte Aufgabe auch so fassen: „Von einer Funktion ist das Differential gegeben, man soll die Funktion selbst aufsuchen.“

Die Operation, durch welche dies geschieht, nennt man die „Integration des vorliegenden Differentials“, und die Wissenschaft, welche von den Integrationen handelt, nennt man „Integral-Rechnung“. Das Operationszeichen für das Integral von $F'(x)dx$ ist ein \int (ein langgezogenes S),**) also

*) Die wichtigsten Formeln sind im Anhange zu einer Tabelle zusammengestellt.

**) Es wird später gezeigt werden, daß man jedes (bestimmte) Integral auch als den Grenzwert einer Summe von unendlich vielen, unendlich kleinen Größen auffassen kann. Dieser Auffassung entspricht das Operationszeichen \int (erster Buchstabe des Wortes Summa), das von *Leibniz* eingeführt ist.

$$(3.) \quad \int F''(x)dx = F'(x).$$

(Sprich: „Integral von $F''(x)dx$ “, oder „Integral über $F''(x)dx$ “, oder kürzer: „Integral $F''(x)dx$ “. Da das Integral als Grenzwert einer Summe zu betrachten ist, so darf man nicht sagen: „Integral aus $F''(x)dx$.“)

In dieser Hauptformel ist somit ausgesprochen, was man unter dem Integral einer gegebenen Differential-Funktion

$$F''(x)dx = f(x)dx$$

versteht.

Beispiele.

1) Ist

$$F(x) = x^3,$$

so wird

$$F'(x) = 3x^2, \quad \text{also} \quad \int 3x^2 dx = x^3.$$

2) Ist

$$F(x) = \sin x,$$

so wird

$$F'(x) = \cos x, \quad \text{also} \quad \int \cos x dx = \sin x.$$

3) Ist

$$F(x) = \operatorname{arctg} x,$$

so wird

$$F'(x) = \frac{1}{1+x^2}, \quad \text{also} \quad \int \frac{dx}{1+x^2} = \operatorname{arctg} x.$$

Aus der vorstehenden Erklärung folgt, daß *Integration und Differentiation entgegengesetzte Operationen sind, die sich gegenseitig aufheben*. Setzt man nämlich aus Gleichung (2.) den Wert von $F'(x)dx$ in die Gleichung (3.) ein, so erhält man

$$(4.) \quad \int dF(x) = F(x);$$

und wenn man beide Seiten der Gleichung (3.) differentiiert,

$$(5.) \quad d \int F''(x)dx = dF'(x) = F''(x)dx.$$

Darin liegt auch ein Mittel, um das durch die Integration sich ergebende Resultat zu prüfen. Differentiiert man nämlich dieses Resultat, so muß man den Ausdruck erhalten, der unter dem Integralzeichen steht.

Weil $F'(x)dx$ nicht nur das Differential von $F(x)$, sondern auch das Differential von $F(x) + C$ ist, wo C eine beliebige Konstante bedeutet, so wird ganz allgemein

$$(6.) \quad \int F'(x)dx = F(x) + C.$$

Das Integral von $F'(x)dx$ hat daher unendlich viele Werte. Dabei nennt man die Größe C die „*Integrations-Konstante*“.

Dies ist aber die *einzig* Willkür, welche bei der Bestimmung des Integrals auftritt, denn es gelten die folgenden Sätze:

Satz 1. *Ist die Ableitung einer stetigen Funktion $\varphi(x)$ für alle Werte von x zwischen a und b gleich 0, so ist der Wert von $\varphi(x)$ in diesem Intervalle konstant.*

Beweis. Nach dem ersten Mittelwertsatz der Differential-Rechnung (D.-R.*), Formel Nr. 88 der Tabelle) ist

$$(7.) \quad \varphi(a + h) = \varphi(a) + h \cdot \varphi'(a + \Theta h),$$

wo Θ zwischen 0 und 1 liegt. Nach Voraussetzung ist $\varphi'(x)$ für alle Werte von x zwischen a und b gleich 0, folglich wird

$$\varphi'(a + \Theta h) = 0,$$

so lange $a + h = x$ in dem angegebenen Intervalle bleibt. Da außerdem h eine endliche Größe ist, so wird

$$(8.) \quad \varphi(a + h) = \varphi(a), \quad \text{oder} \quad \varphi(x) = \varphi(a),$$

d. h. $\varphi(x)$ behält den konstanten Wert $\varphi(a)$.

Hieraus folgt

Satz 2. *Haben die beiden stetigen Funktionen $F(x)$ und $G(x)$ in dem betrachteten Intervalle dieselbe Ableitung, so unterscheiden sie sich voneinander nur durch eine Konstante.*

Beweis. Setzt man

$$(9.) \quad \varphi(x) = G(x) - F(x),$$

so ist die Ableitung von $\varphi(x)$ in dem Intervalle beständig gleich Null, also ist $\varphi(x)$ nach Satz 1 eine Konstante C . Dies gibt

*) Die Zitate, welche sich auf die zwölfte Auflage der Differential-Rechnung beziehen, sollen durch die vorgesetzten Buchstaben: „D.-R.“ hervorgehoben werden.

und legt man durch P_1 die Gerade P_1S parallel zur X -Achse, so wird

$$(19.) \quad QQ_1P_1P = \Delta F(x) < QQ_1P_1S = y_1 \cdot \Delta x.$$

Dies gibt

$$(20.) \quad y \leq \frac{\Delta F(x)}{\Delta x} \leq y_1,$$

oder, weil $\lim y_1 = y$ für $\lim \Delta x = 0$ wird,

$$(21.) \quad y = \frac{dF(x)}{dx}, \quad \text{oder} \quad f(x) = F'(x).$$

Deshalb erhält man

$$(22.) \quad F = F(x) = \int F'(x)dx = \int f(x)dx,$$

oder

$$(22a.) \quad F = \int y dx.$$

Dieselben Schlüsse gelten auch noch, wenn die Kurve vom Punkte P bis zum Punkte P_1 fällt (vergl. Fig. 2), nur erhalten dann die Ungleichheitszeichen die entgegengesetzte Richtung. Es wird nämlich in diesem Falle

$$F = A_1QPA = F(x),$$

$$A_1Q_1P_1A = F(x + \Delta x) = F + \Delta F,$$

$$QQ_1P_1P = \Delta F = \Delta F(x) = F(x + \Delta x) - F(x),$$

$$QQ_1RP \geq \Delta F(x) \geq QQ_1P_1S,$$

oder

$$(23.) \quad y \cdot \Delta x \geq \Delta F(x) \geq y_1 \cdot \Delta x,$$

$$(24.) \quad y \geq \frac{\Delta F(x)}{\Delta x} \geq y_1,$$

also, da auch hier $\lim y_1 = y$ wird für $\lim \Delta x = 0$,


$$(25.) \quad y = \frac{dF(x)}{dx},$$

oder

$$(25a.) \quad f(x) = F'(x).$$


Das Resultat bleibt sogar auch dann noch richtig, wenn die Kurve zwischen P und P_1 abwechselnd steigt und

Fig. 2.



fällt (Fig. 3). Man legt dann durch den höchsten Punkt H mit der Ordinate y' und durch den tiefsten Punkt T mit der Ordinate y'' Parallelen GG_1 und KK_1 zu der X -Achse.

Fig. 8.



Dadurch erhält man die beiden Rechtecke

$$(26.) \quad \begin{cases} QQ_1G_1G = y' \cdot \Delta x & \text{und} \\ QQ_1K_1K = y'' \cdot \Delta x, \end{cases}$$

und zwar wird

$$(27.) \quad y' \cdot \Delta x \cong QQ_1P_1P = \Delta F(x) \cong y'' \cdot \Delta x,$$

oder

$$(28.) \quad y' \cong \frac{\Delta F(x)}{\Delta x} \cong y'',$$

also, da $\lim y' = \lim y'' = y$ für $\lim \Delta x = 0$,

$$(29.) \quad y = \frac{dF(x)}{dx}, \quad \text{oder} \quad f(x) = F'(x).$$

Man findet daher in allen Fällen

$$(30.) \quad F = A_1QPA = \int f(x)dx + C = \int ydx + C.$$

Bei dieser geometrischen Deutung des Integrals erkennt man auch, weshalb zu dem Integral noch eine willkürliche Integrations-Konstante hinzutreten muß. Die Anfangs-Ordinate A_1A , durch welche die ebene Figur F auf der einen Seite begrenzt wird, ist noch beliebig. Einer Verschiebung dieser Anfangs-Ordinate entspricht eine Veränderung der Integrations-Konstanten C .

§ 2.

Einführung der Integrationsgrenzen.

(Vergl. die Formel-Tabelle Nr. 3 bis 6.)

Es gibt in den Anwendungen der Integral-Rechnung Aufgaben, bei denen die Gleichung

$$\int F'(x)dx = F(x) + C$$

für jeden Wert der Integrations-Konstanten C eine Lösung gibt. Man nennt dann $F(x) + C$ das „allgemeine Integral“,

aus dem sich die „*partikulären Integrale*“ ergeben, indem man für C besondere (partikuläre) Werte einsetzt.

Bei anderen Anwendungen der Integral-Rechnung aber darf die Integrations-Konstante C nur *einen* bestimmten Wert haben, der sich im allgemeinen aus der Natur der Aufgabe ohne weiteres ergibt. Gewöhnlich wird die Integrations-Konstante C dadurch ermittelt, daß man den Wert von x aufsucht, für welchen das Integral in der vorgelegten Aufgabe verschwindet.

Ist a dieser besondere Wert von x , so nennt man a „*die untere Grenze*“ des Integrals und schreibt

$$(1.) \quad F = \int_a F'(x) dx = F(x) + C.$$

Da nach Voraussetzung das Integral für $x = a$ verschwindet, so findet man hieraus

$$(2.) \quad 0 = F(a) + C, \quad \text{oder} \quad C = -F(a),$$

also

$$(3.) \quad F = \int_a F'(x) dx = F(x) - F(a).$$

Dieses Verfahren kommt auch bei der geometrischen Deutung des Integrals in Betracht. In den Figuren 1, 2 und 3 z. B. verschwindet der Flächeninhalt der ebenen Figur A_1QPA , wenn die Ordinate QP mit der Anfangs-Ordinate A_1A zusammenfällt, wenn also

$$x = a = OA_1.$$

In vielen Fällen braucht man den Wert von F nur für einen bestimmten Wert von x , z. B. für $x = b$; man nennt dann b „*die obere Grenze*“ und schreibt

$$(4.) \quad F = \int_a^b F'(x) dx = F(b) - F(a).$$

(Sprich: „Integral von $F'(x)dx$ zwischen den Grenzen a und b “.)

F heißt in diesem Falle ein „*bestimmtes Integral*“, während man $F(x)$ das „*unbestimmte Integral*“ von $F'(x)dx$ nennt.

Um anzudeuten, in welcher Weise das bestimmte Integral aus dem unbestimmten hergeleitet wird, schreibt man

$$(5.) \quad F = \int_a^b y dx = \int_a^b F'(x) dx = [F(x)]_a^{b*} = F(b) - F(a).$$

Satz 1. Das bestimmte Integral kann betrachtet werden als Grenzwert einer Summe von unendlich vielen, unendlich kleinen Größen.


Beweis. Der Flächeninhalt der ebenen Figur A_1B_1BA (Fig. 4) war

$$(6.) \quad F = \int_a^b F'(x) dx = F(b) - F(a),$$

wenn diese Figur durch die Kurve

$$y = F'(x), \text{ oder } y = f(x)$$

Fig. 4



begrenzt wird. Dabei werde vorausgesetzt, daß $f(x)$ in dem betrachteten Intervalle eine *stetige* und *eindeutige* Funktion sei. Andererseits kann man aber auch den Flächeninhalt dieser Figur dadurch berechnen, daß man sie durch Parallele zur Y -Achse in n Streifen zerlegt, die alle verschwindend klein werden, wenn n ins Unbegrenzte wächst. Ist nun QQ_1P_1P einer der Streifen, und zieht man durch P eine Parallele PR zur X -Achse, so wird dieser Streifen zerlegt in ein Rechteck QQ_1RP mit dem Flächeninhalte $y \cdot \Delta x$ und in das Dreieck PRP_1 , wobei mit Δx die Breite des Streifens bezeichnet ist. Die Summe der Rechtecke QQ_1RP ist daher

$$(7.) \quad F_1 = \sum_{x=a}^{x=b-\Delta x} y \cdot \Delta x = \sum_{x=a}^{x=b-\Delta x} f(x) \cdot \Delta x = \sum_{x=a}^{x=b-\Delta x} F'(x) \cdot \Delta x.$$

Wächst n ins Unbegrenzte, so wird Δx verschwindend klein, und man erhält

$$(8.) \quad \lim F_1 = \lim \sum F'(x) \cdot \Delta x = F,$$

*) Sprich: „ $F(x)$ zwischen den Grenzen a und b “.

weil die Dreiecke PRP_1 verschwindend kleine Größen *höherer* Ordnung werden, die neben den verschwindend kleinen Größen *erster* Ordnung vernachlässigt werden dürfen.

Von der Richtigkeit dieses Resultats kann man sich auch auf folgende Weise überzeugen.

Der Flächeninhalt des Dreiecks PRP_1 (Fig. 4) ist kleiner als der Flächeninhalt eines Rechtecks mit der Grundlinie $PR = \Delta x$ und der Höhe $RP_1 = h_x$, also

$$\Delta PRP_1 < h_x \cdot \Delta x.$$

Dieselbe Ungleichung gilt für die sämtlichen Dreiecke, welche in Figur 4 von den Streifen abgeschnitten sind. Bezeichnet man also die Summe dieser Dreiecke mit $\sum PRP_1$ und die größte unter den Höhen h_x mit h , so wird

$$\sum PRP_1 < \sum h_x \cdot \Delta x < h \sum \Delta x,$$

oder, da $\sum \Delta x$, d. h. die Summe aller Grundlinien gleich A_1B_1 ist,

$$\sum PRP_1 < h \cdot A_1B_1 = h(b - a).$$

Nach Voraussetzung ist die Funktion $f(x)$ für die betrachteten Werte von x stetig und endlich, deshalb werden die Größen h_x , also auch h und Δx zugleich verschwindend klein, folglich auch $\sum PRP_1$.

In Figur 4 steigt die Kurve von A bis B . Das Rechteck QQ_1RP ist deshalb um das Dreieck PRP_1 kleiner als

Fig. 5.





Fig. 6.



der Streifen QQ_1P_1P . Dasselbe gilt für alle anderen Streifen, in welche die Figur zerlegt ist. Fällt dagegen die Kurve von A bis B (vergl. Fig. 5), so sind die Rechtecke um die

kleinen Dreiecke *größer* als die Streifen der Figur. Es können auch (wie in Fig. 6) die Rechtecke teilweise *größer* und teilweise *kleiner* als die Streifen sein. Die in Gleichung (8.) ausgesprochene Schlußfolgerung bleibt aber auch dann noch richtig, weil die Summe der vernachlässigten oder hinzugefügten Dreiecke zugleich mit Δx verschwindend klein wird.

Statt $\lim \sum$ schreibt man S und fügt die Grenzen der Summation, nämlich a und $\lim(b - \Delta x) = b$ unten und oben dem Summenzeichen S , aus welchem das Zeichen \int entstanden ist, hinzu. Dadurch erhält die Gleichung (8.) die Form

$$(8a.) \quad F = \int_a^b y dx = \int_a^b F'(x) dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a),$$

welche mit Gleichung (6.) übereinstimmt.

Bisher war die Voraussetzung festgehalten worden, daß der betrachtete Kurvenbogen *oberhalb* der X -Achse liegt, d. h. es sollte $y = f(x) \geq 0$ sein für alle in Betracht kommenden Werte von x . Die vorstehenden Schlüsse gelten aber in gleicher Weise auch dann noch, wenn der Bogen AB *unterhalb* der X -Achse liegt, wenn also $y = f(x) \leq 0$ ist für die betrachteten Werte von x . In diesem Falle hat aber selbstverständlich

$f(x) \cdot \Delta x = F'(x) \cdot \Delta x$ und deshalb auch $\sum F'(x) \cdot \Delta x$ einen *negativen* Wert.

Es ist auch nicht notwendig, daß $b > a$ ist; setzt man nämlich für Δx *negative* Werte ein, so muß $b < a$ werden.

Bemerkung. *)

Mit Rücksicht auf den elementaren Charakter des Buches wurde in § 1 der Integrationsprozeß als Umkehrung des Differentiationsprozesses eingeführt. Aber eine wissenschaftliche Behandlung darf dabei nicht stehen bleiben, da es möglich ist, den Begriff des bestimmten Integrals so zu fassen, daß er (wenigstens für stetige Funk-

*) Der Anfänger darf diese Bemerkung, wenn ihr Inhalt für ihn zu schwer verständlich sein sollte, übergehen.

tionen $f(x)$) zwar mit der vorstehenden Erklärung übereinstimmt, aber von der geometrischen Deutung unabhängig wird.

Um zu beweisen, daß es in dem Intervalle von a bis b immer eine eindeutige, stetige Funktion $F(x)$ gibt, deren Ableitung in diesem Intervalle der gegebenen eindeutigen und stetigen Funktion $f(x)$ gleich ist, teilt man das Intervall nach einem, für jeden Wert von n vorgeschriebenen Gesetze in n Teile und nennt die Teilwerte

$$a, x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, b. \quad (a < b)$$

Dabei brauchen die Intervalle nicht einander gleich zu sein; aber das Gesetz der Teilung muß so beschaffen sein, daß mit wachsendem n die einzelnen Intervalle immer kleiner und schließlich beliebig klein werden. Aus der Stetigkeit von $f(x)$ ergibt sich dann die Voraussetzung, daß der Unterschied zwischen dem größten Wert G_α und dem kleinsten Wert K_α , den $f(x)$ annimmt, während x das Intervall von $x_{\alpha-1}$ bis x_α durchläuft, kleiner als die beliebig kleine positive Größe ϵ bleibt, wenn man n hinreichend groß und dadurch die sämtlichen Intervalle

$$\delta_\alpha = x_\alpha - x_{\alpha-1} \leq \delta \quad (\alpha = 1, 2, 3 \dots n, \text{ wobei } x_0 = a, x_n = b.)$$

macht, wo δ eine hinreichend kleine Größe ist. Die Summe

$$(9.) \quad S_n = (x_1 - a)f(a) + (x_2 - x_1)f(x_1) + \dots + (b - x_{n-1})f(x_{n-1}) \\ = \delta_1 f(a) + \delta_2 f(x_1) + \dots + \delta_n f(x_{n-1})^*)$$

nähert sich dann, wie sogleich bewiesen werden soll, mit wachsendem n einem bestimmten, endlichen Grenzwerte S . Diesen Grenzwert nennt man „das bestimmte Integral von $f(x)dx$ innerhalb der Grenzen a und b “ und bezeichnet es mit

$$(10.) \quad S = \int_a^b f(x)dx.$$

Gleichzeitig definiert dieser Grenzwert (in Übereinstimmung mit den früheren Ausführungen) den Flächeninhalt der Figur, die von der Kurve $y = f(x)$, den beiden Ordinaten $x = a$, $x = b$ und dem zugehörigen Abschnitt der X -Achse begrenzt wird.

Zum Beweise der Existenz des Grenzwertes S setze man unter Anwendung der oben eingeführten Bezeichnungen

$$(11.) \quad S'_n = K_1 \delta_1 + K_2 \delta_2 + \dots + K_n \delta_n,$$

$$(12.) \quad S''_n = G_1 \delta_1 + G_2 \delta_2 + \dots + G_n \delta_n,$$

dann wird

$$(13.) \quad S'_n \leq S_n \leq S''_n.$$

Jetzt folgt aus den Gleichungen (11.) und (12.)

$$(14.) \quad S''_n - S'_n = (G_1 - K_1)\delta_1 + (G_2 - K_2)\delta_2 + \dots + (G_n - K_n)\delta_n.$$

Nach Voraussetzung wird aber, wenn man n hinreichend groß macht,

*) Die folgenden Schlüsse bleiben auch dann noch richtig, wenn man in Gleichung (9.) die Größen $f(a)$, $f(x_1)$, \dots , $f(x_{n-1})$ mit $f(\xi_1)$, $f(\xi_2)$, \dots , $f(\xi_n)$ vertauscht, wobei ξ_1 , ξ_2 , \dots , ξ_n beliebige Werte von x in den Intervallen a bis x_1 , x_1 bis x_2 , \dots , x_{n-1} bis b sind.

$$G_\alpha - K_\alpha \leq \varepsilon,$$

folglich wird

$$(15.) \quad S''_n - S'_n \leq \varepsilon(\delta_1 + \delta_2 + \dots + \delta_n) = \varepsilon(b - a).$$

Da man hierbei ε für hinreichend große Werte von n beliebig klein machen kann, und da $b - a$ eine endliche Größe ist, so wird

$$(16.) \quad \lim(S''_n - S'_n) = 0;$$

die beiden Summen S'_n und S''_n nähern sich daher demselben Grenzwerte S , folglich nähert sich auch die dazwischen liegende Summe S_n demselben Grenzwerte S . Es wird also

$$(17.) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} S'_n = \lim_{n \rightarrow \infty} S''_n = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S,$$

wobei S eine bestimmte, endliche Größe ist.

Es ist aber noch zu zeigen, daß bei jeder anderen Einteilung in Intervalle, die mit wachsendem n beliebig klein werden, der Grenzübergang denselben Grenzwert S liefert.

Zu diesem Zwecke zerlege man jetzt das Intervall von $x_{\alpha-1}$ bis x_α durch den Teilwert $x_{\alpha(1)}$ in die beiden Teilintervalle $x_{\alpha-1}$ bis $x_{\alpha(1)}$ und $x_{\alpha(1)}$ bis x_α , und bezeichne mit $G_{\alpha(1)}$, $G_{\alpha(2)}$ bezw. die größten, mit $K_{\alpha(1)}$, $K_{\alpha(2)}$ bezw. die kleinsten Werte, welche $f(x)$ in diesen beiden Teilintervallen annimmt, dann wird

$$K_{\alpha(1)} \geq K_\alpha, \quad K_{\alpha(2)} \geq K_\alpha, \quad G_{\alpha(1)} \leq G_\alpha, \quad G_{\alpha(2)} \leq G_\alpha,$$

folglich ist

$$K_{\alpha(1)}(x_{\alpha(1)} - x_{\alpha-1}) + K_{\alpha(2)}(x_\alpha - x_{\alpha(1)}) \geq K_\alpha[(x_{\alpha(1)} - x_{\alpha-1}) + (x_\alpha - x_{\alpha(1)})] \\ = K_\alpha \delta_\alpha,$$

$$G_{\alpha(1)}(x_{\alpha(1)} - x_{\alpha-1}) + G_{\alpha(2)}(x_\alpha - x_{\alpha(1)}) \leq G_\alpha[(x_{\alpha(1)} - x_{\alpha-1}) + (x_\alpha - x_{\alpha(1)})] \\ = G_\alpha \delta_\alpha.$$

Dieselben Schlüsse bleiben richtig, wenn man das Intervall nicht in zwei, sondern in mehrere Teilintervalle zerlegt; d. h. die Summe der an die Stelle von $K_\alpha \delta_\alpha$ tretenden Produkte ist sicher nicht kleiner als $K_\alpha \delta_\alpha$, und ebenso ist die Summe der an die Stelle von $G_\alpha \delta_\alpha$ tretenden Produkte sicher nicht größer als $G_\alpha \delta_\alpha$.

Das, was für das eine Intervall gilt, gilt für alle Intervalle bei weiterer Teilung in Teilintervalle. Geht bei dieser Weiterteilung die Summe

$$S'_n = K_1 \delta_1 + K_2 \delta_2 + \dots + K_n \delta_n$$

über in S'''_n , und die Summe

$$S''_n = G_1 \delta_1 + G_2 \delta_2 + \dots + G_n \delta_n$$

in S''''_n über, so geht also die doppelte Ungleichung (13.) über in

$$(18.) \quad S'_n \leq S'''_n \leq S_n \leq S''''_n \leq S''_n.$$

Hieraus erkennt man, daß sich die Summe S_n demselben Grenzwerte S nähert, auch wenn man die für jedes n ursprünglich angenommenen Intervalle noch weiter in Teilintervalle zerlegt.

Bezeichnet man jetzt bei irgend einer anderen Einteilung in Intervalle die Teilwerte mit

$$a, x'_1, x'_2, \dots, x'_{v-1}, b,$$

so erhält man für $\alpha = 1, 2, \dots, v$ die Intervalle

$$x'_\alpha - x'_{\alpha-1} = \delta'_\alpha,$$

wobei $x'_0 = a$ und $x'_\nu = b$ sein möge. Hier sei

$$(19.) \quad \sum_\nu = (x'_1 - a)f(a) + (x'_2 - x'_1)f(x'_1) + \dots + (x'_\nu - x'_{\nu-1})f(x'_{\nu-1}) \\ = \delta'_1 f(a) + \delta'_2 f(x'_1) + \dots + \delta'_\nu f(x'_{\nu-1}).$$

Bezeichnet man sodann mit G'_α den *größten* und mit K'_α den *kleinsten* Wert, den $f(x)$ annimmt, wenn x das Intervall von $x'_{\alpha-1}$ bis x'_α durchläuft, so sei

$$(20.) \quad \sum'_\nu = K'_1 \delta'_1 + K'_2 \delta'_2 + \dots + K'_\nu \delta'_\nu,$$

$$(21.) \quad \sum''_\nu = G'_1 \delta'_1 + G'_2 \delta'_2 + \dots + G'_\nu \delta'_\nu;$$

dann wird

$$(22.) \quad \sum'_\nu \leq \sum_\nu \leq \sum''_\nu.$$

Um zu zeigen, daß der Grenzwert \mathcal{S} , dem sich bei unbegrenzt wachsendem ν die Summen \mathcal{S}'_ν , \mathcal{S}''_ν und \mathcal{S}_ν nähern, mit dem Grenzwerte S übereinstimmt, zerlege man das ganze Intervall von a bis b so in Intervalle, daß dabei die Teilwerte x_1, x_2, \dots, x_{n-1} und außerdem auch die Teilwerte $x'_1, x'_2, \dots, x'_{\nu-1}$ vorkommen. Man kann diese Einteilung als eine *Weiterteilung* der *ersten*, und ebenso als eine *Weiterteilung* der *zweiten* Zerlegung betrachten. Da aber nach den vorstehenden Ausführungen der Grenzwert S derselbe bleibt, wenn man die ursprünglich angenommenen Intervalle noch weiter in Teilintervalle zerlegt, so wird man in beiden Fällen auf denselben Grenzwert S geführt, was zu beweisen war.

Der Wert von

$$S = \int_a^b f(x) dx$$

ändert sich mit dem Werte von b ; deshalb möge die Summe S mit $H(b)$ bezeichnet werden; es sei also

$$(23.) \quad H(b) = \int_a^b f(x) dx.$$

Bezeichnet man jetzt mit G den *größten* und mit K den *kleinsten* Wert, den $f(x)$ in dem Intervall von a bis b annimmt, so ist

$$K \leq K_a, \quad G \geq G_a,$$

deshalb folgt aus der doppelten Ungleichung (13.)

$$(24.) \quad K(b-a) \leq H(b) \leq G(b-a),$$

oder, wenn man die Größe M durch die Gleichung

$$(25.) \quad H(b) = (b-a)M$$

erklärt,

$$(26.) \quad K \leq M \leq G,$$

d. h. M ist ein Mittelwert zwischen K und G , den die Funktion $f(x)$, weil sie stetig ist, für einen Wert von x zwischen a und b — er heiße ξ — auch wirklich annimmt. Dabei kann man bekanntlich ξ in der Form

$$\xi = a + \Theta(b - a) \quad (0 \leq \Theta \leq +1)$$

schreiben. Gleichung (25.) geht daher über in

$$(27.) \quad H(b) = \int_a^b f(x) dx = (b - a) f[a + \Theta(b - a)],$$

eine Gleichung, von der sogleich Gebrauch gemacht werden wird.

Nach Gleichung (9.) ist nämlich

$$(28.) \quad S_n = \delta_1 f(a) + \delta_2 f(x_1) + \dots + \delta_n f(x_{n-1}),$$

und wenn man jetzt das Intervall über $b = x_n$ hinaus erweitert, indem man n mit $n + m$ vertauscht,

$$(29.) \quad S_{n+m} = \delta_1 f(a) + \delta_2 f(x_1) + \dots + \delta_n f(x_{n-1}) + \delta_{n+1} f(x_n) \\ + \delta_{n+2} f(x_{n+1}) + \dots + \delta_{n+m} f(x_{n+m-1}),$$

also

$$(30.) \quad S_{n+m} - S_n = \delta_{n+1} f(x_n) + \delta_{n+2} f(x_{n+1}) + \dots + \delta_{n+m} f(x_{n+m-1}).$$

Setzt man hierbei wieder $x_n = b$ und $x_{n+m} = c$, so gehen bei unbegrenzt wachsenden Werten von n und m die Gleichungen (28.), (29.) und (30.) über in

$$(28a.) \quad \lim S_n = H(b) = \int_a^b f(x) dx,$$

$$(29a.) \quad \lim S_{n+m} = H(c) = \int_a^c f(x) dx,$$

$$(30a.) \quad \lim S_{n+m} - \lim S_n = H(c) - H(b) = \int_a^c f(x) dx - \int_a^b f(x) dx = \int_b^c f(x) dx.$$

Statt des konstanten Wertes b kann man in Gleichung (23.) den veränderlichen Wert x einführen und erhält dadurch

$$(31.) \quad H(x) = \int_a^x f(x) dx.$$

Es ist dann noch zu zeigen, daß $H(x)$ eine stetige Funktion der oberen Grenze x ist, daß ihre Ableitung existiert und mit $f(x)$ übereinstimmt, daß also

$$\frac{dH(x)}{dx} = f(x)$$

wird. Beides ergibt sich unmittelbar aus den vorstehenden Untersuchungen, denn setzt man in Gleichung (30a.) $b = x$ und $c = x + \Delta x$, so erhält man

$$(32.) \quad H(x + \Delta x) - H(x) = \int_x^{x+\Delta x} f(x) dx.$$

Vertauscht man schließlich in Gleichung (27.) a mit x und b mit $x + \Delta x$, also $b - a$ mit Δx , so erhält man

$$(33.) \quad \int_x^{x+\Delta x} f(x) dx = \Delta x \cdot f(x + \Theta \cdot \Delta x),$$

oder

$$(34.) \quad H(x + \Delta x) - H(x) = \Delta x \cdot f(x + \theta \cdot \Delta x).$$

Daraus folgt *erstens*, daß $|H(x + \Delta x) - H(x)|$ kleiner gemacht werden kann als die beliebig kleine Größe ε , wenn man

$$\Delta x < \frac{\varepsilon}{|f(x + \theta \cdot \Delta x)|}$$

macht, daß also $H(x)$ eine *stetige* Funktion von x ist, und *zweitens* wird

$$(35.) \quad \frac{H(x + \Delta x) - H(x)}{\Delta x} = f(x + \theta \cdot \Delta x),$$

also

$$(36.) \quad \frac{dH(x)}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{H(x + \Delta x) - H(x)}{\Delta x} = f(x),$$

d. h. die *integrierte Funktion* $f(x)$ ist in der Tat die *Ableitung des Integrals* $H(x)$ inbezug auf die obere Grenze. Dabei ist unter Benutzung der früheren Bezeichnung

$$H(x) = F(x) - F(a), \quad \text{folglich wird auch} \quad \frac{dF(x)}{dx} = f(x).$$

Aus den Gleichungen

$$\int_a^b f'(x) dx = F(b) - F(a) \quad \text{und} \quad \int_b^a f'(x) dx = F(a) - F(b)$$

folgt

$$(37.) \quad \int_a^b f'(x) dx = - \int_b^a f'(x) dx,$$

oder in Worten:

Satz 2. Man darf die obere und die untere Grenze eines bestimmten Integrals miteinander vertauschen, wenn man gleichzeitig das Vorzeichen des Integrals umkehrt.

Hierbei ist in dem einen Integral die untere Grenze größer als die obere und infolgedessen dx negativ.

Aus den Gleichungen

$$\int_a^c f'(x) dx = F(c) - F(a) \quad \text{und} \quad \int_c^b f'(x) dx = F(b) - F(c)$$

folgt durch Addition

$$(38.) \quad \int_a^c f'(x) dx + \int_c^b f'(x) dx = F(b) - F(a) = \int_a^b f'(x) dx,$$

oder in Worten:

Satz 3. Man kann ein bestimmtes Integral in zwei andere zerlegen, indem man zwischen den Grenzen a und b eine beliebige Größe c einschaltet und das erste Integral


zwischen den Grenzen a und c , das zweite Integral zwischen den Grenzen c und b berechnet.

Am anschaulichsten wird der Sinn des Satzes durch die geometrische Deutung des bestimmten Integrals. Ist nämlich

$$y = f(x) = F'(x)$$

die Gleichung einer Kurve, so wird

Fig. 7.




$$F = \int_a^b y dx = \int_a^b F'(x) dx$$

der Flächeninhalt der ebenen Figur A_1B_1BA . Liegt nun c zwischen a und b , so wird die Figur durch die Gerade C_1C , welche im Abstände c parallel zur Y -Achse gezogen ist (vergl. Fig. 7) in zwei Teile zerlegt, nämlich in

$$A_1C_1CA = \int_a^c y dx \quad \text{und} \quad C_1B_1BC = \int_c^b y dx.$$

Der Satz bleibt aber auch dann noch richtig, wenn c

Fig. 8.



nicht zwischen a und b liegt. Es sei zunächst (vergl. Fig. 8) $a < b < c$, so ist unter Beibehaltung der bisherigen Bezeichnungen

$$A_1C_1CA = \int_a^c y dx,$$

$$B_1C_1CB = \int_b^c y dx,$$

also

$$A_1B_1BA = A_1C_1CA - B_1C_1CB = \int_a^c y dx - \int_b^c y dx,$$

oder nach Satz 2

$$A_1B_1BA = \int_a^b y dx = \int_a^c y dx + \int_c^b y dx.$$

Ist endlich (vergl. Fig. 9)
 $c < a < b$, so ist unter Beibehaltung der bisherigen Bezeichnungen

$$C_1 B_1 B C = \int_c^b y dx,$$

$$C_1 A_1 A C = \int_c^a y dx,$$

also

$$A_1 B_1 B A = C_1 B_1 B C - C_1 A_1 A C = \int_c^b y dx - \int_c^a y dx,$$

oder mit Rücksicht auf Satz 2

$$\int_a^b y dx = \int_a^c y dx + \int_c^b y dx.$$

Der Satz läßt sich noch in der Weise verallgemeinern, daß man zwischen den Grenzen a und b nicht *eine*, sondern *beliebig viele* Grenzen einschaltet. Dadurch erhält man z. B.:

$$(39.) \quad \int_a^b y dx = \int_a^c y dx + \int_c^d y dx + \int_d^e y dx + \int_e^b y dx,$$

wobei c , d und e ganz beliebige Zahlen sind.

Voraussetzung ist dabei, daß die Funktion $y = F'(x)$ in den einzelnen Intervallen a bis c , c bis d , d bis e , e bis b und in dem Intervall von a bis b eindeutig und stetig ist.

Bei der geometrischen Deutung des bestimmten Integrals war bisher vorausgesetzt worden, daß der Bogen AB der Kurve, welche der Gleichung

$y = F'(x) = f(x)$
 entspricht, entweder seiner ganzen Länge nach oberhalb oder seiner ganzen Länge nach unterhalb der X -Achse liegt. Jetzt kann man aber die geometrische Deutung auch





Fig. 10.



auf den Fall übertragen, wo der Bogen AB teilweise *über*, teilweise *unter* der X -Achse liegt. Schneidet der Bogen die X -Achse z. B. in den Punkten C und D (Fig. 10), und setzt man

$$OA_1 = a, \quad OC = c, \quad OD = d, \quad OB_1 = b,$$

so wird

$$(40.) \quad \int_a^b y dx = \int_a^c y dx + \int_c^d y dx + \int_d^b y dx,$$

wobei für die einzelnen Integrale auf der rechten Seite dieser Gleichung die frühere Voraussetzung gilt. Wie oben ausgeführt worden ist, haben dabei das erste und dritte Integral einen *positiven* Wert, das zweite Integral dagegen hat einen *negativen* Wert.

§ 3.

Einige Hilfssätze für die Ausführung der Integration.

(Vergl. die Formel-Tabelle Nr. 7 und 8.)

Satz 1. *Ist die Differential-Funktion unter dem Integralzeichen mit einem konstanten Faktor multipliziert, so darf man diesen konstanten Faktor vor das Integralzeichen setzen, d. h. es ist*

$$\int A F'(x) dx = A \int F'(x) dx.$$

Beweis. Es ist

$$(1.) \quad d[AF(x) + C] = AF'(x) dx,$$

hieraus folgt

$$(2.) \quad \int AF'(x) dx = AF(x) + C.$$

Ferner ist

$$(3.) \quad \int F'(x) dx = F(x) + C_1,$$

also

$$(4.) \quad A \int F'(x) dx = AF(x) + A \cdot C_1.$$

Da nun die Werte der Integrations-Konstanten C und AC_1 ganz beliebig sind, so darf man $A \cdot C_1 = C$ machen und erhält demnach aus den Gleichungen (2.) und (4.).

$$(5.) \quad \int AF'(x) dx = A \int F'(x) dx.$$

Satz 2. *Das Integral einer Summe von Differential-Funktionen ist gleich der Summe der Integrale dieser einzelnen Differential-Funktionen; es ist also*

$$\int [F'(x) + G'(x)] dx = \int F'(x) dx + \int G'(x) dx.$$

Beweis. Weil

$$(6.) \quad d[F(x) + G(x) + C] = F'(x)dx + G'(x)dx = [F'(x) + G'(x)]dx,$$

so ist

$$(7.) \quad \int [F'(x) + G'(x)] dx = F(x) + G(x) + C.$$

Ferner ist

$$(8.) \quad \int F'(x) dx = F(x) + C_1,$$

$$(9.) \quad \int G'(x) dx = G(x) + C_2.$$

Durch Addition der Gleichungen (8.) und (9.) erhält man

$$(10.) \quad \int F'(x) dx + \int G'(x) dx = F(x) + G(x) + C_1 + C_2.$$

Die Integrations-Konstanten C, C_1, C_2 haben auch hier ganz beliebige Werte, so daß man $C_1 + C_2 = C$ machen darf. Man erhält demnach aus den Gleichungen (7.) und (10.)

$$(11.) \quad \int [F'(x) + G'(x)] dx = \int F'(x) dx + \int G'(x) dx.$$

Dieser Satz läßt sich unmittelbar erweitern auf Summen von beliebig vielen Gliedern, so daß man erhält

$$(12.) \quad \begin{aligned} \int [F'(x) + G'(x) + H'(x) + \dots] dx \\ = \int F'(x) dx + \int G'(x) dx + \int H'(x) dx + \dots; \end{aligned}$$

sodann läßt er sich auch übertragen auf das Integral einer Differenz, so daß man erhält

$$(13.) \quad \int [F'(x) - G'(x)] dx = \int F'(x) dx - \int G'(x) dx.$$

§ 4.

Unmittelbare Integration einiger Funktionen.

(Vergl. die Formel-Tabelle Nr. 9 bis 25 a.)

Aus der Erklärung des Integrals, nämlich aus der Formel

$$(1.) \quad \int F'(x) dx = F(x) + C,$$

ergibt sich ganz von selbst, wie man durch Umkehrung von

Formeln aus der Differential-Rechnung eine Anzahl von Formeln aus der Integral-Rechnung finden kann. Denn nimmt man die Funktion $F(x)$ beliebig an und bildet $F'(x)$, so erhält man durch Einsetzen in Gleichung (1.) sofort

$$\int F'(x) dx.$$

Setzt man z. B. $F(x) = \frac{x^{m+1}}{m+1}$, so erhält man

$$(2.) \quad \int x^m dx = \frac{x^{m+1}}{m+1} + C.$$

Hierbei darf m jeden beliebigen *positiven* oder *negativen*, *ganzzahligen* oder *gebrochenen* Wert haben. Eine Ausnahme bildet nur der Wert $m = -1$, von welchem nachher noch ausführlich die Rede sein wird.

Besonders hervorgehoben sei noch der Fall $m = 0$, nämlich

$$(2a.) \quad \int dx = x + C,$$

ein Resultat, daß sich auch aus Formel Nr. 1 der Tabelle ergibt.

Mit Hilfe von Gleichung (2.) ist jetzt die Integration *jeder ganzen rationalen* Funktion ausführbar, denn nach den Sätzen des vorhergehenden Paragraphen wird

$$\begin{aligned} & \int (ax^n + a_1x^{n-1} + a_2x^{n-2} + \dots + a_{n-1}x + a_n) dx \\ &= a \int x^n dx + a_1 \int x^{n-1} dx + a_2 \int x^{n-2} dx + \dots + a_{n-1} \int x dx + a_n \int dx \\ &= a \frac{x^{n+1}}{n+1} + a_1 \frac{x^n}{n} + a_2 \frac{x^{n-1}}{n-1} + \dots + a_{n-1} \frac{x^2}{2} + a_n x + C. \end{aligned}$$

Ferner findet man in der angegebenen Weise

$$(3.) \quad \int e^x dx = e^x + C.$$

$$(3a.) \quad \int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C.$$

$$(4.) \quad \int \frac{dx}{x} = \ln x + C.$$

Diese Formel erledigt den Fall, der als Ausnahme von Gleichung (2.) zu betrachten war. Denn Gleichung (2.) würde für $m = -1$ die unbrauchbaren Formeln

$$(5.) \quad \int x^{-1} dx = \int \frac{dx}{x} = \frac{x^{-1+1}}{-1+1} + C,$$

oder

$$(6.) \quad \int \frac{dx}{x} = \frac{1}{0} + C = \infty + C$$

liefern. Man kann aber die Gleichung (4.) aus Gleichung (2.) durch einen Grenzübergang ableiten. Setzt man nämlich in Gleichung (2.)

$$(7.) \quad C = -\frac{1}{m+1} + C',$$

so erhält man

$$(8.) \quad \int x^m dx = \frac{x^{m+1} - 1}{m+1} + C'.$$

Für $\lim m = -1$ wird

$$(9.) \quad \lim \frac{x^{m+1} - 1}{m+1} = \frac{0}{0},$$

und wenn man Zähler und Nenner einzeln nach m differenziert (vergl. D.-R. § 66),

$$(10.) \quad \lim \frac{x^{m+1} - 1}{m+1} = \lim \frac{x^{m+1} \ln x}{1} = \ln x,$$

also in Übereinstimmung mit Gleichung (4.)

$$(11.) \quad \int \frac{dx}{x} = \ln x + C'.$$

$$(12.) \quad \int \cos x dx = \sin x + C.$$

$$(13.) \quad \int \sin x dx = -\cos x + C.$$

$$(14.) \quad \int \frac{dx}{\cos^2 x} = \operatorname{tg} x + C.$$

$$(15.) \quad \int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\operatorname{ctg} x + C.$$

$$(16.) \quad \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x + C = -\arccos x + C'.$$

$$(17.) \quad \int \frac{dx}{1+x^2} = \operatorname{arctg} x + C = -\operatorname{arctg} x + C'.$$

$$(18.) \quad \int \operatorname{Cof} x dx = \operatorname{Sin} x + C.$$

$$(19.) \quad \int \operatorname{Sin} x dx = \operatorname{Cof} x + C.$$

$$(20.) \quad \int \frac{dx}{\cos^2 x} = \operatorname{Tg} x + C.$$

$$(21.) \quad \int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\operatorname{Ctg} x + C.$$

$$(22.) \quad \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + 1}} = \operatorname{Ar} \sin x + C = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) + C.$$

$$(23.) \quad \pm \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - 1}} = \operatorname{Ar} \cos x + C = \ln(x \pm \sqrt{x^2 - 1}) + C \\ = \pm \ln(x + \sqrt{x^2 - 1}) + C^*.$$

$$(24.) \quad \int \frac{dx}{1 - x^2} = \operatorname{Ar} \operatorname{Tg} x + C = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1+x}{1-x} \right) + C.$$

$$(25.) \quad \int \frac{dx}{1 - x^2} = \operatorname{Ar} \operatorname{Ctg} x + C' = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{x+1}{x-1} \right) + C'.$$

Es erscheint auffallend, daß man für $\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$ zwei Werte, nämlich

$$\arcsin x + C \quad \text{und} \quad -\arccos x + C'$$

findet. Die Richtigkeit beider Resultate kann man zunächst durch Differentiation prüfen, wobei sich

$$d(\arcsin x + C) = \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$$

und

$$d(-\arccos x + C') = \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$$

ergibt. Nach Satz 3 in § 1 können sich daher die Funktionen $\arcsin x$ und $-\arccos x$ nur durch eine Konstante voneinander unterscheiden. In der Tat, ist in einem Kreise mit dem Halbmesser 1

*) Man kann sich leicht davon überzeugen, daß

$$\ln(x - \sqrt{x^2 - 1}) = -\ln(x + \sqrt{x^2 - 1})$$

wird, denn es ist

$$x - \sqrt{x^2 - 1} = \frac{(x - \sqrt{x^2 - 1})(x + \sqrt{x^2 - 1})}{x + \sqrt{x^2 - 1}} = \frac{1}{x + \sqrt{x^2 - 1}},$$

folglich ist

$$\ln(x - \sqrt{x^2 - 1}) = \ln \left(\frac{1}{x + \sqrt{x^2 - 1}} \right) = -\ln(x + \sqrt{x^2 - 1}).$$

Weil $\cos(-u) = \cos(+u)$ wird, kann man den Wert von $\operatorname{Ar} \cos x$ mit positivem und mit negativem Vorzeichen nehmen. (Vergl. D.-R., Seite 139 und 146.)

$$OF = ED = x$$

(vergl. Fig. 11), so wird

$$(26.) \quad CD = \arcsin x, \quad DA = \arccos x,$$

also

$$(27.) \quad \arcsin x + \arccos x = CD + DA = \frac{\pi}{2},$$

oder

$$(28.) \quad \arcsin x = \frac{\pi}{2} - \arccos x.$$

Dies kann man auch unabhängig von der Figur zeigen, indem man

$$(29.) \quad \arcsin x = t, \quad \text{also} \quad x = \sin t$$

setzt; dann wird

$$(30.) \quad x = \cos\left(\frac{\pi}{2} - t\right), \quad \text{oder} \quad \arccos x = \frac{\pi}{2} - t,$$

folglich ist

$$(31.) \quad t = \arcsin x = \frac{\pi}{2} - \arccos x.$$

Ebenso findet man

$$(32.) \quad \arctg x = \frac{\pi}{2} - \operatorname{arctg} x,$$

wodurch man erkennt, daß Gleichung (17.) richtig ist.

Schließlich erkennt man aus den Gleichungen

$$(33.) \quad \operatorname{Ar} \mathfrak{Tg} x = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1+x}{1-x} \right),$$

$$(34.) \quad \operatorname{Ar} \mathfrak{Ctg} x = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{x+1}{x-1} \right) = \frac{1}{2} \left[\ln \left(\frac{1+x}{1-x} \right) - \ln(-1) \right]$$

daß

$$(35.) \quad \operatorname{Ar} \mathfrak{Tg} x = \operatorname{Ar} \mathfrak{Ctg} x + \frac{1}{2} \ln(-1)$$


wird, daß also die Gleichungen (24.) und (25.) richtig sind.

Beschränkt man aber die Untersuchung auf reelle Größen, so müssen die Größen, deren Logarithmen auftreten, positiv sein; man muß also schreiben

$$(36.) \quad \int \frac{dx}{1-x^2} = \operatorname{Ar} \mathfrak{Tg} x + C, \quad \text{wenn} \quad |x| < +1,$$

$$(37.) \quad \int \frac{dx}{1-x^2} = \operatorname{Ar} \mathfrak{Ctg} x + C', \quad \text{wenn} \quad |x| > +1.$$

Fig. 11.



§ 5.

Übungs-Aufgaben.

Aufgabe 1. Man soll $x^3 dx$ integrieren.

Auflösung. Setzt man in Formel Nr. 9 der Tabelle $m = 3$, so folgt ohne weiteres

$$\int x^3 dx = \frac{x^{3+1}}{3+1} + C = \frac{x^4}{4} + C.$$

Aufgabe 2. Man soll $7x^3 dx$ integrieren.

Auflösung. Nach Formel Nr. 7 und 9 der Tabelle erhält man

$$\int 7x^3 dx = 7 \int x^3 dx = 7 \frac{x^4}{4} + C.$$

Aufgabe 3. Man soll $\sqrt[3]{x} dx$ integrieren.

Auflösung. Es ist

$$\sqrt[3]{x} = x^{\frac{1}{3}};$$

hieraus ergibt sich, daß

$$\int \sqrt[3]{x} dx = \int x^{\frac{1}{3}} dx = \frac{x^{\frac{1}{3}+1}}{\frac{1}{3}+1} + C = \frac{x^{\frac{4}{3}}}{\frac{4}{3}} + C,$$

oder

$$\int \sqrt[3]{x} dx = \frac{3}{4} \sqrt[3]{x^4} + C.$$

Aufgabe 4. Man soll folgende Differential-Funktionen integrieren:

$$\frac{dx}{x^3}, \quad \sqrt[3]{x^5} dx, \quad \frac{dx}{\sqrt[3]{x^5}}, \quad 4\sqrt[3]{x} dx, \quad \frac{4dx}{\sqrt[3]{x}}.$$

Auflösung. Es wird

$$\text{I. } \int \frac{dx}{x^3} = \int x^{-3} dx = \frac{x^{-3+1}}{-3+1} + C = \frac{x^{-2}}{-2} + C = -\frac{1}{2x^2} + C.$$

$$\text{II. } \int \sqrt[3]{x^5} dx = \int x^{\frac{5}{3}} dx = \frac{x^{\frac{5}{3}+1}}{\frac{5}{3}+1} + C = \frac{x^{\frac{8}{3}}}{\frac{8}{3}} + C = \frac{3}{8} \sqrt[3]{x^8} + C.$$

$$\text{III. } \int \frac{dx}{\sqrt[3]{x^5}} = \int x^{-\frac{5}{3}} dx = \frac{x^{-\frac{5}{3}+1}}{-\frac{5}{3}+1} + C = \frac{x^{-\frac{2}{3}}}{-\frac{2}{3}} + C,$$

oder

$$\int \frac{dx}{\sqrt[3]{x^5}} = -\frac{3}{2\sqrt[3]{x^2}} + C.$$

$$\text{IV. } \int 4\sqrt[3]{x} dx = 4 \int \sqrt[3]{x} dx = 4 \int x^{\frac{1}{3}} dx = 4 \frac{x^{\frac{1}{3}+1}}{\frac{1}{3}+1} + C,$$

$$\int 4\sqrt[3]{x} dx = 4 \frac{x^{\frac{4}{3}}}{\frac{4}{3}} + C = 3\sqrt[3]{x^4} + C.$$

$$\text{V. } \int \frac{4}{\sqrt[3]{x}} dx = 4 \int x^{-\frac{1}{3}} dx = 4 \frac{x^{-\frac{1}{3}+1}}{-\frac{1}{3}+1} + C = 4 \frac{x^{\frac{2}{3}}}{\frac{2}{3}} + C,$$

$$\int \frac{4}{\sqrt[3]{x}} dx = 4 \cdot \frac{3}{2} \sqrt[3]{x^2} + C = 6\sqrt[3]{x^2} + C.$$

Aufgabe 5. Man soll die Differential-Funktion

$$\left(x^4 + 7\sqrt[2]{x} - \frac{11}{\sqrt[3]{x^5}} + \frac{5}{x^6}\right) dx$$

integrieren.

Auflösung. Nach Formel Nr. 8 der Tabelle ergibt sich

$$\begin{aligned} \int \left(x^4 + 7\sqrt[2]{x} - \frac{11}{\sqrt[3]{x^5}} + \frac{5}{x^6}\right) dx \\ = \int x^4 dx + \int 7\sqrt[2]{x} dx - \int \frac{11}{\sqrt[3]{x^5}} dx + \int \frac{5}{x^6} dx \\ = \int x^4 dx + 7 \int x^{\frac{1}{2}} dx - 11 \int x^{-\frac{5}{3}} dx + 5 \int x^{-6} dx. \end{aligned}$$

Wenn man die Integrationen, welche auf der rechten Seite dieser Gleichung angedeutet sind, nach Formel Nr. 9 der Tabelle ausführt und dabei die vier auftretenden Integrations-Konstanten in eine einzige Konstante zusammenfaßt, so findet man

$$\begin{aligned} \int \left(x^4 + 7\sqrt[2]{x} - \frac{11}{\sqrt[3]{x^5}} + \frac{5}{x^6}\right) dx \\ = \frac{x^{4+1}}{4+1} + 7 \frac{x^{\frac{1}{2}+1}}{\frac{1}{2}+1} - 11 \frac{x^{-\frac{5}{3}+1}}{-\frac{5}{3}+1} + 5 \frac{x^{-6+1}}{-6+1} + C \\ = \frac{x^5}{5} + 7 \frac{x^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} - 11 \frac{x^{-\frac{2}{3}}}{-\frac{2}{3}} + 5 \frac{x^{-5}}{-5} + C \\ = \frac{x^5}{5} + \frac{14}{3} \sqrt[2]{x^3} + \frac{33}{2\sqrt[3]{x^2}} - \frac{1}{x^5} + C. \end{aligned}$$

Aufgabe 6. Man soll den Ausdruck

$$\int \left(\frac{x^3}{4} - 7\sqrt[5]{x^9} + \frac{4}{7}x^4 - \frac{4}{3x^2} \right) dx$$

berechnen.

Auflösung. Man erhält zunächst

$$\begin{aligned} & \int \left(\frac{x^3}{4} - 7\sqrt[5]{x^9} + \frac{4}{7}x^4 - \frac{4}{3x^2} \right) dx \\ &= \frac{1}{4} \int x^3 dx - 7 \int x^{\frac{9}{5}} dx + \frac{4}{7} \int x^4 dx - \frac{4}{3} \int x^{-2} dx \\ &= \frac{1}{4} \frac{x^{3+1}}{3+1} - 7 \frac{x^{\frac{9}{5}+1}}{\frac{9}{5}+1} + \frac{4}{7} \frac{x^{4+1}}{4+1} - \frac{4}{3} \frac{x^{-2+1}}{-2+1} + C. \end{aligned}$$

Dies gibt

$$\int \left(\frac{x^3}{4} - 7\sqrt[5]{x^9} + \frac{4}{7}x^4 - \frac{4}{3x^2} \right) dx = \frac{x^4}{16} - \frac{5}{2}\sqrt[5]{x^{14}} + \frac{4}{35}x^5 + \frac{4}{3x} + C.$$

Aufgabe 7. Man soll den Ausdruck

$$\int (a \sin x + b \cos x + ce^x) dx$$

berechnen.

Auflösung. Durch Anwendung der Formeln Nr. 14, 13 und 11 der Tabelle erhält man

$$\int (a \sin x + b \cos x + ce^x) dx = -a \cos x + b \sin x + ce^x + C.$$

Aufgabe 8. Man soll den Ausdruck

$$\int \left(ma^x dx + n \frac{dx}{x} + p \frac{dx}{\cos^2 x} \right)$$

berechnen.

Auflösung. Durch Anwendung der Formeln Nr. 11, 12 und 15 der Tabelle erhält man

$$\int \left(ma^x dx + n \frac{dx}{x} + p \frac{dx}{\cos^2 x} \right) = m \frac{a^x}{\ln a} + n \ln x + p \operatorname{tg} x + C.$$

Aufgabe 9. Man soll den Ausdruck

$$\int \left(\frac{dx}{1+x^2} + a \frac{dx}{\sin^2 x} + \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} \right)$$

berechnen.

Auflösung. Durch Anwendung der Formeln Nr. 18, 22 und 17 der Tabelle erhält man

$$\int \left(\frac{dx}{1+x^2} + a \frac{dx}{\sin^2 x} + \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} \right) = \arctg x - a \operatorname{Ctg} x + \arcsin x + C.$$

$$= -\operatorname{arccotg} x - a \operatorname{Ctg} x - \arccos x + C'.$$

§ 6.

Allgemeine Bemerkungen.

In der Regel wird bei Anwendung der Hauptformel

$$(1.) \quad \int F'(x) dx = F(x) + C$$

nicht die Funktion $F(x)$ bekannt sein, sondern nur ihre Ableitung

$$(2.) \quad F'(x) = f(x).$$

Dann wird man in den meisten Fällen $F(x)$ nicht unmittelbar angeben können; man wird vielmehr, wenn eine Lösung der Aufgabe mit Hilfe elementarer Funktionen überhaupt möglich ist, zur Ermittlung von $F(x)$ Kunstgriffe anwenden, von denen zunächst die folgenden erläutert werden mögen:

- 1.) *Integration durch Substitution,*
 - 2.) *Integration durch Zerlegung,*
 - 3.) *partielle Integration.*
-

II. Abschnitt.

Integration durch Substitution.

§ 7.

Erklärung der Substitutions-Methode.

(Vergl. die Formel-Tabelle Nr. 26.)

Häufig kann man das vorgelegte Integral auf ein bekanntes zurückführen, indem man statt der ursprünglichen Integrations-Veränderlichen x durch die Gleichungen

$$(1.) \quad x = \varphi(t), \quad dx = \varphi'(t)dt$$

eine andere Veränderliche t als *neue Integrations-Veränderliche* einführt. Die gesuchte Funktion $F(x)$ geht dadurch über in

$$(2.) \quad F(x) = F[\varphi(t)] = G(t),$$

d. h. in eine *Funktion von einer Funktion*, für welche nach D.-R. Formel Nr. 36 der Tabelle

$$(3.) \quad \frac{dG(t)}{dt} = G'(t) = \frac{dF(x)}{dt} = \frac{dF(x)}{dx} \cdot \frac{dx}{dt} = F'(x)\varphi'(t)$$

wird. Deshalb findet man die gesuchte Funktion $F(x) = G(t)$ aus der Gleichung

$$(4.) \quad \int f(x)dx = F(x) = G(t) = \int G'(t)dt = \int f[\varphi(t)] \cdot \varphi'(t)dt.$$

In vielen Fällen wird man die Funktion $\varphi(t)$ passend so wählen können, daß sich die Funktion $G(t)$ leichter ermitteln läßt als die Funktion $F(x)$. Drückt man dann in dem gefundenen Resultate die Größe t , der Gleichung (1.) entsprechend, durch x aus, so ist die Integration vollzogen.

Dieses Verfahren, welches man „*Integration durch Substitution*“ nennt, wird am besten durch Beispiele erläutert.

§ 8.

Beispiele für die Substitutions-Methode.

(Vergl. die Formel-Tabelle Nr. 27 bis 30.)

Aufgabe 1. $\int \frac{dx}{x+a} = ?$

Auflösung. Setzt man

(1.) $x + a = t$, also $x = t - a$, $dx = dt$,
so wird nach Formel Nr. 12 der Tabelle

(2.) $\int \frac{dx}{x+a} = \int \frac{dt}{t} = \ln t = \ln(x+a)^*).$

In ähnlicher Weise findet man

(3.) $\int \frac{dx}{x-a} = \ln(x-a).$

Aufgabe 2. $\int \cos(x+a) dx = ?$

Auflösung. Durch dieselbe Substitution wie bei Aufgabe 1 findet man nach Formel Nr. 13 der Tabelle

(4.) $\int \cos(x+a) dx = \sin(x+a).$

Aufgabe 3. $\int \sin(ax+b) dx = ?$

Auflösung. Setzt man

(5.) $ax + b = t$, also $x = \frac{t-b}{a}$, $dx = \frac{dt}{a}$,

so erhält man nach Formel Nr. 14 der Tabelle

(6.) $\int \sin(ax+b) dx = \frac{1}{a} \int \sin t dt = -\frac{1}{a} \cos t = -\frac{1}{a} \cos(ax+b).$

Aufgabe 4. $\int \frac{dx}{\cos^2(3x-4)} = ?$

Auflösung. Indem man

(7.) $3x-4 = t$, also $3dx = dt$

setzt, erhält man nach Formel Nr. 15 der Tabelle

(8.) $\int \frac{dx}{\cos^2(3x-4)} = \frac{1}{3} \int \frac{dt}{\cos^2 t} = \frac{1}{3} \operatorname{tg} t = \frac{1}{3} \operatorname{tg}(3x-4).$

*) Die Integrations-Konstante möge hier und bei den folgenden Aufgaben der Kürze wegen fortgelassen werden.

Aufgabe 5. $\int \cos\left(\frac{x}{2}\right) dx = ?$

Auflösung. Indem man

(9.) $x = 2t, \text{ also } dx = 2dt$

setzt, erhält man

(10.) $\int \cos\left(\frac{x}{2}\right) dx = 2 \int \cos t dt = 2 \sin t = 2 \sin\left(\frac{x}{2}\right).$

In ähnlicher Weise gelangt man zu den folgenden Resultaten:

(11.) $\int e^{ax+b} dx = \frac{1}{a} e^{ax+b} \cdot d(ax+b) = \frac{1}{a} e^{ax+b}.$

(12.) $\int e^{\frac{x}{a}} dx = a \int e^{\frac{x}{a}} d\left(\frac{x}{a}\right) = a e^{\frac{x}{a}}.$

(13.) $\int e^{-\frac{x}{a}} dx = -a \int e^{-\frac{x}{a}} d\left(-\frac{x}{a}\right) = -a e^{-\frac{x}{a}}.$

(14.) $\int \cos\left(\frac{x}{a}\right) dx = a \sin\left(\frac{x}{a}\right).$

(15.) $\int \sin\left(\frac{x}{a}\right) dx = -a \cos\left(\frac{x}{a}\right).$

(16.) $\int \frac{dx}{\sin^2\left(\frac{x}{n}\right)} = n \int \frac{d\left(\frac{x}{n}\right)}{\sin^2\left(\frac{x}{n}\right)} = -n \operatorname{ctg}\left(\frac{x}{n}\right).$

(17.) $\int \frac{dx}{1+(ax+b)^2} = \frac{1}{a} \int \frac{d(ax+b)}{1+(ax+b)^2} = \frac{1}{a} \operatorname{arctg}(ax+b).$

(18.) $\int (ax+b)^3 dx = \frac{1}{a} \int (ax+b)^3 d(ax+b) = \frac{(ax+b)^4}{4a}.$

(19.) $\int \sqrt[5]{(ax+b)^3} dx = \frac{1}{a} \int (ax+b)^{\frac{3}{5}} d(ax+b) = \frac{5 \sqrt[5]{(ax+b)^8}}{8a}.$

(20.) $\int \frac{dx}{\sqrt[7]{(ax+b)^4}} = \frac{1}{a} \int (ax+b)^{-\frac{4}{7}} d(ax+b) = \frac{7 \sqrt[7]{(ax+b)^3}}{3a}.$

Aufgabe 6.

$\int \frac{dx}{a^2 + x^2} = ?$

Auflösung. Setzt man

$$(21.) \quad x = at, \quad \text{also} \quad dx = a dt, \quad t = \frac{x}{a},$$

so erhält man nach Formel Nr. 18 der Tabelle

$$(22.) \quad \int \frac{dx}{a^2 + x^2} = \int \frac{a dt}{a^2 + a^2 t^2} = \frac{1}{a} \int \frac{dt}{1 + t^2} = \frac{1}{a} \operatorname{arctg} t = \frac{1}{a} \operatorname{arctg} \left(\frac{x}{a} \right).$$

Aufgabe 7. $\int \frac{dx}{x^2 - a^2} = ?$

Auflösung. Durch dieselbe Substitution wie bei der vorhergehenden Aufgabe findet man mit Rücksicht auf die Formeln Nr. 25 und 25a der Tabelle

$$(23.) \quad \int \frac{dx}{x^2 - a^2} = \frac{1}{a} \int \frac{dt}{t^2 - 1} = -\frac{1}{a} \operatorname{Ar} \operatorname{Tg} t$$

$$= -\frac{1}{a} \operatorname{Ar} \operatorname{Tg} \left(\frac{x}{a} \right) = \frac{1}{2a} \ln \left(\frac{a-x}{a+x} \right), \quad \text{wenn } |x| < a,$$

oder

$$(24.) \quad \int \frac{dx}{x^2 - a^2} = \frac{1}{a} \int \frac{dt}{t^2 - 1} = -\frac{1}{a} \operatorname{Ar} \operatorname{Ctg} t$$

$$= -\frac{1}{a} \operatorname{Ar} \operatorname{Ctg} \left(\frac{x}{a} \right) = \frac{1}{2a} \ln \left(\frac{x-a}{x+a} \right), \quad \text{wenn } |x| > a > 0.$$

Aufgabe 8. $\int \frac{x dx}{a^2 + x^2} = ?$

Auflösung. Setzt man

$$(25.) \quad a^2 + x^2 = t, \quad \text{also} \quad 2x dx = dt,$$

so findet man

$$(26.) \quad \int \frac{x dx}{a^2 + x^2} = \frac{1}{2} \int \frac{dt}{t} = \frac{1}{2} \ln t = \frac{1}{2} \ln(a^2 + x^2).$$

Durch Vertauschung von $+a^2$ mit $-a^2$ erhält man aus Gleichung (26.)

$$(27.) \quad \int \frac{x dx}{x^2 - a^2} = \frac{1}{2} \ln(x^2 - a^2).$$

§ 9.

Integration von einigen irrationalen Funktionen durch Substitution.

(Vergl. die Formel-Tabelle Nr. 31 bis 42.)

Aufgabe 1. $\int \frac{x dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = ?$

Auflösung. Setzt man

(1.) $\sqrt{a^2 - x^2} = t, \text{ also } a^2 - x^2 = t^2,$

so wird

$$-x dx = t dt,$$

und

(2.) $\int \frac{x dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \int \frac{-t dt}{t} = -\int dt = -t = -\sqrt{a^2 - x^2}.$

Aufgabe 2. $\int \frac{x dx}{\sqrt{a^2 + x^2}} = ?$

Auflösung. Setzt man

(3.) $\sqrt{a^2 + x^2} = t, \text{ also } a^2 + x^2 = t^2,$

so wird

$$x dx = t dt$$

und

(4.) $\int \frac{x dx}{\sqrt{a^2 + x^2}} = \int \frac{t dt}{t} = \int dt = t = +\sqrt{a^2 + x^2}.$

Durch Vertauschung von $+a^2$ mit $-a^2$ findet man aus Gleichung (4.)

(5.) $\int \frac{x dx}{\sqrt{x^2 - a^2}} = +\sqrt{x^2 - a^2}.$

Die in den Gleichungen (2.), (4.) und (5.) enthaltenen Resultate hätte man auch leicht durch *unmittelbare* Integration finden können, wenn man von den Formeln Nr. 31 bis 33 der Tabelle für die Differential-Rechnung ausgegangen wäre.

Aufgabe 3. $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = ?$

Auflösung. Setzt man

$$(6.) \quad x = at, \quad \text{also} \quad dx = a dt, \quad t = \frac{x}{a},$$

so erhält man nach Formel Nr. 17 der Tabelle

$$(7.) \quad \int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \int \frac{a dt}{\sqrt{a^2 - a^2 t^2}} = \int \frac{dt}{\sqrt{1 - t^2}} = \arcsin t = \arcsin \left(\frac{x}{a} \right).$$

Aufgabe 4. $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 + x^2}} = ?$

Auflösung. Durch dieselbe Substitution wie bei der vorhergehenden Aufgabe findet man hier mit Rücksicht auf Formel Nr. 23 der Tabelle

$$(8.) \quad \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + a^2}} = \int \frac{dt}{\sqrt{t^2 + 1}} = \operatorname{Ar} \operatorname{Sin} t = \operatorname{Ar} \operatorname{Sin} \left(\frac{x}{a} \right) \\ = \ln \left(\frac{x + \sqrt{x^2 + a^2}}{a} \right).$$

Ebenso findet man mit Rücksicht auf Formel Nr. 24 der Tabelle

$$(9.) \quad \pm \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - a^2}} = \operatorname{Ar} \operatorname{Cos} \left(\frac{x}{a} \right) = \ln \left(\frac{x \pm \sqrt{x^2 - a^2}}{a} \right) \\ = \pm \ln \left(\frac{x + \sqrt{x^2 - a^2}}{a} \right)^*.$$

Aufgabe 5. $\int \frac{dx}{x \sqrt{a^2 - x^2}} = ?$

Auflösung. Setzt man

$$(10.) \quad x = \frac{a}{t}, \quad \text{also} \quad dx = -\frac{a dt}{t^2},$$

$$\sqrt{a^2 - x^2} = \sqrt{a^2 - \frac{a^2}{t^2}} = \frac{a}{t} \sqrt{t^2 - 1}, \quad t = \frac{a}{x},$$

dann wird

$$\int \frac{dx}{x \sqrt{a^2 - x^2}} = \int \frac{-a dt \cdot t \cdot t}{t^2 \cdot a \cdot a \sqrt{t^2 - 1}} = -\frac{1}{a} \int \frac{dt}{\sqrt{t^2 - 1}},$$

dies gibt nach Formel Nr. 24 der Tabelle

*) Vergl. die Anmerkung auf Seite 22.

$$(11.) \int \frac{dx}{x\sqrt{a^2-x^2}} = -\frac{1}{a} \operatorname{ArCo}f t = -\frac{1}{a} \ln(t + \sqrt{t^2-1}),$$

oder

$$(12.) \int \frac{dx}{x\sqrt{a^2-x^2}} = -\frac{1}{a} \operatorname{ArCo}f\left(\frac{a}{x}\right) = -\frac{1}{a} \ln\left(\frac{a + \sqrt{a^2-x^2}}{x}\right).$$

Aufgabe 6. $\int \frac{dx}{x^2\sqrt{a^2-x^2}} = ?$

Auflösung. Durch dieselbe Substitution wie bei der vorhergehenden Aufgabe findet man

$$(13.) \int \frac{dx}{x^2\sqrt{a^2-x^2}} = \int \frac{-adt \cdot t^2 \cdot t}{t^2 \cdot a^2 \cdot a\sqrt{t^2-1}} = -\frac{1}{a^2} \int \frac{t dt}{\sqrt{t^2-1}},$$

also nach Gleichung (5.)

$$(14.) \int \frac{dx}{x^2\sqrt{a^2-x^2}} = -\frac{1}{a^2} \sqrt{t^2-1} = -\frac{\sqrt{a^2-x^2}}{a^2 x}.$$

Aufgabe 7. $\int \frac{dx}{x\sqrt{a^2+x^2}} = ?$

Auflösung. Setzt man wieder

$$(15.) \quad x = \frac{a}{t}, \quad \text{also} \quad dx = -\frac{adt}{t^2},$$

$$\sqrt{a^2+x^2} = \sqrt{a^2 + \frac{a^2}{t^2}} = \frac{a}{t} \sqrt{t^2+1}, \quad t = \frac{a}{x},$$

so wird

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{a^2+x^2}} = \int \frac{-adt \cdot t \cdot t}{t^2 \cdot a \cdot a\sqrt{t^2+1}} = -\frac{1}{a} \int \frac{dt}{\sqrt{t^2+1}};$$

dies gibt nach Formel Nr. 23 der Tabelle

$$(16.) \int \frac{dx}{x\sqrt{a^2+x^2}} = -\frac{1}{a} \operatorname{Ar} \operatorname{Sin} t = -\frac{1}{a} \ln(t + \sqrt{t^2+1}),$$

oder

$$(17.) \int \frac{dx}{x\sqrt{a^2+x^2}} = -\frac{1}{a} \operatorname{Ar} \operatorname{Sin}\left(\frac{a}{x}\right) = -\frac{1}{a} \ln\left(\frac{a + \sqrt{a^2+x^2}}{x}\right).$$

Aufgabe 8. $\int \frac{dx}{x^2\sqrt{a^2+x^2}} = ?$

Auflösung. Durch dieselbe Substitution wie bei der vorhergehenden Aufgabe findet man

$$(18.) \int \frac{dx}{x^2 \sqrt{a^2 + x^2}} = \int \frac{-adt \cdot t^2 \cdot t}{t^2 \cdot a^2 \cdot a \sqrt{t^2 + 1}} = -\frac{1}{a^2} \int \frac{t dt}{\sqrt{t^2 + 1}},$$

also nach Gleichung (4.)

$$(19.) \int \frac{dx}{x^2 \sqrt{a^2 + x^2}} = -\frac{1}{a^2} \sqrt{t^2 + 1} = -\frac{\sqrt{a^2 + x^2}}{a^2 x}.$$

Aufgabe 9. $\int \frac{dx}{x \sqrt{x^2 - a^2}} = ?$

Auflösung. Setzt man wieder

$$(20.) \quad x = \frac{a}{t}, \quad \text{also} \quad dx = -\frac{adt}{t^2},$$

$$\sqrt{x^2 - a^2} = \sqrt{\frac{a^2}{t^2} - a^2} = \frac{a}{t} \sqrt{1 - t^2}, \quad t = \frac{a}{x},$$

so wird

$$\int \frac{dx}{x \sqrt{x^2 - a^2}} = \int \frac{-adt \cdot t \cdot t}{t^2 \cdot a \cdot a \sqrt{1 - t^2}} = -\frac{1}{a} \int \frac{dt}{\sqrt{1 - t^2}};$$

dies gibt nach Formel Nr. 17 der Tabelle

$$(21.) \int \frac{dx}{x \sqrt{x^2 - a^2}} = -\frac{1}{a} \arcsin t = -\frac{1}{a} \arcsin\left(\frac{a}{x}\right).$$

Aufgabe 10. $\int \frac{dx}{x^2 \sqrt{x^2 - a^2}} = ?$

Auflösung. Durch dieselbe Substitution wie bei der vorhergehenden Aufgabe findet man

$$(22.) \int \frac{dx}{x^2 \sqrt{x^2 - a^2}} = \int \frac{-adt \cdot t^2 \cdot t}{t^2 \cdot a^2 \cdot a \sqrt{1 - t^2}} = -\frac{1}{a^2} \int \frac{t dt}{\sqrt{1 - t^2}},$$

also nach Gleichung (2.)

$$(23.) \int \frac{dx}{x^2 \sqrt{x^2 - a^2}} = +\frac{1}{a^2} \sqrt{1 - t^2} = \frac{\sqrt{x^2 - a^2}}{a^2 x}.$$

§ 10.

Integrale von der Form $\int \frac{f'(x)dx}{f(x)}$.

(Vergl. die Formel-Tabelle Nr. 43 bis 52.)

Aufgabe 1. $\int \frac{dx}{x \ln x} = ?$

Auflösung. Setzt man

(1.) $t = \ln x$, also $dt = \frac{dx}{x}$,

so erhält man

(2.) $\int \frac{dx}{x \ln x} = \int \frac{dt}{t} = \ln t = \ln(\ln x).$

Aufgabe 2. $\int \frac{(8x-7)dx}{4x^2-7x+11} = ?$

Auflösung. Setzt man

(3.) $4x^2 - 7x + 11 = t$, also $(8x-7)dx = dt$,

so erhält man

(4.) $\int \frac{(8x-7)dx}{4x^2-7x+11} = \int \frac{dt}{t} = \ln t = \ln(4x^2 - 7x + 11).$

Aufgabe 3. $\int \frac{(12x^3 + 15x^2 - 4x + 8)dx}{3x^4 + 5x^3 - 2x^2 + 8x - 7} = ?$

Auflösung. Setzt man

(5.) $3x^4 + 5x^3 - 2x^2 + 8x - 7 = t$,

also

$(12x^3 + 15x^2 - 4x + 8)dx = dt$,

so erhält man

(6.) $\int \frac{(12x^3 + 15x^2 - 4x + 8)dx}{3x^4 + 5x^3 - 2x^2 + 8x - 7} = \int \frac{dt}{t} = \ln t$
 $= \ln(3x^4 + 5x^3 - 2x^2 + 8x - 7).$

Die in den letzten Aufgaben angewendete Methode bestand darin, daß man das Integral auf die Form $\int \frac{dt}{t}$ brachte. Dieses Verfahren ist immer anwendbar, wenn unter dem Integralzeichen ein Bruch $\frac{f'(x)dx}{f(x)}$ steht, dessen Zähler das Differential des Nenners ist. Setzt man in diesem Falle nämlich

$$(7.) \quad f(x) = t, \quad \text{also} \quad f'(x)dx = dt,$$

so erhält man

$$(8.) \quad \int \frac{f'(x)dx}{f(x)} = \int \frac{dt}{t} = \ln t = \ln[f(x)]$$

und damit den

Satz. *Steht unter dem Integralzeichen ein Bruch, dessen Zähler das Differential des Nenners ist, so ist das Integral gleich dem natürlichen Logarithmus des Nenners.*

Bei den Anwendungen dieses Satzes wird man allerdings häufig mit der Funktion unter dem Integralzeichen erst eine Umformung vornehmen müssen, um sie auf die beschriebene Form zu bringen, wie man aus den hier folgenden Aufgaben ersehen kann.

Aufgabe 4. $\int \operatorname{tg} x dx = ?$

Auflösung. Bekanntlich ist $\operatorname{tg} x = \frac{\sin x}{\cos x}$, so daß man erhält

$$(9.) \quad \int \operatorname{tg} x dx = - \int \frac{\sin x dx}{\cos x}.$$

Jetzt steht unter dem Integralzeichen ein Bruch, dessen Zähler das Differential des Nenners ist, folglich ist das Integral der natürliche Logarithmus des Nenners, und man erhält

$$(10.) \quad \int \operatorname{tg} x dx = - \ln(\cos x).$$

In ähnlicher Weise findet man

$$(11.) \quad \int \operatorname{ctg} x dx = \int \frac{\cos x dx}{\sin x} = \ln(\sin x).$$

Aufgabe 5. $\int \frac{dx}{\sin x \cos x} = ?$

Auflösung. Dividiert man Zähler und Nenner des Bruches unter dem Integralzeichen durch $\cos^2 x$, so erhält man

$$(12.) \quad \int \frac{dx}{\sin x \cos x} = \int \frac{\frac{dx}{\cos^2 x}}{\frac{\sin x}{\cos x}} = \int \frac{d(\operatorname{tg} x)}{\operatorname{tg} x},$$

folglich wird

$$(13.) \quad \int \frac{dx}{\sin x \cos x} = \ln(\operatorname{tg} x) = -\ln(\operatorname{ctg} x).$$

Aufgabe 6. $\int \frac{dx}{\sin x} = ?$

Auflösung. Diese Aufgabe läßt sich leicht auf die vorhergehende zurückführen, indem man

$$(14.) \quad x = 2t$$

setzt und die bekannte Formel

$$\sin x = \sin(2t) = 2 \sin t \cos t$$

beachtet. Dadurch erhält man

$$(15.) \quad \int \frac{dx}{\sin x} = \int \frac{dt}{\sin t \cos t} = \ln(\operatorname{tg} t) = \ln \left[\operatorname{tg} \left(\frac{x}{2} \right) \right] = -\ln \left[\operatorname{ctg} \left(\frac{x}{2} \right) \right].$$

Aufgabe 7. $\int \frac{dx}{\cos x} = ?$

Auflösung. Diese Aufgabe wird auf die vorhergehende zurückgeführt, indem man

$$(16.) \quad x = \frac{\pi}{2} - t, \text{ also } \cos x = \sin t, \quad dx = -dt, \quad t = \frac{\pi}{2} - x$$

setzt; dann erhält man

$$\int \frac{dx}{\cos x} = -\int \frac{dt}{\sin t} = -\ln \left[\operatorname{tg} \left(\frac{t}{2} \right) \right],$$

oder

$$(17.) \quad \int \frac{dx}{\cos x} = -\ln \left[\operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{4} - \frac{x}{2} \right) \right] = +\ln \left[\operatorname{ctg} \left(\frac{\pi}{4} - \frac{x}{2} \right) \right].$$

Durch die Substitution

$$x = \frac{\pi}{2} - t$$

gehen die trigonometrischen Funktionen

$$\sin x, \cos x, \operatorname{tg} x, \operatorname{ctg} x$$

bezw. in die komplementären Funktionen von t über, nämlich in

$$\cos t, \sin t, \operatorname{ctg} t, \operatorname{tg} t.$$

Bezeichnet man irgendeine Funktion von $\sin x, \cos x, \operatorname{tg} x, \operatorname{ctg} x$ mit $f(\sin x, \cos x, \operatorname{tg} x, \operatorname{ctg} x)$, so wird

$$(18.) \int f(\sin x, \cos x, \operatorname{tg} x, \operatorname{ctg} x) dx = - \int f(\cos t, \sin t, \operatorname{ctg} t, \operatorname{tg} t) dt.$$

Hat man also das eine von diesen beiden Integralen gefunden, so ist damit auch das andere ermittelt. Hieraus erkennt man, daß gerade die Substitution $x = \frac{\pi}{2} - t$ sehr häufig mit gutem Erfolge verwendet werden kann.

Aufgabe 8. $\int \operatorname{Tg} x dx = ?$

Auflösung. Hier ist

$$(19.) \int \operatorname{Tg} x dx = \int \frac{\operatorname{Sin} x dx}{\operatorname{Cos} x} = \int \frac{d(\operatorname{Cos} x)}{\operatorname{Cos} x} = \ln(\operatorname{Cos} x).$$

Aufgabe 9. $\int \operatorname{Ctg} x dx = ?$

Auflösung. Hier ist

$$(20.) \int \operatorname{Ctg} x dx = \int \frac{\operatorname{Cos} x dx}{\operatorname{Sin} x} = \int \frac{d(\operatorname{Sin} x)}{\operatorname{Sin} x} = \ln(\operatorname{Sin} x).$$

Aufgabe 10. $\int \frac{dx}{\operatorname{Sin} x \operatorname{Cos} x} = ?$

Auflösung. Dividiert man Zähler und Nenner des Bruches unter dem Integralzeichen durch $\operatorname{Cos}^2 x$, so erhält man

$$(21.) \int \frac{dx}{\operatorname{Sin} x \operatorname{Cos} x} = \int \frac{\operatorname{Cos}^2 x dx}{\operatorname{Tg} x} = \int \frac{d(\operatorname{Tg} x)}{\operatorname{Tg} x} = \ln(\operatorname{Tg} x) = -\ln(\operatorname{Ctg} x).$$

Aufgabe 11. $\int \frac{dx}{\operatorname{Sin} x} = ?$

Auflösung. Setzt man

$$(22.) \quad x = 2t, \quad \text{also} \quad dx = 2dt,$$

so wird nach D.-R., Formel Nr. 53 der Tabelle

$$(23.) \quad \operatorname{Sin} x = \operatorname{Sin}(2t) = 2 \operatorname{Sin} t \operatorname{Cos} t,$$

also mit Rücksicht auf Gleichung (21.)

$$(24.) \int \frac{dx}{\operatorname{Sin} x} = \int \frac{2dt}{2 \operatorname{Sin} t \operatorname{Cos} t} = \int \frac{dt}{\operatorname{Sin} t \operatorname{Cos} t} \\ = \ln(\operatorname{Tg} t) = \ln \left[\operatorname{Tg} \left(\frac{x}{2} \right) \right] = -\ln \left[\operatorname{Ctg} \left(\frac{x}{2} \right) \right].$$

Aufgabe 12. $\int \frac{1 + e^{-x}}{1 + xe^{-x}} dx = ?$

Auflösung. Multipliziert man Zähler und Nenner des Bruches unter dem Integralzeichen mit e^x , so wird der Zähler, nämlich $(e^x + 1)dx$, das Differential des Nenners $e^x + x$, folglich wird das Integral gleich dem Logarithmus des Nenners; d. h. es wird

$$(25.) \quad \int \frac{1 + e^{-x}}{1 + xe^{-x}} dx = \int \frac{(e^x + 1)dx}{e^x + x} = \ln(e^x + x).$$

§ 11.

**Integrale von der Form $\int F'(t)dt$,
wenn $t = f(x)$ irgendeine transzendente Funktion
von x ist.**

(Vergl. die Formel-Tabelle Nr. 53 bis 83.)

Aufgabe 1. $\int (\sin^4 x - 3\sin^3 x + 4\sin^2 x + 11\sin x) \cos x dx = ?$

Auflösung. Setzt man

$$(1.) \quad \sin x = t, \quad \text{also} \quad \cos x dx = dt,$$

so erhält man

$$(2.) \quad \int (\sin^4 x - 3\sin^3 x + 4\sin^2 x + 11\sin x) \cos x dx = \\ \int (t^4 - 3t^3 + 4t^2 + 11t) dt = \frac{1}{5}t^5 - \frac{3}{4}t^4 + \frac{4}{3}t^3 + \frac{11}{2}t^2 = \\ \frac{1}{5}\sin^5 x - \frac{3}{4}\sin^4 x + \frac{4}{3}\sin^3 x + \frac{11}{2}\sin^2 x.$$

Man erkennt sofort, daß diese Substitution immer eine Vereinfachung herbeiführt, wenn unter dem Integralzeichen eine Funktion $F'(\sin x)$ von $\sin x$ steht, welche mit $\cos x dx$ multipliziert ist; denn man erhält dann

$$(3.) \quad \int F'(\sin x) \cos x dx = \int F'(t) dt = F(\sin x).$$

Aufgabe 2. $\int \frac{\cos x dx}{\sin^3 x} = ?$

Auflösung. Indem man die soeben angegebene Substitution benutzt, findet man

$$(4.) \quad \int \frac{\cos x dx}{\sin^3 x} = \int \frac{dt}{t^3} = \int t^{-3} dt = \frac{t^{-2}}{-2} = -\frac{1}{2\sin^2 x}.$$

Häufig wird man die Funktion unter dem Integralzeichen erst umformen müssen, ehe man die in Gleichung (3.) angedeutete Substitution anwenden kann. Wie dies geschieht, mögen die folgenden Aufgaben zeigen.

Aufgabe 3. $\int \cos^3 x dx = ?$

Auflösung. Durch Anwendung der bekannten Formel

$$(5.) \quad \cos^2 x = 1 - \sin^2 x$$

erhält man

$$(6.) \quad \begin{aligned} \int \cos^3 x dx &= \int (1 - \sin^2 x) \cos x dx = \int (1 - \sin^2 x) d(\sin x) \\ &= \int (1 - t^2) dt = t - \frac{1}{3} t^3 = \sin x - \frac{1}{3} \sin^3 x. \end{aligned}$$

Aufgabe 4. $\int \cos^{2n+1} x dx = ?$

Auflösung. In gleicher Weise wie bei Aufgabe 3 findet man hier

$$(7.) \quad \int \cos^{2n+1} x dx = \int (1 - \sin^2 x)^n \cdot \cos x dx = \int (1 - \sin^2 x)^n d(\sin x).$$

Durch den Faktor $d(\sin x)$ soll angedeutet werden, daß $\sin x$ zur neuen Integrations-Veränderlichen gewählt wird. Dadurch erhält man

$$(8.) \quad \begin{aligned} \int \cos^{2n+1} x dx &= \int (1 - t^2)^n dt \\ &= \int \left[1 - \binom{n}{1} t^2 + \binom{n}{2} t^4 - \binom{n}{3} t^6 + \dots \right. \\ &\quad \left. \pm \binom{n}{1} t^{2n-2} \mp t^{2n} \right] dt \\ &= t - \binom{n}{1} \frac{t^3}{3} + \binom{n}{2} \frac{t^5}{5} - \binom{n}{3} \frac{t^7}{7} + \dots \\ &\quad \pm \binom{n}{1} \frac{t^{2n-1}}{2n-1} \mp \frac{t^{2n+1}}{2n+1}. \end{aligned}$$

Schließlich muß man noch für t wieder $\sin x$ einsetzen.

Aufgabe 5. $\int \sin^n x \cos^{2n+1} x dx = ?$

Auflösung. In ähnlicher Weise wie bei der vorhergehenden Aufgabe findet man hier

$$(9.) \quad \int \sin^m x \cos^{2n+1} x dx = \int \sin^m x (1 - \sin^2 x)^n \cdot d(\sin x),$$

wo durch den Faktor $d(\sin x)$ angedeutet werden soll, daß $\sin x$ zur Integrations-Veränderlichen gewählt wird. Hierdurch erhält man z. B.

$$(10.) \quad \int \frac{\cos^3 x dx}{\sin^4 x} = \int \frac{(1-t^2)dt}{t^4} = \int (t^{-4} - t^{-2})dt \\ = -\frac{t^{-3}}{3} + \frac{t^{-1}}{1} = -\frac{1}{3\sin^3 x} + \frac{1}{\sin x}.$$

In ähnlicher Weise wird man, wenn unter dem Integralzeichen eine Funktion von $\cos x$, multipliziert mit $\sin x dx$, steht, durch die Substitution

$$(11.) \quad \cos x = t, \quad \text{also} \quad -\sin x dx = dt$$

eine Vereinfachung herbeiführen; denn es wird

$$(12.) \quad \int F'(\cos x) \cdot \sin x dx = -\int F'(t)dt = -F(\cos x).$$

Hieraus ergibt sich ohne weiteres die Lösung der beiden folgenden Aufgaben.

Aufgabe 6. $\int (\cos^3 x - 2\cos^2 x + 3\cos x - 4)\sin x dx$

$$= -\frac{1}{4}\cos^4 x + \frac{2}{3}\cos^3 x - \frac{3}{2}\cos^2 x + 4\cos x.$$

Aufgabe 7. $\int \frac{\sin x dx}{\cos^4 x} = + \frac{1}{3\cos^3 x}$

Aufgabe 8. $\int \sin^5 x dx = ?$

Auflösung. Durch Anwendung der bekannten Formel

$$(13.) \quad \sin^2 x = 1 - \cos^2 x$$

erhält man

$$(14.) \quad \int \sin^5 x dx = \int (1 - \cos^2 x)^2 \cdot \sin x dx = -\int (1 - \cos^2 x)^2 d(\cos x) \\ = -\int (1 - 2t^2 + t^4)dt = -\left(t - \frac{2}{3}t^3 + \frac{1}{5}t^5\right) \\ = -\cos x + \frac{2}{3}\cos^3 x - \frac{1}{5}\cos^5 x.$$

Aufgabe 9. $\int \sin^{2n+1} x dx = ?$

Auflösung. In gleicher Weise wie bei Aufgabe 8 findet man hier

$$(15.) \int \sin^{2n+1} x dx = \int (1 - \cos^2 x)^n \cdot \sin x dx \\ = - \int (1 - \cos^2 x)^n \cdot d(\cos x).$$

Auch hier soll durch den Faktor $d(\cos x)$ angedeutet werden, daß $\cos x$ zur neuen Integrations-Veränderlichen gewählt wird. Dadurch erhält man

$$(16.) \int \sin^{2n+1} x dx = - \int (1 - t^2)^n dt,$$

also, abgesehen vom Vorzeichen und von der Bedeutung der Veränderlichen t , dasselbe Integral wie bei Aufgabe 4.

Aufgabe 10. $\int \cos^m x \sin^{2n+1} x dx = ?$

Auflösung. In ähnlicher Weise wie bei Aufgabe 9 findet man hier

$$(17.) \int \cos^m x \sin^{2n+1} x dx = - \int \cos^m x (1 - \cos^2 x)^n d(\cos x),$$

wo durch den Faktor $d(\cos x)$ angedeutet werden soll, daß $\cos x$ zur Integrations-Veränderlichen gewählt wird. Hierdurch erhält man z. B.

$$(18.) \int \cos^2 x \sin^3 x dx = - \int t^2 (1 - t^2) dt = - \int (t^2 - t^4) dt \\ = - \frac{t^3}{3} + \frac{t^5}{5} = - \frac{\cos^3 x}{3} + \frac{\cos^5 x}{5}.$$

Aufgabe 11. $\int (\operatorname{tg}^3 x - 8 \operatorname{tg}^2 x + 5 \operatorname{tg} x - 7) \frac{dx}{\cos^2 x} = ?$

Auflösung. Setzt man

$$(19.) \operatorname{tg} x = t, \quad \text{also} \quad \frac{dx}{\cos^2 x} = dt,$$

so erhält man

$$(20.) \int (\operatorname{tg}^3 x - 8 \operatorname{tg}^2 x + 5 \operatorname{tg} x - 7) \frac{dx}{\cos^2 x} = \int (t^3 - 8t^2 + 5t - 7) dt \\ = \frac{t^4}{4} - \frac{8t^3}{3} + \frac{5t^2}{2} - 7t = \frac{\operatorname{tg}^4 x}{4} - \frac{8 \operatorname{tg}^3 x}{3} + \frac{5 \operatorname{tg}^2 x}{2} - 7 \operatorname{tg} x.$$

Dieselbe Substitution kann man immer anwenden, wenn unter dem Integralzeichen eine Funktion von $\operatorname{tg} x$.

multipliziert mit $\frac{dx}{\cos^2 x}$, steht, d. h. es wird ganz allgemein

$$(21.) \quad \int F'(\operatorname{tg} x) \frac{dx}{\cos^2 x} = \int F'(\operatorname{tg} x) \cdot d(\operatorname{tg} x) = F(\operatorname{tg} x),$$

wo durch den Faktor $d(\operatorname{tg} x)$ angedeutet werden soll, daß $\operatorname{tg} x$ zur Integrations-Veränderlichen gewählt wird.

Häufig wird man erst eine Umformung vornehmen müssen, ehe man auf die in Aufgabe 11 vorausgesetzte Form der Differential-Funktion geführt wird. Wie dies geschieht, mögen die folgenden Aufgaben zeigen.

Aufgabe 12. $\int (\operatorname{tg}^3 x - 7 \operatorname{tg}^2 x + 2 \operatorname{tg} x + 9) dx = ?$

Auflösung. Damit die Funktion unter dem Integralzeichen eine Funktion von $\operatorname{tg} x$, multipliziert mit $\frac{dx}{\cos^2 x}$, wird, muß man sie durch $\cos^2 x$ dividieren und deshalb auch mit

$$(22.) \quad \cos^2 x = \frac{\cos^2 x}{\cos^2 x + \sin^2 x} = \frac{1}{1 + \operatorname{tg}^2 x}$$

multiplizieren. Dadurch erhält man mit Rücksicht auf die Gleichungen (19.)

$$\begin{aligned} (23.) \quad \int (\operatorname{tg}^3 x - 7 \operatorname{tg}^2 x + 2 \operatorname{tg} x + 9) dx \\ = \int \frac{\operatorname{tg}^3 x - 7 \operatorname{tg}^2 x + 2 \operatorname{tg} x + 9}{\operatorname{tg}^2 x + 1} \cdot \frac{dx}{\cos^2 x} \\ = \int \frac{t^3 - 7t^2 + 2t + 9}{t^2 + 1} dt. \end{aligned}$$

Nun ist, wie man durch Division findet,

$$(24.) \quad t^3 - 7t^2 + 2t + 9 = (t^2 + 1)(t - 7) + t + 16,$$

folglich wird mit Rücksicht auf die Formeln Nr. 9, 30 und 18 der Tabelle

$$\begin{aligned} (25.) \quad \int \frac{t^3 - 7t^2 + 2t + 9}{t^2 + 1} dt &= \int (t - 7) dt + \int \frac{t dt}{t^2 + 1} + 16 \int \frac{dt}{1 + t^2} \\ &= \frac{t^2}{2} - 7t + \frac{1}{2} \ln(t^2 + 1) + 16 \operatorname{arctg} t, \end{aligned}$$

oder, wenn man beachtet, daß

$$(26.) \quad t = \operatorname{tg} x, \quad 1 + t^2 = \frac{1}{\cos^2 x}, \quad x = \arctgt$$

ist,

$$(27.) \quad \int (\operatorname{tg}^3 x - 7 \operatorname{tg}^2 x + 2 \operatorname{tg} x + 9) dx = \frac{\operatorname{tg}^2 x}{2} - 7 \operatorname{tg} x - \ln(\cos x) + 16x.$$

Dieses Verfahren führt zu der allgemeinen Formel

$$(28.) \quad \int f(\operatorname{tg} x) \cdot dx = \int \frac{f(\operatorname{tg} x)}{\operatorname{tg}^2 x + 1} \cdot d(\operatorname{tg} x).$$

Aufgabe 13. $\int \operatorname{tg}^n x \cdot dx = ?$

Auflösung. Nach Gleichung (28.) erhält man, indem man $\operatorname{tg} x$ zur Integrations-Veränderlichen macht und mit t bezeichnet,

$$(29.) \quad \int \operatorname{tg}^n x dx = \int \frac{\operatorname{tg}^n x}{\operatorname{tg}^2 x + 1} \cdot d(\operatorname{tg} x) = \int \frac{t^n dt}{t^2 + 1}.$$

Bei der weiteren Behandlung des Integrals muß man zwei Fälle unterscheiden, je nachdem n gerade oder ungerade ist.

I. Fall. $n = 2m$.

Durch Ausführung der Division erhält man

$$(30.) \quad \int \operatorname{tg}^{2m} x \cdot dx = \int \frac{t^{2m}}{t^2 + 1} dt = \int (t^{2m-2} - t^{2m-4} + \dots \pm 1 \mp \frac{1}{1+t^2}) dt$$

$$= \frac{\operatorname{tg}^{2m-1} x}{2m-1} - \frac{\operatorname{tg}^{2m-3} x}{2m-3} + \dots \pm \operatorname{tg} x \mp x.$$

Es ist z. B.

$$(31.) \quad \int \operatorname{tg}^6 x dx = \frac{\operatorname{tg}^5 x}{5} - \frac{\operatorname{tg}^3 x}{3} + \operatorname{tg} x - x.$$

II. Fall. $n = 2m + 1$.

Durch Ausführung der Division erhält man

$$(32.) \quad \int \operatorname{tg}^{2m+1} x \cdot dx = \int \frac{t^{2m+1}}{t^2 + 1} dt$$

$$= \int (t^{2m-1} - t^{2m-3} + \dots \pm t \mp \frac{t}{t^2 + 1}) dt$$

$$= \frac{\operatorname{tg}^{2m} x}{2m} - \frac{\operatorname{tg}^{2m-2} x}{2m-2} + \dots \pm \frac{\operatorname{tg}^2 x}{2} \mp \frac{1}{2} \ln(1 + \operatorname{tg}^2 x),$$

wobei man noch

$$\frac{1}{2} \ln(1 + \operatorname{tg}^2 x) = \frac{1}{2} \ln\left(\frac{1}{\cos^2 x}\right) = -\ln(\cos x)$$

setzen darf. Es ist z. B.

$$(33.) \quad \int \operatorname{tg}^7 x \cdot dx = \frac{\operatorname{tg}^6 x}{6} - \frac{\operatorname{tg}^4 x}{4} + \frac{\operatorname{tg}^2 x}{2} + \ln(\cos x).$$

Aufgabe 14. $\int \frac{dx}{\cos^4 x} = ?$

Auflösung. Bekanntlich ist

$$(34.) \quad \frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \operatorname{tg}^2 x \quad \text{und} \quad \frac{dx}{\cos^2 x} = d(\operatorname{tg} x),$$

folglich wird

$$(35.) \quad \begin{aligned} \int \frac{dx}{\cos^4 x} &= \int \frac{1}{\cos^2 x} \cdot \frac{dx}{\cos^2 x} = \int (1 + \operatorname{tg}^2 x) d(\operatorname{tg} x) \\ &= \operatorname{tg} x + \frac{\operatorname{tg}^3 x}{3}. \end{aligned}$$

Dasselbe Verfahren führt zu der allgemeinen Formel

$$(36.) \quad \int \frac{dx}{\cos^{2m} x} = \int (1 + \operatorname{tg}^2 x)^{m-1} d(\operatorname{tg} x),$$

wo durch den Faktor $d(\operatorname{tg} x)$ angedeutet werden soll, daß $\operatorname{tg} x$ zur Integrations-Veränderlichen gewählt wird.

Aufgabe 15. $\int (\operatorname{ctg}^4 x - 3 \operatorname{ctg}^2 x + 5) \frac{dx}{\sin^2 x} = ?$

Auflösung. Setzt man

$$(37.) \quad \operatorname{ctg} x = t, \quad \text{also} \quad -\frac{dx}{\sin^2 x} = dt,$$

so erhält man

$$(38.) \quad \begin{aligned} \int (\operatorname{ctg}^4 x - 3 \operatorname{ctg}^2 x + 5) \frac{dx}{\sin^2 x} &= -\int (t^4 - 3t^2 + 5) dt \\ &= -\frac{t^5}{5} + \frac{3t^3}{3} - 5t = -\frac{\operatorname{ctg}^5 x}{5} + \operatorname{ctg}^3 x - 5 \operatorname{ctg} x. \end{aligned}$$

Dieselbe Substitution kann man immer anwenden, wenn unter dem Integralzeichen eine Funktion von $\operatorname{ctg} x$, multipliziert mit $\frac{dx}{\sin^2 x}$, steht, d. h. es wird ganz allgemein

$$(39.) \int F'(\operatorname{ctg} x) \frac{dx}{\sin^2 x} = - \int F'(\operatorname{ctg} x) \cdot d(\operatorname{ctg} x) = - F(\operatorname{ctg} x),$$

wo durch den Faktor $d(\operatorname{ctg} x)$ angedeutet werden soll, daß $\operatorname{ctg} x$ zur Integrations-Veränderlichen gewählt wird.

$$\textbf{Aufgabe 16.} \quad \int (\operatorname{ctg}^4 x + 3 \operatorname{ctg}^2 x - 7) dx = ?$$

Auflösung. Damit die Funktion unter dem Integralzeichen eine Funktion von $\operatorname{ctg} x$, multipliziert mit $\frac{dx}{\sin^2 x}$, wird, muß man sie durch $\sin^2 x$ dividieren und deshalb auch mit

$$(40.) \quad \sin^2 x = \frac{\sin^2 x}{\sin^2 x + \cos^2 x} = \frac{1}{1 + \operatorname{ctg}^2 x}$$

multiplizieren. Dadurch erhält man mit Rücksicht auf die Gleichungen (37.), wenn man die Division ausführt,

$$(41.) \quad \begin{aligned} \int (\operatorname{ctg}^4 x + 3 \operatorname{ctg}^2 x - 7) dx &= - \int \frac{t^4 + 3t^2 - 7}{t^2 + 1} dt \\ &= - \int \left(t^2 + 2 - \frac{9}{1 + t^2} \right) dt = - \left(\frac{t^3}{3} + 2t + 9 \operatorname{arctg} t \right), \end{aligned}$$

oder, da $\operatorname{ctg} x = t$ und $\operatorname{arctg} t = x$ ist,

$$(42.) \quad \int (\operatorname{ctg}^4 x + 3 \operatorname{ctg}^2 x - 7) dx = - \frac{\operatorname{ctg}^3 x}{3} - 2 \operatorname{ctg} x - 9x.$$

Dieses Verfahren führt zu der allgemeinen Formel

$$(43.) \quad \int f(\operatorname{ctg} x) \cdot dx = - \int \frac{f(\operatorname{ctg} x)}{\operatorname{ctg}^2 x + 1} \cdot d(\operatorname{ctg} x).$$

$$\textbf{Aufgabe 17.} \quad \int \operatorname{ctg}^n x \cdot dx = ?$$

Auflösung. Nach Gleichung (43.) erhält man, indem man $\operatorname{ctg} x$ zur Integrations-Veränderlichen macht und mit t bezeichnet,

$$(44.) \quad \int \operatorname{ctg}^n x \cdot dx = - \int \frac{t^n dt}{t^2 + 1}.$$

Die weitere Behandlung dieser Aufgabe ergibt sich sodann aus Aufgabe 13.

$$\bullet \textbf{Aufgabe 18.} \quad \int \frac{dx}{\sin^6 x} = ?$$

Auflösung. Bekanntlich ist

$$\frac{1}{\sin^2 x} = 1 + \operatorname{ctg}^2 x \quad \text{und} \quad \frac{dx}{\sin^2 x} = -d(\operatorname{ctg} x),$$

folglich wird

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sin^6 x} &= \int \left(\frac{1}{\sin^2 x} \right)^2 \cdot \frac{dx}{\sin^2 x} = - \int (1 + \operatorname{ctg}^2 x)^2 d(\operatorname{ctg} x) \\ &= - \operatorname{ctg} x - \frac{2 \operatorname{ctg}^3 x}{3} - \frac{\operatorname{ctg}^5 x}{5}. \end{aligned}$$

Dasselbe Verfahren führt zu der allgemeinen Formel

$$(45.) \quad \int \frac{dx}{\sin^{2m} x} = - \int (1 + \operatorname{ctg}^2 x)^{m-1} d(\operatorname{ctg} x),$$

wo durch den Faktor $d(\operatorname{ctg} x)$ angedeutet werden soll, daß $\operatorname{ctg} x$ zur Integrations-Veränderlichen gewählt wird.

Was in den vorstehenden Aufgaben für die trigonometrischen Funktionen $\sin x$, $\cos x$, $\operatorname{tg} x$, $\operatorname{ctg} x$ gezeigt worden ist, kann in gleicher Weise auch für die hyperbolischen Funktionen $\operatorname{Sin} x$, $\operatorname{Cos} x$, $\operatorname{Tg} x$, $\operatorname{Ctg} x$ ausgeführt werden. Dadurch findet man die folgenden Formeln:

$$(46.) \quad \int F'(\operatorname{Sin} x) \operatorname{Cos} x dx = \int F'(\operatorname{Sin} x) \cdot d(\operatorname{Sin} x) = F(\operatorname{Sin} x).$$

$$(47.) \quad \int \operatorname{Cos}^{2n+1} x dx = \int (1 + \operatorname{Sin}^2 x)^n \cdot d(\operatorname{Sin} x).$$

$$(48.) \quad \int F'(\operatorname{Cos} x) \operatorname{Sin} x dx = \int F'(\operatorname{Cos} x) \cdot d(\operatorname{Cos} x) = F(\operatorname{Cos} x).$$

$$(49.) \quad \int \operatorname{Sin}^{2n+1} x dx = \int (\operatorname{Cos}^2 x - 1)^n \cdot d(\operatorname{Cos} x).$$

$$(50.) \quad \int F'(\operatorname{Tg} x) \cdot \frac{dx}{\operatorname{Cos}^2 x} = \int F'(\operatorname{Tg} x) \cdot d(\operatorname{Tg} x) = F(\operatorname{Tg} x).$$

$$(51.) \quad \int f(\operatorname{Tg} x) dx = \int \frac{f(\operatorname{Tg} x)}{1 - \operatorname{Tg}^2 x} \cdot d(\operatorname{Tg} x).$$

$$(52.) \quad \int \frac{dx}{\operatorname{Cos}^{2m} x} = \int (1 - \operatorname{Tg}^2 x)^{m-1} \cdot d(\operatorname{Tg} x).$$

$$(53.) \quad \int F'(\operatorname{Ctg} x) \cdot \frac{dx}{\operatorname{Sin}^2 x} = - \int F'(\operatorname{Ctg} x) \cdot d(\operatorname{Ctg} x) = - F(\operatorname{Ctg} x).$$

$$(54.) \quad \int f(\operatorname{Ctg} x) dx = \int \frac{f(\operatorname{Ctg} x)}{1 - \operatorname{Ctg}^2 x} \cdot d(\operatorname{Ctg} x).$$

$$(55.) \int \frac{dx}{\sin^{2m} x} = - \int (\csc^2 x - 1)^{m-1} \cdot d(\csc x).$$

In ähnlicher Weise kann man durch Substitution ganz allgemein eine Vereinfachung des Integrals herbeiführen, wenn unter dem Integralzeichen das Produkt einer Funktion $F'[f(x)]$ der transzendenten Funktion $f(x)$ und des Differentials von $f(x)$ steht. Dann findet man, indem man

$$t = f(x)$$

zur neuen Integrations-Veränderlichen macht,

$$(56.) \int F'[f(x)] \cdot f'(x) dx = \int F'(t) dt = F(t) = F[f(x)].$$

Dies gibt ohne weiteres die folgenden Formeln:

$$(57.) \int F'(a^x) \cdot a^x dx = \frac{1}{\ln a} \int F'(a^x) \cdot d(a^x) = \frac{1}{\ln a} F(a^x),$$

$$(58.) \int F'(e^x) \cdot e^x dx = \int F'(e^x) \cdot d(e^x) = F(e^x),$$

$$(59.) \int F'(\ln x) \cdot \frac{dx}{x} = \int F'(\ln x) \cdot d(\ln x) = F(\ln x),$$

$$(60.) \int F'(\arcsin x) \cdot \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \int F'(\arcsin x) \cdot d(\arcsin x) \\ = F(\arcsin x),$$

$$(61.) \int F'(\arccos x) \cdot \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = - \int F'(\arccos x) \cdot d(\arccos x) \\ = - F(\arccos x),$$

$$(62.) \int F'(\arctg x) \cdot \frac{dx}{1+x^2} = \int F'(\arctg x) \cdot d(\arctg x) = F(\arctg x),$$

$$(63.) \int F'(\operatorname{arctg} x) \cdot \frac{dx}{1+x^2} = - \int F'(\operatorname{arctg} x) \cdot d(\operatorname{arctg} x) \\ = - F(\operatorname{arctg} x).$$

Hierbei soll durch die Faktoren $d(a^x)$, $d(e^x)$, $d(\ln x)$, $d(\arcsin x)$, $d(\arccos x)$, $d(\arctg x)$, $d(\operatorname{arctg} x)$ angedeutet werden, daß bezw die Größen a^x , e^x , $\ln x$, $\arcsin x$, $\arccos x$, $\arctg x$, $\operatorname{arctg} x$ zu Integrations-Veränderlichen gewählt werden.

Zur Einübung dieser Formeln mögen die folgenden Aufgaben gelöst werden.

Aufgabe 19. $\int (a^{2x} + 3a^x - 7)dx = ?$

Auflösung. Bezeichnet man a^x mit t , so wird

$$\begin{aligned}
 (64.) \quad \int (a^{2x} + 3a^x - 7)dx &= \int (a^x + 3 - 7a^{-x}) \cdot a^x dx \\
 &= \frac{1}{\ln a} \int (t + 3 - 7t^{-1})dt = \frac{1}{\ln a} \left(\frac{t^2}{2} + 3t - 7\ln t \right) \\
 &= \frac{1}{\ln a} \left(\frac{1}{2} a^{2x} + 3a^x - 7x \ln a \right).
 \end{aligned}$$

Aufgabe 20. $\int \frac{\cos(\ln x) \cdot dx}{x} = ?$

Auflösung. Bezeichnet man $\ln x$ mit t , so wird

$$(65.) \quad \int \frac{\cos(\ln x) \cdot dx}{x} = \int \cos t dt = \sin t = \sin(\ln x).$$

Aufgabe 21. $\int \frac{\arcsin x \cdot dx}{\sqrt{1-x^2}} = ?$

Auflösung. Bezeichnet man $\arcsin x$ mit t , so wird

$$(66.) \quad \int \frac{\arcsin x \cdot dx}{\sqrt{1-x^2}} = \int t dt = \frac{t^2}{2} = \frac{1}{2} (\arcsin x)^2.$$

Aufgabe 22. $\int \frac{dx}{(1+x^2)\operatorname{arctg} x} = ?$

Auflösung. Bezeichnet man $\operatorname{arctg} x$ mit t , so wird

$$(67.) \quad \int \frac{dx}{(1+x^2)\operatorname{arctg} x} = \int \frac{dt}{t} = \ln t = \ln(\operatorname{arctg} x).$$

Steht unter dem Integralzeichen irgendeine rationale Funktion von $\sin x$, $\cos x$, $\operatorname{tg} x$, $\operatorname{ctg} x$, so kann man diese transzendenten Funktionen durch die Substitution

$$(68.) \quad \operatorname{tg}\left(\frac{x}{2}\right) = t$$

fortschaffen, so daß man unter dem Integralzeichen nur noch eine *rationale* Funktion von t behält. Es ist nämlich

$$\sin x = 2\sin\left(\frac{x}{2}\right)\cos\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{2\sin\left(\frac{x}{2}\right)\cos\left(\frac{x}{2}\right)}{\cos^2\left(\frac{x}{2}\right) + \sin^2\left(\frac{x}{2}\right)},$$

$$\cos x = \cos^2\left(\frac{x}{2}\right) - \sin^2\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{\cos^2\left(\frac{x}{2}\right) - \sin^2\left(\frac{x}{2}\right)}{\cos^2\left(\frac{x}{2}\right) + \sin^2\left(\frac{x}{2}\right)},$$

oder, wenn man Zähler und Nenner dieser Brüche durch $\cos^2\left(\frac{x}{2}\right)$ dividiert, so folgt aus Gleichung (68.)

$$(69.) \quad \sin x = \frac{2\operatorname{tg}\left(\frac{x}{2}\right)}{1 + \operatorname{tg}^2\left(\frac{x}{2}\right)} = \frac{2t}{1 + t^2},$$

$$(70.) \quad \cos x = \frac{1 - \operatorname{tg}^2\left(\frac{x}{2}\right)}{1 + \operatorname{tg}^2\left(\frac{x}{2}\right)} = \frac{1 - t^2}{1 + t^2},$$

$$(71.) \quad \operatorname{tg} x = \frac{2t}{1 - t^2}, \quad \operatorname{ctg} x = \frac{1 - t^2}{2t}.$$

Aus Gleichung (68.) findet man sodann noch

$$(72.) \quad x = 2\arctgt, \quad \text{also} \quad dx = \frac{2dt}{1 + t^2}$$

und erhält dadurch die Formel

$$(73.) \quad \int f(\sin x, \cos x, \operatorname{tg} x, \operatorname{ctg} x) dx = \int f\left(\frac{2t}{1+t^2}, \frac{1-t^2}{1+t^2}, \frac{2t}{1-t^2}, \frac{1-t^2}{2t}\right) \frac{2dt}{1+t^2}.$$

Mit Hilfe dieser Formel kann man z. B. die folgende Aufgabe lösen:

Aufgabe 23. $\int \frac{(1 + \sin x) dx}{\sin x (1 + \cos x)} = ?$

Auflösung. Nach Gleichung (73.) wird

$$\begin{aligned} \int \frac{(1 + \sin x) dx}{\sin x (1 + \cos x)} &= \int \left(1 + \frac{2t}{1+t^2}\right) \frac{2dt}{1+t^2} : \frac{2t}{1+t^2} \left(1 + \frac{1-t^2}{1+t^2}\right) \\ &= \int \frac{(1+t^2+2t)dt}{t(1+t^2+1-t^2)} = \frac{1}{2} \int (t+2+t^{-1}) dt, \end{aligned}$$

also

$$(74.) \quad \int \frac{(1 + \sin x)dx}{\sin x(1 + \cos x)} = \frac{1}{2} \left(\frac{t^2}{2} + 2t + \ln t \right) \\ = \frac{1}{4} \operatorname{tg}^2 \left(\frac{x}{2} \right) + \operatorname{tg} \left(\frac{x}{2} \right) + \frac{1}{2} \ln \left[\operatorname{tg} \left(\frac{x}{2} \right) \right].$$

Ist $f(\sin x, \cos x, \operatorname{tg} x, \operatorname{ctg} x)$ eine *rationale* Funktion der vier Funktionen $\sin x, \cos x, \operatorname{tg} x, \operatorname{ctg} x$, so erreicht man durch die in Gleichung (73.) angegebene Substitution, daß unter dem Integralzeichen eine *rationale* Funktion der einzigen Veränderlichen t steht. Die Integration rationaler Funktionen ist bereits früher in einigen besonders einfachen Fällen durchgeführt; wie sie aber ganz allgemein durchgeführt werden kann, wird an einer späteren Stelle gezeigt werden.

Steht unter dem Integralzeichen eine *rationale* Funktion der vier *hyperbolischen* Funktionen $\operatorname{Sin} x, \operatorname{Cos} x, \operatorname{Tg} x, \operatorname{Ctg} x$, so beachte man, daß diese Funktionen selbst wieder *rationale* Funktionen von e^x sind. Es ist nämlich

$$\operatorname{Sin} x = \frac{1}{2}(e^x - e^{-x}), \quad \operatorname{Cos} x = \frac{1}{2}(e^x + e^{-x}), \\ \operatorname{Tg} x = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}, \quad \operatorname{Ctg} x = \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}}.$$

Deshalb erreicht man es auch in diesem Falle durch die Substitution

$$(75.) \quad e^x = t, \quad e^{-x} = \frac{1}{t}, \quad dx = \frac{dt}{t},$$

daß unter dem Integralzeichen eine *rationale* Funktion von t steht, die nach den später folgenden Regeln integriert werden kann.

$$\text{Beispiel.} \quad \int \frac{dx}{\operatorname{Cos} x} = 2 \int \frac{dx}{e^x + e^{-x}} = 2 \int \frac{e^x dx}{e^{2x} + 1}.$$

Setzt man also

$$e^x = t, \quad e^x dx = dt,$$

so wird

$$(76.) \quad \int \frac{dx}{\operatorname{Cos} x} = 2 \int \frac{dt}{1 + t^2} = 2 \operatorname{arctg} t = 2 \operatorname{arctg} (e^x)$$

Man kann in diesem Falle die Funktion unter dem Integralzeichen auch dadurch rational machen, daß man

$$(77.) \quad \operatorname{Tg}\left(\frac{x}{2}\right) = t$$

als neue Integrations-Veränderliche einführt, denn es wird dann nach D.-R., Formel Nr. 57, 58 und 79 der Tabelle

$$(78.) \quad \operatorname{Sin} x = \frac{2t}{1+t^2}, \quad \operatorname{Cos} x = \frac{1-t^2}{1+t^2},$$

$$(79.) \quad \operatorname{Tg} x = \frac{2t}{1-t^2}, \quad \operatorname{Ctg} x = \frac{1+t^2}{2t},$$

$$(80.) \quad x = 2\operatorname{ArTg} t, \quad dx = \frac{2dt}{1-t^2},$$

also

$$(81.) \quad \int f(\operatorname{Sin} x, \operatorname{Cos} x, \operatorname{Tg} x, \operatorname{Ctg} x) dx = \int f\left(\frac{2t}{1+t^2}, \frac{1-t^2}{1+t^2}, \frac{2t}{1-t^2}, \frac{1+t^2}{2t}\right) \cdot \frac{2dt}{1-t^2}.$$

§ 12.

Integration durch Einführung trigonometrischer oder hyperbolischer Funktionen.

(Vergl. die Formel-Tabelle Nr. 84 bis 86a.)

Während in den vorhergehenden Paragraphen gezeigt wurde, wie man die Funktion unter dem Integralzeichen, wenn sie trigonometrische oder andere transzendente Funktionen enthält, durch Substitution so umzuformen sucht, daß sie diese transzendenten Funktionen nicht mehr enthält, so gibt es auch Fälle, wo die Integration dadurch erleichtert wird, daß man für die Integrations-Veränderliche x eine trigonometrische oder hyperbolische Funktion der neuen Integrations-Veränderlichen t oder u einführt. Man wendet eine solche Substitution namentlich dann mit gutem Erfolge an, wenn unter dem Integralzeichen eine der Irrationalitäten $\sqrt{a^2 - x^2}$, $\sqrt{a^2 + x^2}$, $\sqrt{x^2 - a^2}$ auftritt.

So werden Integrale von der Form

$$\int f(x, \sqrt{a^2 - x^2}) dx$$

häufig durch die Substitution

$$(1.) \quad x = a \sin t$$

auf einfachere zurückgeführt. Es wird dann nämlich

$$(2.) \quad dx = a \cos t \, dt, \quad \sqrt{a^2 - x^2} = a \cos t,$$

also

$$(3.) \quad \int f(x, \sqrt{a^2 - x^2}) dx = \int f(a \sin t, a \cos t) \cdot a \cos t \, dt.$$

In das sich hieraus ergebende Resultat muß man

$$(4.) \quad \begin{cases} \sin t = \frac{x}{a}, & \cos t = \frac{\sqrt{a^2 - x^2}}{a}, \\ \operatorname{tg} t = \frac{x}{\sqrt{a^2 - x^2}}, & \operatorname{ctg} t = \frac{\sqrt{a^2 - x^2}}{x} \end{cases}$$

einsetzen, damit man schließlich eine Funktion von x erhält.

Die gleichen Dienste leistet die Substitution

$$(5.) \quad x = a \operatorname{Tgu};$$

dann wird

$$(6.) \quad dx = \frac{a \, du}{\operatorname{Cos}^2 u}, \quad \sqrt{a^2 - x^2} = \sqrt{a^2(1 - \operatorname{Tg}^2 u)} = \frac{a}{\operatorname{Cos} u},$$

also

$$(7.) \quad \int f(x, \sqrt{a^2 - x^2}) dx = \int f(a \operatorname{Tgu}, \frac{a}{\operatorname{Cos} u}) \cdot \frac{a \, du}{\operatorname{Cos}^2 u},$$

wobei

$$(8.) \quad \begin{cases} \operatorname{Sin} u = \frac{x}{a}, & \operatorname{Cos} u = \frac{\sqrt{a^2 - x^2}}{a}, \\ \operatorname{Tgu} = \frac{x}{\sqrt{a^2 - x^2}}, & \operatorname{Ctgu} = \frac{\sqrt{a^2 - x^2}}{x}. \end{cases}$$

Übungs-Beispiele.

$$1) \quad \int \frac{dx}{x^2 \sqrt{a^2 - x^2}} = \frac{1}{a^2} \int \frac{dt}{\sin^2 t} = -\frac{1}{a^2} \operatorname{ctg} t = -\frac{\sqrt{a^2 - x^2}}{a^2 x},$$

oder

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{x^2 \sqrt{a^2 - x^2}} &= \frac{1}{a^2} \int \frac{\operatorname{Cos} u \, du}{\operatorname{Sin}^2 u} = \frac{1}{a^2} \int (\operatorname{Sin} u)^{-2} d(\operatorname{Sin} u) \\ &= -\frac{1}{a^2 \operatorname{Sin} u} = -\frac{\sqrt{a^2 - x^2}}{a^2 x}. \end{aligned}$$

(Vergl. Formel Nr. 38 der Tabelle.)

$$2) \quad \int \frac{dx}{(a^2 - x^2) \sqrt{a^2 - x^2}} = \frac{1}{a^2} \int \frac{dt}{\cos^2 t} = \frac{1}{a^2} \operatorname{tg} t = \frac{x}{a^2 \sqrt{a^2 - x^2}},$$

oder

$$\int \frac{dx}{(a^2 - x^2) \sqrt{a^2 - x^2}} = \int \frac{a du \cos^3 u}{\cos^2 u \cdot a^3} = \frac{1}{a^2} \int \cos u du = \frac{\sin u}{a^2}$$

$$= \frac{x}{a^2 \sqrt{a^2 - x^2}}.$$

$$\begin{aligned} 3) \int \frac{(a^2 - 2x^2) dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} &= a^2 \int (1 - 2 \sin^2 t) dt = a^2 \int \cos(2t) dt \\ &= \frac{a^2}{2} \int \cos(2t) \cdot d(2t) = \frac{a^2}{2} \sin(2t) \\ &= a^2 \sin t \cos t = x \sqrt{a^2 - x^2}. \end{aligned}$$

Bei Integralen von der Form

$$\int f(x, \sqrt{a^2 + x^2}) dx$$

kann man häufig die Substitution

$$(9.) \quad x = a \operatorname{tg} t$$

mit gutem Erfolge anwenden. Man erhält dabei

$$(10.) \quad dx = \frac{a dt}{\cos^2 t}, \quad \sqrt{a^2 + x^2} = \frac{a}{\cos t},$$

also

$$(11.) \quad \int f(x, \sqrt{a^2 + x^2}) dx = \int f(a \operatorname{tg} t, \frac{a}{\cos t}) \cdot \frac{a dt}{\cos^2 t},$$

wobei

$$(12.) \quad \begin{cases} \sin t = \frac{x}{\sqrt{a^2 + x^2}}, & \cos t = \frac{a}{\sqrt{a^2 + x^2}}, \\ \operatorname{tg} t = \frac{x}{a}, & \operatorname{ctg} t = \frac{a}{x}. \end{cases}$$

Die gleichen Dienste leistet die Substitution

$$(13.) \quad x = a \sin u;$$

dann wird

$$(14.) \quad dx = a \cos u \cdot du, \quad \sqrt{a^2 + x^2} = \sqrt{a^2 (1 + \sin^2 u)} = a \cos u,$$

also

$$(15.) \quad \int f(x, \sqrt{a^2 + x^2}) dx = \int f(a \sin u, a \cos u) \cdot a \cos u \cdot du,$$

wobei

$$(16.) \quad \begin{cases} \sin u = \frac{x}{a}, & \cos u = \frac{\sqrt{a^2 + x^2}}{a}, \\ \operatorname{Tg} u = \frac{x}{\sqrt{a^2 + x^2}}, & \operatorname{Ctg} u = \frac{\sqrt{a^2 + x^2}}{x}. \end{cases}$$

Übungs-Beispiele.

$$1) \quad \int \frac{x^3 dx}{\sqrt{a^2 + x^2}} = \int \frac{a^3 \sin^3 t \cdot a dt \cdot \cos t}{\cos^3 t \cdot \cos^2 t \cdot a} = a^3 \int \frac{\sin^3 t dt}{\cos^4 t},$$

oder, wenn man

$$(17.) \quad \cos t = z, \quad \text{also} \quad \sin t dt = -dz$$

setzt,

$$(18.) \quad \begin{aligned} \int \frac{x^3 dx}{\sqrt{a^2 + x^2}} &= -a^3 \int \frac{(1 - z^2) dz}{z^4} = -a^3 \int (z^{-4} - z^{-2}) dz \\ &= -a^3 \left(\frac{z^{-3}}{-3} - \frac{z^{-1}}{-1} \right) = \frac{a^3}{3} \left(\frac{1}{z^3} - \frac{3}{z} \right). \end{aligned}$$

Indem man schließlich noch

$$z = \cos t = \frac{a}{\sqrt{a^2 + x^2}}$$

einsetzt, findet man

$$(19.) \quad \begin{aligned} \int \frac{x^3 dx}{\sqrt{a^2 + x^2}} &= \frac{a^3}{3} \left(\frac{(\sqrt{a^2 + x^2})^3}{a^3} - \frac{3\sqrt{a^2 + x^2}}{a} \right) \\ &= \frac{1}{3} \sqrt{a^2 + x^2} (x^2 - 2a^2). \end{aligned}$$

Einfacher findet man dieses Resultat durch die Substitution $x = a \sin u$, denn dadurch wird

$$(20.) \quad \begin{aligned} \int \frac{x^3 dx}{\sqrt{a^2 + x^2}} &= a^3 \int \sin^3 u \cdot du = a^3 \int (\cos^2 u - 1) d(\cos u) \\ &= a^3 \left[\frac{1}{3} \cos^3 u - \cos u \right] = \frac{1}{3} \sqrt{a^2 + x^2} (x^2 - 2a^2). \end{aligned}$$

$$(2) \quad \begin{aligned} \int \frac{dx}{x^4 \sqrt{a^2 + x^2}} &= \frac{1}{a^4} \int \frac{a dt \cdot \cos^4 t \cdot \cos t}{\cos^2 t \cdot \sin^4 t \cdot a} = \frac{1}{a^4} \int \frac{\cos^3 t}{\sin^4 t} dt \\ &= \frac{1}{a^4} \int \left(\frac{1}{\sin^4 t} - \frac{1}{\sin^2 t} \right) d(\sin t) = \frac{1}{a^4} \left(-\frac{1}{3 \sin^3 t} + \frac{1}{\sin t} \right). \end{aligned}$$

Nun ist

$$(21.) \quad \sin t = \frac{x}{\sqrt{a^2 + x^2}}, \quad \frac{1}{\sin t} = \frac{\sqrt{a^2 + x^2}}{x},$$

folglich wird

$$(22.) \quad \int \frac{dx}{x^4 \sqrt{a^2 + x^2}} = \frac{1}{a^4} \left(-\frac{(\sqrt{a^2 + x^2})^3}{3x^3} + \frac{\sqrt{a^2 + x^2}}{x} \right) \\ = \frac{\sqrt{a^2 + x^2}}{3a^4 x^3} (2x^2 - a^2).$$

Auch hier führt die Substitution $x = a \sin u$ schneller zum Ziele, denn es wird

$$\int \frac{dx}{x^4 \sqrt{a^2 + x^2}} = \frac{1}{a^4} \int \frac{du}{\sin^4 u} = \frac{1}{a^4} \int (\operatorname{Ctg}^2 u - 1) \frac{du}{\sin^2 u},$$

oder, wenn man $\operatorname{Ctg} u = z$ setzt,

$$\int \frac{dx}{x^4 \sqrt{a^2 + x^2}} = -\frac{1}{a^4} \int (z^2 - 1) dz = -\frac{1}{a^4} \left(\frac{z^3}{3} - z \right) \\ = \frac{\operatorname{Ctg} u}{3a^4} (3 - \operatorname{Ctg}^2 u) = \frac{\sqrt{a^2 + x^2}}{3a^4 x} \left(3 - \frac{a^2 + x^2}{x^2} \right) \\ = \frac{\sqrt{a^2 + x^2}}{3a^4 x^3} (2x^2 - a^2).$$

$$3) \quad \int \frac{dx}{(a^2 + x^2) \sqrt{a^2 + x^2}} = \int \frac{a dt \cdot \cos^3 t}{\cos^2 t \cdot a^3} = \frac{1}{a^2} \int \cos t dt \\ = \frac{\sin t}{a^2} = \frac{x}{a^2 \sqrt{a^2 + x^2}},$$

oder

$$\int \frac{dx}{(a^2 + x^2) \sqrt{a^2 + x^2}} = \frac{1}{a^2} \int \frac{du}{\sin^3 u} = \frac{1}{a^2} \operatorname{Ctg} u = \frac{x}{a^2 \sqrt{a^2 + x^2}}.$$

Bei Integralen von der Form

$$\int f(x, \sqrt{x^2 - a^2}) dx$$

kann man häufig die Substitution

$$(23.) \quad x = \frac{a}{\cos t}$$

mit gutem Erfolge anwenden. Dabei wird

$$(24.) \quad dx = \frac{a \sin t dt}{\cos^2 t}, \quad \sqrt{x^2 - a^2} = \sqrt{\frac{a^2}{\cos^2 t} - a^2} = a \operatorname{tg} t,$$

also

$$(25.) \quad \int f(x, \sqrt{x^2 - a^2}) dx = \int f\left(\frac{a}{\cos t}, a \operatorname{tg} t\right) \cdot \frac{a \sin t dt}{\cos^2 t},$$

wobei

$$(26.) \quad \begin{cases} \sin t = \frac{\sqrt{x^2 - a^2}}{x}, & \cos t = \frac{a}{x}, \\ \operatorname{tg} t = \frac{\sqrt{x^2 - a^2}}{a}, & \operatorname{ctg} t = \frac{a}{\sqrt{x^2 - a^2}}. \end{cases}$$

Die gleichen Dienste leistet die Substitution

$$(27.) \quad x = a \operatorname{Cof} u;$$

dann wird

$$(28.) \quad dx = a \operatorname{Sin} u \cdot du, \quad \sqrt{x^2 - a^2} = \sqrt{a^2 (\operatorname{Cof}^2 u - 1)} = a \operatorname{Sin} u,$$

also

$$(29.) \quad \int f(x, \sqrt{x^2 - a^2}) dx = \int f(a \operatorname{Cof} u, a \operatorname{Sin} u) \cdot a \operatorname{Sin} u \cdot du,$$

wobei

$$(30.) \quad \begin{cases} \operatorname{Sin} u = \frac{\sqrt{x^2 - a^2}}{a}, & \operatorname{Cof} u = \frac{x}{a}, \\ \operatorname{Tg} u = \frac{\sqrt{x^2 - a^2}}{x}, & \operatorname{Ctg} u = \frac{x}{\sqrt{x^2 - a^2}}. \end{cases}$$

Übungs-Beispiele.

$$\begin{aligned} 1) \quad \int \frac{dx}{x^4 \sqrt{x^2 - a^2}} &= \int \frac{a \sin t dt \cos^4 t \cdot \cos t}{\cos^2 t \cdot a^4 \cdot a \sin t} = \frac{1}{a^4} \int \cos^3 t dt \\ &= \frac{1}{a^4} \int (1 - \sin^2 t) d(\sin t) = \frac{1}{a^4} \left(\sin t - \frac{\sin^3 t}{3} \right), \end{aligned}$$

also

$$(31.) \int \frac{dx}{x^4 \sqrt{x^2 - a^2}} = \frac{1}{3a^4} \left(\frac{3\sqrt{x^2 - a^2}}{x} - \frac{(x^2 - a^2)^{3/2}}{x^3} \right) \\ = \frac{\sqrt{x^2 - a^2}}{3a^4 x^3} (2x^2 + a^2).$$

Setzt man $x = a \operatorname{Cof} u$, so erhält man

$$\int \frac{dx}{x^4 \sqrt{x^2 - a^2}} = \frac{1}{a^4} \int \frac{du}{\operatorname{Cof}^4 u} = \frac{1}{a^4} \int (1 - \operatorname{Tg}^2 u) \frac{du}{\operatorname{Cof}^2 u},$$

oder, wenn man $\operatorname{Tg} u$ mit z bezeichnet,

$$(32.) \int \frac{dx}{x^4 \sqrt{x^2 - a^2}} = \frac{1}{a^4} \int (1 - z^2) dz = \frac{1}{a^4} \left(z - \frac{z^3}{3} \right) \\ = \frac{\operatorname{Tg} u}{3a^4} (3 - \operatorname{Tg}^2 u) = \frac{\sqrt{x^2 - a^2}}{3a^4 x^3} (2x^2 + a^2).$$

$$2) \int \frac{dx}{(x^2 - a^2) \sqrt{x^2 - a^2}} = \int \frac{dx}{(\sqrt{x^2 - a^2})^3} = \int \frac{a \sin t dt \cdot \cos^3 t}{\cos^2 t \cdot a^3 \sin^3 t} \\ = \frac{1}{a^2} \int \frac{\cos t dt}{\sin^2 t} = -\frac{1}{a^2 \sin t},$$

also

$$(33.) \int \frac{dx}{(x^2 - a^2) \sqrt{x^2 - a^2}} = -\frac{x}{a^2 \sqrt{x^2 - a^2}},$$

oder

$$(34.) \int \frac{dx}{(x^2 - a^2) \sqrt{x^2 - a^2}} = \frac{1}{a^2} \int \frac{du}{\operatorname{Sin}^2 u} = -\frac{1}{a^2} \operatorname{Ctg} u \\ = -\frac{x}{a^2 \sqrt{x^2 - a^2}}.$$

$$3) \int \frac{dx}{(x^2 + a^2) \sqrt{x^2 - a^2}} = \int \frac{a \sin t dt \cdot \cos t}{\cos^2 t \left(\frac{a^2}{\cos^2 t} + a^2 \right) \cdot a \sin t} \\ = \frac{1}{a^2} \int \frac{\cos t dt}{1 + \cos^2 t} = \frac{1}{a^2} \int \frac{d(\sin t)}{2 - \sin^2 t}.$$

Setzt man

$$(35.) \quad \sin t = z,$$

so kann man zur Berechnung dieses Integrals Formel Nr. 29 der Tabelle anwenden und findet

$$\int \frac{dx}{(x^2 + a^2)\sqrt{x^2 - a^2}} = -\frac{1}{a^2} \int \frac{dz}{z^2 - 2} = -\frac{1}{2a^2\sqrt{2}} \ln\left(\frac{\sqrt{2}-z}{\sqrt{2}+z}\right) \\ = -\frac{1}{2a^2\sqrt{2}} \ln\left(\frac{\sqrt{2}-\sin t}{\sqrt{2}+\sin t}\right) = \frac{1}{2a^2\sqrt{2}} \ln\left(\frac{x\sqrt{2} + \sqrt{x^2 - a^2}}{x\sqrt{2} - \sqrt{x^2 - a^2}}\right).$$

Man beachte, daß in den drei hier behandelten Fällen die trigonometrische oder hyperbolische Funktion, welche für x substituiert wird, jedesmal so zu wählen ist, daß unter dem Wurzelzeichen ein vollständiges Quadrat steht, daß sich also die Wurzel ausziehen läßt.

Für $x = a \sin t$ wird nämlich

$$\sqrt{a^2 - x^2} = \sqrt{a^2(1 - \sin^2 t)} = a \cos t,$$

für $x = a \operatorname{tg} t$ wird $\sqrt{a^2 + x^2} = \sqrt{a^2(1 + \operatorname{tg}^2 t)} = \frac{a}{\cos t},$

„ $x = \frac{a}{\cos t}$ „ $\sqrt{x^2 - a^2} = \sqrt{\frac{a^2(1 - \cos^2 t)}{\cos^2 t}} = a \operatorname{tg} t;$

und für $x = a \operatorname{Igu}$ wird $\sqrt{a^2 - x^2} = \sqrt{a^2(1 - \operatorname{Igu}^2)} = \frac{a}{\operatorname{Cos} u},$

„ $x = a \operatorname{Sin} u$ „ $\sqrt{a^2 + x^2} = \sqrt{a^2(1 + \operatorname{Sin}^2 u)} = a \operatorname{Cos} u,$

„ $x = a \operatorname{Cos} u$ „ $\sqrt{x^2 - a^2} = \sqrt{a^2(\operatorname{Cos}^2 u - 1)} = a \operatorname{Sin} u.$

Kennt man die trigonometrischen Funktionen, die dabei zu substituieren sind, so ergeben sich die entsprechenden hyperbolischen Funktionen ohne weiteres aus dem, was über die Beziehung zwischen den hyperbolischen und den trigonometrischen Funktionen in § 31 der Differential-Rechnung gesagt ist. Bezeichnet man nämlich mit t den „transzendenten Winkel“ und mit u den gemeinsamen Winkel, so gelten die Formeln

$$\sin t = \operatorname{Igu}, \quad \operatorname{tg} t = \operatorname{Sin} u, \quad \operatorname{sect} = \frac{1}{\cos t} = \operatorname{Cos} u.$$

(Vergl. auch D.-R., Formel Nr. 81 der Tabelle.)

Geometrisch läßt sich dieses Verfahren in folgender Weise deuten. Ist in dem Integral von $f(x, y)dx$

$$(36.) \quad y = \sqrt{a^2 - x^2}, \quad \text{also} \quad x^2 + y^2 = a^2,$$

so entspricht dieser Gleichung ein Kreis mit dem Halbmesser a . (Vergl. Fig. 12.) Dabei lassen sich die Koordinaten x und y des Punktes P als eindeutige Funktionen des Zentriwinkels φ darstellen. Es wird nämlich

$$(37.) \quad x = a \cos \varphi, \quad y = a \sin \varphi,$$

oder, wenn man den Komplementwinkel von φ mit t bezeichnet,

$$(38.) \quad x = a \sin t, \quad y = a \cos t.$$

Ist

$$(39.) \quad y = \sqrt{x^2 - a^2}, \quad \text{also} \quad x^2 - y^2 = a^2,$$

so entspricht dieser Gleichung eine gleichseitige Hyperbel. (Vergl. Fig. 13.) Auch hier lassen sich die Koordinaten x und y des Punktes P als eindeutige Funktionen von u darstellen. Es wird nämlich nach den Sätzen über hyperbolische Funktionen

$$(40.) \quad x = a \operatorname{Cof} u, \quad y = a \operatorname{Sin} u.$$

Ist schließlich

$$(41.) \quad y = \sqrt{a^2 + x^2}, \quad \text{also} \quad y^2 - x^2 = a^2,$$

so ergibt sich aus Fig. 13, indem man x mit y vertauscht,

$$(42.) \quad x = a \operatorname{Sin} u, \quad y = a \operatorname{Cof} u.$$

Fig. 12.





Fig. 13.



Bei der Integration durch Substitution ist die neue Integrations-Veränderliche t im allgemeinen so zu wählen, daß aus der Gleichung

$$x = \varphi(t) \quad \text{die Gleichung} \quad t = \psi(x)$$

abgeleitet werden kann, und jedem Werte von x innerhalb der Integrationsgrenzen nur *ein* Wert von t zugeordnet ist; und umgekehrt darf jedem Wert von t innerhalb der Integrationsgrenzen nur *ein* Wert von x entsprechen. Wenn diese Regel nicht beachtet wird, so können leicht Fehler entstehen. In einem späteren Abschnitte soll diese Frage noch besonders untersucht werden.

III. Abschnitt.

Integration durch Zerlegung.

§ 13.

Integration von einigen gebrochenen rationalen Funktionen durch Zerlegung.

(Vergl. die Formel-Tabelle Nr. 29a, 87 bis 92.)

In vielen Fällen kann man die Differential-Funktion $f(x)dx$ unter dem Integralzeichen in zwei oder mehrere Summanden zerlegen, die dann einzeln sehr leicht integriert werden können. Wie dies namentlich bei gebrochenen rationalen Funktionen geschieht, mögen die folgenden Aufgaben zeigen.

Aufgabe 1. $\int \frac{dx}{x^2 - a^2} = ?$

Auflösung. Die Aufgabe ist schon in § 8 (Aufgabe 7) behandelt worden; dabei ergab sich

$$(1.) \quad \int \frac{dx}{x^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \ln \left(\frac{x-a}{x+a} \right) = -\frac{1}{a} \operatorname{Ar} \operatorname{Ctg} \left(\frac{x}{a} \right).$$

(Vergl. Formel Nr. 29a der Tabelle.)

Dasselbe Resultat findet man auch durch folgende Überlegung. Die beiden Unbekannten A und B lassen sich immer so bestimmen, daß *identisch**)

$$(2.) \quad \frac{1}{x^2 - a^2} = \frac{A}{x-a} + \frac{B}{x+a}$$

wird. In der Tat, schafft man in Gleichung (2.) die Nenner fort, indem man beide Seiten mit

$$x^2 - a^2 = (x-a)(x+a)$$

multipliziert, so erhält man

*) Die Gleichung heißt eine „identische Gleichung“, wenn sie für *alle* Werte von x gilt.

$$(3.) \quad 1 = A(x + a) + B(x - a).$$

Diese Gleichung soll für *alle* Werte von x gelten, folglich auch für $x = +a$ und für $x = -a$. Für $x = +a$ findet man aber

$$(4.) \quad 1 = 2Aa, \quad \text{oder} \quad A = \frac{1}{2a},$$

und für $x = -a$

$$(5.) \quad 1 = -2Ba, \quad \text{oder} \quad B = -\frac{1}{2a}.$$

Setzt man diese Werte in Gleichung (2.) ein, so erhält man

$$(6.) \quad \frac{1}{x^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \left(\frac{1}{x - a} - \frac{1}{x + a} \right).$$

Von der Richtung dieser Gleichung kann man sich überzeugen, indem man die beiden Glieder in der Klammer auf gleichen Nenner bringt. Aus Gleichung (6.) folgt dann ohne weiteres nach Formel Nr. 27 der Tabelle

$$(7.) \quad \int \frac{dx}{x^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \int \left(\frac{1}{x - a} - \frac{1}{x + a} \right) dx \\ = \frac{1}{2a} [\ln(x - a) - \ln(x + a)] = \frac{1}{2a} \ln \left(\frac{x - a}{x + a} \right).$$

Aufgabe 2. $\int \frac{dx}{x^2 + 10x + 16} = ?$

Auflösung. Diese Aufgabe kann man auf die vorhergehende zurückführen. Ergänzt man nämlich die beiden ersten Glieder des Nenners zu einem vollständigen Quadrate, indem man 25 addiert und dann wieder subtrahiert, so erhält man

$$(8.) \quad x^2 + 10x + 16 = (x^2 + 10x + 25) + (16 - 25) = (x + 5)^2 - 9.$$

Indem man jetzt noch

$$(9.) \quad x + 5 = t, \quad \text{also} \quad dx = dt$$

setzt, wird

$$(10.) \quad \int \frac{dx}{x^2 + 10x + 16} = \int \frac{dx}{(x + 5)^2 - 9} = \int \frac{dt}{t^2 - 3^2},$$

oder nach Gleichung (7.), wenn man x mit t und a mit 3 vertauscht,

$$(11.) \quad \int \frac{dx}{x^2 + 10x + 16} = \frac{1}{6} \ln \left(\frac{t-3}{t+3} \right) = \frac{1}{6} \ln \left(\frac{x+2}{x+8} \right).$$

Aufgabe 3. $\int \frac{dx}{x^2 + 6x + 13} = ?$

Auflösung. In ähnlicher Weise wie bei der vorhergehenden Aufgabe wird man hier den Nenner auf die Form

$$(12.) \quad x^2 + 6x + 13 = (x^2 + 6x + 9) + (13 - 9) = (x + 3)^2 + 4$$

bringen und

$$(13.) \quad x + 3 = t, \quad \text{also} \quad dx = dt$$

setzen; dadurch erhält man

$$(14.) \quad \int \frac{dx}{x^2 + 6x + 13} = \int \frac{dx}{(x+3)^2 + 4} = \int \frac{dt}{t^2 + 2^2}.$$

Wollte man jetzt die Integration nach der in Aufgabe 1 gefundenen Formel ausführen, so müßte man

$$a^2 = -4, \quad \text{also} \quad a = 2\sqrt{-1} = 2i$$

setzen, so daß man für das Resultat eine *komplexe* Form erhalten würde. Dies kann man vermeiden, indem man Formel Nr. 28 der Tabelle, nämlich

$$\int \frac{dt}{t^2 + a^2} = \frac{1}{a} \operatorname{arctg} \left(\frac{t}{a} \right)$$

für $a = 2$ anwendet. Dadurch findet man

$$(15.) \quad \int \frac{dx}{x^2 + 6x + 13} = \frac{1}{2} \operatorname{arctg} \left(\frac{t}{2} \right) = \frac{1}{2} \operatorname{arctg} \left(\frac{x+3}{2} \right).$$

Aufgabe 4. $\int \frac{dx}{x^2 + 2bx + c} = ?$

Auflösung. Wie man schon aus den beiden vorhergehenden Aufgaben erkennt, muß man bei dieser Aufgabe drei Fälle unterscheiden, je nachdem $b^2 - c$ positiv, negativ oder gleich Null ist.

1. Fall. $b^2 - c > 0.$

Setzt man in diesem Falle der Kürze wegen

$$(16.) \quad \sqrt{b^2 - c} = +a, \quad \text{also} \quad b^2 - c = +a^2,$$

so wird a eine reelle Größe, und man erhält

$$(17.) \quad x^2 + 2bx + c = (x^2 + 2bx + b^2) + (c - b^2) \\ = (x + b)^2 - a^2.$$

Dies gibt, wenn man $x + b$ mit t bezeichnet, nach Aufgabe 1

$$\int \frac{dx}{x^2 + 2bx + c} = \int \frac{dt}{t^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \ln \left(\frac{t - a}{t + a} \right),$$

oder

$$(18.) \quad \int \frac{dx}{x^2 + 2bx + c} = \frac{1}{2\sqrt{b^2 - c}} \ln \left(\frac{x + b - \sqrt{b^2 - c}}{x + b + \sqrt{b^2 - c}} \right).$$

Man erkennt ohne weiteres den Zusammenhang dieses Verfahrens mit der Auflösung der quadratischen Gleichungen. Um nämlich die quadratische Gleichung

$$x^2 + 2bx + c = 0$$

aufzulösen, bringt man die Gleichung auf die Form

$$x^2 + 2bx + b^2 = b^2 - c$$

und zieht dann auf beiden Seiten dieser letzten Gleichung die Quadratwurzel aus. Dadurch erhält man

$$x + b = \pm \sqrt{b^2 - c},$$

oder

$$x_1 = -b + \sqrt{b^2 - c}, \quad x_2 = -b - \sqrt{b^2 - c},$$

$$x_1 + x_2 = -2b, \quad x_1 \cdot x_2 = c, \quad x_1 - x_2 = 2\sqrt{b^2 - c},$$

$$x^2 + 2bx + c = x^2 - (x_1 + x_2)x + x_1x_2 = (x - x_1)(x - x_2),$$

wo x_1 und x_2 die beiden Wurzeln der quadratischen Gleichung sind. Setzt man diese Werte in die Gleichung (18.) ein, so nimmt dieselbe die Form an

$$(18a.) \quad \int \frac{dx}{(x - x_1)(x - x_2)} = \frac{1}{x_1 - x_2} \ln \left(\frac{x - x_1}{x - x_2} \right).$$

Von der Richtigkeit dieses Resultates kann man sich in folgender Weise überzeugen. Die beiden Unbekannten A und B lassen sich immer so bestimmen, daß *identisch*

$$(19.) \quad \frac{1}{(x - x_1)(x - x_2)} = \frac{A}{x - x_1} + \frac{B}{x - x_2}$$

wird. In der Tat, schafft man in Gleichung (19.) die Nenner fort, indem man beide Seiten mit $(x - x_1)(x - x_2)$ multipliziert, so erhält man

$$(20.) \quad 1 = A(x - x_2) + B(x - x_1).$$

Diese Gleichung soll für *alle* Werte von x gelten, folglich gilt sie auch für $x = x_1$ und für $x = x_2$. Für $x = x_1$ findet man aber

$$(21.) \quad 1 = A(x_1 - x_2), \quad \text{oder} \quad A = \frac{1}{x_1 - x_2},$$

und für $x = x_2$

$$(22.) \quad 1 = B(x_2 - x_1), \quad \text{oder} \quad B = \frac{1}{x_2 - x_1}.$$

Setzt man diese Werte in Gleichung (19.) ein, so erhält man

$$(23.) \quad \frac{1}{(x - x_1)(x - x_2)} = \frac{1}{x_1 - x_2} \left(\frac{1}{x - x_1} - \frac{1}{x - x_2} \right).$$

Daß die rechte Seite dieser Gleichung der linken identisch gleich ist, ergibt sich ohne weiteres, indem man die Glieder in der Klammer auf gleichen Nenner bringt.

Aus Gleichung (23.) folgt dann in Übereinstimmung mit Gleichung (18a.)

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{(x - x_1)(x - x_2)} &= \frac{1}{x_1 - x_2} \int \left(\frac{1}{x - x_1} - \frac{1}{x - x_2} \right) dx \\ &= \frac{1}{x_1 - x_2} [\ln(x - x_1) - \ln(x - x_2)] = \frac{1}{x_1 - x_2} \ln \left(\frac{x - x_1}{x - x_2} \right). \end{aligned}$$

II. Fall. $b^2 - c < 0.$

Setzt man in diesem Falle der Kürze wegen

$$(24.) \quad \sqrt{c - b^2} = a, \quad \text{oder} \quad b^2 - c = -a^2,$$

so wird a eine reelle GröÙe, und man erhält

$$x^2 + 2bx + c = (x^2 + 2bx + b^2) + (c - b^2) = (x + b)^2 + a^2.$$

Dies gibt, wenn man wieder $x + b$ mit t bezeichnet,

$$\int \frac{dx}{x^2 + 2bx + c} = \int \frac{dx}{(x + b)^2 + a^2} = \int \frac{dt}{t^2 + a^2} = \frac{1}{a} \operatorname{arctg} \left(\frac{t}{a} \right),$$

also

$$(25.) \quad \int \frac{dx}{x^2 + 2bx + c} = \frac{1}{\sqrt{c - b^2}} \operatorname{arctg} \left(\frac{x + b}{\sqrt{c - b^2}} \right).$$

Es ist noch hervorzuheben, daß die Gleichungen (18.) und (25.) richtig bleiben, gleichviel ob $b^2 - c$ positiv oder

negativ ist, die rechte Seite von Gleichung (18.) erhält aber eine komplexe Form, wenn $b^2 - c < 0$ ist, und auf der rechten Seite von Gleichung (25.) wird die Größe $\sqrt{c - b^2}$ imaginär, wenn $b^2 - c > 0$ ist. Der Zusammenhang beider Gleichungen ergibt sich aus D.-R., Formel Nr. 196 der Tabelle, nämlich aus

$$(26.) \quad \ln\left(\frac{1 + \varphi i}{1 - \varphi i}\right) = 2i \operatorname{arctg} \varphi.$$

Setzt man nämlich

$$\varphi = \frac{x}{a},$$

so folgt aus Gleichung (26.)

$$\ln\left(\frac{1 + \varphi i}{1 - \varphi i}\right) = \ln\left(\frac{a + xi}{a - xi}\right) = 2i \operatorname{arctg}\left(\frac{x}{a}\right),$$

oder

$$\ln\left(\frac{-i(a + xi)}{(-1)i(a - xi)}\right) = \ln\left(\frac{x - ai}{x + ai}\right) - \ln(-1) = 2i \operatorname{arctg}\left(\frac{x}{a}\right).$$

Dies gibt, wenn man beide Seiten der Gleichung durch $2ai$ dividiert und beachtet, daß nach D.-R., Formel Nr. 195 der Tabelle $\ln(-1)$ den Wert $(2h + 1)\pi i$ hat,

$$(27.) \quad \frac{1}{2ai} \ln\left(\frac{x - ai}{x + ai}\right) = \frac{1}{a} \operatorname{arctg}\left(\frac{x}{a}\right) + \frac{(2h + 1)\pi}{2a},$$

wobei h noch eine beliebige, positive oder negative ganze Zahl ist.

Vertauscht man also in der Formel

$$\int \frac{dx}{x^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \ln\left(\frac{x - a}{x + a}\right)$$

die Größe a mit ai , so erhält man

$$(28.) \quad \int \frac{dx}{x^2 + a^2} = \frac{1}{a} \operatorname{arctg}\left(\frac{x}{a}\right) + \frac{(2h + 1)\pi}{2a}.$$

Setzt man noch

$$a = \sqrt{c - b^2}, \quad \text{also} \quad ai = i\sqrt{c - b^2} = \sqrt{b^2 - c}$$

und vertauscht x mit $x + b$, so geht Gleichung (27.) über in

$$(29.) \quad \frac{1}{2\sqrt{b^2 - c}} \ln \left(\frac{x + b - \sqrt{b^2 - c}}{x + b + \sqrt{b^2 - c}} \right) \\ = \frac{1}{\sqrt{c - b^2}} \operatorname{arctg} \left(\frac{x + b}{\sqrt{c - b^2}} \right) + \frac{(2h + 1)\pi}{2\sqrt{c - b^2}};$$

die beiden Werte, welche man in den Gleichungen (18.) und (25.) für $\int \frac{dx}{x^2 + 2bx + c}$ gefunden hat, unterscheiden sich also voneinander nur durch die Konstante $\frac{(2h + 1)\pi}{2\sqrt{c - b^2}}$.

III. Fall. $b^2 - c = 0$, oder $c = b^2$.

Hier wird, wenn man wieder $x + b$ mit t bezeichnet,

$$\int \frac{dx}{x^2 + 2bx + c} = \int \frac{dx}{x^2 + 2bx + b^2} = \int \frac{dx}{(x + b)^2} = \int \frac{dt}{t^2} = \int t^{-2} dt = -\frac{1}{t},$$

oder

$$(30.) \quad \int \frac{dx}{x^2 + 2bx + b^2} = -\frac{1}{x + b}.$$

Beispiele.

I. Fall. $\int \frac{dx}{(x + 3)(x + 4)} = \ln \left(\frac{x + 3}{x + 4} \right);$

II. Fall. $\int \frac{dx}{x^2 + 4x + 20} = \frac{1}{4} \operatorname{arctg} \left(\frac{x + 2}{4} \right);$

III. Fall. $\int \frac{dx}{x^2 + 8x + 16} = -\frac{1}{x + 4}.$

Aufgabe 5. $\int \frac{(Px + Q)dx}{x^2 + 2bx + c} = ?$

Auflösung. Wäre bei dem Bruche unter dem Integralzeichen der Zähler dem Differential des Nenners gleich oder wenigstens proportional, so könnte die Integration nach Formel Nr. 43 der Tabelle ausgeführt werden, nämlich nach der Formel

$$\int \frac{f'(x)dx}{f(x)} = \ln[f(x)].$$

In dem vorliegenden Falle ist

$$f'(x) = 2x + 2b,$$

deshalb nimmt man mit dem gesuchten Integrale die folgende Umformung vor. Es ist

$$Px + Q = (Px + Pb) + (Q - Pb) = \frac{P}{2}(2x + 2b) + (Q - Pb),$$

folglich wird

$$\begin{aligned} \int \frac{(Px + Q)dx}{x^2 + 2bx + c} &= \int \frac{\frac{1}{2}P(2x + 2b) + (Q - Pb)}{x^2 + 2bx + c} dx \\ &= \frac{P}{2} \int \frac{(2x + 2b)dx}{x^2 + 2bx + c} + (Q - Pb) \int \frac{dx}{x^2 + 2bx + c}, \end{aligned}$$

also

$$(31.) \int \frac{(Px + Q)dx}{x^2 + 2bx + c} = \frac{P}{2} \ln(x^2 + 2bx + c) + (Q - Pb) \int \frac{dx}{x^2 + 2bx + c}.$$

Das Integral, welches auf der rechten Seite dieser Gleichung stehen geblieben ist, findet man nach Aufgabe 4. So ist z. B. für $b^2 - c > 0$

$$\begin{aligned} (31a.) \int \frac{(Px + Q)dx}{x^2 + 2bx + c} &= \frac{P}{2} \ln(x^2 + 2bx + c) + \frac{Q - Pb}{2\sqrt{b^2 - c}} \ln \left(\frac{x + b - \sqrt{b^2 - c}}{x + b + \sqrt{b^2 - c}} \right), \end{aligned}$$

oder, da $x_1 + x_2 = -2b$ und $x_1 - x_2 = 2\sqrt{b^2 - c}$ ist,

$$\begin{aligned} \int \frac{(Px + Q)dx}{(x - x_1)(x - x_2)} &= \frac{P}{2} \ln[(x - x_1)(x - x_2)] + \frac{2Q + P(x_1 + x_2)}{2(x_1 - x_2)} \ln \left(\frac{x - x_1}{x - x_2} \right). \end{aligned}$$

Aus den bekannten Formeln

$$\ln[(x - x_1)(x - x_2)] = \ln(x - x_1) + \ln(x - x_2),$$

$$\ln \left(\frac{x - x_1}{x - x_2} \right) = \ln(x - x_1) - \ln(x - x_2)$$

ergibt sich daher

$$\begin{aligned} \int \frac{(Px + Q)dx}{(x - x_1)(x - x_2)} &= \left(\frac{P}{2} + \frac{2Q + P(x_1 + x_2)}{2(x_1 - x_2)} \right) \ln(x - x_1) \\ &\quad + \left(\frac{P}{2} - \frac{2Q + P(x_1 + x_2)}{2(x_1 - x_2)} \right) \ln(x - x_2), \end{aligned}$$

oder

$$(32.) \quad \int \frac{(Px + Q)dx}{(x - x_1)(x - x_2)} \\ = \frac{1}{x_1 - x_2} [(Px_1 + Q)\ln(x - x_1) - (Px_2 + Q)\ln(x - x_2)].$$

Die Richtigkeit dieses Resultates kann man in folgender Weise bestätigen. Die beiden Unbekannten A und B lassen sich immer so bestimmen, daß *identisch*

$$(33.) \quad \frac{Px + Q}{(x - x_1)(x - x_2)} = \frac{A}{x - x_1} + \frac{B}{x - x_2}$$

wird. Schafft man nämlich in Gleichung (33.) die Nenner fort, indem man beide Seiten mit $(x - x_1)(x - x_2)$ multipliziert, so erhält man

$$(34.) \quad Px + Q = A(x - x_2) + B(x - x_1).$$

Diese Gleichung soll für *alle* Werte von x gelten, folglich gilt sie auch für $x = x_1$ und für $x = x_2$. Für $x = x_1$ findet man aber

$$(35.) \quad Px_1 + Q = A(x_1 - x_2), \quad \text{oder} \quad A = \frac{Px_1 + Q}{x_1 - x_2},$$

und für $x = x_2$

$$(36.) \quad Px_2 + Q = B(x_2 - x_1), \quad \text{oder} \quad B = \frac{Px_2 + Q}{x_2 - x_1}.$$

Setzt man diese Werte in Gleichung (33.) ein, so erhält man

$$(37.) \quad \frac{Px + Q}{(x - x_1)(x - x_2)} = \frac{1}{x_1 - x_2} \left(\frac{Px_1 + Q}{x - x_1} - \frac{Px_2 + Q}{x - x_2} \right).$$

Daß die rechte Seite dieser Gleichung der linken identisch gleich ist, ergibt sich ohne weiteres, indem man die beiden Glieder in der Klammer auf gleichen Nenner bringt.

Aus Gleichung (37.) folgt dann in Übereinstimmung mit Gleichung (32.)

$$(38.) \quad \int \frac{(Px + Q)dx}{(x - x_1)(x - x_2)} = \frac{1}{x_1 - x_2} \int \left(\frac{Px_1 + Q}{x - x_1} - \frac{Px_2 + Q}{x - x_2} \right) dx \\ = \frac{1}{x_1 - x_2} [(Px_1 + Q)\ln(x - x_1) - (Px_2 + Q)\ln(x - x_2)].$$

Dieses Verfahren wird man auch am zweckmäßigsten bei der Behandlung von Zahlenbeispielen anwenden.

Beispiele.

$$\begin{aligned}
 \text{I. } \int \frac{(2x+43)dx}{x^2+x-12} &= \int \frac{(2x+1)dx}{x^2+x-12} + 42 \int \frac{dx}{\left(x+\frac{1}{2}\right)^2 - \left(\frac{7}{2}\right)^2} \\
 &= \ln(x^2+x-12) + 6 \ln \left(\frac{x-3}{x+4} \right) \\
 &= 7 \ln(x-3) - 5 \ln(x+4).
 \end{aligned}$$

Dasselbe Resultat findet man aus Gleichung (32.), denn es ist in diesem Falle

$$\begin{aligned}
 x_1 &= +3, \quad x_2 = -4, \quad x_1 - x_2 = 7, \\
 P &= 2, \quad Q = 43, \quad Px_1 + Q = 49, \quad Px_2 + Q = 35. \\
 \text{II. } \int \frac{(4x-5)dx}{x^2-4x+20} &= \int \frac{2(2x-4)dx}{x^2-4x+20} + 3 \int \frac{dx}{(x-2)^2 + 4^2} \\
 &= 2 \ln(x^2-4x+20) + \frac{3}{4} \operatorname{arctg} \left(\frac{x-2}{4} \right). \\
 \text{III. } \int \frac{(4x-7)dx}{x^2+6x+9} &= \int \frac{(4x+12)-19}{(x+3)^2} dx = 4 \int \frac{dx}{x+3} - 19 \int \frac{dx}{(x+3)^2} \\
 &= 4 \ln(x+3) + \frac{19}{x+3}.
 \end{aligned}$$

Steht unter dem Integralzeichen ein Bruch von der Form

$$\frac{F(x)}{x^2 + 2bx + c},$$

wo der Grad von $F(x)$ gleich 2 oder noch größer als 2 ist, so ist die Funktion eine *unecht* gebrochene rationale Funktion. Sie kann durch Ausführung der Division auf die Form

$$g(x) + \frac{Px + Q}{x^2 + 2bx + c}$$

gebracht werden, wobei $g(x)$ eine *ganze* rationale Funktion ist. Nach dieser Umformung kann die Integration ohne weiteres, den vorstehenden Angaben entsprechend, ausgeführt werden.

Beispiel.

$$\int \frac{3x^3 - 17x^2 + 21x - 43}{x^2 - 8x + 15} dx = ?$$

Hier ist

$$3x^3 - 17x^2 + 21x - 43 = (x^2 - 8x + 15)(3x + 7) + (32x - 148),$$

also

$$\int \frac{3x^3 - 17x^2 + 21x - 43}{x^2 - 8x + 15} dx = \int \left(3x + 7 + \frac{32x - 148}{(x-3)(x-5)} \right) dx.$$

Dabei wird

$$\frac{32x - 148}{(x-3)(x-5)} = \frac{A}{x-3} + \frac{B}{x-5},$$

$$32x - 148 = A(x-5) + B(x-3).$$

Dies gibt für $x = 3$

$$-52 = -2A, \text{ also } A = 26,$$

und für $x = 5$

$$12 = 2B, \text{ also } B = 6,$$

folglich wird

$$\begin{aligned} \int \frac{3x^3 - 17x^2 + 21x - 43}{x^2 - 8x + 15} dx &= \int \left(3x + 7 + \frac{26}{x-3} + \frac{6}{x-5} \right) dx \\ &= \frac{3}{2}x^2 + 7x + 26 \ln(x-3) + 6 \ln(x-5). \end{aligned}$$

Die vorhergehenden Aufgaben behandeln nur die einfachsten Fälle der *Zerlegung in Partialbrüche*. In einem späteren Abschnitte wird gezeigt werden, wie man *jede gebrochene rationale* Funktion durch Zerlegung in Partialbrüche integrieren kann.

Auf die Integration von gebrochenen rationalen Funktionen führen häufig die im vorigen Abschnitte behandelten Substitutionen, wie dort bereits hervorgehoben wurde. Als Beispiele mögen die beiden folgenden Aufgaben dienen.

Aufgabe 6. $\int \frac{dx}{a \sin x + b \cos x + c} = ?$

Auflösung. Zunächst wird man hier die in Formel Nr. 82 der Tabelle angegebene Substitution benutzen und

$$(39.) \quad \begin{cases} \operatorname{tg}\left(\frac{x}{2}\right) = t, & \text{also } dx = \frac{2dt}{1+t^2}, \\ \sin x = \frac{2t}{1+t^2}, & \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2} \end{cases}$$

setzen; dann erhält man

$$(40.) \quad \int \frac{dx}{a \sin x + b \cos x + c} = \int \frac{2dt}{2at + b(1-t^2) + c(1+t^2)} \\ = \int \frac{2dt}{(c-b)t^2 + 2at + (b+c)},$$

oder, wenn man die Größen b_1 und c_1 durch die Gleichungen

$$(41.) \quad a = b_1(c-b), \quad b+c = c_1(c-b)$$

erklärt,

$$(42.) \quad \int \frac{dx}{a \sin x + b \cos x + c} = \frac{2}{c-b} \int \frac{dt}{t^2 + 2b_1t + c_1}.$$

Für $b_1^2 - c_1 > 0$ erhält man daher nach Aufgabe 4 (Formel Nr. 87 der Tabelle)

$$(43.) \quad \int \frac{dx}{a \sin x + b \cos x + c} = \frac{2}{c-b} \cdot \frac{1}{2\sqrt{b_1^2 - c_1}} \ln \left(\frac{t+b_1 - \sqrt{b_1^2 - c_1}}{t+b_1 + \sqrt{b_1^2 - c_1}} \right) \\ = \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2 - c^2}} \ln \left(\frac{t(c-b) + a - \sqrt{a^2 + b^2 - c^2}}{t(c-b) + a + \sqrt{a^2 + b^2 - c^2}} \right);$$

und für $b_1^2 - c_1 < 0$ erhält man nach Aufgabe 4 (Formel Nr. 89 der Tabelle)

$$(44.) \quad \int \frac{dx}{a \sin x + b \cos x + c} = \frac{2}{c-b} \cdot \frac{1}{\sqrt{c_1 - b_1^2}} \operatorname{arctg} \left(\frac{t+b_1}{\sqrt{c_1 - b_1^2}} \right) \\ = \frac{2}{\sqrt{c^2 - a^2 - b^2}} \operatorname{arctg} \left(\frac{t(c-b) + a}{\sqrt{c^2 - a^2 - b^2}} \right).$$

Aufgabe 7. $\int \frac{dx}{(b^2 + x^2)\sqrt{a^2 + x^2}} = ?$

Auflösung. Setzt man nach Formel Nr. 85 der Tabelle

$$x = a \operatorname{tg} t, \quad \sqrt{a^2 + x^2} = \frac{a}{\cos t}, \quad dx = \frac{a dt}{\cos^2 t},$$

so erhält man

$$(45.) \int \frac{dx}{(b^2 + x^2)\sqrt{a^2 + x^2}} = \int \frac{adt \cdot \cos t}{\cos^2 t (b^2 + a^2 \tan^2 t) \cdot a} \\ = \int \frac{\cos t dt}{b^2 \cos^2 t + a^2 \sin^2 t} = \int \frac{d(\sin t)}{b^2 + (a^2 - b^2) \sin^2 t},$$

oder, wenn man

$$(46.) \quad \sin t = \frac{x}{\sqrt{a^2 + x^2}} = z$$

setzt und die Größe $\pm c^2$ durch die Gleichung

$$(47.) \quad b^2 = \pm (a^2 - b^2)c^2$$

erklärt,

$$(48.) \int \frac{dx}{(b^2 + x^2)\sqrt{a^2 + x^2}} = \int \frac{dz}{b^2 + (a^2 - b^2)z^2} = \frac{1}{a^2 - b^2} \int \frac{dz}{z^2 \pm c^2}.$$

Gilt das obere Zeichen, ist also $a^2 > b^2$, so findet man hieraus nach Formel Nr. 28 der Tabelle

$$(49.) \int \frac{dx}{(b^2 + x^2)\sqrt{a^2 + x^2}} = \frac{1}{a^2 - b^2} \cdot \frac{1}{c} \operatorname{arctg}\left(\frac{z}{c}\right) \\ = \frac{1}{b\sqrt{a^2 - b^2}} \operatorname{arctg}\left(\frac{x\sqrt{a^2 - b^2}}{b\sqrt{a^2 + x^2}}\right).$$

Gilt das untere Zeichen, ist also $a^2 < b^2$, so erhält man nach Formel Nr. 29 der Tabelle

$$(50.) \int \frac{dx}{(b^2 + x^2)\sqrt{a^2 + x^2}} = \frac{1}{a^2 - b^2} \cdot \frac{1}{2c} \ln\left(\frac{c - z}{c + z}\right) \\ = -\frac{1}{2b\sqrt{b^2 - a^2}} \ln\left(\frac{b\sqrt{a^2 + x^2} - x\sqrt{b^2 - a^2}}{b\sqrt{a^2 + x^2} + x\sqrt{b^2 - a^2}}\right).$$

§ 14.

Integration von einigen transzendenten Funktionen durch Zerlegung.

Anwendung der *Moirreschen* Formeln.

(Vergl. die Formel-Tabelle Nr. 93 bis 97.)

Aufgabe 1. $\int \frac{dx}{\sin^2 x \cos^2 x} = ?$

Auflösung. Mit Rücksicht auf die bekannte Formel

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

erhält man

$$\int \frac{dx}{\sin^2 x \cos^2 x} = \int \frac{(\sin^2 x + \cos^2 x) dx}{\sin^2 x \cos^2 x} = \int \frac{dx}{\cos^2 x} + \int \frac{dx}{\sin^2 x},$$

folglich wird nach Formel Nr. 15 und 16 der Tabelle

$$\begin{aligned} (1.) \quad \int \frac{dx}{\sin^2 x \cos^2 x} &= \operatorname{tg} x - \operatorname{ctg} x = -\frac{\cos^2 x - \sin^2 x}{\sin x \cos x} \\ &= -\frac{2 \cos(2x)}{\sin(2x)} = -2 \operatorname{ctg}(2x). \end{aligned}$$

Aufgabe 2. $\int \frac{dx}{\sin x \cos x} = ?$

Auflösung. Dieses Integral ist bereits durch Formel Nr. 46 der Tabelle berechnet. Damals wurde die Funktion unter dem Integralzeichen so umgeformt, daß der Zähler des Bruches das Differential des Nenners wurde. Man kann aber die Integration auch durch Zerlegung ausführen. Mit Rücksicht auf die Formeln Nr. 44 und 45 der Tabelle erhält man nämlich

$$\begin{aligned} (2.) \quad \int \frac{dx}{\sin x \cos x} &= \int \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\sin x \cos x} dx = \int \frac{\cos x dx}{\sin x} + \int \frac{\sin x dx}{\cos x} \\ &= \ln(\sin x) - \ln(\cos x) = \ln(\operatorname{tg} x). \end{aligned}$$

Aufgabe 3. $\int \cos^2 x dx = ?$

Auflösung. Bekanntlich ist

$$2 \cos^2 x = 1 + \cos(2x),$$

folglich wird

$$(3.) \quad \int \cos^2 x dx = \frac{1}{2} \int [1 + \cos(2x)] dx = \frac{1}{2} [x + \frac{1}{2} \sin(2x)].$$

Aufgabe 4. $\int \cos^m x dx = ?$

Auflösung. In dem Falle, wo m eine *ungerade* Zahl ist, wendet man am besten Formel Nr. 54 der Tabelle an nach welcher

$$(4.) \quad \int \cos^{2n+1} x dx = \int (1 - \sin^2 x)^n d(\sin x)$$

wird. Ist aber m eine *gerade* Zahl, so kann man die Inte

gration mit Hilfe der *Möivreschen* Formeln ausführen. Nach D.-R., Formel Nr. 190 der Tabelle ist

$$(5.) \quad 2^{2n}(\cos x)^{2n} = 2\cos(2nx) + \binom{2n}{1}2\cos(2n-2)x \\ + \binom{2n}{2}2\cos(2n-4)x + \dots + \binom{2n}{n-1}2\cos(2x) + \binom{2n}{n};$$

indem man beide Seiten dieser Gleichung mit dx multipliziert und dann integriert, erhält man

$$(6.) \quad 2^{2n} \int \cos^{2n} x dx = \frac{2}{2n} \sin(2nx) + \binom{2n}{1} \frac{2}{2n-2} \sin(2n-2)x \\ + \binom{2n}{2} \frac{2}{2n-4} \sin(2n-4)x + \dots + \binom{2n}{n-1} \sin(2x) + \binom{2n}{n} x.$$

Man erkennt, daß Aufgabe 3 ein besonderer Fall dieser Aufgabe ist.

Beispiel.

$$(7.) \quad 64 \int \cos^6 x dx = \frac{1}{3} \sin(6x) + 3\sin(4x) + 15\sin(2x) + 20x.$$

Auch in dem Falle, wo m eine *ungerade* Zahl ist, kommt man mit Hilfe der *Möivreschen* Formeln zum Ziele, wenn auch nicht ganz so leicht wie durch Gleichung (4.). Nach D.-R., Formel Nr. 191 der Tabelle ist nämlich

$$(8.) \quad 2^{2n+1}(\cos x)^{2n+1} = 2\cos(2n+1)x + \binom{2n+1}{1}2\cos(2n-1)x \\ + \binom{2n+1}{2}2\cos(2n-3)x + \dots + \binom{2n+1}{n-1}2\cos(3x) \\ + \binom{2n+1}{n}2\cos x;$$

indem man beide Seiten dieser Gleichung mit dx multipliziert und dann integriert, erhält man

$$(9.) \quad 2^{2n+1} \int \cos^{2n+1} x dx = \frac{2}{2n+1} \sin(2n+1)x \\ + \binom{2n+1}{1} \frac{2}{2n-1} \sin(2n-1)x \\ + \binom{2n+1}{2} \frac{2}{2n-3} \sin(2n-3)x + \dots \\ + \binom{2n+1}{n-1} \frac{2}{3} \sin(3x) + \binom{2n+1}{n} 2\sin x.$$

Beispiel.

$$(10.) \int \cos 7x dx = \frac{2}{7} \sin(7x) + \frac{14}{5} \sin(5x) + 14 \sin(3x) + 70 \sin x.$$

Aufgabe 5. $\int \sin^2 x dx = ?$ **Auflösung.** Bekanntlich ist

$$2 \sin^2 x = 1 - \cos(2x),$$

folglich wird

$$(11.) \int \sin^2 x dx = \frac{1}{2} \int [1 - \cos(2x)] dx = \frac{1}{2} [x - \frac{1}{2} \sin(2x)].$$

Aufgabe 6. $\int \sin^m x dx = ?$

Auflösung. In dem Falle, wo m eine *ungerade* Zahl ist, wendet man am besten Formel Nr. 57 der Tabelle an, nach welcher

$$(12.) \int \sin^{2n+1} x dx = - \int (1 - \cos^2 x)^n d(\cos x)$$

wird. Ist aber m eine *gerade* Zahl, so kann man die Integration mit Hilfe der *Moivreschen* Formeln ausführen. Nach D.-R., Formel Nr. 192 der Tabelle ist

$$(13.) (-1)^n 2^{2n} (\sin x)^{2n} = 2 \cos(2nx) - \binom{2n}{1} 2 \cos(2n-2)x \\ + \binom{2n}{2} 2 \cos(2n-4)x - \dots + (-1)^{n-1} \binom{2n}{n-1} 2 \cos(2x) \\ + (-1)^n \binom{2n}{n};$$

indem man beide Seiten dieser Gleichung mit dx multipliziert und dann integriert, erhält man

$$(14.) (-1)^n 2^{2n} \int \sin^{2n} x dx = \frac{2}{2n} \sin(2nx) \\ - \binom{2n}{1} \frac{2}{2n-2} \sin(2n-2)x \\ + \binom{2n}{2} \frac{2}{2n-4} \sin(2n-4)x - \\ + \dots + (-1)^{n-1} \binom{2n}{n-1} \sin(2x) \\ + (-1)^n \binom{2n}{n} x.$$

Man erkennt, daß Aufgabe 5 ein besonderer Fall dieser Aufgabe ist.

Beispiel.

$$(15.) \quad -64 \int \sin^6 x dx = \frac{1}{3} \sin(6x) - 3 \sin(4x) + 15 \sin(2x) - 20x.$$

Auch in dem Falle, wo m eine *ungerade* Zahl ist, kommt man mit Hilfe der *Moirreschen* Formeln zum Ziele, wenn auch nicht ganz so leicht wie durch Gleichung (12.). Nach D.-R., Formel Nr. 193 der Tabelle ist nämlich

$$(16.) \quad (-1)^n 2^{2n+1} (\sin x)^{2n+1} = 2 \sin(2n+1)x \\ - \binom{2n+1}{1} 2 \sin(2n-1)x \\ + \binom{2n+1}{2} 2 \sin(2n-3)x - + \dots \\ + (-1)^{n-1} \binom{2n+1}{n-1} 2 \sin(3x) \\ + (-1)^n \binom{2n+1}{n} 2 \sin x;$$

indem man beide Seiten dieser Gleichung mit dx multipliziert und dann integriert, erhält man

$$(17.) \quad (-1)^n 2^{2n+1} \int \sin^{2n+1} x dx = -\frac{2}{2n+1} \cos(2n+1)x \\ + \binom{2n+1}{1} \frac{2}{2n-1} \cos(2n-1)x \\ - \binom{2n+1}{2} \frac{2}{2n-3} \cos(2n-3)x + - \dots \\ - (-1)^{n-1} \binom{2n+1}{n-1} \frac{2}{3} \cos(3x) - (-1)^n \binom{2n+1}{n} 2 \cos x.$$

Beispiel.

$$(18.) \quad 128 \int \sin^7 x dx = \frac{2}{7} \cos(7x) - \frac{14}{5} \cos(5x) + 14 \cos(3x) - 70 \cos x.$$

In ähnlicher Weise kann man auch $\int \sin^m x \cos^n x dx$ berechnen, wenn man die *Eulerschen* Formeln

$$(19.) \quad 2i \sin x = e^{xi} - e^{-xi}, \quad 2 \cos x = e^{xi} + e^{-xi}$$

anwendet. Es ist z. B. nach den Gleichungen (19.), wenn man

(20.) $e^{xi} = \cos x + i \sin x = s$, $e^{-xi} = \cos x - i \sin x = t$
 setzt und beachtet, daß $st = 1$ wird,

$$\begin{aligned}
 (21.) \quad -64 \sin^2 x \cos^4 x &= (e^{xi} - e^{-xi})^2 (e^{xi} + e^{-xi})^4 \\
 &= (s - t)^2 (s + t)^4 \\
 &= s^6 + 2s^5t - s^4t^2 - 4s^3t^3 - s^2t^4 + 2st^5 + t^6 \\
 &= (s^6 + t^6) + 2(s^4 + t^4) - (s^2 + t^2) - 4 \\
 &= 2\cos(6x) + 4\cos(4x) - 2\cos(2x) - 4,
 \end{aligned}$$

also

$$(22.) \quad -64 \int \sin^2 x \cos^4 x dx = \frac{1}{3} \sin(6x) + \sin(4x) - \sin(2x) - 4x.$$

IV. Abschnitt.

Partielle Integration.

§ 15.

Erklärung der partiellen Integration.

(Vergl. die Formel-Tabelle Nr. 98.)

Sind u und v zwei beliebige Funktionen von x , welche eine Ableitung besitzen, so ist bekanntlich (vergl. D.-R., Formel Nr. 29 der Tabelle)

$$(1.) \quad d(uv) = vdu + u dv,$$

oder

$$(1a.) \quad u dv = d(uv) - vdu,$$

oder, wenn man beide Seiten dieser Gleichung integriert,

$$(2.) \quad \int u dv = uv - \int v du.$$

Mit Hilfe dieser Formel ist die Integration der Differential-Funktion $u dv$ zurückgeführt auf die Integration von $v du$, wobei es durch passende Wahl der Faktoren u und dv häufig erreicht werden kann, daß $\int v du$ leichter zu ermitteln ist als $\int u dv$.

Wie dieses Verfahren, welches man „*partielle Integration*“ nennt*), angewendet wird, mögen die folgenden Aufgaben zeigen.

*) Die häufig gebrauchte Bezeichnung „*teilweise Integration*“ ist sprachlich nicht zulässig.

§ 16.

Beispiele für die partielle Integration.**Aufgabe 1.** $\int \arctg x \cdot dx = ?$ **Auflösung.** Setzt man

$$(1.) \quad u = \arctg x, \quad \text{also} \quad dv = dx,$$

so wird

$$(2.) \quad du = \frac{dx}{1+x^2}, \quad v = x,$$

$$\int \arctg x \cdot dx = x \cdot \arctg x - \int \frac{x dx}{1+x^2},$$

folglich erhält man nach Formel Nr. 30 der Tabelle

$$(3.) \quad \int \arctg x \cdot dx = x \cdot \arctg x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2).$$

Aufgabe 2. $\int \arcsin x \cdot dx = ?$ **Auflösung.** Setzt man

$$(4.) \quad u = \arcsin x, \quad \text{also} \quad dv = dx,$$

so wird

$$(5.) \quad du = \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}, \quad v = x,$$

$$\int \arcsin x \cdot dx = x \cdot \arcsin x - \int \frac{x dx}{\sqrt{1-x^2}},$$

folglich erhält man nach Formel Nr. 31 der Tabelle

$$(6.) \quad \int \arcsin x \cdot dx = x \cdot \arcsin x + \sqrt{1-x^2}.$$

Aufgabe 3. $\int \ln x \cdot dx = ?$ **Auflösung.** Setzt man

$$(7.) \quad u = \ln x, \quad \text{also} \quad dv = dx,$$

so wird

$$(8.) \quad du = \frac{dx}{x}, \quad v = x,$$

folglich erhält man nach Formel Nr. 98 der Tabelle

$$\int \ln x \cdot dx = x \cdot \ln x - \int x \cdot \frac{dx}{x} = x \cdot \ln x - \int dx,$$

oder

$$(9.) \quad \int \ln x \cdot dx = x(\ln x - 1).$$

Aufgabe 4. $\int x^m \ln x \cdot dx = ?$

Auflösung. Setzt man

$$(10.) \quad u = \ln x, \quad \text{also} \quad dv = x^m dx,$$

so wird

$$(11.) \quad du = \frac{dx}{x}, \quad v = \frac{x^{m+1}}{m+1},$$

folglich erhält man nach Formel Nr. 98 der Tabelle

$$(12.) \quad \begin{aligned} \int x^m \ln x \cdot dx &= \frac{x^{m+1}}{m+1} \ln x - \frac{1}{m+1} \int x^m dx \\ &= \frac{x^{m+1}}{m+1} \left(\ln x - \frac{1}{m+1} \right). \end{aligned}$$

Für $m = 0$ geht diese Aufgabe in Aufgabe 3 über.

Aufgabe 5. $\int x \cdot e^{mx} \cdot dx = ?$

Auflösung. Setzt man

$$(13.) \quad u = x, \quad \text{also} \quad dv = e^{mx} \cdot dx,$$

so wird

$$(14.) \quad du = dx, \quad v = \frac{1}{m} \cdot e^{mx},$$

$$(15.) \quad \begin{aligned} \int x \cdot e^{mx} \cdot dx &= \frac{x}{m} \cdot e^{mx} - \frac{1}{m} \int e^{mx} \cdot dx \\ &= \frac{1}{m^2} \cdot e^{mx} (mx - 1). \end{aligned}$$

Aufgabe 6. $\int x \sin x \cdot dx = ?$

Auflösung. Setzt man

$$(16.) \quad u = x, \quad \text{also} \quad dv = \sin x \cdot dx,$$

so wird

$$(17.) \quad du = dx, \quad v = -\cos x,$$

$$(18.) \quad \begin{aligned} \int x \sin x \cdot dx &= -x \cos x + \int \cos x \cdot dx \\ &= -x \cos x + \sin x. \end{aligned}$$

Aufgabe 7. $\int x^2 \cos x \cdot dx = ?$

Auflösung. Setzt man

$$(19.) \quad u = x^2, \quad \text{also} \quad dv = \cos x \cdot dx,$$

so wird

$$(20.) \quad du = 2x dx, \quad v = \sin x,$$

$$(21.) \quad \int x^2 \cos x \cdot dx = x^2 \sin x - 2 \int x \sin x \cdot dx,$$

folglich erhält man mit Rücksicht auf Gleichung (18.)

$$(22.) \quad \int x^2 \cos x \cdot dx = x^2 \sin x + 2x \cos x - 2 \sin x.$$

Aufgabe 8. $\int (\ln x)^m \cdot dx = ?$

Auflösung. Setzt man

$$(23.) \quad u = (\ln x)^m, \quad \text{also} \quad dv = dx,$$

so wird

$$(24.) \quad du = m(\ln x)^{m-1} \cdot \frac{dx}{x}, \quad v = x,$$

$$(25.) \quad \int (\ln x)^m \cdot dx = x(\ln x)^m - m \int (\ln x)^{m-1} \cdot dx.$$

Das gesuchte Integral ist durch diese Gleichung auf ein ähnliches zurückgeführt, das aus dem gesuchten hervorgeht, indem man m mit $m - 1$ vertauscht, und das deshalb einfacher ist. Durch wiederholte Anwendung der Gleichung (25.) findet man für jeden positiven ganzzahligen Wert von m das gesuchte Integral. Ist z. B. $m = 4$, so erhält man

$$(26.) \quad \int (\ln x)^4 \cdot dx = x(\ln x)^4 - 4 \int (\ln x)^3 \cdot dx,$$

$$(27.) \quad \int (\ln x)^3 \cdot dx = x(\ln x)^3 - 3 \int (\ln x)^2 \cdot dx,$$

$$(28.) \quad \int (\ln x)^2 \cdot dx = x(\ln x)^2 - 2 \int \ln x \cdot dx,$$

$$(29.) \quad \int \ln x \cdot dx = x \ln x - x.$$

Indem man Gleichung (27.) mit -4 , Gleichung (28.) mit $+4 \cdot 3$, Gleichung (29.) mit $-4 \cdot 3 \cdot 2$ multipliziert und sodann die Gleichungen (26.) bis (29.) addiert, erhält man

$$(30.) \quad \int (\ln x)^4 \cdot dx = x[(\ln x)^4 - 4(\ln x)^3 + 4 \cdot 3(\ln x)^2 - 4 \cdot 3 \cdot 2(\ln x) + 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1].$$

In ähnlicher Weise findet man

$$(31.) \int (\ln x)^m \cdot dx = x[(\ln x)^m - m(\ln x)^{m-1} + m(m-1)(\ln x)^{m-2} \\ - + \dots \pm m(m-1) \dots 3 \cdot 2 \cdot \ln x \mp m!].$$

Aufgabe 9. $\int e^x \cdot x^m \cdot dx = ?$

Auflösung. Setzt man

$$(32.) \quad u = x^m, \quad \text{also} \quad dv = e^x \cdot dx,$$

so wird

$$(33.) \quad du = mx^{m-1} \cdot dx, \quad v = e^x,$$

$$(34.) \quad \int e^x \cdot x^m dx = x^m \cdot e^x - m \int e^x \cdot x^{m-1} \cdot dx.$$

Auch hier ist das gesuchte Integral auf ein einfacheres zurückgeführt, das aus dem gesuchten hervorgeht, indem man m mit $m-1$ vertauscht. Deshalb findet man durch das gleiche Verfahren wie bei der vorhergehenden Aufgabe

$$(35.) \int e^x \cdot x^m dx = e^x [x^m - mx^{m-1} + m(m-1)x^{m-2} - + \\ \dots \pm m(m-1) \dots 3 \cdot 2 \cdot x \mp m!].$$

§ 17.

Integration von einigen trigonometrischen Funktionen durch partielle Integration.

(Vergl. die Formel-Tabelle Nr. 99 bis 118.)

Aufgabe 1. $\int \cos^2 x \cdot dx = ?$

Auflösung. Setzt man

$$(1.) \quad u = \cos x, \quad \text{also} \quad dv = \cos x \cdot dx,$$

so wird

$$(2.) \quad du = -\sin x \cdot dx, \quad v = \sin x,$$

$$(3.) \quad \int \cos^2 x \cdot dx = \cos x \sin x + \int \sin^2 x dx.$$

Das Integral auf der rechten Seite dieser Gleichung ist *nicht* einfacher als das gesuchte Integral; beachtet man aber, daß

$$\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$$

ist, so geht Gleichung (3.) über in

$$\int \cos^2 x \cdot dx = \cos x \sin x + \int dx - \int \cos^2 x \cdot dx.$$

Dies gibt, wenn man das zweite Integral auf der rechten Seite dieser Gleichung auf die linke Seite bringt und die ganze Gleichung durch 2 dividiert,

$$(4.) \quad \int \cos^2 x \cdot dx = \frac{1}{2} \sin x \cos x + \frac{x}{2}.$$

Aufgabe 2. $\int \sin^2 x \cdot dx = ?$

Auflösung. Setzt man

$$(5.) \quad u = \sin x, \quad \text{also} \quad dv = \sin x \cdot dx,$$

so wird

$$(6.) \quad du = \cos x \cdot dx, \quad v = -\cos x,$$

$$(7.) \quad \int \sin^2 x \cdot dx = -\sin x \cos x + \int \cos^2 x \cdot dx.$$

Das Integral auf der rechten Seite dieser Gleichung ist *nicht* einfacher als das gesuchte Integral; beachtet man aber, daß

$$\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$$

ist, so geht Gleichung (7.) über in

$$\int \sin^2 x \cdot dx = -\sin x \cos x + \int dx - \int \sin^2 x \cdot dx.$$

Dies gibt, wenn man das zweite Integral auf der rechten Seite dieser Gleichung auf die linke Seite bringt und die ganze Gleichung durch 2 dividiert,

$$(8.) \quad \int \sin^2 x \cdot dx = -\frac{1}{2} \sin x \cos x + \frac{x}{2}.$$

Man erkennt ohne weiteres den Zusammenhang zwischen den beiden letzten Aufgaben. Die Gleichungen (3.) und (7.) stimmen miteinander überein, und durch Addition der Gleichungen (4.) und (8.) erhält man

$$(9.) \quad \int \cos^2 x \cdot dx + \int \sin^2 x \cdot dx = \int (\cos^2 x + \sin^2 x) dx = \int dx = x.$$

Außerdem wird auch noch die Lösung der einen Aufgabe durch die Substitution

$$(10.) \quad x = \frac{\pi}{2} - t$$

in die Lösung der anderen Aufgabe übergeführt. Man erhält nämlich durch diese Substitution

$$\int \sin^2 x dx = -\int \cos^2 t dt.$$

Ähnliches gilt auch für die hier noch folgenden Aufgaben; die Aufgaben lassen sich einander paarweise so zuordnen, daß die Lösung der einen Aufgabe sich unmittelbar aus der Lösung der anderen durch Anwendung dieser Substitution ergibt.

Die Aufgaben 1 und 2 lassen eine wichtige Verallgemeinerung zu, die in den Aufgaben 3 und 5 untersucht werden soll.

Aufgabe 3. $\int \cos^m x \cdot dx = ?$

Auflösung. Setzt man

$$(11.) \quad u = \cos^{m-1} x, \quad \text{also} \quad dv = \cos x \cdot dx,$$

so wird

$$(12.) \quad du = -(m-1) \cos^{m-2} x \sin x \, dx, \quad v = \sin x,$$

$$(13.) \quad \int \cos^m x \cdot dx = \cos^{m-1} x \sin x + (m-1) \int \cos^{m-2} x \sin^2 x \, dx.$$

Das Integral auf der rechten Seite dieser Gleichung ist *nicht* einfacher als das gesuchte Integral; beachtet man aber, daß

$$(14.) \quad \sin^2 x = 1 - \cos^2 x, \quad \text{also} \quad \cos^{m-2} x \sin^2 x = \cos^{m-2} x - \cos^m x$$

ist, so erhält man

$$(15.) \quad \int \cos^m x \cdot dx = \cos^{m-1} x \sin x + (m-1) \int \cos^{m-2} x \cdot dx \\ - (m-1) \int \cos^m x \cdot dx,$$

oder, wenn man das zweite Integral auf der rechten Seite dieser Gleichung, welches mit dem gesuchten Integral identisch ist, auf die linke Seite bringt und die ganze Gleichung durch m dividiert,

$$(16.) \quad \int \cos^m x \cdot dx = \frac{1}{m} \cos^{m-1} x \sin x + \frac{m-1}{m} \int \cos^{m-2} x \cdot dx.$$

Für $m = 2$ geht diese Gleichung in Gleichung (4.) über.

Das Integral auf der rechten Seite von Gleichung (16.) geht aus dem gesuchten Integral hervor, indem man m mit $m-2$ vertauscht, und wird daher einfacher, wenn $m \geq 2$ ist. Es sei z. B. $m = 8$, dann wird

$$(17.) \quad \int \cos^8 x \cdot dx = \frac{1}{8} \cos^7 x \sin x + \frac{7}{8} \int \cos^6 x \cdot dx,$$

$$(18.) \quad \int \cos^6 x \cdot dx = \frac{1}{6} \cos^5 x \sin x + \frac{5}{6} \int \cos^4 x \cdot dx,$$

$$(19.) \quad \int \cos^4 x \cdot dx = \frac{1}{4} \cos^3 x \sin x + \frac{3}{4} \int \cos^2 x \cdot dx,$$

$$(20.) \quad \int \cos^2 x \cdot dx = \frac{1}{2} \cos x \sin x + \frac{x}{2}.$$

Indem man Gleichung (18.) mit $\frac{7}{8}$, Gleichung (19.) mit $\frac{7 \cdot 5}{8 \cdot 6}$, Gleichung (20.) mit $\frac{7 \cdot 5 \cdot 3}{8 \cdot 6 \cdot 4}$ multipliziert und sodann die Gleichungen (17.) bis (20.) addiert, erhält man

$$(21.) \quad \int \cos^8 x \cdot dx = \sin x \left(\frac{1}{8} \cos^7 x + \frac{7}{8 \cdot 6} \cos^5 x + \frac{7 \cdot 5}{8 \cdot 6 \cdot 4} \cos^3 x + \frac{7 \cdot 5 \cdot 3}{8 \cdot 6 \cdot 4 \cdot 2} \cos x \right) + \frac{7 \cdot 5 \cdot 3 \cdot 1}{8 \cdot 6 \cdot 4 \cdot 2} x.$$

In ähnlicher Weise findet man

$$(22.) \quad \int \cos^7 x \cdot dx = \sin x \left(\frac{1}{7} \cos^6 x + \frac{6}{7 \cdot 5} \cos^4 x + \frac{6 \cdot 4}{7 \cdot 5 \cdot 3} \cos^2 x + \frac{6 \cdot 4 \cdot 2}{7 \cdot 5 \cdot 3 \cdot 1} \right).$$

Man wird jedoch in allen Fällen, wo $m = 2n + 1$ eine ungerade Zahl ist, $\int \cos^m x dx$ lieber mit Hilfe von Formel Nr. 54 der Tabelle, nämlich mit Hilfe der Formel

$$\int \cos^{2n+1} x \cdot dx = \int (1 - \sin^2 x)^n \cdot d(\sin x)$$

berechnen. Für $m = 7$ findet man dann z. B.

$$(23.) \quad \int \cos^7 x \cdot dx = \int (1 - 3\sin^2 x + 3\sin^4 x - \sin^6 x) d(\sin x) \\ = \sin x - \sin^3 x + \frac{3}{5} \sin^5 x - \frac{1}{7} \sin^7 x.$$

Man kann die Übereinstimmung der beiden Resultate in Gleichung (22.) und (23.) leicht nachweisen.

Ist dagegen m eine gerade Zahl und positiv, so ist man, wenn man nicht die *Moivreschen* Formeln anwenden will (vergl. Formel Nr. 94 der Tabelle), auf die in Gleichung (16.) enthaltene Rekursionsformel angewiesen. Dabei findet man ähnlich wie in Gleichung (21.)

$$\begin{aligned}
 (24.) \quad \int \cos^{2n} x \cdot dx &= \sin x \left[\frac{1}{2n} \cos^{2n-1} x + \frac{2n-1}{2n(2n-2)} \cos^{2n-3} x \right. \\
 &\quad + \frac{(2n-1)(2n-3)}{2n \cdot (2n-2)(2n-4)} \cos^{2n-5} x + \dots \\
 &\quad + \frac{(2n-1)(2n-3) \dots 5 \cdot 3}{2n(2n-2)(2n-4) \dots 4 \cdot 2} \cos x \Big] \\
 &\quad + \frac{(2n-1)(2n-3) \dots 5 \cdot 3 \cdot 1}{2n(2n-2)(2n-4) \dots 4 \cdot 2} x.
 \end{aligned}$$

Die Richtigkeit dieser Formel kann man mit Rücksicht auf Gleichung (16.) durch den Schluß von n auf $n+1$ beweisen.

Aufgabe 4. $\int \frac{dx}{\cos^n x} = ?$

Auflösung. Die Gleichung (16.) bleibt auch dann noch richtig, wenn m eine von -1 verschiedene *negative* Zahl ist. Setzt man z. B.

$$m = -(n-2) = -n+2,$$

also

$$m-1 = -n+1 = -(n-1), \quad m-2 = -n,$$

so geht die Gleichung (16.) über in

$$(25.) \quad \int \frac{dx}{\cos^{n-2} x} = -\frac{\sin x}{(n-2)\cos^{n-1} x} + \frac{-(n-1)}{-(n-2)} \int \frac{dx}{\cos^n x}.$$

In diesem Falle ist aber das Integral auf der *linken* Seite der Gleichung einfacher als das auf der *rechten* Seite. Deshalb bringt man die Gleichung (25.) auf die Form

$$\frac{n-1}{n-2} \int \frac{dx}{\cos^n x} = \frac{\sin x}{(n-2)\cos^{n-1} x} + \int \frac{dx}{\cos^{n-2} x},$$

oder

$$(26.) \quad \int \frac{dx}{\cos^n x} = \frac{\sin x}{(n-1)\cos^{n-1} x} + \frac{n-2}{n-1} \int \frac{dx}{\cos^{n-2} x}.$$

Es ist z. B.

$$(27.) \quad \int \frac{dx}{\cos^5 x} = \frac{\sin x}{4 \cos^4 x} + \frac{3}{4} \int \frac{dx}{\cos^3 x},$$

$$(28.) \quad \int \frac{dx}{\cos^3 x} = \frac{\sin x}{2 \cos^2 x} + \frac{1}{2} \int \frac{dx}{\cos x}$$

und mit Rücksicht auf Formel Nr. 48 der Tabelle

$$(29.) \quad \int \frac{dx}{\cos x} = -\ln \left[\operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{4} - \frac{x}{2} \right) \right],$$

also, wenn man Gleichung (28.) mit $\frac{3}{4}$, Gleichung (29.) mit $\frac{3 \cdot 1}{4 \cdot 2}$ multipliziert und die Gleichungen (27.) bis (29.) addiert,

$$(30.) \quad \int \frac{dx}{\cos^6 x} = \frac{\sin x}{4 \cos^4 x} + \frac{3 \sin x}{4 \cdot 2 \cos^2 x} - \frac{3 \cdot 1}{4 \cdot 2} \ln \left[\operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{4} - \frac{x}{2} \right) \right].$$

Für $n = 4$ erhält man

$$(31.) \quad \int \frac{dx}{\cos^4 x} = \frac{\sin x}{3 \cos^3 x} + \frac{2}{3} \int \frac{dx}{\cos^2 x} = \frac{\sin x}{3 \cos^3 x} + \frac{2}{3} \operatorname{tg} x.$$

Man wird aber, wenn n eine *gerade* Zahl ist, zur Berechnung von $\int \frac{dx}{\cos^n x}$ zweckmäßiger die Formel Nr. 61 der Tabelle anwenden, nach welcher

$$(32.) \quad \int \frac{dx}{\cos^{2m} x} = \int (1 + \operatorname{tg}^2 x)^{m-1} \cdot d(\operatorname{tg} x)$$

wird. In dem vorliegenden Falle ist z. B.

$$(33.) \quad \int \frac{dx}{\cos^4 x} = \int (1 + \operatorname{tg}^2 x) d(\operatorname{tg} x) = \operatorname{tg} x + \frac{1}{3} \operatorname{tg}^3 x,$$

ein Resultat, das mit dem in Gleichung (31.) übereinstimmt.

Aufgabe 5. $\int \sin^m x \cdot dx = ?$

Auflösung. Durch die Substitution

$$x = \frac{\pi}{2} - t$$

kann diese Aufgabe, wie schon erwähnt, auf die Aufgabe 3 zurückgeführt werden; hier möge jedoch, davon unabhängig, die partielle Integration angewendet werden. Setzt man

$$(34.) \quad u = \sin^{m-1} x, \quad \text{also} \quad dv = \sin x \cdot dx,$$

so wird

$$(35.) \quad du = (m-1) \sin^{m-2} x \cos x dx, \quad v = -\cos x,$$

$$(36.) \quad \int \sin^m x \cdot dx = -\sin^{m-1} x \cos x + (m-1) \int \sin^{m-2} x \cos^2 x dx.$$

Das Integral auf der rechten Seite dieser Gleichung ist *nicht* einfacher als das gesuchte Integral; beachtet man aber, daß

(37.) $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$, also $\sin^{m-2} x \cos^2 x = \sin^{m-2} x - \sin^m x$ ist, so geht Gleichung (36.) über in

$$\int \sin^m x \cdot dx = -\sin^{m-1} x \cos x + (m-1) \int \sin^{m-2} x \cdot dx \\ - (m-1) \int \sin^m x \cdot dx.$$

Dies gibt, wenn man das zweite Integral auf der rechten Seite, welches mit dem gesuchten Integral identisch ist, auf die linke Seite bringt und die ganze Gleichung durch m dividiert,

$$(38.) \int \sin^m x \cdot dx = -\frac{1}{m} \sin^{m-1} x \cos x + \frac{m-1}{m} \int \sin^{m-2} x \cdot dx.$$

Für $m = 2$ geht diese Gleichung in Gleichung (8.) über.

Das Integral auf der rechten Seite von Gleichung (38.) geht aus dem gesuchten hervor, indem man m mit $m-2$ vertauscht, und wird daher einfacher für $m \geq 2$. Es sei z. B. $m = 8$, dann erhält man

$$(39.) \int \sin^8 x \cdot dx = -\frac{1}{8} \sin^7 x \cos x + \frac{7}{8} \int \sin^6 x \cdot dx,$$

$$(40.) \int \sin^6 x \cdot dx = -\frac{1}{6} \sin^5 x \cos x + \frac{5}{6} \int \sin^4 x \cdot dx,$$

$$(41.) \int \sin^4 x \cdot dx = -\frac{1}{4} \sin^3 x \cos x + \frac{3}{4} \int \sin^2 x \cdot dx,$$

$$(42.) \int \sin^2 x \cdot dx = -\frac{1}{2} \sin x \cos x + \frac{x}{2}.$$

Dies gibt ähnlich wie bei $\int \cos^8 x \cdot dx$

$$(43.) \int \sin^8 x \cdot dx = -\cos x \left(\frac{1}{8} \sin^7 x + \frac{7}{8 \cdot 6} \sin^5 x + \frac{7 \cdot 5}{8 \cdot 6 \cdot 4} \sin^3 x \right. \\ \left. + \frac{7 \cdot 5 \cdot 3}{8 \cdot 6 \cdot 4 \cdot 2} \sin x \right) + \frac{7 \cdot 5 \cdot 3 \cdot 1}{8 \cdot 6 \cdot 4 \cdot 2} x.$$

In ähnlicher Weise findet man für $m = 7$

$$(44.) \int \sin^7 x \cdot dx = -\cos x \left(\frac{1}{7} \sin^6 x + \frac{6}{7 \cdot 5} \sin^4 x + \frac{6 \cdot 4}{7 \cdot 5 \cdot 3} \sin^2 x \right. \\ \left. + \frac{6 \cdot 4 \cdot 2}{7 \cdot 5 \cdot 3 \cdot 1} \right).$$

Man wird jedoch in allen Fällen, wo $m = 2n + 1$ eine *ungerade* Zahl ist, $\int \sin^m x \cdot dx$ lieber mit Hilfe von Formel Nr. 57 der Tabelle, nämlich mit Hilfe der Formel

$$\int \sin^{2n+1} x \cdot dx = -\int (1 - \cos^2 x)^n d(\cos x)$$

berechnen. Für $m = 7$ findet man dann z. B.

$$(45.) \int \sin^7 x \cdot dx = -\int (1 - 3\cos^2 x + 3\cos^4 x - \cos^6 x) d(\cos x) \\ = -\cos x + \cos^3 x - \frac{3}{5} \cos^5 x + \frac{1}{7} \cos^7 x.$$

Ist dagegen m eine *gerade* Zahl, und will man nicht die *Moiwreschen* Formeln anwenden (vergl. Formel Nr. 96 der Tabelle), so ist man auf die in Gleichung (38.) enthaltene Rekursionsformel angewiesen. Dabei findet man ähnlich wie in Gleichung (43.)

$$(46.) \int \sin^{2n} x \cdot dx = -\cos x \left[\frac{1}{2n} \sin^{2n-1} x + \frac{2n-1}{2n(2n-2)} \sin^{2n-3} x \right. \\ \left. + \frac{(2n-1)(2n-3)}{2n(2n-2)(2n-4)} \sin^{2n-5} x + \dots \right. \\ \left. + \frac{(2n-1)(2n-3)\dots 5 \cdot 3}{2n(2n-2)(2n-4)\dots 4 \cdot 2} \sin x \right] \\ + \frac{(2n-1)(2n-3)\dots 5 \cdot 3 \cdot 1}{2n(2n-2)(2n-4)\dots 4 \cdot 2} x.$$

Aufgabe 6. $\int \frac{dx}{\sin^n x} = ?$

Auflösung. Auch Gleichung (38.) bleibt noch richtig, wenn m eine von -1 verschiedene *negative* Zahl ist. Setzt man daher wieder

$$m = -(n-2) = -n+2,$$

also

$$m-1 = -n+1 = -(n-1), \quad m-2 = -n,$$

so geht Gleichung (38.) über in

$$(47.) \int \frac{dx}{\sin^{n-2} x} = -\frac{\cos x}{(n-2)\sin^{n-1} x} + \frac{-(n-1)}{-(n-2)} \int \frac{dx}{\sin^n x}.$$

Daraus folgt in ähnlicher Weise wie vorhin

$$(48.) \int \frac{dx}{\sin^n x} = -\frac{\cos x}{(n-1)\sin^{n-1} x} + \frac{n-2}{n-1} \int \frac{dx}{\sin^{n-2} x}.$$

Es ist z. B.

$$(49.) \quad \int \frac{dx}{\sin^5 x} = -\frac{\cos x}{4 \sin^4 x} + \frac{3}{4} \int \frac{dx}{\sin^3 x},$$

$$(50.) \quad \int \frac{dx}{\sin^3 x} = -\frac{\cos x}{2 \sin^2 x} + \frac{1}{2} \int \frac{dx}{\sin x}$$

und mit Rücksicht auf Formel Nr. 47 der Tabelle

$$(51.) \quad \int \frac{dx}{\sin x} = \ln \left[\operatorname{tg} \left(\frac{x}{2} \right) \right],$$

also

$$(52.) \quad \int \frac{dx}{\sin^5 x} = -\frac{\cos x}{4 \sin^4 x} - \frac{3 \cos x}{4 \cdot 2 \sin^2 x} + \frac{3 \cdot 1}{4 \cdot 2} \ln \left[\operatorname{tg} \left(\frac{x}{2} \right) \right].$$

Ist n eine *gerade* Zahl, so wird $\int \frac{dx}{\sin^n x}$ zweckmäßiger durch die Formel Nr. 64 der Tabelle, nämlich durch die Formel

$$\int \frac{dx}{\sin^{2m} x} = -\int (1 + \operatorname{ctg}^2 x)^{m-1} \cdot d(\operatorname{ctg} x)$$

ermittelt. Es ist z. B.

$$(53.) \quad \int \frac{dx}{\sin^4 x} = -\int (1 + \operatorname{ctg}^2 x) d(\operatorname{ctg} x) = -\operatorname{ctg} x - \frac{1}{3} \operatorname{ctg}^3 x.$$

Aufgabe 7. $\int \sin^m x \cos^n x dx = ?$

Auflösung. Ist n eine *ungerade* Zahl, so findet man die einfachste Lösung der Aufgabe mit Hilfe von Formel Nr. 55 der Tabelle; und ist m eine *ungerade* Zahl, so kann man Formel Nr. 58 der Tabelle mit gutem Erfolge anwenden. Sind aber m und n beide *gerade* Zahlen, so wird man in den meisten Fällen durch Anwendung einer der beiden Formeln

$$\cos^2 x = 1 - \sin^2 x \quad \text{und} \quad \sin^2 x = 1 - \cos^2 x$$

auf die durch die vorhergehenden Aufgaben erledigten Fälle kommen. Handelt es sich z. B. um $\int \cos^6 x \sin^4 x dx$, so wird man setzen

$$\begin{aligned} \int \cos^6 x \sin^4 x dx &= \int \cos^6 x (1 - 2 \cos^2 x + \cos^4 x) dx \\ &= \int \cos^6 x dx - 2 \int \cos^8 x dx + \int \cos^{10} x dx. \end{aligned}$$

Diese Integrale kann man aber mit Hilfe der Formel Nr. 101 der Tabelle berechnen.

Oder man setzt

$$\begin{aligned}\int \cos^6 x \sin^4 x dx &= \int \sin^4 x (1 - 3 \sin^2 x + 3 \sin^4 x - \sin^6 x) dx \\ &= \int \sin^4 x dx - 3 \int \sin^6 x dx + 3 \int \sin^8 x dx - \int \sin^{10} x dx\end{aligned}$$

und benutzt dann Formel Nr. 104 der Tabelle zur Berechnung dieser Integrale.

Man kann aber auch den Exponenten des einen Faktors der Differential-Funktion durch partielle Integration schrittweise verkleinern und dadurch den Faktor fortschaffen. Setzt man nämlich

$$(54.) \quad u = \sin^{m-1} x, \quad dv = \cos^n x \sin x dx, \\ \text{und deshalb}$$

$$(55.) \quad du = (m-1) \sin^{m-2} x \cos x dx, \quad v = -\frac{\cos^{n+1} x}{n+1},$$

so erhält man

$$(56.) \quad \int \sin^m x \cos^n x dx = -\frac{\sin^{m-1} x \cos^{n+1} x}{n+1} \\ + \frac{m-1}{n+1} \int \sin^{m-2} x \cos^{n+2} x dx.$$

Daß sich hierbei der Exponent von $\cos x$ um 2 Einheiten erhöht, kann unter Umständen sogar vorteilhaft sein. Ist nämlich m positiv und n negativ, so ist diese Formel sehr brauchbar. Ist z. B.

$$n = -m,$$

so geht Gleichung (56.) über in

$$\int \frac{\sin^m x}{\cos^m x} dx = -\frac{\sin^{m-1} x}{(-m+1) \cos^{m-1} x} + \frac{m-1}{-m+1} \int \frac{\sin^{m-2} x}{\cos^{m-2} x} dx,$$

$$(57.) \quad \int \operatorname{tg}^m x dx = \frac{1}{m-1} \operatorname{tg}^{m-1} x - \int \operatorname{tg}^{m-2} x dx.$$

Ist aber n gleichfalls positiv, so benutze man die Beziehungen

$$\cos^2 x = 1 - \sin^2 x,$$

$$\sin^{m-2} x \cos^{n+2} x = \sin^{m-2} x \cos^n x - \sin^m x \cos^n x.$$

Dadurch geht Gleichung (56.) über in

$$\begin{aligned}\int \sin^m x \cos^n x dx &= -\frac{\sin^{m-1} x \cos^{n+1} x}{n+1} + \frac{m-1}{n+1} \int \sin^{m-2} x \cos^n x dx \\ &\quad - \frac{m-1}{n+1} \int \sin^m x \cos^n x dx,\end{aligned}$$

oder

$$\frac{m+n}{n+1} \int \sin^m x \cos^n x dx = -\frac{\sin^{m-1} x \cos^{n+1} x}{n+1} + \frac{m-1}{n+1} \int \sin^{m-2} x \cos^n x dx.$$

Dann folgt

$$(58.) \int \sin^m x \cos^n x dx = -\frac{\sin^{m-1} x \cos^{n+1} x}{m+n} + \frac{m-1}{m+n} \int \sin^{m-2} x \cos^n x dx.$$

Durch diese Formel kann man den Exponenten von $\sin x$ reduzieren. Einen besonderen Fall dieser Formel erhält man für $n=0$, dann geht nämlich Gleichung (58.) in Gleichung (38.) über.

Vertauscht man in Gleichung (58.) m mit $-m+2$, also $m-1$ mit $-m+1$ und $m-2$ mit $-m$, so erhält man

$$\int \frac{\cos^n x dx}{\sin^{m-2} x} = -\frac{\cos^{n+1} x}{(n-m+2)\sin^{m-1} x} - \frac{m-1}{n-m+2} \int \frac{\cos^n x dx}{\sin^m x},$$

oder

$$(59.) \int \frac{\cos^n x dx}{\sin^m x} = -\frac{\cos^{n+1} x}{(m-1)\sin^{m-1} x} - \frac{n-m+2}{m-1} \int \frac{\cos^n x dx}{\sin^{m-2} x}.$$

Einen besonderen Fall dieser Formel erhält man wieder für $n=0$, dann geht nämlich Gleichung (59.), wenn man m mit n vertauscht, in Gleichung (48.) über.

In ähnlicher Weise kann man den Exponenten von $\cos x$ reduzieren. Setzt man nämlich

$$(60.) \quad u = \cos^{n-1} x, \quad dv = \sin^m x \cos x dx,$$

also

$$(61.) \quad du = -(n-1)\cos^{n-2} x \sin x dx, \quad v = \frac{\sin^{m+1} x}{m+1},$$

so wird

$$(62.) \int \sin^m x \cos^n x dx = \frac{\sin^{m+1} x \cos^{n-1} x}{m+1} + \frac{n-1}{m+1} \int \sin^{m+2} x \cos^{n-2} x dx.$$

Ist n positiv und m negativ, so ist diese Formel sehr brauchbar; ist z. B.

$$m = -n,$$

so geht Gleichung (62.) über in

$$(63.) \quad \int \operatorname{ctg}^n x dx = -\frac{\operatorname{ctg}^{n-1} x}{n-1} - \int \operatorname{ctg}^{n-2} x dx.$$

Ist aber m gleichfalls positiv, so benutze man die Beziehungen

$$\sin^2 x = 1 - \cos^2 x,$$

$$\sin^{m+2} x \cos^{n-2} x = \sin^m x \cos^{n-2} x - \sin^m x \cos^n x.$$

Dadurch geht Gleichung (62.) über in

$$\int \sin^m x \cos^n x dx = \frac{\sin^{m+1} x \cos^{n-1} x}{m+1} + \frac{n-1}{m+1} \int \sin^m x \cos^{n-2} x dx \\ - \frac{n-1}{m+1} \int \sin^m x \cos^n x dx,$$

oder

$$\frac{m+n}{m+1} \int \sin^m x \cos^n x dx = \frac{\sin^{m+1} x \cos^{n-1} x}{m+1} \\ + \frac{n-1}{m+1} \int \sin^m x \cos^{n-2} x dx;$$

daraus folgt

$$(64.) \quad \int \sin^m x \cos^n x dx = \frac{\sin^{m+1} x \cos^{n-1} x}{m+1} \\ + \frac{n-1}{m+n} \int \sin^m x \cos^{n-2} x dx.$$

Durch diese Formel kann man den Exponenten von $\cos x$ reduzieren. Einen besonderen Fall dieser Formel erhält man für $m=0$, dann geht nämlich Gleichung (64.), wenn man n mit m vertauscht, in Gleichung (16.) über.

Vertauscht man in Gleichung (64.) n mit $-n+2$, also $n-1$ mit $-n+1$, $n-2$ mit $-n$, so erhält man

$$\int \frac{\sin^m x dx}{\cos^{n-2} x} = \frac{\sin^{m+1} x}{(m-n+2) \cos^{n-1} x} + \frac{-n+1}{m-n+2} \int \frac{\sin^m x dx}{\cos^n x},$$

oder

$$(65.) \quad \int \frac{\sin^m x dx}{\cos^n x} = \frac{\sin^{m+1} x}{(n-1) \cos^{n-1} x} - \frac{m-n+2}{n-1} \int \frac{\sin^m x dx}{\cos^{n-2} x}.$$

Einen besonderen Fall dieser Formel enthält bereits Gleichung (26.).

Die hergeleiteten Formeln bleiben richtig, gleichviel, ob die Zahlen m und n gerade oder ungerade sind.

Was in den vorstehenden Aufgaben für die *trigonometrischen* Funktionen $\sin x$, $\cos x$, $\operatorname{tg} x$, $\operatorname{ctg} x$ gezeigt worden ist, kann in entsprechender Weise auch für die *hyperbolischen* Funktionen $\operatorname{Sin} x$, $\operatorname{Cos} x$, $\operatorname{Tg} x$, $\operatorname{Ctg} x$ ausgeführt werden; um Raum zu sparen, sollen hier nur die Resultate angegeben werden. Es ist

$$(66.) \int \operatorname{Cos}^m x \cdot dx = \frac{1}{m} \operatorname{Cos}^{m-1} x \operatorname{Sin} x + \frac{m-1}{m} \int \operatorname{Cos}^{m-2} x \cdot dx,$$

$$(67.) \int \operatorname{Sin}^m x \cdot dx = \frac{1}{m} \operatorname{Sin}^{m-1} x \operatorname{Cos} x - \frac{m-1}{m} \int \operatorname{Sin}^{m-2} x \cdot dx,$$

$$(68.) \int \operatorname{Tg}^m x \cdot dx = -\frac{1}{m-1} \operatorname{Tg}^{m-1} x + \int \operatorname{Tg}^{m-2} x \cdot dx,$$

$$(69.) \int \operatorname{Ctg}^m x \cdot dx = -\frac{1}{m-1} \operatorname{Ctg}^{m-1} x + \int \operatorname{Ctg}^{m-2} x \cdot dx.$$

Aufgabe 8. $\int e^{ax} \cos(bx) dx = ?$

Auflösung. Setzt man

$$(70.) \quad u = e^{ax}, \quad dv = \cos(bx) dx,$$

also

$$(71.) \quad du = ae^{ax} dx, \quad v = \frac{1}{b} \sin(bx),$$

so erhält man

$$(72.) \int e^{ax} \cos(bx) dx = \frac{1}{b} e^{ax} \sin(bx) - \frac{a}{b} \int e^{ax} \sin(bx) dx.$$

Setzt man dagegen

$$(73.) \quad u = e^{ax}, \quad dv = \sin(bx) dx,$$

also

$$(74.) \quad du = ae^{ax} dx, \quad v = -\frac{1}{b} \cos(bx),$$

so erhält man

$$(75.) \int e^{ax} \sin(bx) dx = -\frac{1}{b} e^{ax} \cos(bx) + \frac{a}{b} \int e^{ax} \cos(bx) dx.$$

Dies gibt, wenn man Gleichung (75.) mit $-\frac{a}{b}$ multipliziert, zu Gleichung (72.) addiert und das Resultat durch $\frac{a^2 + b^2}{b^2}$ dividiert,

$$(76.) \quad \int e^{ax} \cos(bx) dx = e^{ax} \cdot \frac{a \cos(bx) + b \sin(bx)}{a^2 + b^2}.$$

Multipliziert man dagegen Gleichung (72.) mit $\frac{a}{b}$, addiert dann Gleichung (75.) und dividiert durch $\frac{a^2 + b^2}{b^2}$, so erhält man

$$(77.) \quad \int e^{ax} \sin(bx) dx = e^{ax} \cdot \frac{a \sin(bx) - b \cos(bx)}{a^2 + b^2}.$$

Noch einfacher findet man diese Gleichungen (76.) und (77.) durch Anwendung der Formeln

$$2 \cos(bx) = e^{bxi} + e^{-bxi}, \quad 2i \sin(bx) = e^{bxi} - e^{-bxi},$$

wobei allerdings die Differential-Funktion eine komplexe Form erhält.

§ 18.

Integration von einigen irrationalen Funktionen durch partielle Integration.

(Vergl. die Formel-Tabelle Nr. 119 bis 131a.)

Aufgabe 1. $\int \frac{x^m dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = ?$

Auflösung. Die Aufgabe ist mit Aufgabe 5 im vorhergehenden Paragraphen nahe verwandt, denn setzt man nach Formel Nr. 84 der Tabelle

$$x = a \sin t, \quad \text{also} \quad dx = a \cos t dt, \quad \sqrt{a^2 - x^2} = a \cos t,$$

so wird

$$\int \frac{x^m dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \int \frac{a^m \sin^m t \cdot a \cos t dt}{a \cos t} = a^m \int \sin^m t dt.$$

Die folgenden Umformungen entsprechen deshalb Zeile für Zeile denen in jener Aufgabe. Hier setzt man

$$(1.) \quad u = x^{m-1}, \quad \text{also} \quad dv = \frac{x dx}{\sqrt{a^2 - x^2}},$$

dann wird nach Formel Nr. 31 der Tabelle

$$(2.) \quad du = (m-1)x^{m-2}dx, \quad v = -\sqrt{a^2-x^2},$$

$$(3.) \quad \int \frac{x^m dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = -x^{m-1}\sqrt{a^2-x^2} + (m-1) \int x^{m-2} dx \sqrt{a^2-x^2}.$$

Das Integral auf der rechten Seite dieser Gleichung ist *nicht* einfacher als das gesuchte Integral; beachtet man aber, daß

$$\sqrt{a^2-x^2} = \frac{a^2-x^2}{\sqrt{a^2-x^2}}, \text{ also daß } x^{m-2}\sqrt{a^2-x^2} = \frac{a^2x^{m-2}-x^m}{\sqrt{a^2-x^2}}$$

ist, so geht Gleichung (3.) über in

$$\int \frac{x^m dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = -x^{m-1}\sqrt{a^2-x^2} + (m-1) \int \frac{(a^2x^{m-2}-x^m)dx}{\sqrt{a^2-x^2}}.$$

Dies gibt

$$\begin{aligned} \int \frac{x^m dx}{\sqrt{a^2-x^2}} &= -x^{m-1}\sqrt{a^2-x^2} + (m-1)a^2 \int \frac{x^{m-2} dx}{\sqrt{a^2-x^2}} \\ &\quad - (m-1) \int \frac{x^m dx}{\sqrt{a^2-x^2}}. \end{aligned}$$

Das zweite Integral auf der rechten Seite dieser Gleichung ist mit dem gesuchten Integral identisch. Bringt man dasselbe auf die linke Seite und dividiert die ganze Gleichung durch m , so findet man

$$(4.) \quad \int \frac{x^m dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = -\frac{x^{m-1}}{m}\sqrt{a^2-x^2} + \frac{(m-1)a^2}{m} \int \frac{x^{m-2} dx}{\sqrt{a^2-x^2}}.$$

In dieser Formel geht das Integral auf der rechten Seite der Gleichung aus dem gesuchten Integral hervor, indem man m mit $m-2$ vertauscht. Es ist daher, wenn die ganze Zahl $m \geq 2$ ist, einfacher als das gesuchte Integral.

Für $m=6$ erhält man z. B.

$$(5.) \quad \int \frac{x^6 dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = -\frac{x^5}{6}\sqrt{a^2-x^2} + \frac{5a^2}{6} \int \frac{x^4 dx}{\sqrt{a^2-x^2}},$$

$$(6.) \quad \int \frac{x^4 dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = -\frac{x^3}{4}\sqrt{a^2-x^2} + \frac{3a^2}{4} \int \frac{x^2 dx}{\sqrt{a^2-x^2}},$$

$$(7.) \quad \int \frac{x^2 dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = -\frac{x}{2}\sqrt{a^2-x^2} + \frac{a^2}{2} \int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}}$$

und mit Rücksicht auf Formel Nr. 34 der Tabelle

$$(8.) \quad \int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin\left(\frac{x}{a}\right).$$

Indem man Gleichung (6.) mit $\frac{5a^2}{6}$, Gleichung (7.) mit $\frac{5 \cdot 3a^4}{6 \cdot 4}$, Gleichung (8.) mit $\frac{5 \cdot 3 \cdot 1a^6}{6 \cdot 4 \cdot 2}$ multipliziert und die Gleichungen (5.) bis (8.) addiert, erhält man

$$(9.) \quad \int \frac{x^6 dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = -\sqrt{a^2 - x^2} \left(\frac{x^5}{6} + \frac{5a^2 x^3}{6 \cdot 4} + \frac{5 \cdot 3a^4 x}{6 \cdot 4 \cdot 2} \right) + \frac{5 \cdot 3 \cdot 1}{6 \cdot 4 \cdot 2} a^6 \arcsin\left(\frac{x}{a}\right).$$

In ähnlicher Weise findet man für $m = 7$ mit Rücksicht auf Formel Nr. 31 der Tabelle

$$(10.) \quad \int \frac{x^7 dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = -\sqrt{a^2 - x^2} \left(\frac{x^6}{7} + \frac{6a^2 x^4}{7 \cdot 5} + \frac{6 \cdot 4a^4 x^2}{7 \cdot 5 \cdot 3} + \frac{6 \cdot 4 \cdot 2a^6}{7 \cdot 5 \cdot 3 \cdot 1} \right).$$

Man wird aber die in Gleichung (4.) enthaltene Rekursionsformel nur anwenden, wenn m eine *gerade* Zahl ist. Für *ungerades* m , also für $m = 2n + 1$ führt die Substitution

$$(11.) \quad \sqrt{a^2 - x^2} = t$$

schneller zum Ziele. Es wird dann nämlich

$$a^2 - x^2 = t^2, \quad x^2 = a^2 - t^2, \quad x dx = -t dt,$$

also

$$(12.) \quad \int \frac{x^{2n+1} dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = -\int \frac{(a^2 - t^2)^n t dt}{t} = -\int (a^2 - t^2)^n dt,$$

so daß man nur eine ganze rationale Funktion zu integrieren hat. Es ist z. B.

$$\begin{aligned} \int \frac{x^7 dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} &= -\int (a^6 - 3a^4 t^2 + 3a^2 t^4 - t^6) dt \\ &= -\left(a^6 t - a^4 t^3 + \frac{3}{5} a^2 t^5 - \frac{1}{7} t^7 \right) \\ &= -t \left(a^6 - a^4 t^2 + \frac{3}{5} a^2 t^4 - \frac{1}{7} t^6 \right), \end{aligned}$$

oder, wenn man für t den Wert aus Gleichung (11.) einsetzt,

$$(13.) \int \frac{x^7 dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = -\sqrt{a^2 - x^2} \left(\frac{x^6}{7} + \frac{6a^2 x^4}{7 \cdot 5} + \frac{6 \cdot 4a^4 x^2}{7 \cdot 5 \cdot 3} + \frac{6 \cdot 4 \cdot 2a^6}{7 \cdot 5 \cdot 3 \cdot 1} \right).$$

Das in Gleichung (9.) enthaltene Resultat kann man sogleich verallgemeinern. Setzt man nämlich

$$c_1 = \frac{1}{2}, \quad c_2 = \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4}, \quad c_3 = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6}, \dots$$

allgemein

$$(14.) \quad c_n = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \dots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \dots (2n)}, \quad c_{n+1} = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \dots (2n-1)(2n+1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \dots (2n)(2n+2)},$$

so wird

$$(15.) \quad \frac{c_2}{c_1} = \frac{3}{4}, \quad \frac{c_3}{c_2} = \frac{5}{6}, \quad \dots \quad \frac{c_{n+1}}{c_n} = \frac{2n+1}{2n+2}.$$

Setzt man ferner

$$G_1(x) = \frac{x}{2} = c_1 x,$$

$$G_2(x) = \frac{x^3}{4} + \frac{3a^2 x}{2 \cdot 4} = \frac{c_2}{c_1} \left(\frac{x^3}{3} + \frac{a^2 x}{2} \right) = \frac{c_2}{c_1} \left[\frac{x^3}{3} + a^2 G_1(x) \right],$$

$$G_3(x) = \frac{x^5}{6} + \frac{5a^2 x^3}{4 \cdot 6} + \frac{3 \cdot 5a^4 x}{2 \cdot 4 \cdot 6} = \frac{c_3}{c_2} \left[\frac{x^5}{5} + \frac{a^2 x^3}{4} + \frac{3a^4 x}{2 \cdot 4} \right] \\ = \frac{c_3}{c_2} \left[\frac{x^5}{5} + a^2 G_2(x) \right],$$

allgemein

$$(16.) \quad G_n(x) = \frac{x^{2n-1}}{2n} + \frac{(2n-1)a^2 x^{2n-3}}{(2n-2)2n} \\ + \dots + \frac{3 \cdot 5 \dots (2n-1)a^{2n-2} x}{2 \cdot 4 \dots (2n-2)2n},$$

$$(17.) \quad G_{n+1}(x) = \frac{x^{2n+1}}{2n+2} + \frac{(2n+1)a^2 x^{2n-1}}{2n(2n+2)} \\ + \frac{(2n-1)(2n+1)a^4 x^{2n-3}}{(2n-2)(2n)(2n+2)} + \dots + \frac{3 \cdot 5 \dots (2n-1)(2n+1)a^{2n} x}{2 \cdot 4 \dots (2n-2)2n(2n+2)} \\ = \frac{c_{n+1}}{c_n} \left[\frac{x^{2n+1}}{2n+1} + \frac{a^2 x^{2n-1}}{2n} + \frac{(2n-1)a^4 x^{2n-3}}{(2n-2)2n} + \dots \right. \\ \left. + \frac{3 \cdot 5 \dots (2n-1)a^{2n} x}{2 \cdot 4 \dots (2n-2)2n} \right].$$

so wird

$$(18.) \quad G_{n+1}(x) = \frac{c_{n+1}}{c_n} \left[\frac{x^{2n+1}}{2n+1} + a^2 G_n(x) \right].$$

Nach Einführung dieser Bezeichnungen erhält man

$$(19.) \quad \int \frac{x^{2n} dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = c_n \cdot a^{2n} \arcsin\left(\frac{x}{a}\right) - \sqrt{a^2 - x^2} \cdot G_n(x).$$

Die Richtigkeit dieser Formel kann man durch den Schluß von n auf $n+1$ beweisen. Es ist nämlich nach Gleichung (4.) für $m = 2n+2$

$$\int \frac{x^{2n+2} dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = -\frac{x^{2n+1}}{2n+2} \sqrt{a^2 - x^2} + \frac{(2n+1)a^2}{2n+2} \int \frac{x^{2n} dx}{\sqrt{a^2 - x^2}},$$

oder, wenn man voraussetzt, daß Gleichung (19.) richtig ist,

$$\begin{aligned} \int \frac{x^{2n+2} dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} &= -\frac{x^{2n+1}}{2n+2} \sqrt{a^2 - x^2} + \frac{(2n+1)a^2}{2n+2} c_n a^{2n} \arcsin\left(\frac{x}{a}\right) \\ &\quad - \frac{(2n+1)a^2}{2n+2} \sqrt{a^2 - x^2} \cdot G_n(x), \end{aligned}$$

folglich ist mit Rücksicht auf die Gleichungen (15.) und (18.)

$$(20.) \quad \int \frac{x^{2n+2} dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = c_{n+1} a^{2n+2} \arcsin\left(\frac{x}{a}\right) - \sqrt{a^2 - x^2} \cdot G_{n+1}(x).$$

Ist also die Gleichung (19.) richtig, so bleibt sie auch richtig, wenn man n mit $n+1$ vertauscht. Aus den Gleichungen (5.) bis (9.) erkennt man, daß die Gleichung (19.) für $n = 1, 2$ und 3 richtig ist, folglich bleibt sie auch richtig für $n = 4, 5, 6, \dots$, d. h. für *alle* ganzzahligen, positiven Werte von n .

Aufgabe 2. $\int x^m dx \sqrt{a^2 - x^2} = ?$

Auflösung. Es ist

$$(21.) \quad x^m \sqrt{a^2 - x^2} = \frac{a^2 x^m - x^{m+2}}{\sqrt{a^2 - x^2}},$$

folglich wird

$$(22.) \quad \int x^m dx \sqrt{a^2 - x^2} = a^2 \int \frac{x^m dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} - \int \frac{x^{m+2} dx}{\sqrt{a^2 - x^2}}.$$

Nun erhält man aus Gleichung (4.) durch Vertauschung von m mit $m+2$

$$(23.) \int \frac{x^{m+2} dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = -\frac{x^{m+1}}{m+2} \sqrt{a^2 - x^2} + \frac{(m+1)a^2}{m+2} \int \frac{x^m dx}{\sqrt{a^2 - x^2}}.$$

Subtrahiert man diese Gleichung von der vorigen, so ergibt sich

$$(24.) \int x^m dx \sqrt{a^2 - x^2} = \frac{x^{m+1}}{m+2} \sqrt{a^2 - x^2} + \frac{a^2}{m+2} \int \frac{x^m dx}{\sqrt{a^2 - x^2}}.$$

Das Integral auf der rechten Seite dieser Gleichung kann man dann weiter durch die in Gleichung (4.) enthaltene Rekursionsformel reduzieren. Man findet z. B. für $m = 0$ mit Rücksicht auf Formel Nr. 34 der Tabelle

$$(25.) \int dx \sqrt{a^2 - x^2} = \frac{x}{2} \sqrt{a^2 - x^2} + \frac{a^2}{2} \arcsin\left(\frac{x}{a}\right),$$

und für $m = 1$ mit Rücksicht auf Formel Nr. 31 der Tabelle

$$(26.) \int x dx \sqrt{a^2 - x^2} = \frac{x^2}{3} \sqrt{a^2 - x^2} - \frac{a^2}{3} \sqrt{a^2 - x^2} \\ = -\frac{1}{3} (a^2 - x^2) \sqrt{a^2 - x^2}.$$

Auch hier wird in dem Falle, wo der Exponent m eine *ungerade* Zahl ist, die Substitution

$$\sqrt{a^2 - x^2} = t, \quad x^2 = a^2 - t^2, \quad x dx = -t dt$$

schneller zum Ziele führen. So ist z. B.

$$\int x dx \sqrt{a^2 - x^2} = -\int t^2 dt = -\frac{t^3}{3},$$

woraus sich wieder das in Gleichung (26.) gefundene Resultat ergibt.

Aufgabe 3. $\int \frac{dx}{x^n \sqrt{a^2 - x^2}} = ?$

Auflösung. Gleichung (4.) bleibt auch dann noch richtig, wenn m eine *negative* Zahl ist. Setzt man z. B.

$$m = -(n - 2) = -n + 2,$$

also

$$m - 1 = -n + 1 = -(n - 1), \quad m - 2 = -n,$$

so geht Gleichung (4.) über in

$$\int \frac{dx}{x^{n-2} \sqrt{a^2 - x^2}} = \frac{\sqrt{a^2 - x^2}}{(n-2)x^{n-1}} + \frac{-(n-1)a^2}{-(n-2)} \int \frac{dx}{x^n \sqrt{a^2 - x^2}}.$$

In dieser Gleichung ist das Integral auf der *linken* Seite einfacher als das auf der *rechten*. Deshalb vertauscht man beide Seiten der Gleichung und findet durch Multiplikation mit dem Faktor $\frac{n-2}{(n-1)a^2}$

$$(27.) \int \frac{dx}{x^n \sqrt{a^2 - x^2}} = -\frac{\sqrt{a^2 - x^2}}{(n-1)a^2 x^{n-1}} + \frac{n-2}{(n-1)a^2} \int \frac{dx}{x^{n-2} \sqrt{a^2 - x^2}}.$$

Es ist z. B. für $n = 2$ in Übereinstimmung mit Formel Nr. 38. der Tabelle

$$(28.) \int \frac{dx}{x^2 \sqrt{a^2 - x^2}} = -\frac{\sqrt{a^2 - x^2}}{a^2 x}.$$

Auf dieses Integral kann man $\int \frac{dx}{x^{2m} \sqrt{a^2 - x^2}}$ durch wiederholte Anwendung der gefundenen Rekursionsformel immer zurückführen. Dagegen gelangt man für *ungerade* Werte von n zu $\int \frac{dx}{x \sqrt{a^2 - x^2}}$, auf welches die in Gleichung (27.) enthaltene Formel nicht mehr anwendbar ist, weil die rechte Seite die Form $\infty - \infty$ annimmt. Man erhält aber nach Formel Nr. 37. der Tabelle

$$(29.) \int \frac{dx}{x \sqrt{a^2 - x^2}} = -\frac{1}{a} \operatorname{ArCo}f\left(\frac{a}{x}\right) = -\frac{1}{a} \ln\left(\frac{a + \sqrt{a^2 - x^2}}{x}\right).$$

Aufgabe 4. $\int \frac{x^m dx}{\sqrt{a^2 + x^2}} = ?$

Auflösung. Man kann das gesuchte Integral nach Formel Nr. 85a der Tabelle leicht auf $\int \operatorname{Sin}^m u \cdot du$ zurückführen, indem man

$$x = a \operatorname{Sin} u$$

setzt; denn dann wird

$$dx = a \operatorname{Cos} u \cdot du, \quad \sqrt{a^2 + x^2} = a \operatorname{Cos} u,$$

also

$$\int \frac{x^m dx}{\sqrt{a^2 + x^2}} = a^m \int \operatorname{Sin}^m u \cdot du.$$

Unabhängig davon kann man die Aufgabe in folgender Weise lösen. Setzt man

$$(30.) \quad u = x^{m-1}, \quad \text{also} \quad dv = \frac{x dx}{\sqrt{a^2 + x^2}},$$

so erhält man

$$(31.) \quad du = (m-1)x^{m-2}dx, \quad v = \sqrt{a^2 + x^2},$$

$$(32.) \quad \int \frac{x^m dx}{\sqrt{a^2 + x^2}} = x^{m-1} \sqrt{a^2 + x^2} - (m-1) \int x^{m-2} dx \sqrt{a^2 + x^2}.$$

Das Integral auf der rechten Seite dieser Gleichung ist *nicht* einfacher als das gesuchte Integral; beachtet man aber, daß

$$\sqrt{a^2 + x^2} = \frac{a^2 + x^2}{\sqrt{a^2 + x^2}}, \quad x^{m-2} \sqrt{a^2 + x^2} = \frac{a^2 x^{m-2} + x^m}{\sqrt{a^2 + x^2}}$$

ist, so geht Gleichung (32.) über in

$$(33.) \quad \int \frac{x^m dx}{\sqrt{a^2 + x^2}} = x^{m-1} \sqrt{a^2 + x^2} - (m-1) a^2 \int \frac{x^{m-2} dx}{\sqrt{a^2 + x^2}} \\ - (m-1) \int \frac{x^m dx}{\sqrt{a^2 + x^2}}.$$

Bringt man das zweite Integral auf der rechten Seite dieser Gleichung, da es mit dem gesuchten identisch ist, auf die linke Seite und dividiert die ganze Gleichung durch m , so erhält man

$$(34.) \quad \int \frac{x^m dx}{\sqrt{a^2 + x^2}} = \frac{x^{m-1}}{m} \sqrt{a^2 + x^2} - \frac{(m-1)a^2}{m} \int \frac{x^{m-2} dx}{\sqrt{a^2 + x^2}}.$$

Es ist z. B. für $m = 6$

$$(35.) \quad \int \frac{x^6 dx}{\sqrt{a^2 + x^2}} = \frac{x^5}{6} \sqrt{a^2 + x^2} - \frac{5a^2}{6} \int \frac{x^4 dx}{\sqrt{a^2 + x^2}},$$

$$(36.) \quad \int \frac{x^4 dx}{\sqrt{a^2 + x^2}} = \frac{x^3}{4} \sqrt{a^2 + x^2} - \frac{3a^2}{4} \int \frac{x^2 dx}{\sqrt{a^2 + x^2}},$$

$$(37.) \quad \int \frac{x^2 dx}{\sqrt{a^2 + x^2}} = \frac{x}{2} \sqrt{a^2 + x^2} - \frac{a^2}{2} \int \frac{dx}{\sqrt{a^2 + x^2}}$$

und mit Rücksicht auf Formel Nr. 35 der Tabelle

$$(38.) \quad \int \frac{dx}{\sqrt{a^2 + x^2}} = \operatorname{Ar} \operatorname{Sin} \left(\frac{x}{a} \right) = \ln \left(\frac{x + \sqrt{a^2 + x^2}}{a} \right).$$

Dies gibt

$$(39.) \quad \int \frac{x^6 dx}{\sqrt{a^2 + x^2}} = \sqrt{a^2 + x^2} \left(\frac{x^5}{6} - \frac{5a^2 x^3}{6 \cdot 4} + \frac{5 \cdot 3a^4 x}{6 \cdot 4 \cdot 2} \right) \\ - \frac{5 \cdot 3 \cdot 1}{6 \cdot 4 \cdot 2} a^6 \ln \left(\frac{x + \sqrt{a^2 + x^2}}{a} \right).$$

In ähnlicher Weise findet man

$$(40.) \quad \int \frac{x^7 dx}{\sqrt{a^2 + x^2}} = \sqrt{a^2 + x^2} \left(\frac{x^6}{7} - \frac{6a^2 x^4}{7 \cdot 5} + \frac{6 \cdot 4a^4 x^2}{7 \cdot 5 \cdot 3} - \frac{6 \cdot 4 \cdot 2a^6}{7 \cdot 5 \cdot 3 \cdot 1} \right);$$

man wird aber, wenn m eine *ungerade* Zahl ist, schneller zum Ziele kommen, indem man die Substitution

$$\sqrt{a^2 + x^2} = t, \quad x^2 = t^2 - a^2, \quad \frac{x dx}{\sqrt{a^2 + x^2}} = dt$$

anwendet. So findet man z. B.

$$(41.) \quad \int \frac{x^7 dx}{\sqrt{a^2 + x^2}} = \int x^6 dt = \int (t^6 - 3a^2 t^4 + 3a^4 t^2 - a^6) dt \\ = \frac{t^7}{7} - \frac{3a^2 t^5}{5} + a^4 t^3 - a^6 t.$$

Die vorstehenden Formeln bleiben sämtlich noch richtig, wenn man $+a^2$ mit $-a^2$ vertauscht. Dadurch findet man z. B. aus Gleichung (34.)

$$(42.) \quad \int \frac{x^m dx}{\sqrt{x^2 - a^2}} = \frac{x^{m-1}}{m} \sqrt{x^2 - a^2} + \frac{(m-1)a^2}{m} \int \frac{x^{m-2} dx}{\sqrt{x^2 - a^2}},$$

und aus den Gleichungen (37.) und (38.)

$$(43.) \quad \int \frac{x^2 dx}{\sqrt{x^2 - a^2}} = \frac{x}{2} \sqrt{x^2 - a^2} + \frac{a^2}{2} \ln \left(\frac{x + \sqrt{x^2 - a^2}}{a} \right)^* \\ = \frac{x}{2} \sqrt{x^2 - a^2} + \frac{a^2}{2} \operatorname{ArCo}f \left(\frac{x}{a} \right).$$

*) Durch Vertauschung von $+a^2$ mit $-a^2$ geht allerdings

$$\ln \left(\frac{x + \sqrt{a^2 + x^2}}{a} \right) = \ln(x + \sqrt{a^2 + x^2}) - \ln a$$

über in

$$\ln(x + \sqrt{x^2 - a^2}) - \ln(a \sqrt{-1}) = \ln \left(\frac{x + \sqrt{x^2 - a^2}}{a} \right) - \ln(\sqrt{-1}).$$

Hierbei darf aber die Integrations-Konstante $-\ln(\sqrt{-1})$ fortgelassen werden.

Man kann das Integral $\int \frac{x^m dx}{\sqrt{x^2 - a^2}}$ leicht auf $\int \cos^m u \cdot du$ zurückführen, indem man

$$x = a \cos u$$

setzt; denn dann wird

$$dx = -a \sin u \cdot du, \quad \sqrt{x^2 - a^2} = a \sin u,$$

also

$$\int \frac{x^m dx}{\sqrt{x^2 - a^2}} = -a^m \int \cos^m u \cdot du.$$

Aufgabe 5. $\int x^m dx \sqrt{a^2 + x^2} = ?$

Auflösung. Es ist

$$(44.) \quad x^m \sqrt{a^2 + x^2} = \frac{a^2 x^m + x^{m+2}}{\sqrt{a^2 + x^2}},$$

folglich wird

$$(45.) \quad \int x^m dx \sqrt{a^2 + x^2} = a^2 \int \frac{x^m dx}{\sqrt{a^2 + x^2}} + \int \frac{x^{m+2} dx}{\sqrt{a^2 + x^2}}.$$

Nun erhält man aus Gleichung (34.) durch Vertauschung von m mit $m + 2$

$$(46.) \quad \int \frac{x^{m+2} dx}{\sqrt{a^2 + x^2}} = \frac{x^{m+1}}{m+2} \sqrt{a^2 + x^2} - \frac{(m+1)a^2}{m+2} \int \frac{x^m dx}{\sqrt{a^2 + x^2}}.$$

Addiert man diese Gleichung zu der vorigen, so ergibt sich

$$(47.) \quad \int x^m dx \sqrt{a^2 + x^2} = \frac{x^{m+1}}{m+2} \sqrt{a^2 + x^2} + \frac{a^2}{m+2} \int \frac{x^m dx}{\sqrt{a^2 + x^2}}$$

Das Integral auf der rechten Seite dieser Gleichung kann man dann weiter durch die in Gleichung (34.) enthaltene Rekursionsformel reduzieren. Man findet z. B. für $m = 0$ mit Rücksicht auf Formel Nr. 35 der Tabelle

$$(48.) \quad \int dx \sqrt{a^2 + x^2} = \frac{x}{2} \sqrt{a^2 + x^2} + \frac{a^2}{2} \ln \left(x + \frac{\sqrt{a^2 + x^2}}{a} \right),$$

und für $m = 1$ mit Rücksicht auf Formel Nr. 32 der Tabelle

$$(49.) \quad \int x dx \sqrt{a^2 + x^2} = \frac{x^2}{3} \sqrt{a^2 + x^2} + \frac{a^2}{3} \sqrt{a^2 + x^2} = \frac{1}{3} (a^2 + x^2) \sqrt{a^2 + x^2}.$$

Auch hier wird man in dem Falle, wo der Exponent m eine *ungerade* Zahl ist, besser die Substitution

$$\sqrt{a^2 + x^2} = t$$

benutzen.

Durch Vertauschung von $+a^2$ mit $-a^2$ gehen die Gleichungen (47.) bis (49.) über in

$$(50.) \int x^m dx \sqrt{x^2 - a^2} = \frac{x^{m+1}}{m+2} \sqrt{x^2 - a^2} - \frac{a^2}{m+2} \int \frac{x^m dx}{\sqrt{x^2 - a^2}},$$

$$(51.) \int dx \sqrt{x^2 - a^2} = \frac{x}{2} \sqrt{x^2 - a^2} - \frac{a^2}{2} \ln \left(\frac{x + \sqrt{x^2 - a^2}}{a} \right),^*)$$

$$(52.) \int x dx \sqrt{x^2 - a^2} = \frac{1}{3} (x^2 - a^2) \sqrt{x^2 - a^2}.$$

Aufgabe 6. $\int \frac{dx}{x^n \sqrt{a^2 + x^2}} = ?$

Auflösung. Gleichung* (34.) bleibt auch dann noch richtig, wenn m eine negative Zahl ist. Setzt man z. B.

$$m = -(n-2) = -n+2,$$

also

$$m-1 = -n+1 = -(n-1), \quad m-2 = -n,$$

so geht Gleichung (34.) über in

$$(53.) \int \frac{dx}{x^{n-2} \sqrt{a^2 + x^2}} = -\frac{\sqrt{a^2 + x^2}}{(n-2)x^{n-1}} - \frac{(n-1)a^2}{n-2} \int \frac{dx}{x^n \sqrt{a^2 + x^2}}.$$

Vertauscht man beide Seiten dieser Gleichung miteinander und multipliziert sie mit dem Faktor $-\frac{n-2}{(n-1)a^2}$, so erhält man

$$(54.) \int \frac{dx}{x^n \sqrt{a^2 + x^2}} = -\frac{\sqrt{a^2 + x^2}}{(n-1)a^2 x^{n-1}} - \frac{n-2}{(n-1)a^2} \int \frac{dx}{x^{n-2} \sqrt{a^2 + x^2}}.$$

Es ist z. B. für $n=2$ in Übereinstimmung mit Formel Nr. 40 der Tabelle

$$(55.) \int \frac{dx}{x^2 \sqrt{a^2 + x^2}} = -\frac{\sqrt{a^2 + x^2}}{a^2 x}.$$

Auf dieses Integral kann $\int \frac{dx}{x^{2m} \sqrt{a^2 + x^2}}$ durch wiederholte Anwendung der in Gleichung (54.) enthaltenen Rekur-

*) Vergl. die Anmerkung auf Seite 106.

sionsformel immer zurückgeführt werden. Dagegen gelangt man in dem Falle, wo n eine *ungerade* Zahl ist, zu $\int \frac{dx}{x\sqrt{a^2+x^2}}$, auf welches die in Gleichung (54.) enthaltene Formel nicht mehr anwendbar ist, weil die rechte Seite die Form $-\infty + \infty$ annimmt. Man erhält aber nach Formel Nr. 39 der Tabelle

$$(56.) \int \frac{dx}{x\sqrt{a^2+x^2}} = -\frac{1}{a} \text{Ar}\sin\left(\frac{a}{x}\right) = -\frac{1}{a} \ln\left(\frac{a + \sqrt{a^2+x^2}}{x}\right).$$

Vertauscht man $+a^2$ mit $-a^2$, so gehen die Gleichungen (54.) und (55.) über in

$$(57.) \int \frac{dx}{x^n \sqrt{x^2-a^2}} = + \frac{\sqrt{x^2-a^2}}{(n-1)a^2 x^{n-1}} + \frac{n-2}{(n-1)a^2} \int \frac{dx}{x^{n-2} \sqrt{x^2-a^2}},$$

$$(58.) \int \frac{dx}{x^2 \sqrt{x^2-a^2}} = + \frac{\sqrt{x^2-a^2}}{a^2 x}. \quad (\text{Vergl. Formel Nr. 42 der Tabelle.})$$

Auf dieses Integral läßt sich $\int \frac{dx}{x^{2m} \sqrt{x^2-a^2}}$ durch wiederholte Anwendung der in Gleichung (57.) enthaltenen Rekursionsformel immer zurückführen. Dagegen gelangt man in dem Falle, wo n eine *ungerade* Zahl ist, zu $\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-a^2}}$, auf welches die in Gleichung (57.) enthaltene Formel nicht mehr anwendbar ist, weil die rechte Seite die Form $\infty - \infty$ annimmt. Man erhält aber nach Formel Nr. 41 der Tabelle

$$(59.) \int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-a^2}} = -\frac{1}{a} \text{arc sin}\left(\frac{a}{x}\right).$$

Anwendungen der Integral-Rechnung.

V. Abschnitt.

Quadratur der Kurven.

§ 19.

Quadratur der Kurven bei Anwendung rechtwinkliger Koordinaten.

Nach Formel Nr. 4 der Tabelle ist der Flächeninhalt einer ebenen Figur, welche begrenzt wird

- 1.) von der Kurve $y = f(x)$,
- 2.) von der X -Achse,
- 3.) von den beiden Ordinaten $x = a$ und $x = b$,

gleich

$$(1.) \quad F = \int_a^b y dx = \int_a^b F'(x) dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a),$$

wobei $F'(x) = f(x)$ sein soll.

Die Berechnung des Flächeninhaltes von solchen ebenen Figuren nennt man „*Quadratur der Kurven*“. Man kann die dafür angegebene Formel sofort zur Lösung der folgenden Aufgaben benutzen.

Aufgabe 1. Es sei eine Kurve durch die Gleichung

$$(2.) \quad 8y = x^2$$

gegeben (Fig. 14); man soll die Fläche A_1B_1BA berechnen, welche durch die beiden Ordinaten


$$x = a = 2 \quad \text{und} \quad x = b = 7$$

begrenzt wird.

Auflösung. Nach Gleichung (1.) wird

$$\begin{aligned} (3.) \quad F &= \frac{1}{8} \int_2^7 x^2 dx = \frac{1}{24} [x^3]_2^7 \\ &= \frac{1}{24} (7^3 - 2^3) \\ &= \frac{343 - 8}{24} = \frac{335}{24}. \end{aligned}$$

Fig. 14.



Aufgabe 2. Die Gleichung einer Parabel OP (Fig. 15) sei


$$(4.) \quad y^2 = 2px, \quad \text{oder} \quad y = \sqrt{2px};$$

man soll den Flächeninhalt der Figur OQP berechnen.

Auflösung. Da der Punkt O die Abszisse 0 und der Punkt P die Abszisse OQ gleich x hat, so erhält man nach Gleichung (1.)

$$\begin{aligned} (5.) \quad F &= \int_0^x y dx = \int_0^x \sqrt{2px} \cdot dx \\ &= \sqrt{2p} \int_0^x x^{\frac{1}{2}} dx \\ &= \sqrt{2p} \left[\frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} \right]_0^x = \frac{2x}{3} \sqrt{2px}, \end{aligned}$$

Fig. 15.



oder

$$(6.) \quad F = \frac{2xy}{3}.$$

In diesem Resultate ist der Satz enthalten:

Die von der Parabel OP , der X -Achse und einer beliebigen Ordinate QP begrenzte ebene Figur verhält sich zur Fläche des Rechtecks $OQPR$ mit den Seiten $OQ = x$ und $QP = y$ wie 2 : 3.

Aufgabe 3. Die Gleichung einer Parabel (Fig. 16) sei

$$(7.) \quad y^2 = 9x, \quad \text{oder} \quad y = 3\sqrt{x};$$


man soll die Fläche A_1B_1BA berechnen, wenn

$$OA_1 = 4, \quad OB_1 = 25$$

ist.

Auflösung. Nach Gleichung (1.) wird in diesem Falle

Fig. 16.



$$(8.) \quad F = \int_4^{25} y dx = 3 \int_4^{25} x^{\frac{1}{2}} dx$$

$$= 3 \left[\frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} \right]_4^{25} = 2 \left[x \sqrt{x} \right]_4^{25},$$

also

$$(9.) \quad F = 2(125 - 8) = 234.$$

Aufgabe 4. In einer *Ellipse* mit der Gleichung


$$(10.) \quad b^2 x^2 + a^2 y^2 - a^2 b^2 = 0,$$

oder

$$(10a.) \quad y = \pm \frac{b}{a} \sqrt{a^2 - x^2}$$

sind die Ordinaten $Q_1 P_1$ und $Q_2 P_2$ gezogen (Fig. 17); man soll den Flächeninhalt der Figur $Q_1 Q_2 P_2 P_1$ berechnen.

Fig. 17.



Auflösung. Aus Gleichung (10a.) folgt, da man nur das obere Vorzeichen zu beachten braucht,

$$(11.) \quad F = \int_{x_1}^{x_2} y dx = \frac{b}{a} \int_{x_1}^{x_2} dx \sqrt{a^2 - x^2}, *)$$

folglich wird nach Formel Nr. 123 der Tabelle und mit Rücksicht auf Gleichung (10a.)

*) In gleicher Weise wie bei den geometrischen Anwendungen der Differential-Rechnung sollen auch hier die Koordinaten eines Kurvenpunktes P immer x und y , die eines Kurvenpunktes P_1 immer x_1 und y_1 , allgemein die eines Kurvenpunktes P_n immer x_n und y_n heißen.

$$(12.) \quad F = \frac{b}{a} \left[\frac{x}{2} \sqrt{a^2 - x^2} + \frac{a^2}{2} \arcsin \left(\frac{x}{a} \right) \right]_{x_1}^{x_2}$$

$$= \left[\frac{xy}{2} + \frac{ab}{2} \arcsin \left(\frac{x}{a} \right) \right]_{x_1}^{x_2},$$

oder

$$(13.) \quad F = \frac{1}{2} (x_2 y_2 - x_1 y_1) + \frac{ab}{2} \left[\arcsin \left(\frac{x_2}{a} \right) - \arcsin \left(\frac{x_1}{a} \right) \right].$$

Es sei z. B.

$$a = 6, \quad b = 4, \quad x_1 = 1, \quad x_2 = 5,$$

also

$$y_1 = \frac{4}{6} \sqrt{36 - 1} = \frac{2}{3} \sqrt{35}, \quad y_2 = \frac{4}{6} \sqrt{36 - 25} = \frac{2}{3} \sqrt{11};$$

dann wird

$$F = \frac{1}{3} (5\sqrt{11} - \sqrt{35}) + 12 \left(\arcsin \left(\frac{5}{6} \right) - \arcsin \left(\frac{1}{6} \right) \right).$$

Nun ist

$$5\sqrt{11} = \sqrt{275} = 16,583\,123$$

$$\sqrt{35} = 5,916\,080$$

$$5\sqrt{11} - \sqrt{35} = 10,667\,043,$$

$$\frac{1}{3} (5\sqrt{11} - \sqrt{35}) = 3,555\,681$$

$$12 \arcsin \left(\frac{5}{6} \right) = 11,821\,327$$

$$\frac{1}{3} (5\sqrt{11} - \sqrt{35}) + 12 \arcsin \left(\frac{5}{6} \right) = 15,377\,008$$

$$12 \arcsin \left(\frac{1}{6} \right) = 2,009\,377$$

$$F = 13,367\,631.$$

Aufgabe 4a. Man soll die ganze Fläche der *Ellipse* mit den Halbachsen a und b berechnen (Fig. 17.)

Auflösung. Man erhält den Quadranten der Ellipse, wenn man in der vorhergehenden Aufgabe

$$x_1 = 0 \quad \text{und} \quad x_2 = a,$$

also

$$y_1 = b \quad \text{und} \quad y_2 = 0$$

setzt. Dies gibt

$$(14.) \quad F = \frac{ab}{2} \arcsin 1 = \frac{ab}{2} \cdot \frac{\pi}{2},$$

folglich wird der Flächeninhalt der ganzen Ellipse

$$(15.) \quad E = 4F = ab\pi.$$


Aufgabe 5. In einer *Hyperbel* mit der Gleichung

$$(16.) \quad b^2x^2 - a^2y^2 = a^2b^2,$$

oder

$$(16a.) \quad y = \pm \frac{b}{a} \sqrt{x^2 - a^2}$$

Fig. 18.



sind die Ordinaten Q_1P_1 und Q_2P_2 gezogen (Fig. 18); man soll den Flächeninhalt der Figur $Q_1Q_2P_2P_1$ berechnen.

Auflösung. Aus Gleichung (16a.) folgt, da man nur das obere Vorzeichen zu berücksichtigen braucht,

$$(17.) \quad F = \int_{x_1}^{x_2} y dx = \frac{b}{a} \int_{x_1}^{x_2} dx \sqrt{x^2 - a^2}.$$

Deshalb wird nach Formel Nr. 129a der Tabelle

$$(18.) \quad F = \frac{b}{a} \left[\frac{x}{2} \sqrt{x^2 - a^2} - \frac{a^2}{2} \ln \left(\frac{x + \sqrt{x^2 - a^2}}{a} \right) \right]_{x_1}^{x_2}$$

$$= \frac{b}{a} \left[\frac{x}{2} \sqrt{x^2 - a^2} - \frac{a^2}{2} \operatorname{ArCo} \left(\frac{x}{a} \right) \right]_{x_1}^{x_2},$$

oder mit Rücksicht auf Gleichung (16a.)

$$(19.) \quad F = \left[\frac{xy}{2} - \frac{ab}{2} \ln \left(\frac{x}{a} + \frac{y}{b} \right) \right]_{x_1}^{x_2} \\ = \frac{1}{2} (x_2 y_2 - x_1 y_1) - \frac{ab}{2} \ln \left(\frac{bx_2 + ay_2}{bx_1 + ay_1} \right).$$

Dabei ist $\ln \left(\frac{bx_2 + ay_2}{bx_1 + ay_1} \right)$ aus $\ln \left(\frac{x_2}{a} + \frac{y_2}{b} \right) - \ln \left(\frac{x_1}{a} + \frac{y_1}{b} \right)$ entstanden.

Für den besonderen Fall, wo x_1 gleich a und x_2 gleich x ist, wo also die gesuchte Fläche AQP im Scheitel der Hyperbel beginnt, wird

$$(20.) \quad F = \frac{xy}{2} - \frac{ab}{2} \ln \left(\frac{x}{a} + \frac{y}{b} \right).$$

Aufgabe 6. Die *gleichseitige Hyperbel* ist, wenn man die Asymptoten zu Koordinaten-Achsen macht, durch die Gleichung

$$(21.) \quad xy = 1, \text{ oder } y = \frac{1}{x}$$

gegeben; man soll den Flächeninhalt der Figur $Q_1 Q_2 P_2 P_1$ berechnen (Fig. 19).

Auflösung. Aus Gleichung (21.) folgt nach Formel Nr. 12 der Tabelle

$$F = \int_{x_1}^{x_2} y dx = \int_{x_1}^{x_2} \frac{dx}{x} = [\ln x]_{x_1}^{x_2},$$

also

$$(22.) \quad F = \ln x_2 - \ln x_1 = \ln \left(\frac{x_2}{x_1} \right).$$


Setzt man x_1 gleich 1 und x_2 gleich x , so erhält man

$$(23.) \quad F = \ln x,$$

so daß der Flächeninhalt der ebenen Figur $A_1 Q P A$, in welcher OA_1 gleich 1 sein möge, die geometrische Deutung für die Funktion $\ln x$ gibt.


Aufgabe 7. Die *verallgemeinerte Parabel* ist durch die Gleichung

Fig. 19.



(24.) $y^n = 2px^m$, oder $y = \sqrt[n]{2p} \cdot x^{\frac{m}{n}}$
 gegeben, wobei m und n positive ganze Zahlen sind; man soll den Flächeninhalt der ebenen Figur $Q_1Q_2P_2P_1$ berechnen (Fig. 20).

Auflösung. Aus Gleichung (24.) folgt nach Formel Nr. 9 der Tabelle



$$\begin{aligned}
 (25.) \quad F &= \int_{x_1}^{x_2} y dx = \sqrt[n]{2p} \int_{x_1}^{x_2} x^{\frac{m}{n}} dx \\
 &= \sqrt[n]{2p} \left[\frac{nx^{\frac{m}{n}+1}}{\frac{m}{n}+1} \right]_{x_1}^{x_2} \\
 &= \frac{n}{m+n} \left[x^{\frac{m}{n}+1} \sqrt[n]{2p} \right]_{x_1}^{x_2},
 \end{aligned}$$

oder nach Gleichung (24.)

$$(26.) \quad F = \frac{n}{m+n} [xy]_{x_1}^{x_2} = \frac{n}{m+n} (x_2 y_2 - x_1 y_1).$$

Für den besonderen Fall, wo x_1 gleich 0 und x_2 gleich x ist, wo also die Figur im Scheitel O beginnt, wird

$$(27.) \quad F = OQP = \frac{nxy}{m+n} = \frac{n}{m+n} OQPR.$$

Dies gibt den Satz: Die von der Parabel OP , der X -Achse und einer beliebigen Ordinate QP begrenzte Figur OQP verhält sich zu dem Rechtecke $OQPR$ mit den Seiten OQ gleich x und QP gleich y wie n zu $m+n$.

Aufgabe 8. Die verallgemeinerte Hyperbel (oder *polytropische Kurve*) ist durch die Gleichung

$$(28.) \quad x^m y^n = 2p, \quad \text{oder} \quad y = \sqrt[n]{2p} \cdot x^{-\frac{m}{n}}$$

gegeben, wobei m und n wieder positive ganze Zahlen sind; man soll den Flächeninhalt der ebenen Figur $Q_1Q_2P_2P_1$ (Fig. 21 und 22) berechnen.

Auflösung. Es darf hier vorausgesetzt werden, daß die positiven ganzen Zahlen m und n voneinander verschieden sind, weil der Fall, wo m gleich n , bereits durch Aufgabe 6 erledigt ist. Unter dieser Voraussetzung folgt aus Gleichung (28.) nach Formel Nr. 9 der Tabelle

$$(29.) \quad F = \int_{x_1}^{x_2} y dx = \sqrt[n]{2p} \int_{x_1}^{x_2} x^{-\frac{m}{n}} dx = \sqrt[n]{2p} \left[\frac{nx^{\frac{n-m}{n}}}{n-m} \right]_{x_1}^{x_2} \\ = \frac{n\sqrt[n]{2p}}{n-m} \left(x_2^{\frac{n-m}{n}} - x_1^{\frac{n-m}{n}} \right),$$

oder mit Rücksicht auf Gleichung (28.)

$$(30.) \quad F = \frac{n}{n-m} \left[x^{\frac{n-m}{n}} \sqrt[n]{2p} \right]_{x_1}^{x_2} = \frac{n}{n-m} [xy]_{x_1}^{x_2} \\ = \frac{n(x_2 y_2 - x_1 y_1)}{n-m}.$$

Fig. 21.





Fig. 22.



Bei dieser Aufgabe tritt ein bemerkenswerter Umstand ein, von dem später noch ausführlicher die Rede sein wird, wenn sich die Ordinate $Q_1 P_1$ der Y -Achse immer mehr nähert, wenn also

$$\lim x_1 = 0$$

wird. Die Y -Achse ist nämlich eine Asymptote der Kurve, so daß sich in diesem Grenzfalle der Flächenstreifen in der Richtung der Y -Achse bis ins Unendliche erstreckt. Damit ist aber noch nicht gesagt, daß dann auch der Flächeninhalt der Figur unendlich groß wird; es wird sich vielmehr ergeben, daß derselbe einen *endlichen* Wert erhält, wenn $n > m$ ist (Fig. 21). Dann wird nämlich in Gleichung (29.) der Exponent $\frac{n-m}{n}$ *positiv*, und deshalb

$$(31.) \quad \lim_{x_1=0} x_1^{\frac{n-m}{n}} = 0,$$

so daß Gleichung (29.) in

$$(32.) \quad F = \frac{n\sqrt[2]{2p}}{n-m} x_2^{\frac{n-m}{n}} = \frac{nx_2y_2}{n-m}$$

übergeht.

Ist dagegen $n < m$ (Fig. 22), so wird $\frac{n-m}{n}$ negativ, so daß man Gleichung (29.) besser auf die Form

$$(33.) \quad F = \frac{n\sqrt[2]{2p}}{m-n} \left(\frac{1}{x_1^{\frac{m-n}{n}}} - \frac{1}{x_2^{\frac{m-n}{n}}} \right)$$

bringen wird. Jetzt ist

$$(34.) \quad \lim_{x_1=0} x_1^{\frac{m-n}{n}} = 0,$$

also

$$(35.) \quad \lim_{x_1=0} F = \infty.$$

Eine ähnliche Betrachtung stellt sich ein, wenn man x_2 ins Unbegrenzte wachsen läßt. Dann erstreckt sich der Flächenstreifen in der Richtung der X -Achse bis ins Unendliche, und man erhält in dem ersten Falle, wo

$$n > m, \quad \frac{n-m}{n} > 0, \quad \lim_{x_2=\infty} x_2^{\frac{n-m}{n}} = \infty$$

ist, aus Gleichung (29.)

$$(36.) \quad \lim_{x_2=\infty} F = \infty.$$

In dem zweiten Falle dagegen, wo

$$n < m, \quad \frac{m-n}{n} > 0, \quad \lim_{x_2=\infty} \frac{1}{x_2^{\frac{m-n}{n}}} = 0$$

ist, findet man aus Gleichung (33.)

$$(37.) \quad \lim_{x_2=\infty} F = \frac{n\sqrt[2]{2p}}{m-n} \cdot \frac{1}{x_1^{\frac{m-n}{n}}} = \frac{nx_1y_1}{m-n}.$$

Bei der in Aufgabe 6 behandelten gewöhnlichen gleichseitigen Hyperbel wird der Flächeninhalt der Figur unendlich groß, wenn die Ordinate Q_1P_1 mit der Y -Achse zu-

sammenfällt, und ebenso auch, wenn die Ordinate Q_2P_2 ins Unendliche rückt, weil in Gleichung (22.)

$$\lim_{x_1=0} \ln x_1 = -\infty \quad \text{und} \quad \lim_{x_2=\infty} \ln x_2 = \infty.$$

Aufgabe 9. Die Kettenlinie ist durch die Gleichung


$$(38.) \quad y = \frac{a}{2} \left(e^{\frac{x}{a}} + e^{-\frac{x}{a}} \right) = a \mathfrak{C}o\left(\frac{x}{a}\right)$$

gegeben (D.-R., Seite 418); man soll den Flächeninhalt der Figur $Q_1Q_2P_2P_1$ (Fig. 23) berechnen.

Auflösung. Aus Gleichung (38.) folgt nach Formel Nr. 11 oder Nr. 19 der Tabelle

$$\begin{aligned} (39.) \quad F &= \int_{x_1}^{x_2} y dx \\ &= \frac{a}{2} \int_{x_1}^{x_2} \left(e^{\frac{x}{a}} + e^{-\frac{x}{a}} \right) dx = a \int_{x_1}^{x_2} \mathfrak{C}o\left(\frac{x}{a}\right) dx \\ &= \frac{a^2}{2} \left[e^{\frac{x}{a}} - e^{-\frac{x}{a}} \right]_{x_1}^{x_2} = a^2 \left[\mathfrak{S}in\left(\frac{x}{a}\right) \right]_{x_1}^{x_2}. \end{aligned}$$

Fig. 23.



Nun ergibt sich aber, wie auf Seite 418 der D.-R. gezeigt wurde, aus Gleichung (38.)

$$(40.) \quad \pm \sqrt{y^2 - a^2} = \frac{a}{2} \left(e^{\frac{x}{a}} - e^{-\frac{x}{a}} \right) = a \mathfrak{S}in\left(\frac{x}{a}\right),$$

wobei das obere oder das untere Vorzeichen gilt, je nachdem x positiv oder negativ ist. Sind also x_1 und x_2 beide positiv, so geht Gleichung (39.) über in

$$(41.) \quad F = a \left[\sqrt{y^2 - a^2} \right]_{x_1}^{x_2} = a (\sqrt{y_2^2 - a^2} - \sqrt{y_1^2 - a^2}).$$

Wäre x_1 negativ, so würde man erhalten


$$(42.) \quad F = a (\sqrt{y_2^2 - a^2} + \sqrt{y_1^2 - a^2}).$$

Wird x_1 gleich 0 und x_2 gleich x (Fig. 24), so ist der Flächeninhalt der Figur $OQPA$ gleich

$$(43.) \quad F = a \sqrt{y^2 - a^2}$$

und läßt sich auch sehr leicht als Rechteck darstellen. Beschreibt man nämlich um den Punkt A mit dem Halbmesser y einen Kreisbogen, welcher die X -Achse im Punkte B schneidet, so ist nach dem pythagoräischen Lehrsatz

Fig. 24.



$$(44.) \quad OB = \sqrt{y^2 - a^2},$$

also Rechteck

$$OBCA = a\sqrt{y^2 - a^2}.$$


Daraus erkennt man auch, wie man die Figur $Q_1Q_2P_2P_1$ (Fig. 23) in ein Rechteck verwandeln kann, bei dem wieder $OA = a$ die eine Seite, und $\sqrt{y_2^2 - a^2} - \sqrt{y_1^2 - a^2}$ die andere Seite ist.

Aufgabe 10. Die *Zykloide* ist durch die Gleichungen

$$(45.) \quad x = a(t - \sin t), \quad y = a(1 - \cos t)$$

gegeben (D.-R., Seite 419); man soll den Flächeninhalt der Figur berechnen, welche von einem ganzen Bogen OHA der Zykloide und von der X -Achse begrenzt wird (Fig. 25).

Fig. 25.



Auflösung. Sind x und y als Funktionen einer dritten Veränderlichen t gegeben, so wird es bei der Quadratur der Kurven (und ebenso bei den übrigen Anwendungen der Integral-Rechnung auf die Geometrie) im allgemeinen zweckmäßig sein, diese Größe t als neue Integrations-Veränderliche einzuführen. In der vorliegenden Aufgabe bildet man daher zunächst

$$(46.) \quad dx = a(1 - \cos t)dt,$$

also, da OA gleich dem Umfange $2a\pi$ des rollenden Kreises ist,

$$(47.) \quad F = \int_0^{2a\pi} y dx = a^2 \int_0^{(2a\pi)} (1 - \cos t)(1 - \cos t) dt.$$

Bei Einführung einer neuen Integrations-Veränderlichen muß man sorgfältig darauf achten, daß dabei auch andere Integrations-Grenzen einzuführen sind. Deshalb sind auch in Gleichung (47.) bei dem letzten Integral die Grenzen in Klammern eingeschlossen, um dadurch anzudeuten, daß sich dieselben noch auf die ursprüngliche Integrations-Veränderliche x beziehen, und daß man dafür die entsprechenden Werte von t nachträglich einsetzen soll. Nun ist

$$\begin{aligned} x &= 0 & \text{für } t &= 0, \\ x &= 2a\pi & \text{für } t &= 2\pi, \end{aligned}$$

folglich geht Gleichung (47.) über in

$$(48.) \quad F = a^2 \int_0^{2\pi} (1 - 2\cos t + \cos^2 t) dt.$$

Nach den Formeln Nr. 10, 13 und 99 der Tabelle ist

$$(49.) \quad \begin{cases} \int dt = t, & \int \cos t dt = \sin t, \\ \int \cos^2 t dt = \frac{1}{2} \sin t \cos t + \frac{1}{2} t, \end{cases}$$

so daß man erhält

$$\begin{aligned} (50.) \quad F &= a^2 \left[t - 2 \sin t + \frac{1}{2} \sin t \cos t + \frac{1}{2} t \right]_0^{2\pi} \\ &= \frac{a^2}{2} [3t - \sin t (4 - \cos t)]_0^{2\pi} = 3a^2\pi. \end{aligned}$$


Die Fläche eines Kreises mit dem Halbmesser a ist bekanntlich gleich $a^2\pi$, folglich ist nach Gleichung (50.) die von der Zykloide und der X -Achse begrenzte Fläche dreimal so groß wie die Fläche des erzeugenden Kreises (Fig. 25).

Aufgabe 11. Die *Astroide* sei durch die Gleichungen

$$(51.) \quad x = a \cos^3 t, \quad y = a \sin^3 t$$

gegeben (Fig. 26, D.-R., Seite 426); man soll die von ihr eingeschlossene Fläche berechnen.

Fig. 26.



Auflösung. Um zunächst den Flächeninhalt des Quadranten OAB zu berechnen, muß man in der allgemeinen Formel für x die Grenzen 0 und a einsetzen. Da nun

$$x = 0 \quad \text{für} \quad t = \frac{\pi}{2},$$

$$x = a \quad \text{„} \quad t = 0$$

wird, so sind $\frac{\pi}{2}$ und 0 die ent-

sprechenden Grenzen bei Einführung der Integrations-Veränderlichen t . Deshalb erhält man

$$(52.) \quad dx = -3a \cos^2 t \sin t \, dt,$$

$$(53.) \quad F = \int_0^a y \, dx = -3a^2 \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \sin^3 t \cdot \cos^2 t \sin t \, dt \\ = +3a^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 t \cos^2 t \, dt.$$

Zur Ermittlung des unbestimmten Integrals von $\sin^4 t \cos^2 t \, dt$ beachte man zunächst, daß

$$(54.) \quad \int \sin^4 t \cos^2 t \, dt = \int \sin^4 t \, dt - \int \sin^6 t \, dt$$

ist, und bilde nach Formel Nr. 100 und 104 der Tabelle die Gleichungen

$$(55.) \quad \int \sin^6 t \, dt = -\frac{1}{6} \sin^5 t \cos t + \frac{5}{6} \int \sin^4 t \, dt,$$

$$(56.) \quad \int \sin^4 t \, dt = -\frac{1}{4} \sin^3 t \cos t + \frac{3}{4} \int \sin^2 t \, dt,$$

$$(57.) \quad \int \sin^2 t \, dt = -\frac{1}{2} \sin t \cos t + \frac{1}{2} t.$$

Indem man Gleichung (55.) mit -1 , Gleichung (56.) mit $-\frac{5}{6} + 1 = +\frac{1}{6}$, Gleichung (57.) mit $+\frac{1}{6}$ multipliziert und dann alle drei Gleichungen addiert, findet man

$$(58.) \quad \int \sin^4 t dt - \int \sin^6 t dt = \frac{1}{6} \sin^5 t \cos t - \frac{1}{24} \sin^3 t \cos t \\ - \frac{1}{16} \sin t \cos t + \frac{1}{16} t;$$

folglich ist

$$(59.) \quad F = \frac{a^2}{16} [\cos t (8 \sin^5 t - 2 \sin^3 t - 3 \sin t) + 3t]_0^{\frac{\pi}{2}} \\ = \frac{a^2}{16} \cdot \frac{3\pi}{2} = \frac{3a^2\pi}{32}.$$

Der Flächeninhalt der ganzen Astroide ist daher

$$(60.) \quad 4F = \frac{3a^2\pi}{8}.$$

Dies gibt den Satz: *Der Flächeninhalt der Astroide verhält sich zu dem Flächeninhalte des umschriebenen Kreises wie 3 zu 8.*

Aufgabe 12. Die *Zissoide* des Diokles ist durch die Gleichungen

$$(61.) \quad x = 2a \sin^2 \varphi, \quad y = 2a \frac{\sin^3 \varphi}{\cos \varphi}$$

gegeben (D.-R., Seite 606); man soll den Flächeninhalt der Figur OQP (Fig. 27) berechnen.

Auflösung. Aus den Gleichungen (61.) folgt

$$x = 0 \quad \text{für} \quad \varphi = 0,$$


$$x = 2a \quad \text{„} \quad \varphi = \frac{\pi}{2},$$

$$(62.) \quad dx = 4a \sin \varphi \cos \varphi d\varphi,$$

oder

$$(63.) \quad F = \int_0^x y dx = 8a^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 \varphi d\varphi,$$

Fig. 27.



folglich wird nach Formel Nr. 105 der Tabelle, wenn man n gleich 2 setzt,

$$(64.) \quad F = 8a^2 \left[-\cos \varphi \left(\frac{1}{4} \sin^3 \varphi + \frac{3}{4 \cdot 2} \sin \varphi \right) + \frac{3 \cdot 1}{4 \cdot 2} \varphi \right]_0^\varphi \\ = a^2 [3\varphi - \cos \varphi (2 \sin^3 \varphi + 3 \sin \varphi)].$$

Da die Gerade AB eine Asymptote der Kurve ist, so erstreckt sich der Flächenstreifen bis ins Unendliche, wenn die Ordinate QP der Asymptote immer näher rückt und schließlich mit ihr zusammenfällt, wenn also

$$(65.) \quad \lim x = 2a, \quad \text{oder} \quad \lim \varphi = \frac{\pi}{2}$$

wird. Der Flächeninhalt der Figur bleibt aber endlich, da man aus Gleichung (64.)

$$(66.) \quad \lim_{\varphi = \frac{\pi}{2}} F = \frac{3a^2\pi}{2}$$

erhält. Die Kurve liegt zur X -Achse symmetrisch; deshalb wird der Flächeninhalt der Figur, welche von der ganzen Zissoide und der Asymptote begrenzt ist, gleich

$$3a^2\pi.$$

Aufgabe 13. Die Gleichung

$$(67.) \quad y = \frac{1}{12}(x^3 - 9x^2 + 23x - 15)$$

ist gegeben; man soll $\int_a^b y dx$ berechnen.

Auflösung: Nach Formel Nr. 9 der Tabelle wird

$$(68.) \quad F = \int_a^b y dx = \frac{1}{12} \int_a^b (x^3 - 9x^2 + 23x - 15) dx \\ = \frac{1}{12} \left[\frac{x^4}{4} - 3x^3 + 23\frac{x^2}{2} - 15x \right]_a^b \\ = \frac{1}{48} (b^4 - 12b^3 + 46b^2 - 60b - a^4 + 12a^3 - 46a^2 + 60a).$$

Will man sich über die Bedeutung dieses Resultates Rechenschaft geben, so muß man beachten, daß die der Gleichung (67.), oder der Gleichung

$$(67a.) \quad y = \frac{1}{12}(x-1)(x-3)(x-5)$$

entsprechende Kurve die X-Achse in den Punkten A, B, C mit den Abszissen

$$OA = 1, \quad OB = 3, \\ OC = 5$$

schneidet. (Vergl. Fig. 28.)

Setzt man daher z. B.

$$a = -2, \quad b = +1,$$

so erhält man

$$(69.) \quad \begin{aligned} DAD &= \int_{-2}^{+1} y dx \\ &= \frac{1}{48} (-25 - 416) \\ &= -\frac{147}{16}. \end{aligned}$$

Der Ausdruck ist *negativ*, weil die Figur D_1AD *unterhalb* der X-Achse liegt.

Ferner wird der Flächeninhalt der Figur

$$(70.) \quad ABH = \int_{+1}^{+3} y dx = \frac{1}{48} (-9 + 25) = \frac{1}{3},$$


und zwar ist dieser Ausdruck *positiv*, weil die Figur ABH *oberhalb* der X-Achse liegt. Indem man a gleich 3 und b gleich 5 setzt, findet man den Flächeninhalt der Figur

$$(71.) \quad BCT = \int_3^5 y dx = \frac{1}{48} (-25 + 9) = -\frac{1}{3},$$

und zwar ist dieser Ausdruck wieder *negativ*, weil die Figur *unterhalb* der X-Achse liegt. Endlich ist der Flächeninhalt der Figur

$$(72.) \quad CE_1E = \int_5^7 y dx = \frac{1}{48} (119 + 25) = +3.$$

Fig. 28.



Dieser Ausdruck ist *positiv*, weil die Figur *oberhalb* der X -Achse liegt. Demnach ist

$$(73.) \int_{-2}^{+7} y dx = \frac{1}{48} (119 - 416) = -\frac{99}{16} = -\frac{147}{16} + \frac{1}{3} - \frac{1}{3} + 3$$

und kann geometrisch gedeutet werden durch die Summe der Figuren

D_1AD , ABH , BCT und CE_1E ,

wobei aber die erste und dritte mit *negativem*, die zweite und vierte mit *positivem* Vorzeichen zu nehmen sind.

Dies gibt in Übereinstimmung mit der auf Seite 18 ausgeführten Untersuchung den Satz: Wenn man den Flächeninhalt einer ebenen Figur zwischen einer Kurve $y = f(x)$, der Abszissen-Achse und zwei beliebigen Ordinaten durch Integration berechnet, so sind die Flächenstücke über der Abszissen-Achse mit *positivem*, und die Flächenstücke unter der Abszissen-Achse mit *negativem* Vorzeichen berücksichtigt.


§ 20.

Quadratur der Kurven bei Anwendung schiefwinkliger Koordinaten.

(Vergl. die Formel-Tabelle Nr. 132.)

Ist die Gleichung einer Kurve für *schiefwinklige* Koordinaten gegeben, und bezeichnet man den Winkel, wel-

Fig. 29.



chen die positiven Richtungen der Koordinaten-Achsen miteinander bilden, mit γ , so kann man auch hier durch Parallele zur Y -Achse das Flächenstück in n Streifen zerlegen und die auf Seite 8 und 9 ausgeführten Schlüsse in wenig ver-

änderter Weise wiederholen. Dabei wird der Flächeninhalt eines solchen Streifens QQ_1P_1P (Fig. 29), wenn man ihn unter Vernachlässigung der unendlich kleinen Größen höherer Ordnung als Parallelogramm betrachtet,

$$(1.) \quad QQ_1P_1P = ydx \cdot \sin\gamma,$$

also

$$(2.) \quad A_1B_1BA = \sin\gamma \int_a^b ydx.$$


Übungs-Aufgaben.

Aufgabe 1. Die Gleichung

$$(3.) \quad y^2 = 2px, \quad \text{oder} \quad y = \sqrt{2p} \cdot x^{\frac{1}{2}}$$

stellt auch für schiefwinklige Koordinaten eine *Parabel* dar, wobei die *Y*-Achse eine beliebige Tangente ist, und die *X*-Achse durch den Berührungspunkt parallel zur Achse der Parabel läuft (Fig. 30); man soll den Flächeninhalt der Figur *OQPR* berechnen.

Fig. 30.



Auflösung. Hier ist nach Gleichung (2.)

$$(4.) \quad F = \sin\gamma \cdot \sqrt{2p} \int_0^x x^{\frac{1}{2}} dx = \sin\gamma \cdot \sqrt{2p} \left[\frac{2x^{\frac{3}{2}}}{3} \right]_0^x = \frac{2xy}{3} \sin\gamma.$$


Der Flächeninhalt des Parallelogramms *OQPR* ist gleich $xy \sin\gamma$, folglich bleibt der auf Seite 111 angeführte Satz auch in diesem Falle noch richtig.

Fig. 31.

Aufgabe 2. Macht man in der Ellipse zwei konjugierte Durchmesser, deren Länge $2r$ und $2s$ sein möge, zu Koordinaten-Achsen, so hat die Ellipse (Fig. 31) die Gleichung

$$(5.) \quad \frac{x^2}{r^2} + \frac{y^2}{s^2} = 1,$$

oder



$$y = \pm \frac{s}{r} \sqrt{r^2 - x^2};$$

man soll den Flächeninhalt der Ellipse berechnen.

Auflösung. Hier ist nach Gleichung (2.) mit Rücksicht auf Formel Nr. 123 der Tabelle

$$\begin{aligned} F &= 4 \sin \gamma \int_0^r y dx = \frac{4s \cdot \sin \gamma}{r} \int_0^r dx \sqrt{r^2 - x^2} \\ &= \frac{4s \cdot \sin \gamma}{r} \left[\frac{x}{2} \sqrt{r^2 - x^2} + \frac{r^2}{2} \arcsin \left(\frac{x}{r} \right) \right]_0^r, \end{aligned}$$

oder

$$(6.) \quad F = rs\pi \sin \gamma.$$

Da der Flächeninhalt der Ellipse mit den Halbachsen a und b , wie schon in Aufgabe 4a des vorhergehenden Paragraphen gezeigt wurde, gleich $ab\pi$ ist, so folgt hieraus die wichtige Formel

$$(7.) \quad rs \cdot \sin \gamma = ab.$$

Aufgabe 3. Die Gleichung einer Hyperbel ist, wenn man die Asymptoten zu Koordinaten-Achsen macht,

$$(8.) \quad 4xy = e^2,$$

oder

$$y = \frac{e^2}{4} \cdot \frac{1}{x};$$

man soll den Flächeninhalt der ebenen Figur $Q_1 Q_2 P_2 P_1$ (Fig. 32) berechnen.




Fig. 32.

Auflösung. Aus Gleichung (2.) folgt in diesem Falle mit Rücksicht auf Formel Nr. 12 der Tabelle

$$(9.) \quad F = \sin \gamma \int_{x_1}^{x_2} y dx = \frac{e^2 \sin \gamma}{4} \int_{x_1}^{x_2} \frac{dx}{x} = \frac{e^2 \sin \gamma}{4} \ln \left(\frac{x_2}{x_1} \right).$$

§ 21.

Quadratur von Figuren, welche oben und unten durch eine Kurve begrenzt sind.

(Vergl. die Formel-Tabelle Nr. 133.)

Eine Figur sei oben begrenzt durch die Kurve (Fig. 33)

(1.) $y' = f(x),$


unten durch die Kurve

(2.) $y'' = g(x)$

links und rechts durch die Ordinaten $A''A'$ und $B''B'$ mit den Gleichungen

(3.) $x = a$ und $x = b.$

Man kann dann den Flächeninhalt der Figur $A''B''B'A'$ berechnen, indem man zuerst den Flächeninhalt der Figur



(4.) $ABB'A' = \int_a^b y' dx$

berechnet und davon den Flächeninhalt der Figur

(5.) $ABB''A'' = \int_a^b y'' dx$

abzieht. Dadurch erhält man

(6.) $F = A''B''B'A' = \int_a^b y' dx - \int_a^b y'' dx = \int_a^b (y' - y'') dx.$

Dasselbe Resultat findet man auch, indem man durch zwei benachbarte Punkte Q und Q_1 der X -Achse Parallele zur Y -Achse legt, welche die beiden Kurven bezw. in den Punkten P', P_1 und P'', P''_1 treffen. Den Streifen $P''P''_1P'_1P'$ darf man unter Vernachlässigung von unendlich kleinen Größen höherer Ordnung als ein Rechteck mit den Seiten

$$P''P' = y' - y'' \quad \text{und} \quad QQ_1 = dx$$

betrachten, wenn QQ_1 verschwindend klein wird. Dadurch erhält man für den Flächeninhalt des Streifens

$$P''P''_1P'_1P' = (y' - y'')dx,$$


so daß die Summe aller dieser Streifen, nämlich

$$F = \int_a^b (y' - y'')dx,$$

den Flächeninhalt der ganzen Figur $A''B''B'A'$ gibt.

Dabei ist zunächst stillschweigend die Voraussetzung gemacht worden, daß die Kurvenbögen $A'B'$ und $A''B''$

Fig. 34.



beide über der X -Achse liegen. Das Resultat bleibt aber auch dann noch richtig, wenn diese Voraussetzung nicht erfüllt ist. Liegt z. B. der eine Bogen $A''B''$ unter der X -Achse (Fig. 34), so hat, wie schon früher hervorgehoben wurde, $\int_a^b y''dx$ einen negativen Wert,

so daß

$$\int_a^b y'dx - \int_a^b y''dx = \int_a^b (y' - y'')dx$$

die Summe der beiden Flächenstücke $ABB'A'$ und $A''B''BA$ gibt.

In ähnlicher Weise kann man zeigen, daß Gleichung (6.) noch richtig bleibt, wenn beide Kurvenbögen $A'B'$ und $A''B''$ unter der X -Achse liegen, und schließlich auch, wenn die X -Achse von den Begrenzungskurven geschnitten wird. Den letzten Fall kann man dadurch auf die vorhergehenden Fälle zurückführen, daß man die Figur in mehrere Teile zerlegt, indem man durch die Schnittpunkte der beiden Kurven mit der X -Achse Parallele zu der Y -Achse

zieht. Für jeden einzelnen Teil gelten dann die früheren Voraussetzungen.


Übungs-Aufgaben.

Aufgabe 1. Von einer Parabel mit der Gleichung

$$(7.) \quad y^2 = 2px, \text{ oder } y = \pm \sqrt{2p} \cdot x^{\frac{1}{2}}$$

ist durch die Sehne OP_1 (Fig. 35) das Segment über OP_1 abgeschnitten; man soll den Flächeninhalt dieses Segmentes berechnen.

Fig. 35.



Auflösung. Die Gleichungen der beiden begrenzenden Kurven sind in diesem Falle

$$(8.) \quad y' = \sqrt{2p} \cdot x^{\frac{1}{2}} \text{ und } y'' = \frac{y_1}{x_1} x,$$

folglich erhält man nach Gleichung (6.)

$$(9.) \quad F = \int_0^{x_1} (y' - y'') dx = \int_0^{x_1} \left(\sqrt{2p} \cdot x^{\frac{1}{2}} - \frac{y_1}{x_1} x \right) dx$$

$$= \left[\sqrt{2p} \cdot \frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} - \frac{y_1}{x_1} \frac{x^2}{2} \right]_0^{x_1},$$

oder

$$(10.) \quad F = \frac{2}{3} x_1 y_1 - \frac{1}{2} x_1 y_1 = \frac{x_1 y_1}{6}.$$

Das Segment über OP_1 ist also dreimal kleiner als das zugehörige Dreieck OQ_1P_1 .

Dasselbe Resultat ergibt sich, wenn man von der Fläche OQ_1P_1 , deren Inhalt nach Aufgabe 2 in § 19 gleich $\frac{2}{3} x_1 y_1$ ist, den Flächeninhalt des Dreiecks OQ_1P_1 , nämlich $\frac{1}{2} x_1 y_1$, abzieht.

Aufgabe 2. Von der Parabel mit der Gleichung

$$(11.) \quad y^2 = 2px, \text{ oder } y' = \pm \sqrt{2p} \cdot x^{\frac{1}{2}}$$

ist durch eine Gerade P'_1P_2 mit der Gleichung

Es sei z. B.

$$x_1 = 4, \quad x_2 = 16, \quad 2p = 9,$$

also

$$y_1 = 6, \quad y_2 = 12$$

dann wird

$$(17.) \quad F = \frac{1}{6}(24 + 192) + \frac{1}{2}(48 + 96) = 108.$$

Aufgabe 3. Die Gerade

$$(18.) \quad y' = mx + \mu$$

schneide von der Ellipse

$$(19.) \quad y' = \frac{b}{a} \sqrt{a^2 - x^2}$$

ein Segment P_1P_2B (Fig. 37)

ab; man soll den Flächeninhalt des Segmentes berechnen, wenn die Koordinaten der Punkte P_1 und P_2 gegeben sind.




Fig. 37.

Auflösung. Nach Gleichung (6.) wird in diesem Falle

$$\begin{aligned} (20.) \quad F &= \int_{x_1}^{x_2} (y' - y'') dy = \int_{x_1}^{x_2} \left(\frac{b}{a} \sqrt{a^2 - x^2} - mx - \mu \right) dx \\ &= \left[\frac{b}{a} \left\{ \frac{x}{2} \sqrt{a^2 - x^2} + \frac{a^2}{2} \arcsin \left(\frac{x}{a} \right) \right\} - \frac{mx^2}{2} - \mu x \right]_{x_1}^{x_2} \\ &= \frac{1}{2} \left[xy - mx^2 - 2\mu x + ab \arcsin \left(\frac{x}{a} \right) \right]_{x_1}^{x_2} \\ &= \frac{1}{2} \left[(x_2 y_2 - x_1 y_1) - m(x_2^2 - x_1^2) - 2\mu(x_2 - x_1) \right. \\ &\quad \left. + ab \arcsin \left(\frac{x_2}{a} \right) - ab \arcsin \left(\frac{x_1}{a} \right) \right]. \end{aligned}$$

Nun ist aber bekanntlich

$$(21.) \quad m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}, \quad \mu = \frac{x_2 y_1 - x_1 y_2}{x_2 - x_1},$$

folglich wird

$$\begin{aligned} (22.) \quad m(x_2^2 - x_1^2) + 2\mu(x_2 - x_1) &= (y_2 - y_1)(x_2 + x_1) + 2(x_2 y_1 - x_1 y_2) \\ &= (x_2 y_2 - x_1 y_1) + (x_2 y_1 - x_1 y_2). \end{aligned}$$

Dies gibt

$$(23.) \quad F = \frac{1}{2}(x_1 y_2 - x_2 y_1) + \frac{ab}{2} \left[\arcsin\left(\frac{x_2}{a}\right) - \arcsin\left(\frac{x_1}{a}\right) \right].$$

Es sei z. B.

$$(24.) \quad a = 6, \quad b = 4, \quad x_1 = -1, \quad x_2 = +5,$$

also

$$(25.) \quad y_1 = \frac{2}{3} \sqrt{35}, \quad y_2 = \frac{2}{3} \sqrt{11},$$

dann geht Gleichung (23.) über in

$$(26.) \quad F = 12 \left[\arcsin\left(\frac{5}{6}\right) + \arcsin\left(\frac{1}{6}\right) \right] - \frac{1}{3} (\sqrt{11} + 5\sqrt{35}).$$

Dabei ist

$$12 \arcsin\left(\frac{5}{6}\right) = 11,821\,327, \quad \sqrt{11} = 3,327\,708,$$

$$12 \arcsin\left(\frac{1}{6}\right) = 2,009\,377, \quad 5\sqrt{35} = 29,580\,399,$$

also

$$(27.) \quad F = 13,830\,704 - \frac{1}{3} \cdot 32,908\,107 = 2,861\,335.$$

Verbindet man den Nullpunkt O mit den Punkten P_1 und P_2 (Fig. 37), so erhält man ein Dreieck OP_2P_1 mit dem Flächeninhalte $\frac{1}{2}(x_2 y_1 - x_1 y_2)$. Wenn man daher dieses Dreieck zu dem Segmente über der Sehne P_1P_2 hinzufügt, so ergibt sich nach Gleichung (23.) für den Sektor P_1OP_2 der Flächeninhalt

$$(28.) \quad \text{Sektor} = \frac{ab}{2} \left[\arcsin\left(\frac{x_2}{a}\right) - \arcsin\left(\frac{x_1}{a}\right) \right].$$

Aufgabe 4. Eine *Ellipse* sei durch die Gleichung

$$(29.) \quad a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + a_{33} = 0$$

gegeben; man soll den Flächeninhalt derselben berechnen.

Auflösung. Der Anfangspunkt der Koordinaten liegt im Mittelpunkte der Kurve, aber die Koordinaten-Achsen fallen nicht mit den Achsen der Ellipse zusammen (Fig. 38).

Damit die Gleichung eine reelle Ellipse darstellt, müssen die Ungleichungen

$$(30.) \quad a_{11}a_{22} - a_{12}^2 > 0, \quad a_{22}a_{33} < 0$$

befriedigt werden. Aus Gleichung (29.) folgt dann

$$a_{22}y' = -a_{12}x + \sqrt{(a_{12}^2 - a_{11}a_{22})x^2 - a_{22}a_{33}},$$


$$a_{22}y'' = -a_{12}x - \sqrt{(a_{12}^2 - a_{11}a_{22})x^2 - a_{22}a_{33}},$$

also

$$(31.) \quad y' - y'' = \frac{2}{a_{22}} \sqrt{(a_{12}^2 - a_{11}a_{22})x^2 - a_{22}a_{33}}.$$

Nach den in den Ungleichungen (30.) ausgesprochenen Voraussetzungen kann man zwei reelle Größen c und k durch die Gleichungen

Fig. 38.



$$(32.) \quad c = \sqrt{a_{11}a_{22} - a_{12}^2}, \quad k = \sqrt{-\frac{a_{22}a_{33}}{c^2}}$$

erklären, so daß Gleichung (31.) übergeht in

$$(33.) \quad y' - y'' = \frac{2}{a_{22}} \sqrt{-c^2x^2 + k^2c^2} = \frac{2c}{a_{22}} \sqrt{k^2 - x^2};$$

folglich wird

$$(34.) \quad F = \int_{x_1}^{x_2} (y' - y'') dx = \frac{2c}{a_{22}} \int_{x_1}^{x_2} dx \sqrt{k^2 - x^2}.$$

Zur Bestimmung der Integrationsgrenzen beachte man, daß $(y' - y'')dx$ einer der Streifen ist, in welche man sich die ganze Fläche zerlegt denken muß. Die durch die Integration ausgeführte Summation aller dieser Streifen beginnt in demjenigen Punkte P_1 und endet in demjenigen Punkte P_2 , in welchem der Punkt P' mit dem Punkte P'' zusammenfällt, so daß die Tangenten in den Punkten P_1 und

P_2 zur Y -Achse parallel sind. Die Werte von x_1 und x_2 findet man daher, indem man

$$y' - y'' = \frac{2c}{a_{22}} \sqrt{k^2 - x^2}$$

gleich 0 setzt. Daraus ergibt sich

$$(35.) \quad x_1 = -k \quad \text{und} \quad x_2 = +k,$$

$$(36.) \quad F = \frac{2c}{a_{22}} \int_{-k}^{+k} dx \sqrt{k^2 - x^2},$$

also nach Formel Nr. 123 der Tabelle

$$(37.) \quad F = \frac{2c}{a_{22}} \left[\frac{x}{2} \sqrt{k^2 - x^2} + \frac{k^2}{2} \arcsin\left(\frac{x}{k}\right) \right]_{-k}^{+k} \\ = \frac{k^2 c}{a_{22}} [\arcsin 1 - \arcsin(-1)] = \frac{k^2 c \pi}{a_{22}},$$

oder mit Rücksicht auf die Gleichungen (32.)

$$(38.) \quad F = - \frac{a_{22} a_{33} \pi}{a_{22} c} = - \frac{a_{33} \pi}{\sqrt{a_{11} a_{22} - a_{12}^2}}.$$

Dasselbe Resultat findet man, wenn man die Halbachsen a und b bestimmt und in die Formel

$$F = ab\pi$$

einsetzt, denn es ist bekanntlich

$$(39.) \quad a = \sqrt{\frac{-2a_{33}}{a_{11} + a_{22} \pm \sqrt{(a_{11} - a_{22})^2 + 4a_{12}^2}}}, \\ b = \sqrt{\frac{-2a_{33}}{a_{11} + a_{22} \mp \sqrt{(a_{11} - a_{22})^2 + 4a_{12}^2}}},$$

also

$$(40.) \quad ab = \frac{-2a_{33}}{\sqrt{(a_{11} + a_{22})^2 - (a_{11} - a_{22})^2 - 4a_{12}^2}} \\ = \frac{-a_{33}}{\sqrt{a_{11} a_{22} - a_{12}^2}}.$$

Aufgabe 5. Man soll den Flächeninhalt der Figur berechnen, die von den beiden Parabeln

$$(41.) \quad y^2 = 2px$$


und

$$(42.) \quad x^2 = 2qy$$

begrenzt wird. (Vergl. Fig. 39.)

Auflösung. Hier ist, da sich die beiden Parabeln im Nullpunkt O und zum zweiten Male in einem Punkte P_1 schneiden,

Fig. 39.



$$(43.) \quad y' = \sqrt{2px}, \quad y'' = \frac{x^2}{2q},$$

also

$$(44.) \quad F = \int_0^{x_1} (y' - y'') dx = \sqrt{2p} \int_0^{x_1} x^{\frac{1}{2}} dx - \frac{1}{2q} \int_0^{x_1} x^2 dx.$$

Dabei findet man die Koordinaten des Punktes P_1 aus der Gleichung

$$x_1 = \frac{y_1^2}{2p} = \frac{x_1^4}{8pq^2}.$$

Dies gibt

$$(45.) \quad x_1 = 2\sqrt[3]{pq^2}, \quad y_1 = 2\sqrt[3]{p^2q};$$

folglich wird


$$(46.) \quad F = \left[\sqrt{2p} \cdot \frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{2q} \frac{x^3}{3} \right]_0^{x_1} \\ = \frac{2}{3} \sqrt{2p} \cdot \sqrt[3]{8pq^2} - \frac{1}{6q} 8pq^2 = \frac{8pq}{3} - \frac{4pq}{3} = \frac{4pq}{3}.$$

Wenn die Kurvenbögen, welche die Figur oben und unten begrenzen, Teile derselben Kurve sind, wie es in Aufgabe 4 der Fall war, so kann man die Rechnung durch Einführung eines „variablen Parameters“ t wesentlich vereinfachen. Läßt sich nämlich die begrenzende Kurve durch die Gleichungen

$$(47.) \quad x = \varphi(t), \quad y = \psi(t)$$

darstellen, wobei $\varphi(t)$ und $\psi(t)$ für die betrachteten Kurvenpunkte *eindeutige* Funktionen von t sind, so kann man den

Fig. 40.



Parameter t zur Integrationsveränderlichen machen. Um z. B. den Flächeninhalt der Figur zu berechnen, welche durch den Bogen $A'BA''$ der Kurve und die Ordinate $A_1A''A'$ begrenzt wird (vergl. Fig. 40), erhält man zunächst nach den bisherigen Regeln

$$(48.) \quad F = \int_a^b (y' - y'') dx.$$

Jetzt durchlaufe der Kurvenpunkt P die Kurve von A' bis B , wenn t alle Werte von t_1 bis t' annimmt, und er durchlaufe die Kurve von B bis A'' , wenn t alle Werte von t' bis t_2 annimmt, wobei entweder $t_1 < t' < t_2$, oder $t_1 > t' > t_2$ sein möge. Dann wird

$$(49.) \quad \int_a^b y' dx = \int_{t_1}^{t'} \psi(t) \cdot \varphi'(t) dt,$$

$$(50.) \quad -\int_a^b y'' dx = + \int_b^a y'' dx = \int_{t'}^{t_2} \psi(t) \cdot \varphi'(t) dt,$$

folglich ist

$$(51.) \quad F = \int_{t_1}^{t'} \psi(t) \cdot \varphi'(t) dt + \int_{t'}^{t_2} \psi(t) \cdot \varphi'(t) dt = \int_{t_1}^{t_2} \psi(t) \cdot \varphi'(t) dt.$$

Ein besonderer Vorteil dieser Methode liegt darin, daß man die Koordinaten des Punktes B und den zugehörigen Wert des Parameters t nicht zu ermitteln braucht. Außerdem kann man dieses Verfahren auch auf den Fall verallgemeinern, wo die begrenzende Kurve *mehrere* Ausbiegungen hat.

Will man z. B. auf diesem Wege die Aufgabe 4 lösen, so benützt man den Umstand, daß sich x und y durch die Formeln

$$(52.) \quad x = k \sin t, \quad a_{22}y = k(c \cos t - a_{12} \sin t)$$

als eindeutige Funktionen eines Parameters t darstellen lassen. Dabei ist wieder

$$(53.) \quad c^2 = a_{11}a_{22} - a_{12}^2, \quad c^2k^2 = -a_{22}a_{33}.$$

Die Richtigkeit dieser Formeln ergibt sich durch Elimination des Parameters t aus den Gleichungen (52.). Man erhält dann nämlich

$$\sin t = \frac{x}{k}, \quad \cos t = \frac{a_{12}x + a_{22}y}{kc},$$

also

$$\frac{x^2}{k^2} + \frac{a_{12}^2x^2 + 2a_{12}a_{22}xy + a_{22}^2y^2}{k^2c^2} = 1,$$

$$(c^2 + a_{12}^2)x^2 + 2a_{12}a_{22}xy + a_{22}^2y^2 + a_{22}a_{33} = 0,$$

oder

$$(54.) \quad a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + a_{33} = 0.$$

Die Gleichungen (52.) stellen also dieselbe Ellipse dar wie die Gleichung (29.). (Vergl. Fig. 38.)

Für $t = -\frac{\pi}{2}$ erhält man $x = -k$, $y = +\frac{a_{12}k}{a_{22}}$; das sind die Koordinaten des Punktes P_1 . Für $t = 0$ erhält man $x = 0$, $y = +\frac{kc}{a_{22}}$; das sind, wenn man voraussetzt, daß a_{22} positiv ist, die Koordinaten des Schnittpunktes der Ellipse mit dem oberen Teile der Y -Achse. Für $t = +\frac{\pi}{2}$ erhält man $x = +k$, $y = -\frac{a_{12}k}{a_{22}}$, also die Koordinaten des Punktes P_2 . Für $t = \pi$ erhält man $x = 0$, $y = -\frac{kc}{a_{22}}$, also die Koordinaten des Schnittpunktes mit dem unteren Teile der Y -Achse, und für $t = \frac{3\pi}{2}$ erhält man wieder die Koordinaten des Punktes P_1 .

Durchläuft also t alle Werte von $-\frac{\pi}{2}$ bis $+\frac{\pi}{2}$, so durchläuft P den oberen Teil der Ellipse von P_1 bis P_2 ; und durchläuft t alle Werte von $+\frac{\pi}{2}$ bis $+\frac{3\pi}{2}$, so durchläuft P den unteren Teil der Ellipse P_2 bis P_1 . Daraus findet man für den Flächeninhalt der Ellipse

$$\begin{aligned}
 (55.) \quad F &= \int_{x_1}^{x_2} (y' - y'') dx = \frac{k^2}{a_{22}} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{+\frac{3\pi}{2}} (c \cos t - a_{12} \sin t) \cos t dt \\
 &= \frac{k^2}{a_{22}} \left[c \int_{-\frac{\pi}{2}}^{+\frac{3\pi}{2}} \cos^2 t dt - a_{12} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{+\frac{3\pi}{2}} \sin t \cos t dt \right].
 \end{aligned}$$

Dies gibt nach den Formeln Nr. 99 und 53 der Tabelle in Übereinstimmung mit Gleichung (38.)

$$\begin{aligned}
 F &= \frac{k^2}{a_{22}} \left[\frac{c}{2} \left(\cos t \sin t + t \right) - \frac{a_{12}}{2} \sin^2 t \right]_{-\frac{\pi}{2}}^{+\frac{3\pi}{2}} \\
 &= \frac{k^2}{a_{22}} \left[\frac{c}{2} \left(\frac{3\pi}{2} + \frac{\pi}{2} \right) - \frac{a_{12}}{2} (+1 - 1) \right] = \frac{k^2 c \pi}{a_{22}},
 \end{aligned}$$


oder mit Rücksicht auf die Gleichungen (53.)

$$(56.) \quad F = \frac{k^2 c^2 \pi}{a_{22} c} = \frac{a_{22} a_{33} \pi}{a_{22} c} = \frac{a_{33} \pi}{\sqrt{a_{11} a_{22} - a_{12}^2}}.$$

Aufgabe 6. Man soll den Flächeninhalt der *Kardioide*

$$(57.) \quad x = a[2 \cos t - \cos(2t)], \quad y = a[2 \sin t - \sin(2t)]$$

Fig. 41.



berechnen. (Vergl. Fig. 41.)

Auflösung. Wenn t alle Werte von 0 bis π annimmt, erhält man die obere Hälfte der Kurve, aber in der Richtung von der Spitze A anfangend; und wenn t alle Werte von π bis 2π durchläuft, erhält man die untere Hälfte mit dem Endpunkte A .

Da die X -Achse eine Symmetrie-Achse ist, genügt es, für die obere Hälfte der Figur den Flächeninhalt auszurechnen und das gefundene Resultat mit 2 zu multiplizieren. Bezeichnet man dabei den größten Wert, den x annehmen kann, mit x' und den zugehörigen Wert von t mit t' , so wird

$$F = 2 \left(\int_{-3a}^{x'} y' dx - \int_{+a}^{x'} y'' dx \right) = 2 \left(\int_{-3a}^{x'} y' dx + \int_{x'}^{+a} y'' dx \right).$$

Dabei ergibt sich aus den folgenden Schlüssen, daß die Berechnung von x' und t' nicht erforderlich ist. Es wird nämlich in diesem Falle, wenn man y' , y'' und dx durch den Parameter t darstellt,

$$(58.) \quad F = 4a^2 \int_{\pi}^{t'} [2\sin t - \sin(2t)] \cdot [-\sin t + \sin(2t)] dt \\ + 4a^2 \int_{t'}^0 [2\sin t - \sin(2t)] \cdot [-\sin t + \sin(2t)] dt,$$

oder

$$(59.) \quad F = 4a^2 \int_{\pi}^0 [2\sin t - \sin(2t)] \cdot [-\sin t + \sin(2t)] dt.$$

Dies gibt

$$(60.) \quad F = 4a^2 \left[2 \int_0^{\pi} \sin^2 t dt - 6 \int_0^{\pi} \sin^2 t \cos t dt + \frac{1}{2} \int_{(0)}^{(\pi)} \sin^2(2t) d(2t) \right].$$

folglich wird nach den Formeln Nr. 100 und 53 der Tabelle

$$(61.) \quad F = 4a^2 \left[-\sin t \cos t + t - 2\sin^3 t - \frac{1}{4} \sin(2t) \cos(2t) + \frac{t}{2} \right]_0^{\pi} \\ = 6a^2 \pi.$$

Man hätte hier sogleich die *ganze* Fläche der Figur erhalten, wenn man für t die Integrationsgrenzen 0 und 2π genommen hätte. Dabei wäre der Fall in Betracht gekommen, wo die Kurve *zwei* Ausbiegungen hat.

§ 22.


Quadratur der Kurven bei Anwendung von Polarkoordinaten.

(Vergl. die Formel-Tabelle Nr. 134.)

Bei Anwendung von Polarkoordinaten mögen die Koordinaten eines Punktes P immer mit r und φ , die eines

Punktes P_1 mit r_1 und φ_1 , allgemein die eines Punktes P_n mit r_n und φ_n bezeichnet werden. Nennt man den Flächen-

Fig. 42.



inhalt einer Figur AOP , welche durch zwei beliebige Radii vektoren OA , OP und durch den Kurvenbogen AP begrenzt wird (Fig. 42), S (Sektor), so ist S eine Funktion von φ . Den kleinen Zuwachs

$$(1.) \quad \Delta S = POP_1,$$

welchen diese Funktion erleidet, wenn der Winkel XOP gleich φ um die kleine Größe POP_1 gleich

$\Delta\varphi$ zunimmt, findet man, indem man den Bogen PP_1 durch die Gerade PP_1 ersetzt und zunächst den Flächeninhalt des geradlinigen Dreiecks POP_1 berechnet. Für diesen erhält man

$$(2.) \quad \Delta POP_1 = \frac{1}{2} OP \cdot OP_1 \sin(\Delta\varphi) = \frac{1}{2} r(r + \Delta r) \frac{\sin(\Delta\varphi)}{\Delta\varphi} \Delta\varphi.$$

Der Unterschied zwischen dem Kurvensektor POP_1 und dem Dreieck POP_1 ist ein Segment über der Sehne PP_1 , das eine unendlich kleine Größe höherer Ordnung wird und deshalb vernachlässigt werden darf, wenn $\Delta\varphi$ verschwindend klein wird. Dann gehen auch die Größen QP_1 gleich Δr und ΔS bzw. in die verschwindend kleinen Größen dr und dS über, und man erhält

$$(3.) \quad \lim_{\Delta\varphi=0} (r + \Delta r) = r, \quad \lim_{\Delta\varphi=0} \frac{\sin(\Delta\varphi)}{\Delta\varphi} = 1,$$

also

$$(4.) \quad dS = \frac{1}{2} r^2 d\varphi$$

und


$$(5.) \quad S = \frac{1}{2} \int_a^\varphi r^2 d\varphi,$$

wobei $\sphericalangle XOA = a$ und $\sphericalangle XOP = \varphi$ gesetzt ist.

Gewöhnlich wird bei den Anwendungen auch die obere Grenze φ einen konstanten Wert β haben, welcher dem Radius vektor OB (Fig. 43) entspricht.

Auch dieses Integral kann als eine Summe von unendlich vielen, unendlich kleinen Größen betrachtet werden. Teilt man nämlich den Winkel AOB nach einem bestimmten Gesetze in n (gleiche oder ungleiche) Teile, so wird auch der Sektor AOB in n Teile zerlegt (Fig. 43), von denen man jeden einzelnen POP_1 unter Vernachlässigung unendlich kleiner Größen höherer Ordnung, nämlich unter Vernachlässigung der Dreiecke PQP_1 , als einen Kreissektor mit dem Flächeninhalte $\frac{1}{2}r^2d\varphi$ betrachten kann. Dabei ist für das Gesetz der Teilung die Voraussetzung gemacht, daß, wenn die Anzahl n der Sektoren unendlich groß wird, die einzelnen Sektoren gleichzeitig sämtlich unendlich klein werden.

Fig. 43.



Durch Summierung aller dieser unendlich kleinen Sektoren findet man für den Flächeninhalt des ganzen Sektors

$$(6.) \quad S = \frac{1}{2} \int_a^b r^2 d\varphi.$$


Übungs-Aufgaben.

Aufgabe 1. Man soll den Flächeninhalt des Sektors P_1OP_2 bei der *Archimedischen Spirale* (D.-R., Seite 494)

$$(7.) \quad r = a\varphi$$

berechnen (Fig. 44).

Fig. 44.



Auflösung. Nach Gleichung

(6.) ist in diesem Falle

$$(8.) \quad S = \frac{1}{2} \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} r^2 d\varphi = \frac{a^2}{2} \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} \varphi^2 d\varphi$$

$$= \frac{a^2}{6} [\varphi^3]_{\varphi_1}^{\varphi_2} = \frac{1}{6a} (a^3 \varphi_2^3 - a^3 \varphi_1^3),$$

also

$$(9.) \quad S = \frac{r_2^3 - r_1^3}{6a}.$$

Aufgabe 2. Man soll den Flächeninhalt des Sektors P_1OP_2 bei der *allgemeinen Spirale* (D.-R., Seite 497)


$$(10.) \quad r = a\varphi^n$$

berechnen.

Auflösung. In ähnlicher Weise wie bei der vorhergehenden Aufgabe erhält man hier

$$(11.) \quad S = \frac{1}{2} \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} r^2 d\varphi = \frac{a^2}{2} \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} \varphi^{2n} d\varphi \\ = \frac{a^2}{2} \left[\frac{\varphi^{2n+1}}{2n+1} \right]_{\varphi_1}^{\varphi_2} = \frac{a^2(\varphi_2^{2n+1} - \varphi_1^{2n+1})}{2(2n+1)}.$$

Fig. 45.



Aufgabe 3. Man soll den Flächeninhalt des Sektors P_1OP_2 bei der *logarithmischen Spirale* (D.-R., Seite 498)


$$(12.) \quad r = e^{a\varphi}$$

berechnen (Fig. 45).

Auflösung. Aus Gleichung (6.) erhält man in diesem Falle

$$(13.) \quad S = \frac{1}{2} \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} r^2 d\varphi = \frac{1}{2} \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} e^{2a\varphi} d\varphi \\ = \frac{1}{4a} \int_{(\varphi_1)}^{(\varphi_2)} e^{2a\varphi} d(2a\varphi) = \frac{1}{4a} [e^{2a\varphi}]_{\varphi_1}^{\varphi_2},$$

Fig. 46.



also

$$(14.) \quad S = \frac{1}{4a} (e^{2a\varphi_2} - e^{2a\varphi_1}) = \frac{r_2^2 - r_1^2}{4a}.$$

Aufgabe 4. Die Gleichung

$$(15.) \quad r^{-\frac{1}{2}} = a^{-\frac{1}{2}} \cos\left(-\frac{\varphi}{2}\right),$$

oder

$$(15a.) \quad r = \frac{a}{\cos^2\left(\frac{\varphi}{2}\right)}$$

stellt nach D.-R., Seite 502 eine *Parabel* dar (Fig. 46); man soll das Segment BCA berechnen.

Auflösung. Aus Gleichung (15a.) folgt in diesem Falle

$$(16.) \quad S = \frac{1}{2} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{+\frac{\pi}{2}} r^2 d\varphi = \frac{a^2}{2} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{+\frac{\pi}{2}} \frac{d\varphi}{\cos^4\left(\frac{\varphi}{2}\right)},$$

oder, wenn man

$$\varphi = 2t$$

setzt und Formel Nr. 61 der Tabelle berücksichtigt,

$$(17.) \quad S = a^2 \int_{-\frac{\pi}{4}}^{+\frac{\pi}{4}} \frac{dt}{\cos^4 t} = a^2 \int_{-\frac{\pi}{4}}^{+\frac{\pi}{4}} (1 + \operatorname{tg}^2 t) d(\operatorname{tg} t) \\ = a^2 \left[\operatorname{tg} t + \frac{1}{3} \operatorname{tg}^3 t \right]_{-\frac{\pi}{4}}^{+\frac{\pi}{4}} = a^2 \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{3} \right) = \frac{8a^2}{3}.$$

Aufgabe 5. Man soll den Flächeninhalt der *Kardioide* (D.-R., Seite 501) mit der Gleichung

$$(18.) \quad r^{\frac{1}{2}} = a^{\frac{1}{2}} \cos\left(\frac{\varphi}{2}\right),$$

oder

$$(18a.) \quad r = a \cos^2\left(\frac{\varphi}{2}\right)$$


berechnen (Fig. 47).

Auflösung. Setzt man

$$\varphi = 2t,$$

so wird zunächst mit Rücksicht auf Formel Nr. 102 der Tabelle

Fig. 47.



$$(19.) \quad S = \frac{1}{2} \int_0^{\varphi} r^2 d\varphi = \frac{a^2}{2} \int_0^{\varphi} \cos^4\left(\frac{\varphi}{2}\right) d\varphi = a^2 \int_0^t \cos^4 t dt \\ = a^2 \left[\frac{1}{4} \cos^3 t \sin t + \frac{3}{8} \cos t \sin t + \frac{3}{8} t \right]_0^t,$$

also

$$(20.) \quad S = \frac{a^2}{8} \left[2 \cos^3\left(\frac{\varphi}{2}\right) \sin\left(\frac{\varphi}{2}\right) + 3 \cos\left(\frac{\varphi}{2}\right) \sin\left(\frac{\varphi}{2}\right) + 3 \frac{\varphi}{2} \right].$$

Läßt man φ bis π , also $\frac{\varphi}{2}$ bis $\frac{\pi}{2}$ wachsen, so wird

$$(21.) \quad S = \frac{3a^2\pi}{16}$$

die Hälfte des gesuchten Flächeninhalts, für welchen man daher

$$(22.) \quad F = \frac{3a^2\pi}{8}$$

erhält. Der Flächeninhalt der Kardioide verhält sich also zum Flächeninhalt des Kreises mit dem Halbmesser a wie 3 zu 8.

Aufgabe 6. Man soll den Flächeninhalt der *Lemniskate* (D.-R., Seite 500) berechnen (Fig. 48).



Auflösung. Die Gleichung der Lemniskate ist

$$(23.) \quad r^2 = a^2 \cos(2\varphi),$$

folglich wird

$$(24.) \quad S = \frac{1}{2} \int_0^\varphi r^2 d\varphi = \frac{a^2}{2} \int_0^\varphi \cos(2\varphi) d\varphi = \frac{a^2}{4} \int_0^{(2\varphi)} \cos(2\varphi) d(2\varphi) \\ = \frac{a^2}{4} [\sin(2\varphi)]_0^\varphi = \frac{a^2}{4} \sin(2\varphi).$$

Den vierten Teil (Quadranten) der Lemniskate erhält man, wenn φ von 0 bis $\frac{\pi}{4}$, also 2φ von 0 bis $\frac{\pi}{2}$ wächst, folglich wird der Flächeninhalt der ganzen Lemniskate

$$(25.) \quad F = a^2 \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = a^2.$$

Aufgabe 7. Man soll den Sektor AOP der gleichseitigen Hyperbel

(26.) $x^2 - y^2 = a^2$, oder nach D.-R., Seite 501 $r^2 \cos(2\varphi) = a^2$ berechnen (Fig. 49).


Auflösung. In diesem Falle wird

$$(26a.) \quad r^2 = \frac{a^2}{\cos(2\varphi)},$$

also

$$\begin{aligned} (27.) \quad S &= \frac{1}{2} \int_0^{\varphi} r^2 d\varphi \\ &= \frac{a^2}{2} \int_0^{\varphi} \frac{d\varphi}{\cos(2\varphi)} \\ &= \frac{a^2}{4} \int_0^{(2\varphi)} \frac{d(2\varphi)}{\cos(2\varphi)}. \end{aligned}$$

Fig. 49.



Dies gibt nach Formel Nr. 48 der Tabelle

$$(28.) \quad S = \frac{a^2}{4} \left[\ln \left\{ \operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{4} + \varphi \right) \right\} \right]_0^{\varphi} = \frac{a^2}{4} \ln \left[\operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{4} + \varphi \right) \right].$$

Aufgabe 8. Die Gleichung des *Folium Cartesii* (D.-R., Seite 394) war für rechtwinklige Koordinaten

$$(29.) \quad x^3 + y^3 - 3axy = 0;$$

man soll den Flächeninhalt der Schleife berechnen (Fig. 50).

Fig. 50.


Auflösung. Bei Anwendung rechtwinkliger Koordinaten müßte man die kubische Gleichung (29.) nach y auflösen und erhielte einen Ausdruck für $y' - y''$, dessen Integration große Schwierigkeiten bereiten würde. Führt man dagegen durch die Gleichungen

$$(30.) \quad x = r \cos \varphi, \quad y = r \sin \varphi$$

Polarkoordinaten ein, so geht Gleichung (29.) über in

$$(31.) \quad r = \frac{3a \sin \varphi \cos \varphi}{\cos^3 \varphi + \sin^3 \varphi}.$$

Da der Kurvenpunkt P die Schleife durchläuft, wenn φ die Werte von 0 bis $\frac{\pi}{2}$ annimmt, so findet man für den gesuchten Flächeninhalt



$$(32.) \quad S = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} r^2 d\varphi = \frac{9a^2}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 \varphi \cos^2 \varphi d\varphi}{(\cos^3 \varphi + \sin^3 \varphi)^2}.$$

Indem man Zähler und Nenner des Bruches, der unter dem Integralzeichen steht, durch $\cos^3 \varphi$ dividiert und beachtet, daß

$$\frac{d\varphi}{\cos^2 \varphi} = d(\operatorname{tg} \varphi)$$

ist, ergibt sich

$$(33.) \quad S = \frac{9a^2}{2} \int_{(0)}^{\left(\frac{\pi}{2}\right)} \frac{\operatorname{tg}^2 \varphi d(\operatorname{tg} \varphi)}{(1 + \operatorname{tg}^3 \varphi)^2} = \frac{9a^2}{2} \int_{(0)}^{\left(\frac{\pi}{2}\right)} \frac{t^2 dt}{(1 + t^3)^2},$$

wobei $\operatorname{tg} \varphi$ mit t bezeichnet ist. Setzt man noch

$$1 + t^3 = z, \quad \text{also} \quad 3t^2 dt = dz,$$

so wird

$$(34.) \quad \int \frac{3t^2 dt}{(1 + t^3)^2} = \int \frac{dz}{z^2} = \int z^{-2} dz = -\frac{1}{z},$$

folglich ist

$$(35.) \quad S = \frac{3a^2}{2} \left[-\frac{1}{z} \right]_{(0)}^{\left(\frac{\pi}{2}\right)} = \frac{3a^2}{2} \left[-\frac{1}{1 + \operatorname{tg}^3 \varphi} \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{3a^2}{2}.$$

Der Flächeninhalt der Schleife ist also dreimal so groß wie der Flächeninhalt des Dreiecks AOB.

§ 23.

Übergang von rechtwinkligen Koordinaten zu Polarkoordinaten.

(Vergl. die Formel-Tabelle Nr. 135.)

Ist eine Kurve durch die Gleichungen

$$(1.) \quad x = \varphi(t), \quad y = \psi(t)$$

gegeben, so führt man zur Berechnung des von ihr eingeschlossenen Flächeninhalts häufig mit gutem Erfolge Polarkoordinaten ein. Aus den Gleichungen

$$(2.) \quad x = r \cos \varphi, \quad y = r \sin \varphi$$

findet man nämlich

$$(3.) \quad \operatorname{tg} \varphi = \frac{y}{x},$$

$$(4.) \quad \frac{d\varphi}{\cos^2 \varphi} = \frac{xdy - ydx}{x^2},$$

und wenn man diese Gleichung mit

$$r^2 \cos^2 \varphi = x^2$$

multipliziert,

$$(5.) \quad r^2 d\varphi = xdy - ydx = \left(x \frac{dy}{dt} - y \frac{dx}{dt} \right) dt.$$

Dadurch geht Formel Nr. 134 der Tabelle über in

$$(6.) \quad S = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} r^2 d\varphi = \frac{1}{2} \int_{(\alpha)}^{(\beta)} (xdy - ydx) = \frac{1}{2} \int_{(\alpha)}^{(\beta)} \left(x \frac{dy}{dt} - y \frac{dx}{dt} \right) dt.$$

Übungs-Aufgaben.

Aufgabe 1. Man soll den Sektor AOP der gleichseitigen Hyperbel mit den Gleichungen

$$(7.) \quad x = a \operatorname{Cof} u, \quad y = a \operatorname{Sin} u \quad (\text{also } x^2 - y^2 = a^2)$$

berechnen (Fig. 49 auf Seite 147).

Auflösung. Aus den Gleichungen (7.) folgt

$$(8.) \quad dx = a \operatorname{Sin} u \cdot du, \quad dy = a \operatorname{Cof} u \cdot du,$$

also

$$(9.) \quad xdy - ydx = a^2 (\operatorname{Cof}^2 u - \operatorname{Sin}^2 u) du = a^2 du,$$

$$(10.) \quad S = \frac{1}{2} \int_0^u (xdy - ydx) = \frac{a^2}{2} \int_0^u du = \frac{a^2 u}{2}.$$

Für a gleich 1 wird deshalb

$$(11.) \quad u = 2S,$$

d. h. u ist der doppelte Flächeninhalt des Sektors AOP , wie schon in § 29, Seite 144 der Differential-Rechnung hervorgehoben wurde.

Dieses Resultat stimmt auch mit dem in Aufgabe 7 des vorhergehenden Paragraphen gefundenen überein, denn aus den Gleichungen

$$(12.) \quad x = a \operatorname{Cos} u = r \cos \varphi, \quad y = a \operatorname{Sin} u = r \sin \varphi$$

folgt

$$(13.) \quad \operatorname{Tg} u = \operatorname{tg} \varphi,$$

$$(14.) \quad \operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{4} + \varphi \right) = \frac{1 + \operatorname{tg} \varphi}{1 - \operatorname{tg} \varphi} = \frac{1 + \operatorname{Tg} u}{1 - \operatorname{Tg} u} = \frac{\operatorname{Cos} u + \operatorname{Sin} u}{\operatorname{Cos} u - \operatorname{Sin} u}.$$

Nun ist aber nach D.-R., Formel Nr. 50 und 51 der Tabelle

$$(15.) \quad \operatorname{Cos} u + \operatorname{Sin} u = e^u, \quad \operatorname{Cos} u - \operatorname{Sin} u = e^{-u},$$

deshalb geht Gleichung (14.) über in

$$(16.) \quad \operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{4} + \varphi \right) = \frac{e^u}{e^{-u}} = e^{2u},$$

folglich wird

$$(17.) \quad \ln \left[\operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{4} + \varphi \right) \right] = 2u$$

und

$$(18.) \quad S = \frac{a^2}{4} \ln \left[\operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{4} + \varphi \right) \right] = \frac{a^2 u}{2}.$$

Aufgabe 2. Man soll den Sektor AOP der *Kreis-evolute* (D.-R., Seite 429) mit den Gleichungen

Fig. 51.

$$(19.) \quad \begin{cases} x = a(\cos t + t \sin t), \\ y = a(\sin t - t \cos t) \end{cases}$$

berechnen (Fig. 51).


Auflösung. Aus den Gleichungen (19.) findet man

$$(20.) \quad \begin{cases} dx = a(-\sin t + \sin t + t \cos t) dt = at \cos t dt, \\ dy = a(\cos t - \cos t - t \sin t) dt = -at \sin t dt, \end{cases}$$

folglich wird

$$(21.) \quad x dy - y dx = a^2 t^2 dt,$$

$$(22.) \quad S = \frac{a^2}{2} \int_0^t t^2 dt = \frac{a^2 t^3}{6} = AOP$$



Aufgabe 3. Man soll den Flächeninhalt der *Astroide* mit den Gleichungen

$$(23.) \quad x = a \cos^3 t, \quad y = a \sin^3 t$$

berechnen (Fig. 52).

Auflösung. Aus den Gleichungen (23.) findet man

$$(24.) \quad \begin{cases} dx = -3a \cos^2 t \sin t \, dt, \\ dy = +3a \sin^2 t \cos t \, dt, \end{cases}$$

folglich wird

$$(25.) \quad xdy - ydx = 3a^2(\sin^2 t \cos^4 t + \sin^4 t \cos^2 t)dt = 3a^2 \sin^2 t \cos^2 t \, dt,$$

$$(26.) \quad S = \frac{3a^2}{2} \int_0^t \sin^2 t \cos^2 t \, dt = AOP,$$

oder

$$(27.) \quad S = \frac{3a^2}{8} \int_0^t 4 \sin^2 t \cos^2 t \, dt = \frac{3a^2}{16} \int_{(0)}^{(t)} \sin^2(2t) d(2t).$$

Dies gibt nach Formel Nr. 100 der Tabelle

$$(28.) \quad S = \frac{3a^2}{16} \left[-\frac{1}{2} \sin(2t) \cos(2t) + t \right]_0^t = \frac{3a^2}{16} \left[t - \frac{1}{4} \sin(4t) \right].$$

Für $t = \frac{\pi}{2}$ erhält man

den Sektor AOB , d. h. den vierten Teil der Astroide, folglich ist der Flächeninhalt der ganzen Astroide in Übereinstimmung mit Aufgabe 11 in § 19

$$(29.) \quad F = \frac{3a^2 \pi}{8}.$$

Aufgabe 4. Man soll den Flächeninhalt der *Epi-zykloiden* mit den Gleichungen

$$(30.) \quad x = a[m \cos t - \cos(mt)], \quad y = a[m \sin t - \sin(mt)]$$

berechnen (Fig. 53, vergl. D.-R., Seite 423).

Fig. 52.





Fig. 53.



Auflösung. Aus den Gleichungen (30.) folgt

$$(31.) \quad dx = ma[-\sin t + \sin(mt)]dt, \quad dy = ma[\cos t - \cos(mt)]dt,$$

also, wenn man beachtet, daß hier $m = n + 1$ zu setzen ist,

$$(32.) \quad xdy - ydx = ma^2[(m+1) - (m+1)\cos(nt)]dt \\ = m(m+1)a^2[1 - \cos(nt)]dt.$$

Dies gibt für den Sektor AOP

$$(33.) \quad S = \frac{m(m+1)a^2}{2} \int_0^t [1 - \cos(nt)]dt \\ = \frac{m(m+1)a^2}{2} \left[t - \frac{1}{n} \sin(nt) \right].$$

Wenn der Sektor durch einmaliges Abrollen des rollenden Kreises entstanden ist, wenn es sich also um den Sektor $AOBC$ handelt, so hat man den Wälzungswinkel des rollenden Kreises

$$nt = 2\pi, \quad \text{also} \quad t = \frac{2\pi}{n}$$

zu setzen und erhält

$$(34.) \quad S = \frac{m(m+1)a^2\pi}{n} = \frac{(n+1)(n+2)a^2\pi}{n} = AOBC.$$

Ist n eine ganze Zahl, so schließt sich die Kurve, und die ganze Fläche besteht genau aus n solchen Sektoren; in diesem Falle wird also der Flächeninhalt der Epizykloide

$$(35.) \quad F = n \cdot AOBC = (n+1)(n+2)a^2\pi.$$

Ist z. B. $n = 6$, wie es in Figur 53 der Fall ist, so wird

$$(36.) \quad F = 56a^2\pi.$$

Für $n = 1$ ist die Epizykloide eine *Kardioide*, deren Flächeninhalt demnach

$$(37.) \quad F = 6a^2\pi$$

ist. Dieses Resultat stimmt mit den in § 21, Aufgabe 6 und in § 22, Aufgabe 5 gefundenen überein; nur war in dem zweiten Falle der Halbmesser a viermal größer als in den hier benutzten Gleichungen.

Aufgabe 5. Man soll den Flächeninhalt der *Hypozykloiden* mit den Gleichungen

$$(38.) \quad x = a[m \cos t + \cos(mt)], \quad y = a[m \sin t - \sin(mt)]$$

berechnen (Fig. 54).

Auflösung. Aus den Gleichungen (38.) folgt

$$(39.) \quad \begin{cases} dx = ma[-\sin t - \sin(mt)]dt, \\ dy = ma[\cos t - \cos(mt)]dt, \end{cases}$$

also, wenn man beachtet, daß hier $m = n - 1$ zu setzen ist,

$$(40.) \quad \begin{aligned} xdy - ydx &= ma^2[(m-1) - (m-1)\cos(nt)]dt \\ &= m(m-1)a^2[1 - \cos(nt)]dt, \end{aligned}$$

folglich wird

$$(41.) \quad \begin{aligned} S &= \frac{m(m-1)a^2}{2} \int_0^t [1 - \cos(nt)]dt \\ &= \frac{m(m-1)a^2}{2} \left[t - \frac{1}{n} \sin(nt) \right] = AOP. \end{aligned}$$

Wenn der Sektor durch einmaliges Abrollen des rollenden Kreises entstanden ist, so hat man den Wälzungswinkel dieses Kreises

$$nt = 2\pi, \quad \text{also} \quad t = \frac{2\pi}{n}$$

zu setzen; dann wird

$$(42.) \quad \begin{aligned} S &= \frac{m(m-1)a^2\pi}{n} \\ &= \frac{(n-1)(n-2)a^2\pi}{n} \\ &= AOB D. \end{aligned}$$


Ist n eine ganze Zahl, so schließt sich die Kurve, und man erhält für den Flächeninhalt der ganzen Hypozykloide

$$(43.) \quad F = n \cdot AOB D = (n-1)(n-2)a^2\pi.$$

Für den in Figur 54 berücksichtigten Fall ist

$$(44.) \quad n = 3 \quad \text{und} \quad F = 2a^2\pi,$$

Fig. 54.



also doppelt so groß wie der rollende Kreis, oder wie der durch die Punkte DEF gelegte Kreis.

Bei der *Astroide* hat man $n = 4$ zu setzen und erhält in Übereinstimmung mit Aufgabe 11 in § 19 und Aufgabe 3 in diesem Paragraphen

$$(45.) \quad F = 6a^2\pi,$$

nur ist in der vorliegenden Darstellung der Wert von a viermal kleiner als dort.

VI. Abschnitt.

Kubatur der Rotationskörper.

§ 24.

Berechnung des Volumens eines Rotationskörpers.

(Vergl. die Formel-Tabelle Nr. 136 bis 138.)

Eine Kurve (Fig. 55) mit der Gleichung

$$(1.) \quad y = f(x)$$


rotiere um die X -Achse, dann beschreibt jeder Punkt der Kurve einen Kreis. Um das Volumen V des Körpers zu berechnen, welcher bei

der Rotation von der Figur A_1QPA beschrieben wird, beachte man zunächst, daß V eine Funktion von x ist. Wenn nämlich $OQ = x$ um die Größe $QQ_1 = \Delta x$ wächst, so wächst auch V um den von dem Viereck QQ_1P_1P beschriebenen Rotationskörper ΔV . Dabei ist ΔV

größer als der von dem Rechteck QQ_1RP bei der Rotation beschriebene Zylinder $y^2\pi \cdot \Delta x$ und kleiner als der von dem Rechteck $QQ_1P_1R_1$ bei der Rotation beschriebene Zylinder $y_1^2\pi \cdot \Delta x$; es ist daher

$$(2.) \quad y^2\pi \cdot \Delta x \leq \Delta V \leq y_1^2\pi \cdot \Delta x.$$

Fig. 55.



Dies gilt nur, wenn die Kurve (wie in Figur 55) vom Punkte P bis zum Punkte P_1 steigt; wenn sie dagegen in diesem Intervalle fällt, so wird

$$(3.) \quad y^2 \pi \cdot \Delta x \cong \Delta V \cong y_1^2 \pi \cdot \Delta x.$$

Steigt und fällt die Kurve in dem Intervalle von P bis P_1 abwechselnd (vergl. Fig. 3), so sei y' die Ordinate des höchsten Punktes H und y'' die Ordinate des tiefsten Punktes T , dann wird

$$(4.) \quad y'^2 \pi \cdot \Delta x \cong \Delta V \cong y''^2 \pi \cdot \Delta x.$$

In dieser Ungleichung sind die beiden vorhergehenden Ungleichungen (2.) und (3.) als besondere Fälle inbegriffen. Indem man die Ungleichung (4.) durch Δx dividiert, erhält man

$$(5.) \quad y'^2 \pi \cong \frac{\Delta V}{\Delta x} \cong y''^2 \pi.$$

Da nun für $\lim \Delta x = 0$

$$\lim y' = \lim y'' = y$$

wird, so folgt hieraus

$$(6.) \quad \frac{dV}{dx} = y^2 \pi, \quad \text{oder} \quad dV = y^2 \pi dx;$$

dies gibt

$$(7.) \quad V = \pi \int_a^x y^2 dx,$$

wobei die untere Grenze a die Abszisse OA_1 des Kurvenpunktes A ist, denn für x gleich a wird das Volumen des Körpers gleich Null.

Gewöhnlich wird man auch für die obere Grenze einen konstanten Wert b einsetzen müssen, so daß man erhält

$$(8.) \quad V = \pi \int_a^b y^2 dx.$$

Auch dieses Integral kann man als eine Summe von unendlich vielen, unendlich kleinen Größen ansehen. Zerlegt man nämlich die ebene Figur $A_1 B_1 B A$ durch Parallele

zur Y -Achse in n Streifen, die alle verschwindend klein werden, wenn n ins Unbegrenzte wächst (Fig. 56), so beschreiben bei der Rotation die Ordinaten QP , Q_1P_1, \dots Ebenen, welche auf der Rotations-Achse senkrecht stehen. Durch diese Ebenen wird der Rotationskörper, wenn die Ordinaten einander immer näher rücken, in unendlich viele, unendlich dünne „*Schichten*“ oder „*Scheiben*“ zerlegt, deren Summe gleich dem gesuchten Volumen V ist. Man darf jeden dieser Streifen QQ_1PP als ein Rechteck, jede dieser Scheiben also als einen Zylinder betrachten, denn die kleinen Dreiecke PRP_1 , welche dabei vernachlässigt werden, beschreiben bei der Rotation ringförmige Körper, deren Volumina im Vergleich zu dem Volumen der ganzen Scheiben unendlich kleine Größen *höherer Ordnung* sind.

Das Volumen des unendlich flachen Zylinders, welcher bei der Rotation von dem Rechteck QQ_1RP beschrieben wird, ist


$$y^2\pi \cdot dx,$$

wenn man die Höhe dx des Zylinders sogleich verschwindend klein annimmt. Man nennt diese Größe $y^2\pi dx$ das „**Volumen-Element**“ des Rotationskörpers. Die Summe aller dieser unendlich vielen, unendlich flachen Zylinder (Volumen-Elemente) gibt dann das gesuchte Volumen des Rotationskörpers, nämlich in Übereinstimmung mit Gleichung (8.)

$$V = \pi \int_a^b y^2 dx.$$

In ähnlicher Weise findet man auch das Volumen eines Rotationskörpers, bei welchem die Y -Achse die Rotationsachse ist; nur muß man in diesem Falle x und y miteinander vertauschen, so daß man


Fig. 56.



(9.)

$$V = \pi \int_c^d x^2 dy$$

Fig. 57.



erhält. Es ist dabei zu beachten, daß hier y die Integrations-Veränderliche ist, und daß man deshalb erst integrieren kann, nachdem man in Gleichung (9.) x^2 als Funktion von y dargestellt hat, während in Gleichung (8.) x die Integrations-Veränderliche war.

Um dies anzudeuten, mögen die Integrationsgrenzen a und b in Gleichung (8.), da sie besondere Werte von x sind, mit x_1 und x_2 bezeichnet werden; und ebenso mögen in Gleichung (9.) die Integrationsgrenzen c und d , da sie besondere Werte von y sind, mit y_1 und y_2 bezeichnet werden.

Man erhält daher


$$(10.) \quad V = \pi \int_{x_1}^{x_2} y^2 dx,$$

wenn die X -Achse die Rotations-Achse ist, und

$$(11.) \quad V = \pi \int_{y_1}^{y_2} x^2 dy,$$

wenn die Y -Achse die Rotations-Achse ist.

Fig. 58.



Durch Verlegung der Koordinaten-Achsen kann man es immer erreichen, daß die X -Achse oder die Y -Achse mit der Rotations-Achse zusammenfällt. Ist z. B. in Figur 58 die Gerade C_1D_1 mit der Gleichung

$$x = a$$

Rotations-Achse, so verschiebe man die Y -Achse parallel mit sich um die Strecke OA gleich a , indem man

$$x = x' + a, \quad \text{oder} \quad x' = x - a$$

setzt, dann wird

$$(12.) \quad V = \pi \int_{y_1}^{y_2} x'^2 dy = \pi \int_{y_1}^{y_2} (x - a)^2 dy.$$

Die Berechnung des Volumens der Körper nennt man „Kubatur der Körper“.

§ 25.

Übungs - Aufgaben.

Aufgabe 1. Ein *gerader Kreiskegel*, dessen Grundkreis den Halbmesser a hat, und dessen Höhe gleich h ist, entsteht, indem ein rechtwinkliges Dreieck OCA (Fig. 59) um die X -Achse rotiert; man soll das Volumen des Kegels berechnen.

Auflösung. In dem rechtwinkligen Dreieck OCA ist die Kathete OC gleich h , und die andere Kathete CA gleich a , folglich hat die Hypotenuse OA die Gleichung

$$(1.) \quad y = \frac{ax}{h}.$$

Das Volumen des Kegels wird daher nach Formel Nr. 136 der Tabelle


$$(2.) \quad V = \pi \int_0^h y^2 dx = \frac{a^2 \pi}{h^2} \int_0^h x^2 dx,$$

also

$$(3.) \quad V = \frac{a^2 \pi}{h^2} \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^h = \frac{a^2 \pi h}{3}.$$


Aufgabe 2. Ein *abgestumpfter gerader Kreiskegel* habe die Höhe h und sei begrenzt durch die beiden Kreise mit

Fig. 59.



den Halbmessern a_1 und a_2 ; man soll das Volumen des Kegelstumpfes berechnen.

Fig. 60.



Auflösung. Der Kegelstumpf entsteht durch Rotation des Parallelogramms OA_2A_1 um die X -Achse (Fig. 60), wobei OA gleich h mit der X -Achse und OA_1 gleich a_1 mit der Y -Achse zusammenfällt. Die Gleichung der Geraden A_1A_2 ist daher

$$(4.) \quad y = \frac{a_2 - a_1}{h} x + a_1,$$

folglich wird


$$\begin{aligned} (5.) \quad V &= \pi \int_0^h y^2 dx = \pi \int_0^h \left[\frac{(a_2 - a_1)^2 x^2}{h^2} + \frac{2(a_2 - a_1)a_1 x}{h} + a_1^2 \right] dx \\ &= \pi \left[\frac{(a_2 - a_1)^2 x^3}{3h^2} + \frac{2(a_2 - a_1)a_1 x^2}{2h} + a_1^2 x \right]_0^h \\ &= \frac{h\pi}{3} [(a_2 - a_1)^2 + 3(a_2 - a_1)a_1 + 3a_1^2], \end{aligned}$$

also

$$(6.) \quad V = \frac{h\pi}{3} (a_1^2 + a_1 a_2 + a_2^2).$$

Aufgabe 3. Der Halbmesser einer Kugel sei a ; man soll das Volumen einer Kugelschicht berechnen, welche unten

Fig. 61.



und oben von zwei Kreisen mit den Halbmessern x_1 und x_2 begrenzt ist und die Höhe h hat.

Auflösung. Die Kugelschicht entsteht (Fig. 61) durch Rotation der Figur $R_1P_1P_2R_2$ um die Y -Achse, wobei P_1P_2 der Bogen eines Kreises mit der Gleichung

$$(7.) \quad x^2 + y^2 = a^2, \quad \text{oder} \quad x^2 = a^2 - y^2$$

ist. Nach Formel Nr. 137 der Tabelle erhält man daher

$$(8.) \quad V = \pi \int_{y_1}^{y_2} x^2 dy = \pi \int_{y_1}^{y_2} (a^2 - y^2) dy = \pi \left[a^2 y - \frac{y^3}{3} \right]_{y_1}^{y_2},$$

also

$$\begin{aligned} (9.) \quad V &= \frac{\pi}{3} [3a^2(y_2 - y_1) - (y_2^3 - y_1^3)] \\ &= \frac{(y_2 - y_1)\pi}{3} [3a^2 - y_2^2 - y_1 y_2 - y_1^2], \\ &= \frac{(y_2 - y_1)\pi}{6} [3(a^2 - y_2^2) + 3(a^2 - y_1^2) + (y_2^2 - 2y_1 y_2 + y_1^2)]. \end{aligned}$$

Nun ist aber

$$(10.) \quad y_2 - y_1 = h, \quad y_2^2 - 2y_1 y_2 + y_1^2 = h^2,$$

und nach Gleichung (7.)

$$a^2 - y_1^2 = x_1^2, \quad a^2 - y_2^2 = x_2^2,$$

folglich wird

$$(11.) \quad V = \frac{h\pi}{6} (3x_1^2 + 3x_2^2 + h^2).$$

Setzt man in Gleichung (8.) y_1 gleich 0 und y_2 gleich a , so geht die Kugelschicht in die Halbkugel über, so daß man für das Volumen der ganzen Kugel

$$(12.) \quad V = 2\pi \left[a^2 y - \frac{y^3}{3} \right]_0^a = \frac{4a^3\pi}{3}$$


erhält.

Fig. 62.

Aufgabe 4. Die *Parabel* OP mit der Gleichung

$$(13.) \quad y^2 = 2px$$

rotiere um die X -Achse (Fig. 62); man soll das Volumen des von der Figur OQP beschriebenen *Rotations-Paraboloids* berechnen.



Auflösung. Nach Formel Nr. 136 der Tabelle ist


$$(14.) \quad V = \pi \int_0^x y^2 dx = 2p\pi \int_0^x x dx = 2p\pi \cdot \frac{x^2}{2} = \frac{x \cdot 2px \cdot \pi}{2} = \frac{xy^2\pi}{2}.$$

Dies gibt den Satz: *Das Volumen des Rotations-Paraboloids ist halb so groß wie der von dem entsprechenden Rechteck OQPR mit den Seiten x und y bei der Rotation beschriebene Zylinder.*

Für x gleich y wird

$$(15.) \quad V = \frac{x^3\pi}{2}$$

Fig. 63.



Beschreibt man über einem Kreise mit dem Halbmesser x einen Zylinder mit der Höhe x , eine Halbkugel, ein Rotations-Paraboloid und einen Kegel mit der Höhe x (Fig. 63), so sind die Volumina dieser vier Körper bezw.


$$x^3\pi, \quad \frac{2x^3\pi}{3}, \quad \frac{x^3\pi}{2}, \quad \frac{x^3\pi}{3};$$

sie verhalten sich daher zueinander wie

$$6 : 4 : 3 : 2.$$

Aufgabe 5. Rotiert eine *Ellipse* mit der Gleichung

Fig. 64.



$$(16.) \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1,$$

oder

$$(16a.) \quad y^2 = \frac{b^2}{a^2} (a^2 - x^2)$$

um die große Achse (Fig. 64), so heißt der dabei beschriebene Rotationskörper „*längliches Rotations-Ellipsoid*“;

man soll das Volumen der Schicht berechnen, welche bei der Rotation von der Figur $Q_1Q_2P_2P_1$ beschrieben wird.

$$\begin{aligned}
 (21.) \quad V &= \frac{a^2\pi}{b^2} \int_{y_1}^{y_2} (b^2 - y^2) dy = \frac{a^2\pi}{b^2} \left[b^2 y - \frac{y^3}{3} \right]_{y_1}^{y_2} \\
 &= \frac{h\pi}{6} \left(3x_1^2 + 3x_2^2 + \frac{a^2 h^2}{b^2} \right),
 \end{aligned}$$

wobei die Höhe $y_2 - y_1$ mit h bezeichnet ist.

Für x_1 gleich 0, x_2 gleich 0, h gleich $2b$ erhält man das Volumen des ganzen Sphäroids, nämlich


$$(22.) \quad V = \frac{4a^2 b \pi}{3}.$$

Aufgabe 7. Rotiert eine *Hyperbel* mit der Gleichung

$$(23.) \quad \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad \text{oder} \quad y^2 = \frac{b^2}{a^2} (x^2 - a^2)$$

um die X -Achse, so entsteht das „*zweischalige Rotations-Hyperboloid*“ (Fig. 66); man soll das Volumen einer Schicht dieses Körpers berechnen.

Fig. 66.



Auflösung. Hier ist

$$\begin{aligned}
 (24.) \quad V &= \pi \int_{x_1}^{x_2} y^2 dx = \frac{b^2\pi}{a^2} \int_{x_1}^{x_2} (x^2 - a^2) dx = \frac{b^2\pi}{a^2} \left[\frac{x^3}{3} - a^2 x \right]_{x_1}^{x_2} \\
 &= \frac{b^2\pi}{3a^2} [x_2^3 - x_1^3 - 3a^2(x_2 - x_1)] \\
 &= \frac{b^2\pi(x_2 - x_1)}{3a^2} (x_2^2 + x_1x_2 + x_1^2 - 3a^2) \\
 &= \frac{\pi(x_2 - x_1)}{6} \left[\frac{3b^2}{a^2} (x_2^2 - a^2) + \frac{3b^2}{a^2} (x_1^2 - a^2) \right. \\
 &\quad \left. - \frac{b^2}{a^2} (x_2 - x_1)^2 \right],
 \end{aligned}$$

oder, wenn man $x_2 - x_1$ mit h bezeichnet und Gleichung (23.) berücksichtigt,

$$(25.) \quad V = \frac{h\pi}{6} \left(3y_1^2 + 3y_2^2 - \frac{b^2 h^2}{a^2} \right).$$

Für

$$x_1 = a, y_1 = 0; \quad x_2 = x, y_2 = y; \quad h = x - a$$

erhält man das Volumen des Körpers, der bei der Rotation von der Figur A_1QP beschrieben wird, nämlich

$$(26.) \quad V = \frac{(x-a)\pi}{6} \left[3y^2 - \frac{b^2(x-a)^2}{a^2} \right] = \frac{b^2(x-a)^2\pi}{3a^2} (x+2a).$$

Aufgabe 8. Rotiert eine *Hyperbel* mit der Gleichung


$$(27.) \quad \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1,$$

Fig. 67.

oder

$$(27a.) \quad x^2 = \frac{a^2}{b^2} (y^2 + b^2)$$

um die Y -Achse, so entsteht das „einschalige Rotations-Hyperboloid“ (Fig. 67); man soll das Volumen einer Schicht dieses Körpers berechnen.



Auflösung. Hier ist

$$(28.) \quad V = \pi \int_{y_1}^{y_2} x^2 dy = \frac{a^2\pi}{b^2} \int_{y_1}^{y_2} (y^2 + b^2) dy = \frac{a^2\pi}{b^2} \left[\frac{y^3}{3} + b^2 y \right]_{y_1}^{y_2} \\ = \frac{a^2\pi(y_2 - y_1)}{3b^2} (y_2^2 + y_1 y_2 + y_1^2 + 3b^2),$$

oder

$$(29.) \quad V = \frac{(y_2 - y_1)\pi}{6} \left[\frac{3a^2}{b^2} (y_2^2 + b^2) + \frac{3a^2}{b^2} (y_1^2 + b^2) - \frac{a^2}{b^2} (y_2 - y_1)^2 \right].$$

Bezeichnet man die Höhe $y_2 - y_1$ der Schicht wieder mit h , so wird mit Rücksicht auf die Gleichungen (27a.)

$$(30.) \quad V = \frac{h\pi}{6} \left(3x_1^2 + 3x_2^2 - \frac{a^2 h^2}{b^2} \right).$$

Für

$$x_1 = a, y_1 = 0; \quad x_2 = x, y_2 = y, h = y$$


erhält man das Volumen des Körpers, der bei der Rotation der Figur $OAPR$ um die Y -Achse beschrieben wird, nämlich

$$(31.) \quad V = \frac{y\pi}{6} \left(3a^2 + 3x^2 - \frac{a^2 y^2}{b^2} \right) = \frac{a^2 y \pi}{3b^2} (y^2 + 3b^2).$$

Aufgabe 9. Man soll das Volumen des Körpers berechnen, welcher durch Rotation der *Kettenlinie* um die X -Achse entsteht (Fig. 68).

Auflösung. Die Gleichung der Kettenlinie ist

Fig. 68.



$$(32.) \quad y = \frac{a}{2} \left(e^{\frac{x}{a}} + e^{-\frac{x}{a}} \right) \\ = a \operatorname{Co}\left(\frac{x}{a}\right),$$

oder

$$\pm \sqrt{y^2 - a^2} = \frac{a}{2} \left(e^{\frac{x}{a}} - e^{-\frac{x}{a}} \right) \\ = a \operatorname{Si}\left(\frac{x}{a}\right),$$

folglich wird

$$(33.) \quad V = \pi \int_{x_1}^{x_2} y^2 dx = a^2 \pi \int_{x_1}^{x_2} \operatorname{Co}^2\left(\frac{x}{a}\right) dx.$$

Setzt man

$$\frac{x}{a} = t, \quad \text{also} \quad x = at, \quad dx = a dt,$$

so erhält man nach Formel Nr. 113 der Tabelle

$$(34.) \quad V = a^3 \pi \int_{(x_1)}^{(x_2)} \operatorname{Co}^2 t dt = a^3 \pi \left[\frac{1}{2} \operatorname{Co} t \operatorname{Si} t + \frac{1}{2} t \right]_{(x_1)}^{(x_2)} \\ = \frac{a\pi}{2} \left[a \operatorname{Co}\left(\frac{x}{a}\right) \cdot a \operatorname{Si}\left(\frac{x}{a}\right) + ax \right]_{x_1}^{x_2} = \frac{a\pi}{2} \left[\pm y \sqrt{y^2 - a^2} + ax \right]_{x_1}^{x_2}.$$

Daraus folgt, wenn x_1 und x_2 beide positiv sind,

$$(34a.) \quad V = \frac{a\pi}{2} [y_2 \sqrt{y_2^2 - a^2} - y_1 \sqrt{y_1^2 - a^2} + a(x_2 - x_1)].$$

Wird dagegen x_1 negativ, wie es in Figur 68 der Fall ist, so wird

$$(34b.) \quad V = \frac{a\pi}{2} [y_2 \sqrt{y_2^2 - a^2} + y_1 \sqrt{y_1^2 - a^2} + a(x_2 - x_1)].$$

Für $x_1 = 0$, $y_1 = a$; $x_2 = x$, $y_2 = y$ erhält man

$$(35.) \quad V = \frac{a\pi}{2} (y \sqrt{y^2 - a^2} + ax).$$

Aufgabe 10. Man soll das Volumen des Körpers berechnen, welcher durch Rotation der *Zykloide* um die *X*-Achse entsteht (Fig. 69).

Fig. 69.

Auflösung. Die Gleichungen der Zykloide sind

$$(36.) \quad \begin{cases} x = a(t - \sin t), \\ y = a(1 - \cos t); \end{cases}$$

d. h. x und y sind beide als Funktionen einer dritten Veränderlichen t dargestellt;

deshalb wird es zweckmäßig sein, t als Integrations-Veränderliche einzuführen.

Dies gibt

$$(37.) \quad dx = a(1 - \cos t)dt,$$

also, wenn der Körper durch Rotation der Figur OQP entsteht,


$$(38.) \quad \begin{aligned} V &= \pi \int_0^x y^2 dx = a^3 \pi \int_0^t (1 - \cos t)^3 dt \\ &= a^3 \pi \int_0^t (1 - 3 \cos t + 3 \cos^2 t - \cos^3 t) dt, \end{aligned}$$

folglich wird nach den Formeln Nr. 10, 13, 99 und 54 der Tabelle

$$(39.) \quad \begin{aligned} V &= a^3 \pi (t - 3 \sin t + \frac{3}{2} \sin t \cos t + \frac{3}{2} t - \sin t + \frac{1}{3} \sin^3 t) \\ &= a^3 \pi [\frac{5}{2} t + \sin t (-4 + \frac{3}{2} \cos t + \frac{1}{3} \sin^2 t)]. \end{aligned}$$


Für $t = 2\pi$ erhält man das Volumen des Körpers, welcher durch Rotation der ganzen Zykloide $OAHP$ entsteht, nämlich

$$(40.) \quad V = 5a^3\pi^2.$$



Aufgabe 11. Man soll das Volumen des Körpers berechnen, welcher durch Rotation der *Astroide* um die *X*-Achse entsteht (Fig. 70).

Fig. 70.



Auflösung. Die Gleichungen der Astroide sind

$$(41.) \quad x = a \cos^3 t, \quad y = \sin^3 t,$$

folglich ist, wenn man wieder t zur Integrations-Veränderlichen macht und zunächst den Körper berechnet, welcher durch Rotation der Figur $OQPB$ entsteht,

$$(42.) \quad dx = -3a \cos^2 t \sin t \, dt,$$

$$(43.) \quad V = \pi \int_0^x y^2 dx = -3a^3 \pi \int_{\frac{\pi}{2}}^t \sin^6 t \cos^2 t \sin t \, dt \\ = 3a^3 \pi \int_{\left(\frac{\pi}{2}\right)}^{(t)} (1 - \cos^2 t)^3 \cos^2 t \cdot d(\cos t).$$

Setzt man also

$$\cos t = z,$$

so wird, wenn man beachtet, daß $\cos\left(\frac{\pi}{2}\right)$ gleich 0 ist,

$$(44.) \quad V = 3a^3 \pi \int_0^z (z^2 - 3z^4 + 3z^6 - z^8) dz \\ = 3a^3 \pi \left(\frac{z^3}{3} - \frac{3z^5}{5} + \frac{3z^7}{7} - \frac{z^9}{9} \right) \\ = \frac{a^3 \pi}{105} (105 \cos^3 t - 189 \cos^5 t + 135 \cos^7 t - 35 \cos^9 t).$$

Für t gleich 0 erhält man das Volumen des Körpers, welcher bei der Rotation von dem Quadranten OAB beschrieben wird, folglich ist das Volumen des ganzen Rotationskörpers

$$(45.) \quad V = \frac{2a^3 \pi}{105} (105 - 189 + 135 - 35) = \frac{32a^3 \pi}{105}.$$

Aufgabe 12. Man soll das Volumen des Körpers berechnen, welcher durch Rotation der *Zissoide* um die *X*-Achse entsteht (Fig. 71).

Auflösung. Die Gleichungen der *Zissoide* sind

$$(46.) \quad x = 2a \sin^2 \varphi, \quad y = \frac{2a \sin^3 \varphi}{\cos \varphi},$$

folglich wird

$$(47.) \quad dx = 4a \sin \varphi \cos \varphi d\varphi,$$

$$(48.) \quad V = \pi \int_0^x y^2 dx = 16a^3 \pi \int_0^{\varphi} \frac{\sin^7 \varphi d\varphi}{\cos \varphi}.$$

Setzt man also

$$(49.) \quad \cos \varphi = t, \quad \sin^2 \varphi = 1 - t^2,$$

$$\sin \varphi d\varphi = -dt,$$

so wird

$$t = 1 \quad \text{für} \quad \varphi = 0,$$


und man erhält

$$\begin{aligned} (50.) \quad V &= -16a^3 \pi \int_1^t \frac{(1-t^2)^3 dt}{t} \\ &= -16a^3 \pi \int_1^t \left(\frac{1}{t} - 3t + 3t^3 - t^5 \right) dt \\ &= -16a^3 \pi \left[\ln t - \frac{3t^2}{2} + \frac{3t^4}{4} - \frac{t^6}{6} \right]_1^t \\ &= \frac{4a^3 \pi}{3} (-12 \ln t + 18t^2 - 9t^4 + 2t^6 - 11). \end{aligned}$$

Nun ist

$$\begin{aligned} (51.) \quad t^2 &= \cos^2 \varphi = 1 - \sin^2 \varphi = \frac{2a-x}{2a}, \\ -48a^3 \ln t &= -24a^3 \ln(t^2) = +24a^3 \ln \left(\frac{2a}{2a-x} \right), \\ +72a^3 t^2 &= 36a^2 (2a-x) = 72a^3 - 36a^2 x, \\ -36a^3 t^4 &= -9a(2a-x)^2 = -36a^3 + 36a^2 x - 9a x^2, \\ +8a^3 t^6 &= 44a^3 = (2a-x)^3 - 44a^3 \\ &= -36a^3 - 12a^2 x + 6a x^2 - x^3, \end{aligned}$$

Fig. 71.




folglich wird

$$(52.) \quad V = \frac{\pi}{3} \left[24a^3 \ln \left(\frac{2a}{2a-x} \right) - x^3 - 3ax^2 - 12a^2x \right].$$

Aufgabe 13. Man soll das Volumen des Körpers berechnen, der durch Rotation der *Zissoide* um die Asymptote mit der Gleichung $x = 2a$ entsteht (Fig. 72).

Fig. 72.



Auflösung. Zunächst möge das Volumen des Körpers berechnet werden, welcher bei der Rotation von der Figur *OASP* beschrieben wird. Nach Formel Nr. 138 der Tabelle findet man, wenn man in diesem Falle a mit $2a$ vertauscht,

$$(53.) \quad V = \pi \int_0^y (x - 2a)^2 dy.$$

Dabei folgt aus den Gleichungen (46.)

$$(54.) \quad \begin{cases} x - 2a = -2a \cos^2 \varphi, \\ dy = \frac{2a}{\cos^2 \varphi} (3 \cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi) \sin^2 \varphi d\varphi, \end{cases}$$

also

$$(55.) \quad \begin{aligned} V &= 8a^3 \pi \int_0^{\varphi} \sin^2 \varphi \cos^2 \varphi (3 \cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi) d\varphi \\ &= 8a^3 \pi \int_0^{\varphi} (1 - \cos^2 \varphi) \cos^2 \varphi (1 + 2 \cos^2 \varphi) d\varphi \\ &= 8a^3 \pi \int_0^{\varphi} (\cos^2 \varphi + \cos^4 \varphi - 2 \cos^6 \varphi) d\varphi. \end{aligned}$$

Nun ist nach Formel Nr. 101 der Tabelle

$$(56.) \quad \int \cos^6 \varphi d\varphi = \frac{1}{6} \cos^5 \varphi \sin \varphi + \frac{5}{6} \int \cos^4 \varphi d\varphi,$$

$$(57.) \quad \int \cos^4 \varphi d\varphi = \frac{1}{4} \cos^3 \varphi \sin \varphi + \frac{3}{4} \int \cos^2 \varphi d\varphi,$$

$$(58.) \quad \int \cos^2 \varphi d\varphi = \frac{1}{2} \cos \varphi \sin \varphi + \frac{1}{2} \varphi.$$

Multipliziert man Gleichung (56.) mit -2 , Gleichung (57.) mit $-2 \cdot \frac{5}{6} + 1 = -\frac{2}{3}$, Gleichung (58.) mit $-\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} + 1 = \frac{1}{2}$ und addiert diese drei Gleichungen, so erhält man unter Hinzufügung des Faktors $8a^3\pi$

$$(59.) \quad V = 8a^3\pi \int_0^{\varphi} (\cos^2\varphi + \cos^4\varphi - 2\cos^6\varphi) d\varphi$$

$$= 8a^3\pi \left[-\frac{1}{3}\cos^5\varphi \sin\varphi - \frac{1}{6}\cos^3\varphi \sin\varphi + \frac{1}{4}\cos\varphi \sin\varphi + \frac{1}{4}\varphi \right].$$

Wenn φ bis $\frac{\pi}{2}$ wächst, so wird y unendlich groß. Gleichzeitig erstreckt sich auch der Rotationskörper bis ins Unendliche. Das Integral verliert also zunächst seinen Sinn, denn bei seiner Erklärung war vorausgesetzt, daß die Funktion unter dem Integralzeichen endlich bleibt. Wenn man aber den Wert des Integrals als Grenzwert erklärt, wenn man also $V = \lim_{\varphi=\frac{\pi}{2}}^{(\varphi)} \int y^2 dx$ setzt, so bleibt das Volumen trotzdem endlich, denn man erhält

$$(60.) \quad \lim_{\varphi=\frac{\pi}{2}} V = a^3\pi^2.$$


Aufgabe 14. Man soll das Volumen des Körpers berechnen, welcher durch Rotation der *Ellipse*

$$(61.) \quad y = c \pm \frac{b}{a} \sqrt{a^2 - x^2}$$

um die X -Achse entsteht (Fig. 73), wenn c größer als b ist.

Auflösung. Man kann das gesuchte Volumen V als die Differenz zweier Volumina V' und V'' betrachten, von denen V' bei der Rotation von der

Fig. 73.



Figur $Q_1Q_2P_2'P_1'$ und V'' von der Figur $Q_1Q_2P_2''P_1''$ beschrieben wird. Dabei ist

$$(62.) \quad V' = \pi \int_{x_1}^{x_2} y'^2 dx, \quad V'' = \pi \int_{x_1}^{x_2} y''^2 dx,$$

also

$$(63.) \quad V = V' - V'' = \pi \int_{x_1}^{x_2} (y'^2 - y''^2) dx.$$

Bei der vorliegenden Aufgabe ist

$$y' = c + \frac{b}{a} \sqrt{a^2 - x^2}, \quad y'' = c - \frac{b}{a} \sqrt{a^2 - x^2},$$

also

$$y' + y'' = 2c, \quad y' - y'' = \frac{2b}{a} \sqrt{a^2 - x^2},$$

folglich wird

$$(64.) \quad (y' + y'')(y' - y'') = y'^2 - y''^2 = \frac{4bc}{a} \sqrt{a^2 - x^2},$$

$$(65.) \quad V = \frac{4bc\pi}{a} \int_{x_1}^{x_2} dx \sqrt{a^2 - x^2}.$$

Will man das Volumen des Körpers berechnen, welcher durch Rotation der *ganzen* Ellipse entsteht, so hat man

$$x_1 = -a, \quad x_2 = +a$$

zu setzen und erhält nach Formel Nr. 123 der Tabelle

$$(66.) \quad \begin{aligned} V &= \frac{4bc\pi}{a} \left[\frac{x}{2} \sqrt{a^2 - x^2} + \frac{a^2}{2} \arcsin\left(\frac{x}{a}\right) \right]_{-a}^{+a} \\ &= \frac{4bc\pi}{a} \left[\frac{a^2}{2} \arcsin(+1) - \frac{a^2}{2} \arcsin(-1) \right] \\ &= 2abc\pi^2. \end{aligned}$$

Auch hier kann man die Rechnung durch Einführung eines variablen Parameters t vereinfachen in ähnlicher Weise, wie es auf Seite 137 bis 141 bei der Quadratur der Kurven geschehen ist. Setzt man nämlich in der vorstehenden Aufgabe

$$(67.) \quad x = a \sin t, \quad \text{so wird} \quad y = c + b \cos t.$$

Dabei durchläuft der Kurvenpunkt P die obere Hälfte der Ellipse von A bis B , wenn t alle Werte von $-\frac{\pi}{2}$ bis $+\frac{\pi}{2}$ annimmt; und der Kurvenpunkt P durchläuft die

untere Hälfte der Ellipse von B bis A , wenn t alle Werte von $\frac{\pi}{2}$ bis $\frac{3\pi}{2}$ annimmt. Deshalb wird

$$(68.) \quad \int_{-a}^{+a} y'^2 dx = a \int_{-\frac{\pi}{2}}^{+\frac{\pi}{2}} (c + b \cos t)^2 \cos t dt,$$

$$(69.) \quad - \int_{-a}^{+a} y''^2 dx = + a \int_{+\frac{\pi}{2}}^{-\frac{\pi}{2}} y''^2 dx = a \int_{+\frac{\pi}{2}}^{-\frac{\pi}{2}} (c + b \cos t)^2 \cos t dt,$$

folglich wird

$$(70.) \quad V = a\pi \int_{-\frac{\pi}{2}}^{+\frac{3\pi}{2}} (c^2 \cos t + 2bc \cos^2 t + b^2 \cos^3 t) dt.$$

Dies gibt nach den Formeln Nr. 13, 99 und 54 der Tabelle in Übereinstimmung mit Gleichung (66.)

$$(71.) \quad V = a\pi \left[c^2 \sin t + bc (\cos t \sin t + t) + b^2 \left(\sin t - \frac{1}{3} \sin^3 t \right) \right]_{-\frac{\pi}{2}}^{+\frac{3\pi}{2}}$$

$$= a\pi \left[c^2 (-1 + 1) + bc \left(\frac{3\pi}{2} + \frac{\pi}{2} \right) + b^2 \left(-\frac{2}{3} + \frac{2}{3} \right) \right]$$

$$= 2abc\pi^2.$$


Fig. 74.

Dies kann man sogleich verallgemeinern. Die ebene Figur $A'BA''$ (vergl. Fig. 74) werde durch den Kurvenbogen $A'BA''$ mit den Gleichungen

$$(72.) \quad x = \varphi(t), \quad y = \psi(t)$$

und durch die Ordinate $A_1A''A'$ begrenzt. Dabei seien wieder $\varphi(t)$ und $\psi(t)$ für die betrachteten Kurvenpunkte *eindeutige* Funktionen von t , d. h. der

Kurvenpunkt P durchlaufe die Kurve von A' bis B , wenn t alle Werte von t_1 bis t' annimmt, und er durchlaufe die Kurve von B bis A'' , wenn t alle Werte von t' bis t_2 an-



nimmt, wobei $t_1 < t' < t_2$ oder $t_1 > t' > t_2$ sein möge. Soll man dann das Volumen des Körpers berechnen, der durch Rotation dieser ebenen Figur um die X -Achse entsteht, so erhält man zunächst nach den bisherigen Regeln

$$(73.) \quad V = \pi \int_a^b (y'^2 - y''^2) dx.$$

Nun wird aber

$$\begin{aligned} \int_a^b y'^2 dx &= \int_{t_1}^{t'} \psi(t)^2 \cdot \varphi'(t) dt, \\ - \int_a^b y''^2 dx &= + \int_b^{t_2} y'^2 dx = \int_{t'}^{t_2} \psi(t)^2 \cdot \varphi'(t) dt, \end{aligned}$$

folglich findet man


$$(74.) \quad V = \pi \int_{t_1}^{t_2} \psi(t)^2 \cdot \varphi'(t) dt.$$

Ein besonderer Vorzug dieser Methode liegt auch hier wieder darin, daß man die Koordinaten des Punktes B und den zugehörigen Wert t' des Parameters t nicht zu ermitteln braucht.

Aufgabe 15. Man soll das Volumen des Körpers berechnen, der durch Rotation der *Kardioide*

$$(75.) \quad x = a[2\cos t - \cos(2t)], \quad y = a[2\sin t - \sin(2t)]$$

Fig. 75.



um die X -Achse entsteht. (Vergl. Fig. 75.)

Auflösung. Wie schon in § 21 bei Aufgabe 6 gezeigt wurde, durchläuft der Kurvenpunkt P , von A anfangend, die obere Hälfte der Kurve, wenn t alle Werte von 0 bis π durchläuft. Bezeichnet man dann den größten Wert, den x

annehmen kann, mit x' und den zugehörigen Wert von t mit t' , so wird

$$\begin{aligned}
 (76.) \quad F &= \pi \int_{-3a}^{x'} y'^2 dx - \pi \int_{+a}^{x'} y''^2 dx = \pi \int_{-3a}^{x'} y'^2 dx + \pi \int_{x'}^{+a} y''^2 dx \\
 &= \pi \int_{\pi}^{\frac{\pi}{2}} \psi(t)^2 \cdot \varphi'(t) dt + \pi \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \psi(t)^2 \cdot \varphi'(t) dt = \pi \int_{\pi}^0 \psi(t)^2 \cdot \varphi'(t) dt.
 \end{aligned}$$

Da in diesem Falle

$$dx = \varphi'(t) dt = 2a[-\sin t + \sin(2t)] dt$$

ist, so erhält man

$$\begin{aligned}
 (77.) \quad V &= 2a^3 \pi \int_{\pi}^0 [2\sin t - \sin(2t)]^2 \cdot [-\sin t + \sin(2t)] dt \\
 &= 2a^3 \pi \int_0^{\pi} [4\sin^3 t - 8\sin^2 t \sin(2t) + 5\sin t \sin^2(2t) - \sin^3(2t)] dt.
 \end{aligned}$$

Dabei ist nach den Formeln Nr. 57, 53 und 56 der Tabelle

$$\int \sin^3 t dt = -\int (1 - \cos^2 t) d(\cos t) = -\cos t + \frac{1}{3} \cos^3 t,$$

$$\int \sin^2 t \sin(2t) dt = 2 \int \sin^3 t \cos t dt = \frac{1}{2} \sin^4 t,$$

$$\begin{aligned}
 \int \sin t \sin^2(2t) dt &= 4 \int \sin^3 t \cos^2 t dt = -4 \int (\cos^2 t - \cos^4 t) d(\cos t) \\
 &= -4 \left(\frac{1}{3} \cos^3 t - \frac{1}{5} \cos^5 t \right),
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \int \sin^3(2t) dt &= -\frac{1}{2} \int [1 - \cos^2(2t)] d \cos(2t) \\
 &= -\frac{1}{2} \left[\cos(2t) - \frac{1}{3} \cos^3(2t) \right],
 \end{aligned}$$

folglich wird

$$\begin{aligned}
 (78.) \quad V &= 2a^3 \pi \left[-4 \cos t + \frac{4}{3} \cos^3 t - 4 \sin^4 t - \frac{20}{3} \cos^3 t \right. \\
 &\quad \left. + 4 \cos^5 t + \frac{1}{2} \cos(2t) - \frac{1}{6} \cos^3(2t) \right]_0^{\pi} \\
 &= 2a^3 \pi \left[\left(+4 + \frac{16}{3} - 4 + \frac{1}{2} - \frac{1}{6} \right) - \left(-4 - \frac{16}{3} + 4 + \frac{1}{2} - \frac{1}{6} \right) \right] \\
 &= \frac{64a^3 \pi}{3}.
 \end{aligned}$$

VII. Abschnitt.

Rektifikation der ebenen Kurven.

§ 26.

Rektifikation ebener Kurven, deren Gleichung auf ein rechtwinkliges Koordinaten-System bezogen ist.

(Vergl. die Formel-Tabelle Nr. 139.)


Ist

(1.)

$$y = f(x)$$

die Gleichung einer Kurve (Fig. 76), so wird der Bogen

Fig. 76.



AP gleich s ebenfalls eine Funktion von x . Wächst nämlich x um die Größe QQ_1 gleich Δx , so wächst auch der Bogen s um die Größe $\overline{PP_1}$ gleich Δs . Betrachtet man zunächst Δs als die Sehne $\overline{PP_1}$, so ist Δs die Hypotenuse in dem rechtwinkligen Dreieck PRP_1 , so daß man erhält

$$(2.) \quad \overline{PP_1}^2 = \overline{PR}^2 + \overline{RP_1}^2, \text{ oder } \Delta s^2 = \Delta x^2 + \Delta y^2,$$

$$(2a.) \quad \Delta s = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}.$$

Läßt man die beiden Punkte P und P_1 einander unendlich nahe rücken, so gehen Δx , Δy , Δs bzw. in die Differentiale dx , dy , ds über, und der unendlich kleine Bogen PP_1 fällt mit der unendlich kleinen Sehne PP_1 gleich ds zusammen. Deshalb erhält man für den unendlich kleinen Zuwachs ds des Bogens s aus Gleichung (2a.)

$$(3.) \quad ds = \sqrt{dx^2 + dy^2} = dx \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}.$$

Daraus folgt durch Integration für den Bogen AP selbst

$$(4.) \quad s = \int_a^x ds = \int_a^x dx \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}.$$

Man wird hierbei die Integrationsgrenzen zweckmäßiger Weise mit x_1 und x_2 bezeichnen, um anzudeuten, daß x die Integrations-Veränderliche ist. Dadurch geht Gleichung (4.) über in

$$(4a.) \quad s = \int_{x_1}^{x_2} ds = \int_{x_1}^{x_2} \sqrt{dx^2 + dy^2} = \int_{x_1}^{x_2} dx \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}.$$

Man kann nämlich auch y zur Integrations-Veränderlichen machen, denn aus Gleichung (3.) folgt

$$(5.) \quad ds = dy \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2},$$

also

$$(6.) \quad s = \int_{y_1}^{y_2} ds = \int_{y_1}^{y_2} \sqrt{dx^2 + dy^2} = \int_{y_1}^{y_2} dy \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2}.$$

Sind x und y als Funktionen einer dritten Veränderlichen t gegeben, so wird man in den meisten Fällen mit gutem Erfolge t zur Integrations-Veränderlichen machen und schreiben

$$(7.) \quad ds = dt \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2},$$

$$(8.) \quad s = \int_{t_1}^{t_2} ds = \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{dx^2 + dy^2} = \int_{t_1}^{t_2} dt \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2}.$$

In dieser Formel sind die Gleichungen (4a.) und (6.) als besondere Fälle enthalten, welche sich ergeben, wenn man


$$t = x \quad \text{bzw.} \quad t = y$$

setzt.

Auch hier kann man das bestimmte Integral als Summe von unendlich vielen, unendlich kleinen Größen betrachten, oder, strenger gefaßt, als Grenzwert einer Summe, bei der die einzelnen Summanden ins Unbegrenzte abnehmen, wo-

durch gleichzeitig ihre Anzahl ins Unbegrenzte wächst. Zerlegt man nämlich den Abschnitt Q_1Q_2 auf der X -Achse

Fig. 77.



(Fig. 77) in n (gleiche oder ungleiche) Teile und legt durch die Schnittpunkte Parallele zur Y -Achse, so wird auch der Bogen P_1P_2 gleich s in n Teile zerlegt.

Indem man die aufeinander folgenden Schnittpunkte des Bogens durch gerade Linien miteinander verbindet, erhält man zwischen P_1 und P_2 ein Polygon von n Seiten. Wird nun n unendlich groß, und werden die einzelnen Seiten des Polygons unendlich klein, so fallen sie mit den Bögen, deren Sehnen ds sie sind, zusammen.

Der ganze Bogen P_1P_2 oder s wird daher die Summe von diesen unendlich vielen, unendlich kleinen Sehnen ds , so daß man wieder erhält


$$s = \int ds = \int \sqrt{dx^2 + dy^2} = \int_{x_1}^{x_2} dx \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}.$$

§ 27.

Übungs-Aufgaben.

Aufgabe 1. Man soll die Länge des Bogens OP der *Parabel* mit der Gleichung

Fig. 78.



$$(1.) \quad y^2 = 2px$$

berechnen (Fig. 78).

Auflösung. Aus Gleichung (1.)

folgt

$$(2.) \quad y dy = p dx, \text{ oder } \frac{dx}{dy} = \frac{y}{p}.$$

Man wird hier nämlich y zur Integrations-Veränderlichen machen, weil sich x und $\frac{dx}{dy}$ rational durch y dar-

stellen lassen. Dadurch erhält man nach Formel Nr. 139 der Tabelle

$$(3.) \quad s = \int_0^y dy \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} = \frac{1}{p} \int_0^y dy \sqrt{p^2 + y^2},$$

und dies gibt nach Formel Nr. 129 der Tabelle

$$(4.) \quad s = \frac{1}{p} \left[\frac{y}{2} \sqrt{p^2 + y^2} + \frac{p^2}{2} \ln \left(\frac{y + \sqrt{p^2 + y^2}}{p} \right) \right]_0^y \\ = \frac{y}{2p} \sqrt{p^2 + y^2} + \frac{p}{2} \ln \left(\frac{y + \sqrt{p^2 + y^2}}{p} \right) \\ = \frac{y}{2p} \sqrt{p^2 + y^2} + \frac{p}{2} \operatorname{Ar} \sin \left(\frac{y}{p} \right).$$

Aufgabe 2. Man soll die Länge des Bogens P_1P_2 der *Ellipse* mit der Gleichung

$$(5.) \quad b^2x^2 + a^2y^2 = a^2b^2$$

berechnen (Fig. 79).

Auflösung. Aus Gleichung (5.) folgt

$$(6.) \quad y = \frac{b}{a} \sqrt{a^2 - x^2}. \quad \frac{dy}{dx} = \frac{-bx}{a \sqrt{a^2 - x^2}},$$

$$(7.) \quad \left(\frac{ds}{dx}\right)^2 = 1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2 = \frac{a^4 - e^2x^2}{a^2(a^2 - x^2)},$$

wobei


$$e^2 = a^2 - b^2$$

ist. Daraus ergibt sich

$$(8.) \quad s = \frac{1}{a} \int_{x_1}^{x_2} \frac{dx \sqrt{a^4 - e^2x^2}}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \frac{1}{a} \int_{x_1}^{x_2} \frac{(a^4 - e^2x^2) dx}{\sqrt{(a^2 - x^2)(a^4 - e^2x^2)}}.$$


Dieses Integral, das ein „*elliptisches Integral zweiter Gattung*“ genannt wird, kann erst an einer späteren Stelle ermittelt werden, da es sich weder durch algebraische

Fig. 79.



Funktionen noch durch die bisher betrachteten transzendenten Funktionen ausdrücken läßt. Man erkennt daher aus dieser Aufgabe, wie die Anwendungen der Integral-Rechnung auf *neue transzendente* Funktionen führen.

Fig. 80.



Aufgabe 3. Man soll die Länge des Bogens P_1P_2 der *Hyperbel* mit der Gleichung

$$(9.) \quad b^2x^2 - a^2y^2 = a^2b^2$$

berechnen (Fig. 80).

Auflösung. Man findet hier in ähnlicher Weise wie bei der vorhergehenden Aufgabe

$$(10.) \quad s = -\frac{1}{a} \int_{x_1}^{x_2} \frac{(a^4 - e^2x^2)dx}{V(a^2 - x^2)(a^4 - e^2x^2)} = \frac{1}{a} \int_{x_1}^{x_2} \frac{(e^2x^2 - a^4)dx}{V(x^2 - a^2)(e^2x^2 - a^4)},$$

nur ist bei der Hyperbel e^2 gleich $a^2 + b^2$.

Aufgabe 4. Man soll die Länge des Bogens P_1P_2 der *Kettenlinie* mit der Gleichung


$$(11.) \quad y = \frac{a}{2} \left(e^{\frac{x}{a}} + e^{-\frac{x}{a}} \right) = a \operatorname{Cof} \left(\frac{x}{a} \right),$$

oder

$$(11a.) \quad \pm V y^2 - a^2 = \frac{a}{2} \left(e^{\frac{x}{a}} - e^{-\frac{x}{a}} \right) = a \operatorname{Sin} \left(\frac{x}{a} \right)$$

berechnen (Fig. 81).

Fig. 81.



Auflösung. Aus den Gleichungen (11.) und (11a.) folgt

$$(12.) \quad \frac{dy}{dx} = \frac{1}{2} \left(e^{\frac{x}{a}} - e^{-\frac{x}{a}} \right) = \operatorname{Sin} \left(\frac{x}{a} \right),$$

$$(13.) \quad \left(\frac{ds}{dx} \right)^2 = 1 + \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 = 1 + \operatorname{Sin}^2 \left(\frac{x}{a} \right) = \operatorname{Cof}^2 \left(\frac{x}{a} \right),$$

oder

$$(13a.) \quad \frac{ds}{dx} = \mathfrak{Cof}\left(\frac{x}{a}\right) = \frac{1}{2} \left(e^{\frac{x}{a}} + e^{-\frac{x}{a}} \right)$$

$$(14.) \quad s = \int_{x_1}^{x_2} \mathfrak{Cof}\left(\frac{x}{a}\right) dx = a \int_{x_1}^{x_2} \mathfrak{Cof}\left(\frac{x}{a}\right) d\left(\frac{x}{a}\right) = a \left[\mathfrak{Sin}\left(\frac{x}{a}\right) \right]_{x_1}^{x_2} \\ = \sqrt{y_2^2 - a^2} - \sqrt{y_1^2 - a^2}.$$

Für x_1 gleich 0, x_2 gleich x wird der Bogen

$$(15.) \quad AP = \sqrt{y^2 - a^2}$$

und kann sehr leicht konstruiert werden. Beschreibt man nämlich um A (Fig. 82) mit dem Halbmesser y einen Kreisbogen, welcher die X -Achse im Punkte B trifft, und vervollständigt das Rechteck $OBCA$, so ist

$$(16.) \quad AC = \sqrt{y^2 - a^2} = \widehat{AP}.$$

In ähnlicher Weise könnte man die Bögen AP_1 und AP_2 als gerade Linien AC_1 und AC_2 darstellen, deren Differenz

$$(17.) \quad AC_2 - AC_1 = C_1C_2 = \widehat{P_1P_2}$$

sein würde.




Fig. 82.

Aufgabe 5. Man soll die Länge des Bogens OP bei der Zykloide mit den Gleichungen


$$(18.) \quad x = a(t - \sin t), \quad y = a(1 - \cos t)$$

berechnen (Fig. 83).

Auflösung. Aus den Gleichungen (18.) folgt

$$(19.) \quad dx = a(1 - \cos t)dt, \quad dy = a \sin t dt,$$

Fig. 83.



$$(20.) \quad ds^2 = dx^2 + dy^2 = a^2(1 - 2\cos t + \cos^2 t + \sin^2 t)dt^2 \\ = 2a^2(1 - \cos t)dt^2 = 4a^2\sin^2\left(\frac{t}{2}\right)dt^2.$$

$$(21.) \quad ds = 2a\sin\left(\frac{t}{2}\right)dt = 4a\sin\left(\frac{t}{2}\right)d\left(\frac{t}{2}\right),$$

folglich ist


$$(22.) \quad s = 4a \int_{(0)}^{(t)} \sin\left(\frac{t}{2}\right)d\left(\frac{t}{2}\right) = 4a\left[-\cos\left(\frac{t}{2}\right)\right]_0^t \\ = 4a\left[1 - \cos\left(\frac{t}{2}\right)\right] = 8a\sin^2\left(\frac{t}{4}\right).$$

Wird der Wälzungswinkel t gleich 2π , so rollt der die Kurve erzeugende Kreis einmal ab. Dadurch erhält man für den Bogen der *ganzen* Zyклоide

$$(23.) \quad s = 8a,$$

ein Resultat, das schon bei der Krümmung der Kurven (D.-R., Seite 480) ermittelt wurde.

Fig. 84.



Aufgabe 6. Man soll die Länge des Bogens BP bei der *Asterioide* mit den Gleichungen

$$(24.) \quad x = a\cos^3 t, \quad y = a\sin^3 t$$

berechnen (Fig. 84).

Auflösung. Aus den Gleichungen (24.) folgt

$$(25.) \quad \begin{cases} dx = -3a\cos^2 t \sin t dt, \\ dy = +3a\sin^2 t \cos t dt, \end{cases}$$

$$(26.) \quad ds^2 = dx^2 + dy^2 \\ = 9a^2\sin^2 t \cos^2 t (\cos^2 t + \sin^2 t) dt^2 \\ = 9a^2\sin^2 t \cos^2 t dt^2,$$

also

$$(27.) \quad ds = \pm 3a\sin t \cos t dt.$$

Hierbei ist das untere Zeichen zu nehmen, weil s zunimmt, wenn t abnimmt. Dies gibt

$$\begin{aligned}
 (28.) \quad s &= -3a \int_{\frac{\pi}{2}}^t \sin t \cos t dt = -\frac{3a}{2} [\sin^2 t]_{\frac{\pi}{2}}^t \\
 &= \frac{3a}{2} (1 - \sin^2 t) = \frac{3a}{2} \cos^2 t.
 \end{aligned}$$

Für t gleich 0 wird s dem Quadranten BA der Astroide gleich, nämlich

$$(29.) \quad s = \frac{3a}{2}.$$

Der ganze Umfang der Astroide ist daher

$$U = 6a.$$

Da der Punkt P die ganze Kurve durchläuft, wenn t alle Werte von 0 bis 2π annimmt, so hätte es nahe gelegen,

$$U = \pm 3a \int_0^{2\pi} \sin t \cos t dt$$

zu setzen. Dann, hätte man aber einen Fehler gemacht, wie man schon daraus erkennt, daß der Wert dieses Integrals gleich Null sein würde, gleichviel ob man das obere oder das untere Vorzeichen nimmt. Der Fehler ist dadurch entstanden, daß man bei der Wurzelauziehung aus

$$ds^2 = 9a^2 \sin^2 t \cos^2 t dt^2$$

für alle Werte von t dasselbe Vorzeichen genommen hat, während das Vorzeichen in verschiedenen Quadranten verschieden ist. Durchläuft nämlich der Punkt P die Kurve nicht in der Richtung B nach A , sondern von A nach B usw. bis nach A zurück, so wächst der Bogen s gleichzeitig mit t , d. h. ds und dt haben stets gleiches Zeichen. Darauf muß man bei der Wurzelauziehung achten. Liegt t zwischen 0 und $\frac{\pi}{2}$, so muß man

$$ds = +3a \sin t \cos t dt$$

setzen, weil $\sin t$ und $\cos t$ beide positiv sind. Liegt dagegen t zwischen $\frac{\pi}{2}$ und π , so muß man

$$ds = -3a \sin t \cos t dt$$

setzen, weil $\sin t$ positiv und $\cos t$ negativ ist. Liegt t zwischen π und $\frac{3\pi}{2}$, so muß man

$$ds = + 3a \sin t \cos t dt$$

setzen, weil $\sin t$ und $\cos t$ beide negativ sind; und liegt t zwischen $\frac{3\pi}{2}$ und 2π , so muß man wieder

$$ds = - 3a \sin t \cos t dt$$

setzen, weil $\sin t$ negativ und $\cos t$ positiv ist.

Deshalb wird der Umfang der Astroide

$$\begin{aligned} U &= 3a \left[+ \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin t \cos t dt - \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \sin t \cos t dt + \int_{\pi}^{\frac{3\pi}{2}} \sin t \cos t dt \right. \\ &\quad \left. - \int_{\frac{3\pi}{2}}^{2\pi} \sin t \cos t dt \right] \\ &= \frac{3a}{2} \left(\left[\sin^2 t \right]_0^{\frac{\pi}{2}} - \left[\sin^2 t \right]_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} + \left[\sin^2 t \right]_{\pi}^{\frac{3\pi}{2}} - \left[\sin^2 t \right]_{\frac{3\pi}{2}}^{2\pi} \right); \end{aligned}$$


dies gibt

$$U = \frac{3a}{2} (1 + 1 + 1 + 1) = 6a.$$

Dieses Beispiel möge zeigen, wie vorsichtig man sein muß, um bei der Bildung von ds durch Wurzelausziehung aus ds^2 das Vorzeichen richtig zu bestimmen.

Aufgabe 7. Man soll die Länge des Bogens AP der Kreisevolvente mit den Gleichungen

Fig. 85.



$$(30.) \quad \begin{cases} x = a(\cos t + t \sin t), \\ y = a(\sin t - t \cos t) \end{cases}$$

berechnen (Fig. 85).

Auflösung. Aus den Gleichungen (30.) folgt

$$(31.) \quad \begin{cases} dx = at \cos t dt, \\ dy = at \sin t dt, \end{cases}$$

$$(32.) \quad ds^2 = dx^2 + dy^2 = a^2 t^2 (\cos^2 t + \sin^2 t) dt^2 = a^2 t^2 dt^2,$$

$$(33.) \quad ds = at dt,$$

$$(34.) \quad s = a \int_0^t t dt = \frac{at^2}{2}.$$

Aufgabe 8. Man soll die Länge des Bogens AP bei den *Epizykloiden* mit den Gleichungen

$$(35.) \quad x = a[m \cos t - \cos(mt)], \quad y = a[m \sin t - \sin(mt)]$$

berechnen (Fig. 86).

Auflösung. Aus den Gleichungen (35.) folgt

$$(36.) \quad dx = ma[-\sin t + \sin(mt)]dt, \quad dy = ma[\cos t - \cos(mt)]dt;$$

dies gibt, wenn man wieder $m - 1$ mit n bezeichnet,

$$(37.) \quad ds^2 = dx^2 + dy^2 = 2m^2 a^2 [1 - \cos(nt)] dt^2$$

$$= 4m^2 a^2 \sin^2\left(\frac{nt}{2}\right) dt^2,$$

$$(38.) \quad ds = 2ma \sin\left(\frac{nt}{2}\right) dt = \frac{4ma}{n} \sin\left(\frac{nt}{2}\right) d\left(\frac{nt}{2}\right),$$

$$(39.) \quad s = \frac{4ma}{n} \int_0^{(t)} \sin\left(\frac{nt}{2}\right) d\left(\frac{nt}{2}\right) = \frac{4ma}{n} \left[-\cos\left(\frac{nt}{2}\right) \right]_0^t$$

$$= \frac{4ma}{n} \left[1 - \cos\left(\frac{nt}{2}\right) \right] = \frac{8ma}{n} \sin^2\left(\frac{nt}{4}\right).$$


Wird der Wälzungswinkel nt des rollenden Kreises gleich 2π , so erhält man für den vollständigen Bogen ACB (Fig. 86)

$$(40.) \quad s = \frac{8ma}{n} = \frac{8(n+1)a}{n}.$$

Ist n eine ganze Zahl, so schließt sich die Kurve; ihr Umfang U besteht aus n solchen Bögen, so daß man erhält

$$(41.) \quad U = 8(n+1)a.$$

Fig. 86.



$$(49.) \quad s = \frac{8ma}{n} = \frac{8(n-1)a}{n}.$$

Ist n eine ganze Zahl, so schließt sich die Kurve; ihr Umfang U besteht dann aus n solchen Bögen, so daß man erhält

$$(50.) \quad U = 8(n-1)a.$$

Für den in Figur 87 gewählten Fall, in welchem n gleich 3 ist, erhält man z. B.

$$(51.) \quad U = 16a.$$

Bei der *Astroide* hat man n gleich 4 zu setzen und erhält

$$(52.) \quad U = 24a.$$

Aufgabe 10. Man soll die Bogenlänge bei der *Neilschen Parabel* berechnen (Fig. 88).

Auflösung. Die Evolute der Parabel

$$(53.) \quad y^2 = 2px$$

ist bekanntlich (vergl. D.-R., Seite 473)

$$(54.) \quad F(x, y) = 27py^2 - 8(x-p)^3 = 0,$$

(eine Kurve, welche man auch die „*Neilsche Parabel*“ nennt. Zur Berechnung der Bogenlänge bei dieser Kurve bilde man zunächst

$$(55.) \quad F_1 = -24(x-p)^2, \quad F_2 = 54py,$$

folglich wird

$$(56.) \quad \frac{dy}{dx} = -\frac{F_1}{F_2} = +\frac{4(x-p)^2}{9py},$$

also mit Rücksicht auf Gleichung (54.)


$$(57.) \quad \left(\frac{ds}{dx}\right)^2 = 1 + \frac{16(x-p)^4}{81p^2y^2} = 1 + \frac{2(x-p)}{3p} = \frac{p+2x}{3p},$$

$$(57a.) \quad \frac{ds}{dx} = \frac{\sqrt{p+2x}}{\sqrt{3p}}.$$

Setzt man daher

$$(58.) \quad \sqrt{p+2x} = t, \quad \text{also} \quad p+2x = t^2, \quad dx = t dt,$$

Fig. 88.



so erhält man

$$(59) \quad s = \frac{1}{\sqrt{3p}} \int_p^x \sqrt{p+2x} \, dx = \frac{1}{\sqrt{3p}} \int_{(p)}^{(x)} t^2 dt = \frac{1}{3\sqrt{3p}} [t^3]_{(p)}^{(x)},$$

oder

$$(60.) \quad s = \frac{1}{3\sqrt{3p}} [(2x+p)\sqrt{2x+p} - 3p\sqrt{3p}].$$

§ 28.

Rektifikation ebener Kurven, deren Gleichung auf Polarkoordinaten bezogen ist.


(Vergl. die Formel-Tabelle Nr. 140.)

Bei Anwendung von Polarkoordinaten sei die Gleichung einer Kurve AP (Fig. 89)

$$(1.) \quad r = F(\varphi),$$

dann ist auch die Länge s des Bogens AP eine Funktion von φ , denn der Bogen wächst gleichzeitig mit dem Winkel

Fig. 89.



φ . Nimmt man sogleich an, daß der Zuwachs POP_1 von φ verschwindend klein wird, und bezeichnet denselben dementsprechend mit $d\varphi$, so wird auch der Zuwachs PP_1 oder ds des Bogens verschwindend klein. Beschreibt man daher um O mit dem Halbmesser OP gleich r einen Kreisbogen PQ , so kann man das rechtwinklige Dreieck PQP_1 als

ein *geradliniges* Dreieck betrachten und findet nach dem Pythagoräischen Lehrsatz, wie auch schon früher gezeigt wurde,

$$\overline{PP_1}^2 = \overline{QP_1}^2 + \overline{PQ}^2,$$

oder (vergl. D.-R., Formel Nr. 158 der Tabelle)

$$(2.) \quad ds^2 = dr^2 + r^2 d\varphi^2.$$

Dies gibt

$$(3.) \quad ds = \sqrt{dr^2 + r^2 d\varphi^2} = d\varphi \sqrt{\left(\frac{dr}{d\varphi}\right)^2 + r^2},$$

also, wenn man die Grenzen sogleich mit φ_1 und φ_2 bezeichnet,

$$(4.) \quad s = \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} ds = \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} d\varphi \sqrt{\left(\frac{dr}{d\varphi}\right)^2 + r^2}.$$

Man kann natürlich statt φ auch andere Integrations-Veränderliche einführen. Sind z. B. r und φ beide Funktionen von t , so folgt aus Gleichung (3.)

$$(5.) \quad ds = \sqrt{dr^2 + r^2 d\varphi^2} = dt \sqrt{\left(\frac{dr}{dt}\right)^2 + r^2 \left(\frac{d\varphi}{dt}\right)^2},$$

und für t gleich r

$$(6.) \quad ds = dr \sqrt{1 + r^2 \left(\frac{d\varphi}{dr}\right)^2};$$

dies gibt

$$(7.) \quad s = \int_{r_1}^{r_2} dr \sqrt{1 + r^2 \left(\frac{d\varphi}{dr}\right)^2} = \int_{t_1}^{t_2} dt \sqrt{\left(\frac{dr}{dt}\right)^2 + r^2 \left(\frac{d\varphi}{dt}\right)^2}.$$

§ 29.

Übungs-Aufgaben.

Aufgabe 1. Man soll die Länge des Bogens bei der *Archimedischen Spirale* mit der Gleichung

$$(1.) \quad r = a\varphi$$

berechnen (Fig. 90).

Fig. 90.

Auflösung. Aus Gleichung (1.) folgt


$$(2.) \quad dr = a d\varphi,$$

$$ds^2 = dr^2 + r^2 d\varphi^2$$

$$= a^2(1 + \varphi^2) d\varphi^2,$$

folglich wird

$$(3.) \quad ds = a d\varphi \sqrt{1 + \varphi^2},$$



$$(4.) \quad s = a \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} d\varphi \sqrt{1 + \varphi^2}.$$

Dies gibt nach Formel Nr. 129 der Tabelle


$$(5.) \quad s = a \left[\frac{\varphi}{2} \sqrt{1 + \varphi^2} + \frac{1}{2} \operatorname{Ar} \operatorname{Sin} \varphi \right]_{\varphi_1}^{\varphi_2} \\ = a \left[\frac{\varphi}{2} \sqrt{1 + \varphi^2} + \frac{1}{2} \ln(\varphi + \sqrt{1 + \varphi^2}) \right]_{\varphi_1}^{\varphi_2},$$

oder

$$(5a.) \quad s = \frac{a}{2} \left[\varphi_2 \sqrt{1 + \varphi_2^2} - \varphi_1 \sqrt{1 + \varphi_1^2} + \ln \left(\frac{\varphi_2 + \sqrt{1 + \varphi_2^2}}{\varphi_1 + \sqrt{1 + \varphi_1^2}} \right) \right] \\ = \frac{r_2 \sqrt{a^2 + r_2^2} - r_1 \sqrt{a^2 + r_1^2}}{2a} + \frac{a}{2} \ln \left(\frac{r_2 + \sqrt{a^2 + r_2^2}}{r_1 + \sqrt{a^2 + r_1^2}} \right).$$

Aufgabe 2. Man soll die Länge des Bogens bei der *hyperbolischen Spirale* mit der Gleichung

Fig. 91.



(6.) $r\varphi = a$, oder $r = a\varphi^{-1}$,
berechnen (Fig. 91).

Auflösung. Aus Gleichung (6.)

folgt

$$(7.) \quad dr = -a\varphi^{-2} d\varphi,$$

$$(8.) \quad ds^2 = dr^2 + r^2 d\varphi^2 \\ = a^2(\varphi^{-4} + \varphi^{-2}) d\varphi^2,$$

$$(9.) \quad ds = \frac{a}{\varphi^2} \sqrt{1 + \varphi^2} \cdot d\varphi,$$

$$(10.) \quad s = a \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} \frac{d\varphi \sqrt{1 + \varphi^2}}{\varphi^2} = a \left[\int_{\varphi_1}^{\varphi_2} \frac{d\varphi}{\varphi^2 \sqrt{1 + \varphi^2}} + \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} \frac{d\varphi}{\sqrt{1 + \varphi^2}} \right].$$

Dies gibt nach den Formeln Nr. 40 und 35 der Tabelle

$$(11.) \quad s = a \left[-\frac{\sqrt{1 + \varphi^2}}{\varphi} + \ln(\varphi + \sqrt{1 + \varphi^2}) \right]_{\varphi_1}^{\varphi_2} \\ = \left[-\sqrt{a^2 + r^2} + a \ln \left(\frac{a + \sqrt{a^2 + r^2}}{r} \right) \right]_{r_1}^{r_2},$$

also

$$(12.) \quad s = \sqrt{a^2 + r_1^2} - \sqrt{a^2 + r_2^2} + a \ln \left(\frac{r_1(a + \sqrt{a^2 + r_2^2})}{r_2(a + \sqrt{a^2 + r_1^2})} \right).$$

Aufgabe 3. Man soll die Länge des Bogens bei der *logarithmischen Spirale* mit der Gleichung

$$(13.) \quad r = e^{a\varphi},$$

berechnen (Fig. 92).

Auflösung. Aus Gleichung (13.)

folgt

$$(14.) \quad dr = e^{a\varphi} \cdot a d\varphi = ar d\varphi,$$

oder

$$(14a.) \quad d\varphi = \frac{dr}{ar},$$

$$(15.) \quad ds^2 = dr^2 + r^2 d\varphi^2 = dr^2 \left(1 + \frac{1}{a^2} \right),$$

$$(16.) \quad ds = dr \sqrt{1 + \frac{1}{a^2}} = \frac{dr}{a} \sqrt{a^2 + 1};$$

dies gibt

$$(17.) \quad s = \frac{\sqrt{a^2 + 1}}{a} \int_{r_1}^{r_2} dr = \frac{r_2 - r_1}{a} \sqrt{a^2 + 1}.$$

Aufgabe 4. Man soll die Länge des Bogens AP bei der *Parabel* mit der Gleichung

$$(18.) \quad r^{-\frac{1}{2}} = a^{-\frac{1}{2}} \cos\left(-\frac{\varphi}{2}\right), \text{ oder } r = \frac{a}{\cos^2\left(\frac{\varphi}{2}\right)}$$

berechnen (Fig. 93).

Auflösung. Aus Gleichung (18.) folgt

$$(19.) \quad dr = \frac{a \sin\left(\frac{\varphi}{2}\right) d\varphi}{\cos^3\left(\frac{\varphi}{2}\right)}.$$

$$(20.) \quad ds^2 = dr^2 + r^2 d\varphi^2 = \frac{a^2 d\varphi^2}{\cos^6\left(\frac{\varphi}{2}\right)},$$

Fig. 92.





Fig. 93.



$$(21.) \quad ds = \frac{a d\varphi}{\cos^3\left(\frac{\varphi}{2}\right)},$$

also, wenn man $\varphi = 2t$ setzt und die Formeln Nr. 103 und 48 der Tabelle beachtet,


$$(22.) \quad s = 2a \int_0^{\varphi} \frac{d\left(\frac{\varphi}{2}\right)}{\cos^3\left(\frac{\varphi}{2}\right)} = 2a \int_0^t \frac{dt}{\cos^3 t} \\ = 2a \left[\frac{\sin t}{2\cos^2 t} + \frac{1}{2} \ln \left\{ \operatorname{ctg} \left(\frac{\pi}{4} - \frac{t}{2} \right) \right\} \right]_0^t,$$

oder

$$(23.) \quad s = \frac{a \sin\left(\frac{\varphi}{2}\right)}{\cos^2\left(\frac{\varphi}{2}\right)} + a \ln \left[\operatorname{ctg} \left(\frac{\pi - \varphi}{4} \right) \right].$$

Aufgabe 5. Man soll die Länge des Bogens AP bei der *Kardioide* mit der Gleichung

Fig. 94.



$$(24.) \quad r^{\frac{1}{2}} = a^{\frac{1}{2}} \cos\left(\frac{\varphi}{2}\right),$$

oder

$$(24a.) \quad r = a \cos^2\left(\frac{\varphi}{2}\right)$$

berechnen (Fig. 94).

Auflösung. Aus Gleichung (24a.) folgt

$$(25.) \quad dr = -a \cos\left(\frac{\varphi}{2}\right) \sin\left(\frac{\varphi}{2}\right) d\varphi,$$

$$(26.) \quad ds^2 = dr^2 + r^2 d\varphi^2$$

$$= a^2 \cos^2\left(\frac{\varphi}{2}\right) \left[\sin^2\left(\frac{\varphi}{2}\right) + \cos^2\left(\frac{\varphi}{2}\right) \right] d\varphi^2 = a^2 \cos^2\left(\frac{\varphi}{2}\right) d\varphi^2,$$

$$(27.) \quad ds = a \cos\left(\frac{\varphi}{2}\right) d\varphi = 2a \cos\left(\frac{\varphi}{2}\right) d\left(\frac{\varphi}{2}\right),$$

$$(28.) \quad s = 2a \int_0^{\varphi} \cos\left(\frac{\varphi}{2}\right) d\left(\frac{\varphi}{2}\right) = 2a \sin\left(\frac{\varphi}{2}\right).$$

Für φ gleich π erhält man die Länge des Bogens APQ , nämlich

$$(29.) \quad s = 2a,$$

d. h. der Bogen APQ ist dem Durchmesser des in Figur 94 der Kardioiden umschriebenen Kreises gleich.

Aufgabe 6. Man soll die Länge des Bogens OP bei der Zissoide mit der Gleichung

$$(30.) \quad r = \frac{2a \sin^2 \varphi}{\cos \varphi}$$

berechnen (Fig. 95).

Auflösung. Aus Gleichung (30.) folgt

$$(31.) \quad dr = \frac{2a \sin \varphi (1 + \cos^2 \varphi) d\varphi}{\cos^2 \varphi},$$

$$(32.) \quad ds^2 = dr^2 + r^2 d\varphi^2 = \frac{4a^2 \sin^2 \varphi (1 + 3 \cos^2 \varphi) d\varphi^2}{\cos^4 \varphi},$$

also

$$(33.) \quad ds = \frac{2a \sin \varphi d\varphi \sqrt{1 + 3 \cos^2 \varphi}}{\cos^2 \varphi}.$$

Setzt man

$$(34.) \quad \sqrt{3} \cdot \cos \varphi = t,$$

also

$$-\sqrt{3} \sin \varphi d\varphi = dt,$$


so wird

$$(35.) \quad ds = -\frac{2a \sqrt{3} \cdot dt \sqrt{1 + t^2}}{t^2},$$

$$(36.) \quad s = -2a \sqrt{3} \int_{(0)}^{(\varphi)} \frac{dt \sqrt{1 + t^2}}{t^2}$$

$$= -2a \sqrt{3} \left(\int_{(0)}^{(\varphi)} \frac{dt}{t^2 \sqrt{1 + t^2}} + \int_{(0)}^{(\varphi)} \frac{dt}{\sqrt{1 + t^2}} \right),$$

Fig. 95.



folglich erhält man mit Rücksicht auf die Formeln Nr. 40 und 35 der Tabelle

$$(37.) \quad s = -2a\sqrt{3} \left[-\frac{\sqrt{1+t^2}}{t} + \ln(t + \sqrt{1+t^2}) \right]_{(0)}^{(\varphi)},$$

oder

$$(38.) \quad s = 2a \left[\frac{\sqrt{1+3\cos^2\varphi}}{\cos\varphi} - 2 - \sqrt{3} \cdot \ln \left(\frac{\sqrt{3} \cdot \cos\varphi + \sqrt{1+3\cos^2\varphi}}{2 + \sqrt{3}} \right) \right].$$

VIII. Abschnitt.

Komplanation der Rotationsflächen.

§ 30.

Berechnung des Flächen-Elementes bei einer Rotationsfläche.


(Vergl. die Formel-Tabelle Nr. 141 und 142.)

Rotiert eine Kurve mit der Gleichung

$$(1.) \quad y = f(x)$$

um die X -Achse, so beschreibt der Bogen AP (Fig. 96) eine Rotationsfläche, deren Oberfläche O eine Funktion von x ist. Wächst nämlich x um die Größe QQ_1 gleich Δx , so wächst auch die Oberfläche um denjenigen Teil ΔO der Rotationsfläche, welcher bei der Rotation von dem Bogen PP_1 beschrieben wird.

Fig. 96.



Zur Berechnung von ΔO betrachte man zunächst den Mantel des Kegelstumpfes, welcher bei der Rotation von der Sehne PP_1 gleich Δs beschrieben wird. Der Mantel dieses Kegelstumpfes ist nach bekannten Sätzen aus der Stereometrie

$$(2.) \quad \begin{aligned} M &= \pi(QP + Q_1P_1) \cdot PP_1 \\ &= \pi(y + y_1) \cdot \Delta s. \end{aligned}$$

Rückt nun der Punkt P_1 dem Punkte P unendlich nahe, so fällt der Bogen PP_1 mit der Sehne PP_1 zusammen; dabei geht Δs über in ds , und $\lim y_1$ wird gleich y ; folglich findet man für das *Oberflächen-Element* dO aus Gleichung (2.)

$$(3.) \quad dO = 2\pi y ds.$$

Daraus ergibt sich durch Integration

$$(4.) \quad O = 2\pi \int_{x_1}^{x_2} y ds,$$

wobei die Grenzen mit x_1 und x_2 bezeichnet sind, weil man x als die Integrations-Veränderliche betrachtet.

Auch hier kann man das bestimmte Integral als Summe von unendlich vielen, unendlich kleinen Größen betrachten, oder, strenger gefaßt, als Grenzwert einer Summe, bei der die einzelnen Summanden ins Unbegrenzte abnehmen, wodurch gleichzeitig ihre Anzahl ins Unbegrenzte wächst. Denn durch Schnitte, senkrecht zur Rotations-Achse, wird die Fläche in „Zonen“ zerlegt. Werden diese Zonen dadurch, daß die Anzahl der Schnitte ins Unbegrenzte wächst, unendlich schmal, so geht jede dieser Zonen über in den Mantel eines Kegelstumpfes mit der Seitenkante ds , begrenzt von zwei Kreisen mit den Halbmessern y und $y + dy$.

Rotiert die Kurve um die Y -Achse, so erhält man in ähnlicher Weise für den Flächeninhalt der Rotationsoberfläche durch Vertauschung von x mit y

$$(5.) \quad O = 2\pi \int_{y_1}^{y_2} x ds.$$

Die auf diese Weise ausgeführte Berechnung der Oberfläche nennt man „*Komplanation der Rotationsflächen*“.

§ 31.

Übungs-Aufgaben.

Aufgabe 1. Man soll den Flächeninhalt einer *Kugelzone* berechnen (Fig. 97).

Auflösung. Rotiert der Bogen P_1P_2 des Kreises mit der Gleichung

$$(1.) \quad x^2 + y^2 = a^2, \text{ oder } x = \sqrt{a^2 - y^2}$$

um die Y -Achse, so beschreibt er eine Kugelzone, deren Oberfläche nach Formel Nr. 142 der Tabelle

$$(2.) \quad O = 2\pi \int_{y_1}^{y_2} x ds$$

wird. Dabei folgt aus Gleichung (1.)

$$(3.) \quad dx = -\frac{y dy}{\sqrt{a^2 - y^2}},$$

$$(4.) \quad ds^2 = \frac{(y^2 + a^2 - y^2) dy^2}{a^2 - y^2} \\ = \frac{a^2 dy^2}{a^2 - y^2},$$

$$(5.) \quad ds = \frac{a dy}{\sqrt{a^2 - y^2}} = \frac{a dy}{x},$$

$$(6.) \quad x ds = a dy,$$

$$(7.) \quad O = 2a\pi \int_{y_1}^{y_2} dy = 2a\pi(y_2 - y_1) = 2a\pi h,$$

wenn man die Höhe $y_2 - y_1$ der Kugelzone wieder mit h bezeichnet.

Setzt man y_2 gleich $+a$, y_1 gleich $-a$, also h gleich $2a$, so erhält man für die Oberfläche der ganzen Kugel

$$(8.) \quad O = 4a^2\pi.$$

Aufgabe 2. Man soll die Oberfläche des *Rotationsparaboloids* berechnen (Fig. 98).

Auflösung. Die Gleichung der Parabel ist

$$(9.) \quad y^2 = 2px;$$

daraus folgt

$$(10.) \quad \frac{dy}{dx} = \frac{p}{y},$$

$$(11.) \quad \left(\frac{ds}{dx}\right)^2 = \frac{p^2 + y^2}{y^2} = \frac{p^2 + 2px}{y^2},$$

Fig. 97.





Fig. 98.



$$(11a.) \quad \frac{ds}{dx} = \frac{1}{y} \sqrt{p^2 + 2px},$$

$$(12.) \quad yds = dx \sqrt{p^2 + 2px}.$$

Setzt man

$$(13.) \quad \sqrt{p^2 + 2px} = t, \quad \text{also} \quad p^2 + 2px = t^2, \quad p dx = t dt,$$

so wird

$$(14.) \quad yds = \frac{t^2 dt}{p},$$

also nach Formel Nr. 141 der Tabelle

$$(15.) \quad O = 2\pi \int_0^x yds = \frac{2\pi}{p} \int_{(0)}^{(x)} t^2 dt = \frac{2\pi}{3p} [(\sqrt{p^2 + 2px})^3]_0^x.$$


Dies gibt mit Rücksicht auf Gleichung (9.)

$$(16.) \quad O = \frac{2\pi}{3p} [(p^2 + y^2) \sqrt{p^2 + y^2} - p^3].$$

Aufgabe 3. Man soll die Oberfläche des *Rotations-ellipsoids* berechnen (Fig. 99).

Auflösung. Die Gleichung der Ellipse ist

Fig. 99.



$$(17.) \quad b^2 x^2 + a^2 y^2 - a^2 b^2 = 0;$$

daraus folgt

$$(18.) \quad \frac{dy}{dx} = -\frac{b^2 x}{a^2 y},$$

$$(19.) \quad \left(\frac{ds}{dx}\right)^2 = \frac{a^4 y^2 + b^4 x^2}{a^4 y^2} = \frac{b^2(a^4 - e^2 x^2)}{a^4 y^2},$$

$$(20.) \quad \frac{ds}{dx} = \frac{b}{a^2 y} \sqrt{a^4 - e^2 x^2},$$

$$(21.) \quad yds = \frac{b \cdot dx}{a^2} \sqrt{a^4 - e^2 x^2} = \frac{b \cdot d(ex)}{a^2 e} \sqrt{a^4 - e^2 x^2},$$

$$(22.) \quad O = \frac{2b\pi}{a^2 e} \int_{(x_1)}^{(x_2)} d(ex) \sqrt{a^4 - e^2 x^2}.$$

Dies gibt nach Formel Nr. 123 der Tabelle, wenn man a^2 mit a^4 und x mit ex vertauscht,

$$(23.) \quad O = \frac{2b\pi}{a^2e} \left[\frac{ex}{2} \sqrt{a^4 - e^2x^2} + \frac{a^4}{2} \arcsin\left(\frac{ex}{a^2}\right) \right]_{x_1}^{x_2}.$$

Für x_2 gleich a wird

$$\sqrt{a^4 - e^2x_2^2} = a\sqrt{a^2 - e^2} = ab;$$

deshalb erhält man, indem man Gleichung (23.) mit 2 multipliziert und x_1 gleich 0 setzt, für die ganze Oberfläche des Rotationsellipsoids

$$(24.) \quad \begin{aligned} O &= \frac{2b\pi}{a^2e} \left[a^2be + a^4 \arcsin\left(\frac{e}{a}\right) \right] \\ &= 2b^2\pi + \frac{2a^2b\pi}{e} \arcsin\left(\frac{e}{a}\right). \end{aligned}$$

Man kann sich davon überzeugen, daß der gefundene Ausdruck die Oberfläche der Kugel liefert, wenn die rotierende Ellipse in einen Kreis übergeht, wenn man also a gleich b und e gleich 0 macht. Allerdings nimmt dann das zweite Glied die Form $\frac{0}{0}$ an; setzt man aber

$$e = az,$$

so findet man nach der Regel, welche für die Berechnung von solchen unbestimmten Ausdrücken in D.-R., Seite 353 angegeben ist,

$$(25.) \quad \lim_{e=0} \left[\frac{a}{e} \arcsin\left(\frac{e}{a}\right) \right] = \lim_{z=0} \frac{\arcsin z}{z} = \lim_{z=0} \frac{\frac{1}{\sqrt{1-z^2}}}{1} = 1$$

und


$$(26.) \quad \lim_{b=a} O = 2a^2\pi + 2a^2\pi = 4a^2\pi.$$

Aufgabe 4. Man soll die Oberfläche des *Sphäroids* berechnen (Fig. 100).

Auflösung. Aus der Gleichung (17.) der Ellipse folgt

$$(27.) \quad \frac{dx}{dy} = -\frac{a^2y}{b^2x},$$

Fig. 100.



$$(28.) \quad \left(\frac{ds}{dy}\right)^2 = 1 + \frac{a^4 y^2}{b^4 x^2} = \frac{b^4 x^2 + a^4 y^2}{b^4 x^2} = \frac{a^2(b^4 + e^2 y^2)}{b^4 x^2},$$

$$(29.) \quad \frac{ds}{dy} = \frac{a}{b^2 x} \sqrt{b^4 + e^2 y^2},$$

$$(30.) \quad x ds = \frac{a \cdot dy}{b^2} \sqrt{b^4 + e^2 y^2} = \frac{a \cdot d(ey)}{b^2 e} \sqrt{b^4 + e^2 y^2},$$

$$(31.) \quad O = \frac{2a\pi}{b^2 e} \int_{(y_1)}^{(y_2)} d(ey) \sqrt{b^4 + e^2 y^2}.$$

Dies gibt nach Formel Nr. 129 der Tabelle, wenn man a^2 mit b^4 und x mit ey vertauscht,

$$(32.) \quad O = \frac{2a\pi}{b^2 e} \left[\frac{ey}{2} \sqrt{b^4 + e^2 y^2} + \frac{b^4}{2} \ln \left(\frac{ey + \sqrt{b^4 + e^2 y^2}}{b^2} \right) \right]_{y_1}^{y_2}.$$

Für y_2 gleich b wird

$$\sqrt{b^4 + e^2 y_2^2} = b \sqrt{b^2 + e^2} = ab;$$

deshalb erhält man, indem man Gleichung (32.) mit 2 multipliziert und y_1 gleich 0 setzt, für die ganze Oberfläche des Sphäroids

$$(33.) \quad O = \frac{2a\pi}{b^2 e} \left[ab^2 e + b^4 \ln \left(\frac{be + ab}{b^2} \right) \right] \\ = 2a^2 \pi + \frac{2ab^2 \pi}{e} \ln \left(\frac{a + e}{b} \right).$$

Nun ist

$$\frac{(a + e)^2}{b^2} = \frac{(a + e)^2}{a^2 - e^2} = \frac{a + e}{a - e},$$

folglich kann man den Ausdruck für O auch auf die Form bringen

$$(34.) \quad O = 2a^2 \pi + \frac{ab^2 \pi}{e} \ln \left(\frac{a + e}{a - e} \right).$$

Auch hier kann man sich davon überzeugen, daß der gefundene Ausdruck die Oberfläche der Kugel liefert, wenn die rotierende Ellipse in den Kreis übergeht, wenn man also a gleich b und e gleich 0 macht. Allerdings nimmt das zweite Glied wieder die unbestimmte Form $\frac{0}{0}$ an; setzt man aber

$$e = az,$$

so findet man nach der Regel, welche für die Berechnung von solchen unbestimmten Formen in D.-R., Seite 353 angegeben ist,

$$(35.) \lim_{e=0} \frac{a}{e} \ln \left(\frac{a+e}{a-e} \right) = \lim_{z=0} \frac{\ln \left(\frac{1+z}{1-z} \right)}{z} = \lim_{z=0} \frac{\ln(1+z) - \ln(1-z)}{z}$$


$$= \lim_{z=0} \frac{\frac{1}{1+z} + \frac{1}{1-z}}{1} = 2$$

und

$$(36.) \lim_{b=a} O = 2a^2\pi + a^2\pi \cdot 2 = 4a^2\pi.$$

Aufgabe 5. Man soll die Oberfläche des *zweischaligen Rotationshyperboloids* berechnen (Fig. 101).

Fig. 101.



Auflösung. Die Gleichung der Hyperbel ist

$$(37.) \quad b^2x^2 - a^2y^2 - a^2b^2 = 0;$$

daraus folgt

$$(38.) \quad \frac{dy}{dx} = \frac{b^2x}{a^2y},$$

$$(39.) \quad \left(\frac{ds}{dx} \right)^2 = \frac{a^4y^2 + b^4x^2}{a^4y^2} = \frac{b^2(e^2x^2 - a^4)}{a^4y^2},$$

$$(40.) \quad \frac{ds}{dx} = \frac{b}{a^2y} \sqrt{e^2x^2 - a^4},$$

$$(41.) \quad yds = \frac{b \cdot dx}{a^2} \sqrt{e^2x^2 - a^4} = \frac{b \cdot d(ex)}{a^2e} \sqrt{e^2x^2 - a^4},$$

$$(42.) \quad O = \frac{2b\pi}{a^2e} \int_{(x_1)}^{(x_2)} d(ex) \sqrt{e^2x^2 - a^4}.$$

Dies gibt nach Formel Nr. 129 a der Tabelle, wenn man a^2 mit a^4 und x mit ex vertauscht,

$$(43.) \quad O = \frac{2b\pi}{a^2e} \left[\frac{ex}{2} \sqrt{e^2x^2 - a^4} - \frac{a^4}{2} \ln \left(\frac{ex + \sqrt{e^2x^2 - a^4}}{a^2} \right) \right]_{x_1}^{x_2}.$$

Setzt man x_1 gleich a und x_2 gleich x , so wird


$$\sqrt{e^2x_1^2 - a^4} = a \sqrt{e^2 - a^2} = ab,$$

und man erhält für die von dem Bogen AP bei der Rotation beschriebene Fläche

$$(44.) \quad O = \frac{bx\pi}{a^2} \sqrt{e^2x^2 - a^4} - b^2\pi - \frac{a^2b\pi}{e} \ln \left(\frac{ex + \sqrt{e^2x^2 - a^4}}{a(e+b)} \right).$$

Aufgabe 6. Man soll die Oberfläche des *einschaligen Rotationshyperboloids* berechnen (Fig. 102).

Fig. 102.



Auflösung. Aus der Gleichung (37.) der Hyperbel folgt

$$(45.) \quad \frac{dx}{dy} = \frac{a^2y}{b^2x},$$

$$(46.) \quad \left(\frac{ds}{dy} \right)^2 = \frac{b^4x^2 + a^4y^2}{b^4x^2} = \frac{a^2(b^4 + e^2y^2)}{b^4x^2};$$

$$(47.) \quad \frac{ds}{dy} = \frac{a}{b^2x} \sqrt{b^4 + e^2y^2},$$

$$(48.) \quad xds = \frac{a \cdot dy}{b^2} \sqrt{b^4 + e^2y^2} = \frac{a \cdot d(ey)}{b^2e} \sqrt{b^4 + e^2y^2},$$

$$(49.) \quad O = \frac{2a\pi}{b^2e} \int_{(y_1)}^{(y_2)} d(ey) \sqrt{b^4 + e^2y^2}.$$

Dies gibt nach Formel Nr. 129 der Tabelle, wenn man a^2 mit b^4 und x mit ey vertauscht,

$$(50.) \quad O = \frac{2a\pi}{b^2e} \left[\frac{ey}{2} \sqrt{b^4 + e^2y^2} + \frac{b^4}{2} \ln \left(\frac{ey + \sqrt{b^4 + e^2y^2}}{b^2} \right) \right]_{y_1}^{y_2}.$$

Für y_1 gleich 0, y_2 gleich y erhält man daher

$$(51.) \quad O = \frac{ay\pi}{b^2} \sqrt{b^4 + e^2 y^2} + \frac{ab^2\pi}{e} \ln \left(\frac{ey + \sqrt{b^4 + e^2 y^2}}{b^2} \right).$$

Aufgabe 7. Man soll die Oberfläche des Körpers berechnen, welcher durch Rotation der Kettenlinie mit der Gleichung

$$(52.) \quad y = \frac{a}{2} \left(e^{\frac{x}{a}} + e^{-\frac{x}{a}} \right) = a \mathfrak{C}o\mathfrak{h} \left(\frac{x}{a} \right),$$

oder

$$(52a.) \quad \pm \sqrt{y^2 - a^2} = \frac{a}{2} \left(e^{\frac{x}{a}} - e^{-\frac{x}{a}} \right) = a \mathfrak{S}i\mathfrak{n} \left(\frac{x}{a} \right)$$

um die X -Achse entsteht (Fig. 103).

Auflösung. Aus Gleichung

(52.) folgt

$$(53.) \quad \frac{ds}{dx} = \frac{1}{2} \left(e^{\frac{x}{a}} + e^{-\frac{x}{a}} \right) = \mathfrak{C}o\mathfrak{h} \left(\frac{x}{a} \right),$$

$$(54.) \quad O = 2\pi \int_{x_1}^{x_2} y ds = 2a\pi \int_{x_1}^{x_2} \mathfrak{C}o\mathfrak{h}^2 \left(\frac{x}{a} \right) dx \\ = 2a^2\pi \int_{t_1}^{t_2} \mathfrak{C}o\mathfrak{h}^2 t dt,$$

wenn man $x = at$ setzt. Dies gibt nach Formel Nr. 113 der Tabelle

$$O = 2a^2\pi \left[\frac{1}{2} \mathfrak{C}o\mathfrak{h} \left(\frac{x}{a} \right) \mathfrak{S}i\mathfrak{n} \left(\frac{x}{a} \right) + \frac{1}{2} \frac{x}{a} \right]_{x_1}^{x_2},$$

oder mit Rücksicht auf die Gleichungen (52.) und (52a.)

$$(55.) \quad O = \pi [y \sqrt{y^2 - a^2} + ax]_{x_1}^{x_2} \\ = \pi [y_2 \sqrt{y_2^2 - a^2} \mp y_1 \sqrt{y_1^2 - a^2} + a(x_2 - x_1)].$$

Hierbei gilt das obere oder das untere Vorzeichen, je nachdem x_1 positiv oder negativ ist.

Aufgabe 8. Man soll die Oberfläche des Körpers berechnen, welcher durch Rotation der Zykloide

Fig. 103.





Fig. 104.



$$(56.) \quad \begin{cases} x = a(t - \sin t), \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases}$$

um die X -Achse entsteht (Fig. 104).

Auflösung. Aus den Gleichungen (56.) folgt

$$(57.) \quad ds = 2a \sin\left(\frac{t}{2}\right) dt,$$

$$(58.) \quad y ds = 2a^2(1 - \cos t) \sin\left(\frac{t}{2}\right) dt = 4a^2 \sin^3\left(\frac{t}{2}\right) dt.$$

Dies gibt

$$\begin{aligned} (59.) \quad 0 &= 16a^2\pi \int_0^t \sin^3\left(\frac{t}{2}\right) d\left(\frac{t}{2}\right) \\ &= -16a^2\pi \int_0^t \left[1 - \cos^2\left(\frac{t}{2}\right)\right] d\cos\left(\frac{t}{2}\right) \\ &= -16a^2\pi \left[\cos\left(\frac{t}{2}\right) - \frac{1}{3}\cos^3\left(\frac{t}{2}\right)\right]_0^t \\ &= \frac{16a^2\pi}{3} \left[2 - 3\cos\left(\frac{t}{2}\right) + \cos^3\left(\frac{t}{2}\right)\right]. \end{aligned}$$

Für t gleich 2π erhält man die Oberfläche, welche bei der Rotation von dem ganzen Zykloidenbogen OHA beschrieben wird, nämlich

$$(60.) \quad O = \frac{16a^2\pi}{3} (2 + 3 - 1) = \frac{64a^2\pi}{3}.$$

Aufgabe 9. Man soll die Oberfläche des Körpers berechnen, welcher durch Rotation der *Astroide*

$$(61.) \quad x = a \cos^3 t, \quad y = a \sin^3 t$$

um die X -Achse entsteht (Fig. 105).

Auflösung. Aus den Gleichungen (61.) folgt

$$(62.) \quad ds = -3a \sin t \cos t dt,$$

$$(63.) \quad y ds = -3a^2 \sin^4 t \cos t dt.$$

Dies gibt für die ganze Oberfläche

$$(64.) \quad O = -12a^2\pi \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \sin^4 t \cos t \, dt,$$

oder

$$(65.) \quad O = +12a^2\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 t \cdot d(\sin t) = \frac{12a^2\pi}{5} [\sin^5 t]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{12a^2\pi}{5}.$$

Durchläuft t alle Werte von 0 bis π , so durchläuft der zugehörige Kurvenpunkt P , von A anfangend, die ganze obere Hälfte der Astroide. Trotzdem darf man bei Berechnung der ganzen Oberfläche nicht

$$O = 6a^2\pi \int_0^{\pi} \sin^4 t \cos t \, dt$$

setzen. Denn, da nach dieser Festsetzung ds und dt gleiches

Vorzeichen haben, so muß man im *ersten* Quadranten

$$ds = +3a \sin t \cos t \, dt$$

setzen; im *zweiten* Quadranten dagegen muß man

$$ds = -3a \sin t \cos t \, dt$$

setzen. (Vergl. die Ausführungen bei der Rektifikation der Astroide auf Seite 183 und 184.)

Aufgabe 10. Man soll die Oberfläche des Körpers berechnen, welcher durch Rotation der *Kreisevolvente*

$$(66.) \quad x = a(\cos t + t \sin t), \quad y = a(\sin t - t \cos t)$$

um die X -Achse entsteht.

Auflösung. Aus den Gleichungen (66.) folgt


$$(67.) \quad ds = a \, dt.$$

Da s mit t zugleich wächst, so haben ds und dt hier stets dasselbe Vorzeichen. Ferner ist

$$(68.) \quad y \, ds = a^2(t \sin t - t^2 \cos t) \, dt,$$

$$(69.) \quad O = 2a^2\pi \int_0^t (t \sin t - t^2 \cos t) \, dt.$$

Fig. 105.



Setzt man

(70.) $u = t^2$, $dv = \cos t dt$, also $du = 2t dt$, $v = \sin t$
in die Formel Nr. 98 der Tabelle, nämlich in die Gleichung

$$(71.) \quad \int u dv = uv - \int v du$$

ein, so erhält man

$$(72.) \quad \int t^2 \cos t dt = t^2 \sin t - 2 \int t \sin t dt.$$

Setzt man dagegen

(73.) $u = t$, $dv = \sin t dt$, also $du = dt$, $v = -\cos t$
in die Gleichung (71.) ein, so ergibt sich

$$(74.) \quad \int t \sin t dt = -t \cos t + \int \cos t dt = -t \cos t + \sin t.$$

Indem man Gleichung (72.) mit -1 , Gleichung (74.) mit $+3$ multipliziert und dann beide Gleichungen addiert, findet man

$$(75.) \quad \int t \sin t dt - \int t^2 \cos t dt = -t^2 \sin t - 3t \cos t + 3 \sin t.$$

Deshalb wird

$$(76.) \quad O = 2a^2 \pi (3 \sin t - 3t \cos t - t^2 \sin t).$$

Bezeichnet man denjenigen Wert von t , für welchen (bei wachsendem t) y zum ersten Male gleich Null wird, mit t_0 , so darf in Gleichung (76.) t alle Werte von $t = 0$ bis $t = t_0$ annehmen. Wird t größer als t_0 , so wird y und infolgedessen auch $y ds$ negativ. Deshalb wird auch

$$2\pi \int_{t_0}^t y ds$$

negativ, solange für die betrachteten Werte von t der Wert von y negativ bleibt. Damit man für diesen Teil der Oberfläche einen positiven Wert erhält, muß man daher für das entsprechende Intervall

$$O = -2\pi \int_{t_0}^t y ds$$

setzen.

Aufgabe 11. Man soll die Oberfläche des Körpers berechnen, welcher durch Rotation der *Kardioide*

$$(77.) \quad y = a[2 \cos t - \cos(2t)], \quad y = a[2 \sin t - \sin(2t)]$$

um die X -Achse entsteht.

Auflösung. Aus den Gleichungen (77.) folgt

$$(78.) \quad dx = 2a[-\sin t + \sin(2t)]dt = 4a \sin\left(\frac{t}{2}\right) \cos\left(\frac{3t}{2}\right) dt,$$

$$(79.) \quad dy = 2a[\cos t - \cos(2t)]dt = 4a \sin\left(\frac{t}{2}\right) \sin\left(\frac{3t}{2}\right) dt,$$

also

$$(80.) \quad ds^2 = 16a^2 \sin^2\left(\frac{t}{2}\right) dt^2, \quad ds = 4a \sin\left(\frac{t}{2}\right) dt,$$

$$(81.) \quad yds = 4a^2[2\sin t - \sin(2t)] \sin\left(\frac{t}{2}\right) dt$$

$$= 8a^2 \sin t (1 - \cos t) \sin\left(\frac{t}{2}\right) dt$$

$$= 32a^2 \sin^4\left(\frac{t}{2}\right) \cos\left(\frac{t}{2}\right) dt = 64a^2 \sin^4\left(\frac{t}{2}\right) d \sin\left(\frac{t}{2}\right).$$

Dies gibt, da yds positiv bleibt, wenn t alle Werte von 0 bis π annimmt,

$$(82.) \quad \begin{aligned} 0 &= 128a^2\pi \int_{(0)}^{(\pi)} \sin^4\left(\frac{t}{2}\right) d \sin\left(\frac{t}{2}\right) \\ &= \frac{128a^2\pi}{5} \left[\sin^5\left(\frac{t}{2}\right) \right]_0^\pi = \frac{128a^2\pi}{5}. \end{aligned}$$

IX. Abschnitt.

Rektifikation der Raumkurven.

§ 32.

Berechnung des Bogen-Elementes einer Raumkurve.

(Vergl. die Formel-Tabelle Nr. 143.)

Der Durchschnitt zweier krummen Flächen mit den Gleichungen

$$(1.) \quad F(x, y, z) = 0 \quad \text{und} \quad G(x, y, z) = 0$$

ist im allgemeinen eine Raumkurve (vergl. § 145 und 46 der D.-R.). Indem man aus den beiden Gleichungen (1.) die Veränderliche z eliminiert, erhält man

$$(2.) \quad H(x, y) = 0, \quad \text{oder} \quad y = f(x).$$

Dies ist die Gleichung eines Zylinders, welcher die Schnittkurve in die XY -Ebene projiziert. Ebenso findet man durch Elimination der Veränderlichen y aus den Gleichungen (1.)

$$(3.) \quad K(x, z) = 0, \quad \text{oder} \quad z = g(x).$$

Dies ist die Gleichung eines Zylinders, welcher die Schnittkurve in die XZ -Ebene projiziert. Da die Raumkurve, die durch die beiden Gleichungen (1.) erklärt wird, auf diesen beiden Zylindern liegt, so ist sie auch die Schnittkurve dieser beiden Zylinder, oder wenigstens ein Teil davon. Die beiden Zylinder können nämlich möglicherweise auch noch andere Kurvenstücke gemeinsam haben, die *nicht* mit der durch die Gleichungen (1.) gegebenen Kurve zusammenfallen.

Setzt man noch für x irgendeine Funktion von einer vierten Veränderlichen t , so werden mit Rücksicht auf die

Gleichungen (2.) und (3.) auch y und z Funktionen von t , so daß man die Raumkurve auch durch die drei Gleichungen

$$(4.) \quad x = f_1(t), \quad y = f_2(t), \quad z = f_3(t)$$

darstellen kann. Umgekehrt lassen sich drei solche Gleichungen auch immer als Raumkurve geometrisch deuten.

Um nun die Länge s des Kurvenbogens AP zu bestimmen, nehme man auf der Kurve zwei benachbarte Punkte P und P_1 an und lege durch jeden derselben drei Ebenen, parallel zu den Koordinaten-Ebenen (Fig. 106). Dann erhält man ein rechtwinkliges Parallelepipedon mit den Kanten

$$x_1 - x, \quad y_1 - y, \quad z_1 - z$$

und mit der Diagonale

$$(5.) \quad \overline{PP_1} = \sqrt{(x_1 - x)^2 + (y_1 - y)^2 + (z_1 - z)^2}.$$

Rücken die Punkte P und P_1 einander unendlich nahe, so fällt der Bogen PP_1 mit der Sehne PP_1 zusammen, die Größen

$$PP_1, \quad x_1 - x, \quad y_1 - y, \quad z_1 - z$$

gehen bezw. über in

$$ds, \quad dx, \quad dy, \quad dz,$$

und aus der Gleichung (5.) ergibt sich

$$(6.) \quad ds^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2.$$


Daraus folgt für die Länge des Bogens zwischen zwei bestimmten Punkten der Raumkurve, die den Parameterwerten $t = t_1$ und $t = t_2$ entsprechen,

$$(7.) \quad s = \int ds = \int \sqrt{dx^2 + dy^2 + dz^2} = \int_{t_1}^{t_2} dt \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dt}\right)^2}.$$

Für t gleich x wird z. B.

$$(8.) \quad s = \int_{x_1}^{x_2} dx \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dx}\right)^2}.$$

Fig. 106.



§ 33.

Übungs - Aufgaben.

Aufgabe 1. Man soll die Bogenlänge bei der *zylindrischen Schraubenlinie* (vergl. D.-R., Seite 672 und 673)

$$(1.) \quad x^2 + y^2 = a^2, \quad y = x \operatorname{tg}\left(\frac{z}{c}\right)$$

berechnen.

Auflösung. In dem vorliegenden Falle wird es zweckmäßig sein, x , y und z als Funktionen einer einzigen Veränderlichen φ^*) auszudrücken, indem man

$$(2.) \quad x = a \cos \varphi$$

setzt, dann folgt aus den Gleichungen (1.)

$$(3.) \quad y = a \sin \varphi, \quad z = c\varphi,$$

und man erhält

$$(4.) \quad dx = -a \sin \varphi d\varphi, \quad dy = a \cos \varphi d\varphi, \quad dz = c d\varphi,$$

$$(5.) \quad ds^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2 = (a^2 + c^2) d\varphi^2,$$

$$(6.) \quad ds = d\varphi \sqrt{a^2 + c^2},$$

$$(7.) \quad s = \sqrt{a^2 + c^2} \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} d\varphi = (\varphi_2 - \varphi_1) \sqrt{a^2 + c^2}.$$

Dieses Resultat ergibt sich auch daraus, daß die Schraubenlinie entsteht, indem man ein rechtwinkliges Dreieck mit den Katheten $a\varphi$, $c\varphi$ und der Hypotenuse $\varphi\sqrt{a^2 + c^2}$ auf den Kreiszylinder

$$x^2 + y^2 = a^2$$

so aufwickelt, daß die Kathete $a\varphi$ mit der Basiskurve (d. h. mit dem Kreise) zusammenfällt. Die Hypotenuse bildet dann die Schraubenlinie.

Aufgabe 2. Man soll die Bogenlänge bei der *konischen Spirale*

$$(8.) \quad x = e^{a\varphi} \cos \varphi, \quad y = e^{a\varphi} \sin \varphi, \quad z = ce^{a\varphi}$$

berechnen.

*) Der Parameter ist hier nicht mit t , sondern mit φ bezeichnet, weil er mit dem Argument φ bei Polarkoordinaten übereinstimmt.

Auflösung. Die Projektion der Kurve in die XY -Ebene ist eine Kurve, bei welcher φ der Winkel zwischen der X -Achse und dem Radius vektor ist, denn aus den Gleichungen (8.) folgt

$$(9.) \quad \frac{y}{x} = \operatorname{tg} \varphi.$$

Die Projektion hat daher in Polarkoordinaten die Gleichung

$$(10.) \quad x^2 + y^2 = r^2 = e^{2a\varphi}, \quad \text{oder} \quad r = e^{a\varphi},$$

d. h. die konische Spirale liegt auf einem Zylinder, welcher auf der XY -Ebene senkrecht steht und die *logarithmische Spirale* zur Basiskurve hat. Außerdem folgt aus den Gleichungen (8.)

$$(11.) \quad x^2 + y^2 - \frac{z^2}{c^2} = 0;$$

die konische Spirale liegt also auch auf einem Kreiskegel, dessen Spitze in dem Anfangspunkt der Koordinaten liegt, und dessen Achse mit der Z -Achse zusammenfällt.

Aus den Gleichungen (8.) findet man

$$(12.) \quad \begin{cases} dx = e^{a\varphi}(a \cos \varphi - \sin \varphi) d\varphi, \\ dy = e^{a\varphi}(a \sin \varphi + \cos \varphi) d\varphi, \\ dz = e^{a\varphi} \cdot a c d\varphi. \end{cases}$$

Dies gibt

$$(13.) \quad ds^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2 = e^{2a\varphi}(a^2 + 1 + a^2 c^2) d\varphi^2,$$

$$(14.) \quad ds = e^{a\varphi} \cdot d\varphi \sqrt{1 + a^2 + a^2 c^2},$$

$$(15.) \quad s = \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} e^{a\varphi} \cdot d\varphi \sqrt{1 + a^2 + a^2 c^2} = \frac{1}{a} \sqrt{1 + a^2 + a^2 c^2} (e^{a\varphi_2} - e^{a\varphi_1}),$$

oder

$$(16.) \quad s = \frac{z_2 - z_1}{ac} \sqrt{1 + a^2 + a^2 c^2}.$$

Für einen ganzen Umgang wird

$$(17.) \quad \varphi_2 = \varphi_1 + 2\pi, \quad z_2 = ce^{a(\varphi_1 + 2\pi)} = z_1 \cdot e^{2a\pi},$$

also

$$(18.) \quad s = \frac{z_1}{ac} (e^{2a\pi} - 1) \sqrt{1 + a^2 + a^2 c^2}.$$

Aufgabe 3. Man soll die Bogenlänge einer Raumkurve dritten Grades mit den Gleichungen

$$(19.) \quad x = 2a^2t, \quad y = 3abt^2, \quad z = 3b^2t^3$$

berechnen, wobei a und b zwei beliebige konstante Größen sind.

Auflösung. Aus den Gleichungen (19.) findet man

$$(20.) \quad dx = 2a^2dt, \quad dy = 6abt\,dt, \quad dz = 9b^2t^2dt,$$

folglich wird

$$(21.) \quad ds^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2 = (4a^4 + 36a^2b^2t^2 + 81b^4t^4)dt^2 \\ = (2a^2 + 9b^2t^2)^2 \cdot dt^2,$$

also

$$(22.) \quad ds = (2a^2 + 9b^2t^2)dt.$$

Macht man den Anfangspunkt der Koordinaten, durch den die Kurve hindurchgeht, auch zum Anfangspunkte des Kurvenbogens, so erhält man

$$(23.) \quad s = \int_0^t (2a^2 + 9b^2t^2)dt = 2a^2t + 3b^2t^3 = x + z.$$

Zweiter Teil.

X. Abschnitt.

Integration der gebrochenen rationalen Funktionen.

§ 34.

Echt gebrochene und unecht gebrochene rationale Funktionen.

Wie schon in der Differential-Rechnung (Seite 15 und 16) gezeigt wurde, läßt sich jede *gebrochene* rationale Funktion als Quotient zweier *ganzen* rationalen Funktionen darstellen, d. h. sie läßt sich auf die Form

$$(1.) \frac{F(x)}{f(x)} = \frac{Ax^m + A_1x^{m-1} + A_2x^{m-2} + \dots + A_{m-1}x + A_m}{ax^n + a_1x^{n-1} + a_2x^{n-2} + \dots + a_{n-1}x + a_n}$$

bringen. Hierbei sind die Koeffizienten $A, A_1, A_2, \dots, a, a_1, a_2, \dots$ beliebige (reelle oder komplexe) konstante Zahlen, und die Exponenten m und n sind beliebige *positive ganze* Zahlen. Hätten $F(x)$ und $f(x)$ einen gemeinsamen Teiler $\vartheta(x)$, wäre also

$$F(x) = \vartheta(x)F_1(x) \quad \text{und} \quad f(x) = \vartheta(x)f_1(x),$$

so könnte man in Gleichung (1.) Zähler und Nenner durch $\vartheta(x)$ dividieren und erhielte

$$\frac{F_1(x)}{f_1(x)} = \frac{F(x)}{f(x)};$$

es soll daher angenommen werden, daß $F(x)$ und $f(x)$ keinen gemeinsamen Teiler haben. Den Koeffizienten a der höchsten Potenz von x im Nenner kann man immer gleich 1

machen, weil man, wenn a von 1 verschieden ist, Zähler und Nenner des Bruches durch a dividieren kann. Der Nenner $f(x)$ soll daher in dem folgenden immer die Form

$$(2.) \quad f(x) = x^n + a_1 x^{n-1} + a_2 x^{n-2} + \dots + a_{n-1} x + a_n$$

haben.

Man teilt die gebrochenen rationalen Funktionen in echt gebrochene und unecht gebrochene rationale Funktionen ein, und zwar heißt eine gebrochene rationale Funktion „echt gebrochen“, wenn der Grad des Zählers kleiner ist als der Grad des Nenners; sie heißt dagegen „unecht gebrochen“, wenn der Grad des Zählers größer oder mindestens ebenso groß ist wie der Grad des Nenners.

Hiernach ist die durch Gleichung (1.) erklärte Funktion $\frac{F(x)}{f(x)}$ echt gebrochen, wenn $m < n$, und sie ist unecht gebrochen, wenn $m \geq n$ ist.

Satz 1. Jede unecht gebrochene rationale Funktion läßt sich als die Summe einer ganzen und einer echt gebrochenen rationalen Funktion darstellen. Es ist also

$$(3.) \quad \frac{F(x)}{f(x)} = g(x) + \frac{\varphi(x)}{f(x)},$$

wo $g(x)$ eine ganze rationale Funktion und der Grad von $\varphi(x)$ kleiner ist als der von $f(x)$.

Der Beweis des Satzes ergibt sich einfach durch Division. Ist nämlich bei der Division von $F(x)$ durch $f(x)$ der Quotient gleich $g(x)$ und der Rest gleich $\varphi(x)$, so ist

$$(4.) \quad F(x) = f(x)g(x) + \varphi(x),$$

wobei der Grad des Restes $\varphi(x)$ kleiner gemacht werden kann als der Grad des Divisors $f(x)$. Aus Gleichung (4.) ergibt sich sofort

$$(5.) \quad \frac{F(x)}{f(x)} = g(x) + \frac{\varphi(x)}{f(x)}.$$

Am besten erkennt man das Verfahren aus einem Beispiele. Es sei

$$\frac{F(x)}{f(x)} = \frac{x^3 + 9x^2 + 12x - 16}{x^2 + 2x - 3},$$

dann erhält man durch Division

$$\begin{array}{r}
 x^3 + 9x^2 + 12x - 16 = (x^2 + 2x - 3)(x + 7) + (x + 5), \\
 x^3 + 2x^2 - 3x \\
 \hline
 + 7x^2 + 15x - 16 \\
 + 7x^2 + 14x - 21 \\
 \hline
 x + 5
 \end{array}$$

also

$$(6.) \quad \frac{x^3 + 9x^2 + 12x - 16}{x^2 + 2x - 3} = (x + 7) + \frac{x + 5}{x^2 + 2x - 3}.$$

In ähnlicher Weise findet man

$$(7.) \quad \frac{2x^4 - 3x^3 - 6x^2 + 34x - 9}{x^2 - 3x + 4} = (2x^2 + 3x - 5) + \frac{7x + 11}{x^2 - 3x + 4}.$$

Sind $\frac{\varphi_1(x)}{f_1(x)}$ und $\frac{\varphi_2(x)}{f_2(x)}$ zwei echt gebrochene rationale

Funktionen, bei denen $f_1(x)$ den Grad n_1 und $f_2(x)$ den Grad n_2 haben möge, so daß der Grad von $\varphi_1(x)$ höchstens $n_1 - 1$ und der von $\varphi_2(x)$ höchstens $n_2 - 1$ sein kann, so ist

$$(8.) \quad \frac{\varphi_1(x)}{f_1(x)} + \frac{\varphi_2(x)}{f_2(x)} = \frac{\varphi_1(x) \cdot f_2(x) + \varphi_2(x) \cdot f_1(x)}{f_1(x) \cdot f_2(x)}$$

wieder eine echt gebrochene rationale Funktion, denn der Nenner hat den Grad $n_1 + n_2$, während jedes der Produkte $\varphi_1(x) \cdot f_2(x)$ und $\varphi_2(x) \cdot f_1(x)$ und deshalb auch ihre Summe höchstens den Grad $n_1 + n_2 - 1$ hat. Eine ähnliche Betrachtung gilt für die Differenz zweier echt gebrochenen rationalen Funktionen. Dies gibt

Satz 2. *Die Summe oder Differenz zweier echt gebrochenen rationalen Funktionen ist wieder eine echt gebrochene rationale Funktion.*

Dieser Satz läßt sich unmittelbar auf die algebraische Summe von beliebig vielen echt gebrochenen rationalen Funktionen übertragen.

§ 35.

Zerlegung der echt gebrochenen rationalen Funktionen in Partialbrüche, wenn die Wurzeln der Gleichung $f(x) = 0$ sämtlich voneinander verschieden sind.

(Vergl. die Formel-Tabelle Nr. 144.)

Nach dem im vorhergehenden Paragraphen bewiesenen Satze kommt es bei der Integration der gebrochenen ratio-

nalen Funktionen nur auf die Integration der *echt* gebrochenen rationalen Funktionen an; denn, wäre die vorgelegte Funktion *unecht* gebrochen, so könnte man sie in eine *ganze* und in eine *echt* gebrochene rationale Funktion zerlegen. Die Integration der *ganzen* rationalen Funktionen ist aber bereits auf Seite 20 in § 4 erledigt.

Die Integration der *echt* gebrochenen rationalen Funktionen kann man durch *Zerlegung in Partialbrüche* ausführen, wobei der Generalnenner der einzelnen Partialbrüche $f(x)$ sein muß. Deshalb muß man hier die Zerlegung der ganzen rationalen Funktion $f(x)$ in lineare Faktoren benutzen. In § 112 der Differential-Rechnung (Seite 542) war nämlich der Satz bewiesen worden: *Jede ganze rationale Funktion n^{ten} Grades läßt sich in n lineare Faktoren zerlegen.* Es ist also

$$(1.) \quad f(x) = x^n + a_1 x^{n-1} + a_2 x^{n-2} + \dots + a_{n-1} x + a_n \\ = (x - x_1)(x - x_2)(x - x_3) \dots (x - x_n),$$

und $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ sind die Wurzeln der Gleichung

$$(2.) \quad f(x) = 0.$$

Für das Folgende muß man zwei Fälle unterscheiden, je nachdem diese Wurzeln $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ sämtlich voneinander verschieden sind oder nicht.

Hier möge zunächst der *erste Fall* behandelt werden, wo die Wurzeln der Gleichung (2.) sämtlich voneinander verschieden sind. Um die vielen Indizes zu vermeiden, mögen dabei diese Wurzeln mit a, b, c, \dots, k, l bezeichnet werden, so daß die Gleichung (1.) übergeht in

$$(3.) \quad f(x) = (x - a)(x - b)(x - c) \dots (x - k)(x - l).$$

Es soll dann gezeigt werden, daß die *echt* gebrochene rationale Funktion $\frac{\varphi(x)}{f(x)}$ auf die Form

$$(4.) \quad \frac{\varphi(x)}{f(x)} = \frac{A}{x - a} + \frac{B}{x - b} + \frac{C}{x - c} + \dots + \frac{K}{x - k} + \frac{L}{x - l}$$

gebracht werden kann, wobei die Zähler A, B, C, \dots, K, L der Partialbrüche konstante Größen sind*).

*) Für den Fall $n = 2$ ist die Zerlegung in Partialbrüche schon in § 13 durchgeführt worden.

Beweis. Es sei

$$(5.) \quad f_1(x) = \frac{f(x)}{x-a} = (x-b)(x-c) \dots (x-k)(x-l),$$

dann ist $f_1(x)$ nur noch eine ganze Funktion $(n-1)^{\text{ten}}$ Grades; ferner sei

$$(6.) \quad A = \frac{\varphi(a)}{f_1(a)}.$$

Nach diesen Festsetzungen wird die ganze rationale Funktion

$$(7.) \quad \varphi(x) - Af_1(x) = \frac{\varphi(x)f_1(a) - \varphi(a)f_1(x)}{f_1(a)},$$

deren Grad höchstens $n-1$ sein kann, gleich 0 für $x=a$, so daß nach Satz 2 in § 112 der D.-R. (Seite 541) $\varphi(x) - Af_1(x)$ durch $x-a$ teilbar sein muß. Man erhält also

$$(8.) \quad \varphi(x) - Af_1(x) = (x-a)\varphi_1(x),$$

oder

$$(8a.) \quad \varphi(x) = Af_1(x) + (x-a)\varphi_1(x),$$

wo $\varphi_1(x)$ eine ganze rationale Funktion von x ist, deren Grad höchstens gleich $n-2$ sein kann. Hieraus folgt

$$(9.) \quad \frac{\varphi(x)}{f(x)} = \frac{Af_1(x) + (x-a)\varphi_1(x)}{(x-a)f_1(x)} = \frac{A}{x-a} + \frac{\varphi_1(x)}{f_1(x)}.$$

Dabei ist $\frac{\varphi_1(x)}{f_1(x)}$ nach den gemachten Angaben wieder eine echt gebrochene rationale Funktion, welche aber einfacher ist als $\frac{\varphi(x)}{f(x)}$, denn $f_1(x)$ ist nur noch vom Grade $n-1$, und $\varphi_1(x)$ ist höchstens vom Grade $n-2$.

In derselben Weise kann man jetzt zeigen, daß

$$(10.) \quad \frac{\varphi_1(x)}{f_1(x)} = \frac{B}{x-b} + \frac{\varphi_2(x)}{f_2(x)},$$

wo $f_2(x)$ vom Grade $n-2$ und $\varphi_2(x)$ höchstens vom Grade $n-3$ ist. So kann man fortfahren und findet die Gleichungen

$$(11.) \quad \begin{cases} \frac{\varphi_2(x)}{f_2(x)} = \frac{C}{x-c} + \frac{\varphi_3(x)}{f_3(x)}, \\ \dots\dots\dots \\ \frac{\varphi_{n-2}(x)}{f_{n-2}(x)} = \frac{K}{x-k} + \frac{\varphi_{n-1}(x)}{f_{n-1}(x)}, \\ \frac{\varphi_{n-1}(x)}{f_{n-1}(x)} = \frac{L}{x-l}. \end{cases}$$

Addiert man die Gleichungen (9.), (10.) und (11.) und läßt die Glieder fort, welche auf *beiden* Seiten der Gleichung stehen, so erhält man

$$(12.) \quad \frac{\varphi(x)}{f(x)} = \frac{A}{x-a} + \frac{B}{x-b} + \frac{C}{x-c} + \dots + \frac{K}{x-k} + \frac{L}{x-l}.$$

Dieser Beweis liefert sogleich den Wert von A ; es ist nämlich

$$(13.) \quad A = \frac{\varphi(a)}{f_1(a)} = \frac{\varphi(a)}{(a-b)(a-c)\dots(a-k)(a-l)}.$$

In derselben Weise, wie A aus $\frac{\varphi(x)}{f(x)}$ berechnet ist, könnte man jetzt B aus $\frac{\varphi_1(x)}{f_1(x)}$, C aus $\frac{\varphi_2(x)}{f_2(x)}$, ... berechnen.

Dazu würde aber erstens die Bildung von $\frac{\varphi_1(x)}{f_1(x)}$, $\frac{\varphi_2(x)}{f_2(x)}$, ... erforderlich sein, und zweitens könnte man leicht glauben, daß die durch Gleichung (12.) erfolgte Zerlegung in Partialbrüche verschiedene Resultate liefere, je nachdem man zuerst das Glied $\frac{A}{x-a}$ oder ein anderes absondert. Dies ist aber nicht der Fall, es gilt vielmehr der Satz: *Die Zerlegung in Partialbrüche ist eindeutig*; d. h. die Werte von A, B, C, \dots, K, L sind unabhängig von der Reihenfolge, in der man sie herleitet. Multipliziert man nämlich Gleichung (12.) mit

$$f(x) = (x-a)(x-b)(x-c)\dots(x-k)(x-l),$$

so erhält man

$$\begin{aligned}
 (14.) \quad \varphi(x) = & A(x-b)(x-c)\dots(x-k)(x-l) \\
 & + B(x-a)(x-c)\dots(x-k)(x-l) \\
 & + C(x-a)(x-b)\dots(x-k)(x-l) \\
 & + \dots\dots\dots \\
 & + K(x-a)(x-b)\dots(x-i)(x-l) \\
 & + L(x-a)(x-b)\dots(x-i)(x-k)^*).
 \end{aligned}$$

Setzt man in dieser Gleichung der Reihe nach

$$x = a, \quad x = b, \quad x = c, \dots x = k, \quad x = l,$$

so wird

$$(15.) \quad \begin{cases} \varphi(a) = A(a-b)(a-c)\dots(a-k)(a-l), \\ \varphi(b) = B(b-a)(b-c)\dots(b-k)(b-l), \\ \varphi(c) = C(c-a)(c-b)\dots(c-k)(c-l), \\ \dots\dots\dots \\ \varphi(l) = L(l-a)(l-b)\dots(l-i)(l-k). \end{cases}$$

Dies gibt

$$(16.) \quad \begin{cases} A = \frac{\varphi(a)}{(a-b)(a-c)\dots(a-k)(a-l)}, \\ B = \frac{\varphi(b)}{(b-a)(b-c)\dots(b-k)(b-l)}, \\ C = \frac{\varphi(c)}{(c-a)(c-b)\dots(c-k)(c-l)}, \\ \dots\dots\dots \\ L = \frac{\varphi(l)}{(l-a)(l-b)\dots(l-i)(l-k)}. \end{cases}$$

Man erhält also für die Zähler der Partialbrüche genau dieselben Werte, gleichviel ob man mit der Absonderung des betreffenden Partialbruches anfängt oder nicht.

Die Gleichungen (16.) lassen sich noch etwas einfacher schreiben. Aus Gleichung (5.) folgt nämlich

$$f(x) = (x-a)f_1(x).$$

Differentiiert man beide Seiten dieser Gleichung, so erhält man

$$(17.) \quad f'(x) = (x-a)f_1'(x) + f_1(x),$$

und dies gibt für $x = a$

$$f'(a) = f_1(a).$$

*) In diesem Falle ist mit i nicht etwa $\sqrt{-1}$ gemeint, sondern ist hier eine Wurzel der Gleichung $f(x) = 0$.

Deshalb geht Gleichung (13.) über in

$$(18.) \quad A = \frac{\varphi(a)}{f'(a)}.$$

In entsprechender Weise findet man dann

$$(18a.) \quad B = \frac{\varphi(b)}{f'(b)}, \quad C = \frac{\varphi(c)}{f'(c)}, \quad \dots \quad K = \frac{\varphi(k)}{f'(k)}, \quad L = \frac{\varphi(l)}{f'(l)}.$$

Es war von vornherein die Voraussetzung gemacht worden, daß $f(x)$ und $\varphi(x)$ keinen gemeinsamen Teiler haben. Die vorstehenden Ausführungen würden zwar auch ohne diese Voraussetzung richtig bleiben, aber die Rechnung würde unnötigerweise umständlich werden. Hätten nämlich $f(x)$ und $\varphi(x)$ einen gemeinsamen Teiler, z. B. den gemeinsamen Teiler $x - a$, so würde der erste Partialbruch $\frac{A}{x-a}$ wegfallen, weil $\varphi(a)$ und deshalb auch A in diesem Falle gleich Null wären.

Für die Ausführung der numerischen Berechnung ist dasselbe Verfahren wie bei dem oben gegebenen Beweise am meisten geeignet; man schaffe also in Gleichung (12.) durch Multiplikation mit

$$f(x) = (x-a)(x-b)(x-c)\dots(x-k)(x-l)$$

die Nenner fort, um die Gleichung (14.) zu erhalten, aus der sich dann die Werte von $A, B, C, \dots K, L$ unmittelbar ergeben, indem man bezw.

$$x = a, \quad x = b, \quad x = c, \dots x = k, \quad x = l$$

einsetzt.

Man kann allerdings zur Berechnung der Größen $A, B, C, \dots K, L$ auch das folgende Verfahren anwenden, das später in dem allgemeineren Falle, wo die Wurzeln von $f(x)$ nicht alle voneinander verschieden sind, noch in Betracht kommen wird.

In Gleichung (14.) ist die linke Seite höchstens vom Grade $n-1$; ebenso ist die rechte Seite eine Funktion vom Grade $n-1$, die man sich nach Potenzen von x geordnet denken kann. Da die Gleichung für *alle* Werte von x gilt, so müssen die einzelnen Koeffizienten der linken

Seite gleich sein den gleichstelligen Koeffizienten auf der rechten Seite, welche lineare Funktionen (d. h. Funktionen ersten Grades) der n gesuchten Größen $A, B, C, \dots K, L$ sind. Nun hat aber eine Funktion $(n-1)^{\text{ten}}$ Grades im ganzen n Koeffizienten. Man erhält also n lineare Gleichungen mit n Unbekannten, welche sich, wie aus den vorstehenden Angaben folgt, stets auflösen lassen.

Am besten wird man dieses Verfahren durch die Behandlung einiger Aufgaben verstehen.

Aufgabe 1. Man soll den Bruch $\frac{15x^2 - 70x - 95}{x^3 - 6x^2 - 13x + 42}$ in Partialbrüche zerlegen.

Auflösung. Man setzt den Nenner gleich Null und erhält dadurch die Gleichung

$$(19.) \quad x^3 - 6x^2 - 13x + 42 = 0.$$

Löst man diese Gleichung auf, so ergeben sich folgende Wurzeln:

$$(20.) \quad a = 7, \quad b = -3, \quad c = 2.$$

deshalb wird

$$(21.) \quad x^3 - 6x^2 - 13x + 42 = (x - 7)(x + 3)(x - 2).$$

Hieraus folgt

$$(22.) \quad \frac{15x^2 - 70x - 95}{x^3 - 6x^2 - 13x + 42} = \frac{15x^2 - 70x - 95}{(x - 7)(x + 3)(x - 2)} \\ = \frac{A}{x - 7} + \frac{B}{x + 3} + \frac{C}{x - 2}.$$

Um die Werte von A, B und C zu ermitteln, schaffe man die Nenner fort, indem man Gleichung (22.) mit

$$x^3 - 6x^2 - 13x + 42 = (x - 7)(x + 3)(x - 2)$$

multipliziert. Dadurch erhält man

$$(23.) \quad 15x^2 - 70x - 95 = A(x + 3)(x - 2) \\ + B(x - 7)(x - 2) + C(x - 7)(x + 3).$$

Da diese Gleichung für alle Werte von x gilt, so findet man daraus für $x = 7$

$$150 = 50A, \quad \text{oder} \quad A = 3,$$

für $x = -3$

$$250 = 50B, \text{ oder } B = 5,$$

und für $x = 2$

$$-175 = -25C, \text{ oder } C = 7,$$

folglich wird

$$(24.) \quad \frac{15x^2 - 70x - 95}{x^3 - 6x^2 - 13x + 42} = \frac{3}{x-7} + \frac{5}{x+3} + \frac{7}{x-2}.$$

Man kann auch die rechte Seite von Gleichung (23.) nach fallenden Potenzen von x ordnen und erhält dann

$$(25.) \quad \begin{aligned} &15x^2 - 70x - 95 \\ &= x^2(A + B + C) + x(A - 9B - 4C) + (-6A + 14B - 21C). \end{aligned}$$

Diese Gleichung gilt für jeden Wert von x , folglich müssen die Koeffizienten gleicher Potenzen von x auf beiden Seiten dieser Gleichung einander gleich sein, d. h. es muß

$$(26.) \quad A + B + C = 15,$$

$$(27.) \quad A - 9B - 4C = -70,$$

$$(28.) \quad -6A + 14B - 21C = -95$$

sein. Löst man diese Gleichungen zwischen A , B und C auf, so ergibt sich wieder

$$(29.) \quad A = 3, \quad B = 5, \quad C = 7.$$

Zu demselben Resultate kommt man natürlich auch durch Anwendung der Gleichungen (18.) und (18a.), indem man

$$(30.) \quad A = \frac{\varphi(a)}{f'(a)}, \quad B = \frac{\varphi(b)}{f'(b)}, \quad C = \frac{\varphi(c)}{f'(c)}$$

setzt. In dem vorliegenden Falle ist

$$(31.) \quad a = 7, \quad b = -3, \quad c = 2$$

und

$$(32.) \quad f'(x) = 3x^2 - 12x - 13;$$

dies gibt

$$(33.) \quad \left\{ \begin{array}{l} A = \frac{q(7)}{f'(7)} = \frac{15 \cdot 49 - 70 \cdot 7 - 95}{3 \cdot 49 - 12 \cdot 7 - 13} = \frac{150}{50} = 3, \\ B = \frac{q(-3)}{f'(-3)} = \frac{15 \cdot 9 + 70 \cdot 3 - 95}{3 \cdot 9 + 12 \cdot 3 - 13} = \frac{250}{50} = 5, \\ C = \frac{q(2)}{f'(2)} = \frac{15 \cdot 4 - 70 \cdot 2 - 95}{3 \cdot 4 - 12 \cdot 2 - 13} = \frac{-175}{-25} = 7. \end{array} \right.$$

Aufgabe 2. Man soll die Funktion $\frac{x^2+1}{x^3-x}$ in Partialbrüche zerlegen.

Auflösung. Hier ist

$$(34.) \quad f(x) = x^3 - x = x(x-1)(x+1),$$

also

$$(35.) \quad \frac{q(x)}{f(x)} = \frac{x^2+1}{x^3-x} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x-1} + \frac{C}{x+1}.$$

Um die Größen A, B, C zu bestimmen, multipliziert man beide Seiten der Gleichung (35.) mit x^3-x und erhält

$$(36.) \quad x^2+1 = A(x^2-1) + B(x^2+x) + C(x^2-x).$$

Diese Gleichung gilt für alle Werte von x , deshalb findet man für $x=0$

$$(37.) \quad 1 = -A, \text{ oder } A = -1,$$

für $x=1$

$$(38.) \quad 2 = 2B, \text{ oder } B = +1$$

und für $x=-1$

$$(39.) \quad 2 = 2C, \text{ oder } C = +1;$$

folglich wird

$$(40.) \quad \frac{x^2+1}{x^3-x} = -\frac{1}{x} + \frac{1}{x-1} + \frac{1}{x+1}.$$

Ordnet man die rechte Seite von Gleichung (36.) nach fallenden Potenzen von x , so erhält man

$$(36a.) \quad x^2+1 = x^2(A+B+C) + x(B-C) - A.$$

Da die gleichstelligen Koeffizienten auf beiden Seiten dieser Gleichung einander gleich sein müssen, so zerfällt die Gleichung (36a.) in die Gleichungen

$$(41.) \quad \begin{cases} A + B + C = 1, \\ B - C = 0, \\ -A = 1. \end{cases}$$

Die Auflösung dieser Gleichungen gibt wieder

$$(42.) \quad A = -1, \quad B = 1, \quad C = 1.$$

Dasselbe Resultat erhält man auch, indem man

$$(43.) \quad A = \frac{\varphi(a)}{f'(a)}, \quad B = \frac{\varphi(b)}{f'(b)}, \quad C = \frac{\varphi(c)}{f'(c)},$$

$$(44.) \quad a = 0, \quad b = 1, \quad c = -1,$$

$$(45.) \quad f'(x) = 3x^2 - 1, \quad \varphi(x) = x^2 + 1$$

setzt, denn es wird

$$(46.) \quad \begin{cases} A = \frac{\varphi(0)}{f'(0)} = \frac{0+1}{0-1} = -1, \\ B = \frac{\varphi(1)}{f'(1)} = \frac{1+1}{3-1} = +1, \\ C = \frac{\varphi(-1)}{f'(-1)} = \frac{1+1}{3-1} = +1. \end{cases}$$

Aufgabe 3. Man soll die echt gebrochene rationale Funktion $\frac{4x^2 - 15x + 19}{(x-1)(x-2)(x-3)}$ in Partialbrüche zerlegen.

Auflösung. Hier ist

$$(47.) \quad \frac{4x^2 - 15x + 19}{(x-1)(x-2)(x-3)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x-2} + \frac{C}{x-3},$$

oder, wenn man beide Seiten der Gleichung mit

$$(x-1)(x-2)(x-3)$$

multipliziert,

$$(48.) \quad 4x^2 - 15x + 19 = A(x-2)(x-3) + B(x-1)(x-3) + C(x-1)(x-2).$$

Dies gibt für $x = 1$

$$8 = 2A, \quad \text{oder} \quad A = 4,$$

für $x = 2$

$$5 = -B, \quad \text{oder} \quad B = -5$$

und für $x = 3$

$$10 = 2C, \quad \text{oder} \quad C = 5,$$

also

$$(49.) \quad \frac{4x^2 - 15x + 19}{(x-1)(x-2)(x-3)} = \frac{4}{x-1} - \frac{5}{x-2} + \frac{5}{x-3}.$$

Aufgabe 4. Man soll die echt gebrochene rationale Funktion $\frac{1}{1+x-x^2}$ in Partialbrüche zerlegen.

Auflösung. Hier muß man erst Zähler und Nenner des Bruches mit -1 multiplizieren, damit der Koeffizient von x^2 im Nenner gleich $+1$ wird. Dadurch erhält man

$$(50.) \quad \frac{\varphi(x)}{f(x)} = \frac{-1}{x^2 - x - 1}.$$

Die beiden Wurzeln der Gleichung

$$(51.) \quad f(x) = x^2 - x - 1 = 0$$

sind

$$(52.) \quad a = \frac{1}{2}(1 + \sqrt{5}), \quad b = \frac{1}{2}(1 - \sqrt{5}).$$

Deshalb ist

$$(53.) \quad \frac{-1}{x^2 - x - 1} = \frac{A}{x - \frac{1}{2}(1 + \sqrt{5})} + \frac{B}{x - \frac{1}{2}(1 - \sqrt{5})},$$

oder

$$(54.) \quad \frac{-1}{x^2 - x - 1} = \frac{2A}{2x - 1 - \sqrt{5}} + \frac{2B}{2x - 1 + \sqrt{5}}.$$

Multipliziert man diese Gleichung mit

$$(2x - 1 - \sqrt{5})(2x - 1 + \sqrt{5}) = 4(x^2 - x - 1),$$

so erhält man

$$-4 = 2A(2x - 1 + \sqrt{5}) + 2B(2x - 1 - \sqrt{5}),$$

oder

$$(55.) \quad -2 = 2x(A + B) + A(-1 + \sqrt{5}) + B(-1 - \sqrt{5});$$

daraus folgt

$$(56.) \quad \begin{cases} A + B = 0, \\ A(1 - \sqrt{5}) + B(1 + \sqrt{5}) = 2, \end{cases}$$

oder

$$(57.) \quad A = -\frac{1}{\sqrt{5}}, \quad B = +\frac{1}{\sqrt{5}}.$$

Dies gibt

$$(58.) \quad \frac{1}{1+x-x^2} = \frac{2}{\sqrt{5}} \left(\frac{1}{2x-1+\sqrt{5}} - \frac{1}{2x-1-\sqrt{5}} \right).$$

Aufgabe 5. Man soll die gebrochene rationale Funktion $\frac{4x^4 - x^3 - 46x^2 - 20x + 153}{x^3 - 2x^2 - 9x + 18}$ in Partialbrüche zerlegen.

Auflösung. Die vorgelegte Funktion ist eine *unecht gebrochene*; deshalb muß man sie zunächst durch Division in eine *ganze* und eine *echt gebrochene* rationale Funktion zerlegen. Dadurch erhält man

$$(59.) \quad \frac{4x^4 - x^3 - 46x^2 - 20x + 153}{x^3 - 2x^2 - 9x + 18} = 4x + 7 + \frac{4x^2 - 29x + 27}{x^3 - 2x^2 - 9x + 18}.$$

Die Wurzeln der Gleichung

$$f(x) = x^3 - 2x^2 - 9x + 18 = 0$$

sind

$$(60.) \quad a = 2, \quad b = 3, \quad c = -3,$$

folglich wird

$$(61.) \quad f(x) = x^3 - 2x^2 - 9x + 18 = (x-2)(x-3)(x+3),$$

$$(62.) \quad \frac{4x^2 - 29x + 27}{(x-2)(x-3)(x+3)} = \frac{A}{x-2} + \frac{B}{x-3} + \frac{C}{x+3},$$

$$(63.) \quad \begin{aligned} &4x^2 - 29x + 27 \\ &= A(x-3)(x+3) + B(x-2)(x+3) + C(x-2)(x-3). \end{aligned}$$

Für $x = 2$ erhält man

$$(64.) \quad -15 = -5A, \quad \text{oder} \quad A = 3,$$

für $x = 3$

$$(65.) \quad -24 = 6B, \quad \text{oder} \quad B = -4$$

und für $x = -3$

$$(66.) \quad 150 = 30C, \quad \text{oder} \quad C = 5,$$

also

$$(67.) \quad \frac{4x^4 - x^3 - 46x^2 - 20x + 153}{x^3 - 2x^2 - 9x + 18} = 4x + 7 + \frac{3}{x-2} - \frac{4}{x-3} + \frac{5}{x+3}.$$

Die angegebene Methode für die Zerlegung in Partialbrüche bleibt richtig, gleichviel ob die Wurzeln der Gleichung $f(x) = 0$ reelle oder komplexe Größen*) sind.

Im letzteren Falle werden aber die Partialbrüche selbst eine komplexe Form annehmen, die man vermeiden kann, wenn die Koeffizienten von $\varphi(x)$ und $f(x)$ reell sind.

Wie dies geschieht, möge zunächst die folgende Aufgabe lehren.

Aufgabe 6. Man soll die echt gebrochene rationale Funktion $\frac{13x^2 - 68x + 95}{x^3 - 11x^2 + 43x - 65}$ in Partialbrüche zerlegen.

Auflösung. Indem man den Nenner gleich Null setzt, erhält man die Gleichung

$$x^3 - 11x^2 + 43x - 65 = 0$$

mit den Wurzeln

$$(68.) \quad a = 5, \quad b = 3 + 2\sqrt{-1}, \quad c = 3 - 2\sqrt{-1},$$

oder, wenn man $\sqrt{-1}$ mit i bezeichnet,

$$(68a.) \quad a = 5, \quad b = 3 + 2i, \quad c = 3 - 2i.$$

Demnach ist der Nenner der gebrochenen Funktion

$$(69.) \quad x^3 - 11x^2 + 43x - 65 = (x - 5)(x - 3 - 2i)(x - 3 + 2i).$$

Dies gibt

$$(70.) \quad \frac{13x^2 - 68x + 95}{x^3 - 11x^2 + 43x - 65} = \frac{A}{x - 5} + \frac{B}{x - 3 - 2i} + \frac{C}{x - 3 + 2i},$$

und wenn man beide Seiten dieser Gleichung mit

$$x^3 - 11x^2 + 43x - 65$$

multipliziert,

$$(71.) \quad 13x^2 - 68x + 95 = A(x - 3 - 2i)(x - 3 + 2i) \\ + B(x - 5)(x - 3 + 2i) \\ + C(x - 5)(x - 3 - 2i).$$

Dies gibt für $x = 5$

$$(72.) \quad 80 = A(2 - 2i)(2 + 2i) = 8A, \quad \text{oder} \quad A = 10,$$

für $x = 3 + 2i$

$$(73.) \quad -44 + 20i = (-2 + 2i)4i \cdot B, \quad \text{oder} \quad B = \frac{3 - 8i}{2}$$

und für $x = 3 - 2i$

*) Vergl. D.-R., § 103—111.

(74.) $-44 - 20i = -(-2 - 2i)4i \cdot C$, oder $C = \frac{3 + 8i}{2}$,
 folglich ist

$$(75.) \quad \frac{13x^2 - 68x + 95}{x^3 - 11x^2 + 43x - 65} = \frac{10}{x-5} + \frac{3-8i}{2(x-3-2i)} + \frac{3+8i}{2(x-3+2i)}.$$

Da die beiden letzten Glieder konjugiert komplexe Größen sind, so muß ihre Summe reell sein*). In der Tat, es ist

$$\frac{3-8i}{2(x-3-2i)} + \frac{3+8i}{2(x-3+2i)} = \frac{3x+7}{x^2-6x+13},$$

also

$$(76.) \quad \frac{13x^2 - 68x + 95}{x^3 - 11x^2 + 43x - 65} = \frac{10}{x-5} + \frac{3x+7}{x^2-6x+13}.$$

Ganz allgemein gilt nun folgendes. Sind in $f(x)$ die Koeffizienten reell, so treten die komplexen Wurzeln in $f(x) = 0$ bekanntlich paarweise auf**). Ist z. B. b gleich $g + hi$, so ist eine andere Wurzel, sie heiße c , gleich $g - hi$, also

$$(77.) \quad b = g + hi, \quad c = g - hi.$$

Sind nun auch in $\varphi(x)$ die Koeffizienten reell, so werden

$$(78.) \quad B = \frac{\varphi(b)}{f'(b)} = \frac{\varphi(g+hi)}{f'(g+hi)} \quad \text{und} \quad C = \frac{\varphi(c)}{f'(c)} = \frac{\varphi(g-hi)}{f'(g-hi)}$$

konjugiert komplexe Größen, etwa

$$B = G + Hi, \quad C = G - Hi;$$

folglich erhält man

$$(79.) \quad \frac{B}{x-b} + \frac{C}{x-c} = \frac{G+Hi}{x-g-hi} + \frac{G-Hi}{x-g+hi} = \frac{2G(x-g)-2Hh}{(x-g)^2 + h^2},$$

oder

$$(80.) \quad \frac{B}{x-b} + \frac{C}{x-c} = \frac{Px+Q}{(x-g)^2 + h^2},$$

wo

$$(81.) \quad P = 2G, \quad Q = -2Gg - 2Hh$$

reelle Größen sind.

*) Vergl. D.-R., Seite 512, Satz 1.

**) Vergl. D.-R., § 114.

Durch Anwendung der Gleichung (80.) kann man also bei der Partialbruch-Zerlegung die komplexen Größen ganz vermeiden.

In Aufgabe 6 hätte man z. B. setzen können

$$(82.) \quad \frac{13x^2 - 68x + 95}{x^3 - 11x^2 + 43x - 65} = \frac{A}{x-5} + \frac{Px + Q}{x^2 - 6x + 13}.$$

Multipliziert man beide Seiten dieser Gleichung mit

$$x^3 - 11x^2 + 43x - 65 = (x-5)(x^2 - 6x + 13),$$

so erhält man

$$(83.) \quad \begin{aligned} 13x^2 - 68x + 95 &= A(x^2 - 6x + 13) + P(x^2 - 5x) + Q(x - 5) \\ &= x^2(A + P) + x(-6A - 5P + Q) + (13A - 5Q). \end{aligned}$$

Daraus folgen die Gleichungen

$$(84.) \quad \begin{cases} A + P = +13, \\ -6A - 5P + Q = -68, \\ 13A - 5Q = +95. \end{cases}$$

Durch Auflösung dieser Gleichungen ergibt sich

$$(85.) \quad A = 10, \quad P = 3, \quad Q = 7,$$

und wenn man diese Werte in Gleichung (82.) einsetzt,

$$\frac{13x^2 - 68x + 95}{x^3 - 11x^2 + 43x - 65} = \frac{10}{x-5} + \frac{3x+7}{x^2 - 6x + 13}.$$

Dieses Resultat stimmt natürlich mit dem früheren überein.

Noch einfacher gestaltet sich die Rechnung durch die folgenden Überlegungen. Aus Gleichung (83.), nämlich aus der Gleichung

$$13x^2 - 68x + 95 = A(x^2 - 6x + 13) + P(x^2 - 5x) + Q(x - 5)$$

ergibt sich für $x = 5$

$$80 = 8A, \quad \text{oder} \quad A = 10;$$

und für solche Werte von x , für welche

$$(86.) \quad x^2 - 6x + 13 = 0, \quad \text{oder} \quad x^2 = 6x - 13$$

wird, erhält man weiter

$$(87.) \quad 10x - 74 = (P + Q)x - 13P - 5Q.$$

Da Gleichung (86.) für zwei Werte von x befriedigt wird, nämlich für

$$x = 3 + 2i \quad \text{und} \quad x = 3 - 2i,$$

so wird auch Gleichung (87.) für diese beiden Werte von

x befriedigt. Nun ist aber Gleichung (87.) nur vom *ersten* Grade, folglich müssen (nach D.-R., § 112, Satz 5a auf Seite 543) die gleichstelligen Koeffizienten auf beiden Seiten der Gleichung einander gleich sein, d. h. es wird

$$(88.) \quad P + Q = 10, \quad 13P + 5Q = 74, \quad \text{also} \quad P = 3, \quad Q = 7.$$

Wie sich dieses Verfahren allgemein durchführen läßt, mögen die folgenden Aufgaben zeigen.

Aufgabe 7. Man soll die echt gebrochene rationale Funktion $\frac{6x^2 - 25x + 89}{x^3 - 7x^2 + 32x - 60}$ in Partialbrüche zerlegen.

Auflösung. Indem man den Nenner

$$(89.) \quad x^3 - 7x^2 + 32x - 60 = 0$$

setzt, erhält man für die Wurzeln dieser Gleichung

$$(90.) \quad a = 3, \quad b = 2 + 4i, \quad c = 2 - 4i.$$

Deshalb ist

$$(91.) \quad x^3 - 7x^2 + 32x - 60 = (x-3)(x-2-4i)(x-2+4i) \\ = (x-3)(x^2 - 4x + 20),$$

$$(92.) \quad \frac{6x^2 - 25x + 89}{x^3 - 7x^2 + 32x - 60} = \frac{A}{x-3} + \frac{Px + Q}{x^2 - 4x + 20}.$$

Multipliziert man beide Seiten dieser Gleichung mit $(x-3)(x^2 - 4x + 20)$, so ergibt sich

$$(93.) \quad 6x^2 - 25x + 89 = A(x^2 - 4x + 20) + P(x^2 - 3x) + Q(x-3).$$

Daraus folgt für $x = 3$

$$(94.) \quad 68 = 17A, \quad \text{oder} \quad A = 4,$$

und für

$$(95.) \quad x^2 - 4x + 20 = 0, \quad \text{oder} \quad x^2 = 4x - 20$$

$$(96.) \quad -x - 31 = (P + Q)x - 20P - 3Q.$$

Indem man die gleichstelligen Koeffizienten auf beiden Seiten dieser Gleichung einander gleichsetzt, findet man

$$(97.) \quad P + Q = -1, \quad 20P + 3Q = 31,$$

$$(98.) \quad P = 2, \quad Q = -3;$$

und wenn man diese Werte in Gleichung (92.) einsetzt,

$$(99.) \quad \frac{6x^2 - 25x + 89}{x^3 - 7x^2 + 32x - 60} = \frac{4}{x-3} + \frac{2x-3}{x^2 - 4x + 20}.$$

Aufgabe 8. Man soll die echt gebrochene rationale Funktion $\frac{7x^3 - 6x^2 + 9x + 108}{(x^2 - 4x + 13)(x^2 + 2x + 5)}$ in Partialbrüche zerlegen.

Auflösung. Indem man den Nenner

$$(100.) \quad f(x) = (x^2 - 4x + 13)(x^2 + 2x + 5) = 0$$

setzt, erhält man die vier komplexen Wurzeln

$$(101.) \quad a = 2 + 3i, \quad b = 2 - 3i, \quad c = -1 + 2i, \quad d = -1 - 2i;$$

deshalb wird man den vorgelegten Bruch auf die Form

$$(102.) \quad \frac{7x^3 - 6x^2 + 9x + 108}{(x^2 - 4x + 13)(x^2 + 2x + 5)} = \frac{Px + Q}{x^2 - 4x + 13} + \frac{Rx + S}{x^2 + 2x + 5}$$

bringen. Hieraus erhält man durch Fortschaffung der Nenner

$$(103.) \quad 7x^3 - 6x^2 + 9x + 108 = (Px + Q)(x^2 + 2x + 5) + (Rx + S)(x^2 - 4x + 13).$$

Dies gibt für

$$x^2 - 4x + 13 = 0, \quad \text{oder} \quad x^2 = 4x - 13, \quad x^3 = 3x - 52$$

$$(104.) \quad 6x - 178 = P(16x - 78) + Q(6x - 8).$$

Da die gleichstelligen Koeffizienten auf beiden Seiten dieser Gleichung einander gleich sein müssen, so gelten die Gleichungen

$$(105.) \quad 8P + 3Q = 3, \quad 39P + 4Q = 89,$$

folglich wird

$$(106.) \quad P = 3, \quad Q = -7.$$

Setzt man in Gleichung (103.)

$$x^2 + 2x + 5 = 0, \quad \text{oder} \quad x^2 = -2x - 5, \quad x^3 = -x + 10,$$

so findet man in ähnlicher Weise die Gleichungen

$$(107.) \quad 14x + 208 = R(20x + 30) + S(-6x + 8),$$

$$(108.) \quad 10R - 3S = 7, \quad 15R + 4S = 104,$$

$$(109.) \quad R = 4, \quad S = 11,$$

und wenn man diese Werte in die Gleichung (102.) einsetzt,

$$(110.) \quad \frac{7x^3 - 6x^2 + 9x + 108}{(x^2 - 4x + 13)(x^2 + 2x + 5)} = \frac{3x - 7}{x^2 - 4x + 13} + \frac{4x + 11}{x^2 + 2x + 5}.$$

In ähnlicher Weise findet man

Aufgabe 9.

$$\frac{2x^2 - 10x + 14}{(x-4)(x-3)(x-2)} = \frac{3}{x-4} - \frac{2}{x-3} + \frac{1}{x-2}.$$

Aufgabe 10.

$$\frac{-22x + 12}{(x^2-4)(x-4)} = \frac{1}{3} \left(\frac{12}{x-2} + \frac{7}{x+2} - \frac{19}{x-4} \right).$$

Aufgabe 11.

$$\frac{12x^2 + 36x - 18}{x^3 - 9x} = \frac{2}{x} + \frac{11}{x-3} - \frac{1}{x+3}.$$

Aufgabe 12.

$$\begin{aligned} \frac{8x^2 - 16x + 3}{(x-1)(x^2-4x+2)} &= \frac{5}{x-1} + \frac{1}{2\sqrt{2}} \left(\frac{13+3\sqrt{2}}{x-2-\sqrt{2}} - \frac{13-3\sqrt{2}}{x-2+\sqrt{2}} \right) \\ &= \frac{5}{x-1} + \frac{3x+7}{x^2-4x+2}. \end{aligned}$$

Aufgabe 13.

$$\begin{aligned} \frac{7x^2 - 10x + 37}{(x+1)(x^2-4x+13)} &= \frac{3}{x+1} + \frac{2-i}{x-2-3i} + \frac{2+i}{x-2+3i} \\ &= \frac{3}{x+1} + \frac{4x-2}{x^2-4x+13}. \end{aligned}$$

Aufgabe 14.

$$\frac{5x^3 - 12x^2 - 9x + 30}{(x^2+4x+5)(x^2-6x+13)} = \frac{3x+5}{x^2+4x+5} + \frac{2x-7}{x^2-6x+13}.$$

§ 36.

Zerlegung der echt gebrochenen rationalen Funktionen in Partialbrüche, wenn die Gleichung $f(x) = 0$ auch gleiche Wurzeln besitzt.

(Vergl. die Formel-Tabelle Nr. 145.)

Hat die Gleichung $f(x) = 0$ auch *gleiche* Wurzeln, so kann man diese gleichen Wurzeln zusammenfassen und $f(x)$ auf die Form

$$(1.) \quad f(x) = (x-a)^{\alpha}(x-b)^{\beta}(x-c)^{\gamma} \dots (x-k)^{\kappa}(x-l)^{\lambda}$$

bringen, wobei die Größen a, b, c, \dots, k, l sämtlich vonein-

ander verschieden sind, und von den Größen $\alpha, \beta, \gamma, \dots, x, \lambda$ mindestens eine größer als 1 sein soll. Dabei ist

$$(2.) \quad \alpha + \beta + \gamma + \dots + x + \lambda = n.$$

Auch möge wieder vorausgesetzt werden, daß $\varphi(x)$ keinen Teiler mit $f(x)$ gemein habe, daß also $\varphi(x)$ für x gleich a, b, c, \dots, k oder l von Null verschieden sei. Man erkennt sogleich, daß in diesem Falle die Gleichung

$$\frac{\varphi(x)}{f(x)} = \frac{A}{x-a} + \frac{B}{x-b} + \frac{C}{x-c} + \dots + \frac{K}{x-k} + \frac{L}{x-l}$$

nicht mehr bestehen kann, weil der Generalnenner auf der rechten Seite nicht mehr gleich $f(x)$ ist.

Hier kommt man durch folgende Überlegung zum Ziele. Es sei

$$(3.) \quad f_1(x) = \frac{f(x)}{(x-a)^\alpha} = (x-b)^\beta (x-c)^\gamma \dots (x-k)^\kappa (x-l)^\lambda$$

und

$$(4.) \quad A_1 = \frac{\varphi(a)}{f_1(a)},$$

dann wird die ganze rationale Funktion

$$(5.) \quad \varphi(x) - A_1 f_1(x) = \frac{\varphi(x)f_1(a) - \varphi(a)f_1(x)}{f_1(a)}$$

gleich 0 für $x = a$, folglich ist sie teilbar durch $x - a$. Man erhält also

$$(6.) \quad \varphi(x) - A_1 f_1(x) = (x-a)\varphi_1(x),$$

oder

$$(6a.) \quad \varphi(x) = A_1 f_1(x) + (x-a)\varphi_1(x).$$

Da die ganze rationale Funktion $\varphi(x) - A_1 f_1(x)$ höchstens vom Grade $n-1$ ist, so kann $\varphi_1(x)$ höchstens eine ganze rationale Funktion vom Grade $n-2$ sein.

Nach diesen Angaben wird also

$$(7.) \quad \frac{\varphi(x)}{f(x)} = \frac{A_1 f_1(x) + (x-a)\varphi_1(x)}{(x-a)^\alpha f_1(x)} = \frac{A_1}{(x-a)^\alpha} + \frac{\varphi_1(x)}{(x-a)^{\alpha-1} f_1(x)}.$$

Man hat also von $\frac{\varphi(x)}{f(x)}$ ein Glied $\frac{A_1}{(x-a)^\alpha}$ abgesondert,

so daß nur noch eine echt gebrochene Funktion $\frac{\varphi_1(x)}{(x-a)^{\alpha-1} f_1(x)}$

übrig bleibt, bei welcher der Grad des Nenners nicht mehr n , sondern nur noch $n - 1$ ist.

Ist $\alpha > 1$, so kann man dieses Verfahren wiederholen und erhält ebenso

$$(8.) \quad \frac{\varphi_1(x)}{(x-a)^{\alpha-1}f_1(x)} = \frac{A_2}{(x-a)^{\alpha-1}} + \frac{\varphi_2(x)}{(x-a)^{\alpha-2}f_1(x)},$$

also

$$(9.) \quad \frac{\varphi(x)}{f(x)} = \frac{A_1}{(x-a)^\alpha} + \frac{A_2}{(x-a)^{\alpha-1}} + \frac{\varphi_2(x)}{(x-a)^{\alpha-2}f_1(x)},$$

wo jetzt in der echt gebrochenen Funktion $\frac{\varphi_2(x)}{(x-a)^{\alpha-2}f_1(x)}$ der Grad des Nenners wieder um 1 kleiner ist.

Wendet man dieses Verfahren α -mal an, so ergibt sich

$$(10.) \quad \frac{\varphi(x)}{f(x)} = \frac{A_1}{(x-a)^\alpha} + \frac{A_2}{(x-a)^{\alpha-1}} + \dots + \frac{A_\alpha}{x-a} + \frac{\varphi_\alpha(x)}{f_1(x)}.$$

In dieser Weise kann man fortfahren und findet schließlich die Gleichung

$$(11.) \quad \begin{aligned} \frac{\varphi(x)}{f(x)} = & \frac{A_1}{(x-a)^\alpha} + \frac{A_2}{(x-a)^{\alpha-1}} + \dots + \frac{A_\alpha}{x-a} \\ & + \frac{B_1}{(x-b)^\beta} + \frac{B_2}{(x-b)^{\beta-1}} + \dots + \frac{B_\beta}{x-b} \\ & + \dots \dots \dots \\ & + \frac{L_1}{(x-l)^\lambda} + \frac{L_2}{(x-l)^{\lambda-1}} + \dots + \frac{L_\lambda}{x-l}. \end{aligned}$$

Die Zähler $A_1, A_2, \dots, A_\alpha, B_1, B_2, \dots, B_\beta, \dots, L_1, L_2, \dots, L_\lambda$ dieser Partialbrüche berechnet man, indem man beide Seiten der Gleichung (11.) mit dem Generalnenner

$$f(x) = (x-a)^\alpha(x-b)^\beta(x-c)^\gamma \dots (x-k)^\nu(x-l)^\lambda$$

multipliziert, nach Potenzen von x ordnet und die gleichstelligen Koeffizienten auf beiden Seiten der Gleichung einander gleichsetzt. Dies gibt dann, wie man leicht bestätigen kann, n lineare Gleichungen mit den n Unbekannten

$$A_1, A_2, \dots, A_\alpha, B_1, B_2, \dots, B_\beta, \dots, L_1, L_2, \dots, L_\lambda,$$

und zwar sind diese Gleichungen, wie sich aus den vorstehenden Ausführungen ergibt, immer lösbar.

Aus dem Umstande, daß diese n linearen Gleichungen mit n Unbekannten nur eine Lösung besitzen, kann man

wieder schließen, daß auch in diesem Falle die Partialbruch-Zerlegung nur auf *eine* Weise geschehen kann, d. h. daß man dasselbe Resultat erhält, gleichviel ob man zuerst die Partialbrüche

$$\frac{A_1}{(x-a)^\alpha} + \frac{A_2}{(x-a)^{\alpha-1}} + \dots + \frac{A_\alpha}{x-a}$$

absondert, oder ob man mit der Absonderung der Partialbrüche in einer späteren Zeile von Gleichung (11.) anfängt.

Die Berechnung der Zähler wird ziemlich umständlich, wenn n eine große Zahl ist; dann kommt man schneller zum Ziele, indem man, der Gleichung (4.) entsprechend, zunächst

$$A_1 = \frac{\varphi(a)}{f_1'(a)}$$

berechnet und das gleiche Verfahren auf die Ermittlung von $B_1, C_1, \dots, K_1, L_1$ anwendet. Dies geschieht am einfachsten, indem man in Gleichung (11.) durch Multiplikation mit

$$f(x) = (x-a)^\alpha (x-b)^\beta (x-c)^\gamma \dots (x-k)^\nu (x-l)^\mu$$

die Nenner fortschafft und dann der Reihe nach

$$x = a, \quad x = b, \quad x = c, \dots, x = k, \quad x = l$$

setzt. Die Berechnung der übrigen Zähler der Partialbrüche geschieht dann nach dem zuerst beschriebenen Verfahren, ist aber viel leichter geworden, weil man nur noch $n - m$ lineare Gleichungen mit $n - m$ Unbekannten hat, wobei m die Anzahl der voneinander verschiedenen Wurzeln a, b, c, \dots, k, l der Gleichung $f(x) = 0$ ist.

Einige Beispiele mögen zur Erläuterung dieser Angaben dienen.

Aufgabe 1. Man soll die gebrochene rationale Funktion $\frac{4x^3 - 63x^2 + 338x - 619}{(x-7)(x-5)^3}$ in Partialbrüche zerlegen.

Auflösung. In diesem Falle muß man

$$(12.) \quad \frac{4x^3 - 63x^2 + 338x - 619}{(x-7)(x-5)^3} = \frac{A}{x-7} + \frac{B_1}{(x-5)^3} + \frac{B_2}{(x-5)^2} + \frac{B_3}{x-5}$$

setzen. Dies gibt, wenn man beide Seiten der Gleichung mit $(x-7)(x-5)^3$ multipliziert,

$$(13.) \quad 4x^3 - 63x^2 + 338x - 619 = A(x-5)^3 + B_1(x-7) + B_2(x-7)(x-5) + B_3(x-7)(x-5)^2$$

oder

$$(14.) \quad 4x^3 - 63x^2 + 338x - 619 = x^3(A + B_3) + x^2(-15A + B_2 - 17B_3) + x(75A + B_1 - 12B_2 + 95B_3) + (-125A - 7B_1 + 35B_2 - 175B_3).$$

Daraus folgen die Gleichungen

$$(15.) \quad \begin{cases} A + B_3 = 4, \\ -15A + B_2 - 17B_3 = -63, \\ 75A + B_1 - 12B_2 + 95B_3 = 338, \\ -125A - 7B_1 + 35B_2 - 175B_3 = -619. \end{cases}$$

Durch Auflösung dieser Gleichungen ergibt sich

$$(16.) \quad A = 4, \quad B_1 = 2, \quad B_2 = -3, \quad B_3 = 0,$$

so daß man erhält

$$(17.) \quad \frac{4x^3 - 63x^2 + 338x - 619}{(x-7)(x-5)^3} = \frac{4}{x-7} + \frac{2}{(x-5)^3} - \frac{3}{(x-5)^2}.$$

Wendet man das andere Verfahren an, indem man in Gleichung (13.) zuerst $x = 7$ setzt, so findet man

$$(18.) \quad 32 = 8A, \quad \text{oder} \quad A = 4;$$

und für $x = 5$ findet man aus Gleichung (13.)

$$(19.) \quad -4 = -2B_1, \quad \text{oder} \quad B_1 = 2.$$

Zur Ermittlung von B_2 und B_3 braucht man jetzt noch zwei Gleichungen. Deshalb wählt man von den vier Gleichungen (15.), welche zur Verfügung stehen, diejenige aus, welche sich am leichtesten herleiten lassen; d. h. man braucht jetzt garnicht mehr die Gleichung (14.) vollständig zu bilden, sondern berechnet von der rechten Seite diese Gleichung nur den Koeffizienten von x^3 und das konstante Glied. Daraus ergeben sich in Übereinstimmung mit den Gleichungen (15.) die Gleichungen

$$(20.) \quad A + B_3 = 4,$$

$$(21.) \quad -125A - 7B_1 + 35B_2 - 175B_3 = -619,$$

die sich aber mit Hilfe der Gleichungen (18.) und (19.) auf (20a.)

$$B_3 = 0,$$

(21a.) $35B_2 - 175B_3 = -105$, oder $B_2 = -3$

reduzieren. Auf diese Weise wird man wieder zu dem in Gleichung (17.) angegebenen Resultate geführt.

Aufgabe 2. Man soll den Bruch $\frac{3x^3 + 10x^2 - x}{(x^2 - 1)^2}$ in Partialbrüche zerlegen.

Auflösung. Hier muß man

$$(22.) \quad \frac{3x^3 + 10x^2 - x}{(x^2 - 1)^2} = \frac{A_1}{(x-1)^2} + \frac{A_2}{x-1} + \frac{B_1}{(x+1)^2} + \frac{B_2}{x+1}$$

setzen und erhält durch Multiplikation mit

$$(x^2 - 1)^2 = (x-1)^2(x+1)^2$$

$$(23.) \quad 3x^3 + 10x^2 - x = A_1(x+1)^2 + A_2(x+1)^2(x-1) + B_1(x-1)^2 + B_2(x+1)(x-1)^2.$$

Hieraus ergibt sich für $x = 1$

$$(24.) \quad 12 = 4A_1, \text{ oder } A_1 = 3,$$

und für $x = -1$

$$(25.) \quad 8 = 4B_1, \text{ oder } B_1 = 2.$$

Zur Ermittlung von A_2 und B_2 suche man auf der rechten Seite von Gleichung (23.) den Koeffizienten von x^3 und das konstante Glied auf und setze die gefundenen Größen den gleichstelligen Koeffizienten auf der linken Seite gleich. Dadurch erhält man die beiden Gleichungen

$$(26.) \quad A_2 + B_2 = 3,$$

$$(27.) \quad A_1 - A_2 + B_1 + B_2 = 0,$$

oder mit Rücksicht auf die Gleichungen (24.) und (25.)

$$(27a.) \quad -A_2 + B_2 = -5,$$

also

$$(28.) \quad A_2 = 4, \quad B_2 = -1,$$

so daß Gleichung (22.) übergeht in

$$(29.) \quad \frac{3x^3 + 10x^2 - x}{(x^2 - 1)^2} = \frac{3}{(x-1)^2} + \frac{4}{x-1} + \frac{2}{(x+1)^2} - \frac{1}{x+1}.$$

In ähnlicher Weise findet man

Aufgabe 3.

$$\frac{x^4 - x^3 - 16x^2 + 38x - 25}{(x-1)^2(x-2)^3} = \frac{3}{(x-1)^2} + \frac{2}{x-1} - \frac{5}{(x-2)^3} + \frac{4}{(x-2)^2} - \frac{1}{x-2}.$$

Dieses Verfahren gilt auch hier noch, wenn die Wurzeln a, b, c, \dots, k, l sämtlich oder teilweise komplex sind. Man kann aber, wenn in $f(x)$ und $\varphi(x)$ die Koeffizienten sämtlich reell sind, das Resultat gleichfalls auf eine reelle Form bringen. Ist z. B. b gleich $g + hi$, so wird eine andere Wurzel, sie heiße c , gleich $g - hi$, und es wird β gleich γ sein, wie in der Algebra bewiesen wird (vergl. D.-R., § 114). Nun folgt aber aus der Bildung der Größen B_1, B_2, \dots, B_β und $C_1, C_2, \dots, C_\gamma$, daß man die letzteren durch Vertauschung von $+i$ mit $-i$ aus den ersteren erhält. Ist also

$$(30.) \quad B_1 = G_1 + H_1i, \quad B_2 = G_2 + H_2i, \quad \dots \quad B_\beta = G_\beta + H_\beta i,$$

so wird

$$(31.) \quad C_1 = G_1 - H_1i, \quad C_2 = G_2 - H_2i, \quad \dots \quad C_\beta = G_\beta - H_\beta i.$$

Deshalb werden die Summen

$$(32.) \quad \left\{ \begin{array}{l} \frac{B_1}{(x-b)^\beta} + \frac{C_1}{(x-c)^\beta}, \\ \frac{B_2}{(x-b)^{\beta-1}} + \frac{C_2}{(x-c)^{\beta-1}}, \\ \dots \dots \dots \\ \frac{B_\beta}{x-b} + \frac{C_\beta}{x-c} \end{array} \right.$$

sämtlich reell.

Man kann auch hier in der Zwischenrechnung die komplexen Größen ganz vermeiden. Wenn man nämlich die Ausdrücke (32.) auf gleichen Nenner bringt und addiert,

so erhält man $\frac{F(x)}{[(x-g)^2 + h^2]^\beta}$, wo der Nenner vom Grade

2β , der Zähler aber höchstens vom Grade $2\beta - 1$ ist; denn die Summe von echt gebrochenen rationalen Funktionen ist stets wieder eine echt gebrochene rationale Funktion (Vergl. Satz 2 in § 34.) Jetzt findet man durch Division

$$(33.) \quad F(x) = [(x-g)^2 + h^2] F_1(x) + P_1 x + Q_1,$$

also

$$(34.) \quad \frac{F(x)}{[(x-g)^2 + h^2]^\beta} = \frac{P_1 x + Q_1}{[(x-g)^2 + h^2]^\beta} + \frac{F_1(x)}{[(x-g)^2 + h^2]^{\beta-1}}.$$

Ebenso findet man durch Division

$$(35.) \quad \frac{F_1(x)}{[(x-g)^2 + h^2]^{\beta-1}} = \frac{P_2 x + Q_2}{[(x-g)^2 + h^2]^{\beta-1}} + \frac{F_2(x)}{[(x-g)^2 + h^2]^{\beta-2}}.$$

In derselben Weise kann man fortfahren und erhält schließlich

$$(36.) \quad \frac{B_1}{(x-b)^\beta} + \frac{B_2}{(x-b)^{\beta-1}} + \dots + \frac{B_\beta}{x-b} + \frac{C_1}{(x-c)^\beta} + \frac{C_2}{(x-c)^{\beta-1}} + \dots + \frac{C_\beta}{x-c} \\ = \frac{P_1 x + Q_1}{[(x-g)^2 + h^2]^\beta} + \frac{P_2 x + Q_2}{[(x-g)^2 + h^2]^{\beta-1}} + \dots + \frac{P_\beta x + Q_\beta}{(x-g)^2 + h^2}.$$

Die Berechnung der Größen $P_1, Q_1, P_2, Q_2, \dots, P_\beta, Q_\beta$ erfolgt jetzt wieder wie früher, indem man den Ausdruck, welcher sich für $\frac{\varphi(x)}{f(x)}$ durch Partialbruch-Zerlegung ergibt, vorläufig aber noch die unbestimmten Größen $P_1, Q_1, P_2, Q_2, \dots, P_\beta, Q_\beta$ usw. enthält, mit $f(x)$ multipliziert, nach Potenzen von x ordnet und die einzelnen Koeffizienten den gleichstelligen Koeffizienten von $\varphi(x)$ gleichsetzt. Dadurch erhält man n lineare Gleichungen mit n Unbekannten, deren Auflösung nach diesen Unbekannten immer möglich ist.

Man kann aber auch hier die Rechnung wesentlich abkürzen, indem man

$$(x-g)^2 + h^2 = 0, \quad \text{oder} \quad x^2 = 2gx - g^2 - h^2$$

setzt. Dadurch kann man die eben beschriebene Gleichung auf den ersten Grad bringen und durch Gleichsetzung der gleichstelligen Koeffizienten die beiden darin verbliebenen Unbekannten P_1 und Q_1 berechnen.

Am besten wird dieses Verfahren durch Beispiele erläutert.

Aufgabe 4. Man soll die echt gebrochene rationale

Funktion $\frac{2x+2}{(x-1)(x^2+1)^2}$ in Partialbrüche zerlegen.

Auflösung. Nach dem Gesagten muß man hier

$$(37.) \quad \frac{2x+2}{(x-1)(x^2+1)^2} = \frac{A}{x-1} + \frac{P_1x+Q_1}{(x^2+1)^2} + \frac{P_2x+Q_2}{x^2+1}$$

setzen. Wenn man beide Seiten dieser Gleichung mit $(x-1)$ mal $(x^2+1)^2$ multipliziert, erhält man

$$(38.) \quad 2x+2 = A(x^2+1)^2 + (P_1x+Q_1)(x-1) + (P_2x+Q_2)(x-1)(x^2+1),$$

oder, wenn man die rechte Seite dieser Gleichung nach fallenden Potenzen von x ordnet,

$$(39.) \quad 2x+2 = x^4(A+P_2) + x^3(-P_2+Q_2) + x^2(2A+P_1+P_2-Q_2) + x(-P_1+Q_1-P_2+Q_2) + (A-Q_1-Q_2).$$

Durch Gleichsetzung der gleichstelligen Koeffizienten ergibt sich hieraus

$$(40.) \quad \begin{cases} A + P_2 = 0, \\ -P_2 + Q_2 = 0, \\ 2A + P_1 + P_2 - Q_2 = 0, \\ -P_1 + Q_1 - P_2 + Q_2 = 2, \\ A - Q_1 - Q_2 = 2. \end{cases}$$

Löst man diese Gleichungen auf, so findet man

$$(41.) \quad A = 1, \quad P_1 = -2, \quad Q_1 = 0, \quad P_2 = -1, \quad Q_2 = -1,$$

also

$$(42.) \quad \frac{2x+2}{(x-1)(x^2+1)^2} = \frac{1}{x-1} - \frac{2x}{(x^2+1)^2} - \frac{x+1}{x^2+1}.$$

Die Rechnung wird wesentlich abgekürzt, wenn man in Gleichung (38.) zunächst $x=1$ setzt. Dadurch erhält man

$$(43.) \quad 4 = 4A, \quad \text{oder} \quad A = 1.$$

Für $x^2 = -1$ geht sodann Gleichung (38.) über in

$$(44.) \quad 2x+2 = (P_1x+Q_1)(x-1) = (-P_1+Q_1)x - P_1 - Q_1,$$

und daraus folgt

$$(45.) \quad -P_1 + Q_1 = 2, \quad -P_1 - Q_1 = 2,$$

$$(46.) \quad P_1 = -2, \quad Q_1 = 0.$$

Um noch die beiden Größen P_2 und Q_2 zu finden, braucht man auf der rechten Seite von Gleichung (38.) nur diejenigen beiden Koeffizienten zu berechnen, welche sich

am leichtesten ermitteln lassen, nämlich die Koeffizienten von x^4 und x^0 . Wenn man diese Größen den gleichstelligen Koeffizienten auf der linken Seite von Gleichung (38.) gleichsetzt, erhält man

$$(47.) \quad A + P_2 = 0, \quad A - Q_1 - Q_2 = 2,$$

oder mit Rücksicht auf die Gleichungen (43.) und (46.)

$$(48.) \quad P_2 = -1, \quad Q_2 = -1.$$

Daraus ergibt sich wieder Gleichung (42.).

Aufgabe 5. Man soll die echt gebrochene rationale Funktion $\frac{3x^5 + 2x^4 + 6x^3 - 11x^2 - 12x - 8}{(x-2)^2(x^2+2x+2)^2}$ in Partialbrüche zerlegen.

Auflösung. Hier ist zu setzen

$$(49.) \quad \frac{\varphi(x)}{f(x)} = \frac{A_1}{(x-2)^2} + \frac{A_2}{x-2} + \frac{P_1x + Q_1}{(x^2+2x+2)^2} + \frac{P_2 + Q_2}{x^2+2x+2},$$

folglich wird

$$(50.) \quad \begin{aligned} \varphi(x) &= 3x^5 + 2x^4 + 6x^3 - 11x^2 - 12x - 8 \\ &= A_1(x^2+2x+2)^2 + A_2(x-2)(x^2+2x+2)^2 \\ &\quad + (P_1x + Q_1)(x-2)^2 + (P_2x + Q_2)(x-2)^2(x^2+2x+2). \end{aligned}$$

Dies gibt für $x = 2$

$$(51.) \quad 100 = 100A_1, \quad \text{oder} \quad A_1 = 1$$

und für $x^2 + 2x + 2 = 0$, oder $x^2 = -2x - 2$

$$10x + 30 = (P_1x + Q_1)(-6x + 2) = (14P_1 - 6Q_1)x + (12P_1 + 2Q_1),$$

also

$$(52.) \quad 7P_1 - 3Q_1 = 5, \quad 6P_1 + Q_1 = 15,$$

$$(53.) \quad P_1 = 2, \quad Q_1 = 3.$$

Setzt man jetzt noch die Koeffizienten von x^5 , x^4 und x^0 auf beiden Seiten von Gleichung (50.) einander gleich, so erhält man

$$A_2 + P_2 = 3, \quad A_1 + 2A_2 - 2P_2 + Q_2 = 2,$$

$$4A_1 - 8A_2 + 4Q_1 + 8Q_2 = -8,$$

oder mit Rücksicht auf die Gleichungen (51.) und (53.)

$$(54.) \quad A_2 + P_2 = 3, \quad 2A_2 - 2P_2 + Q_2 = 1, \quad A_2 - Q_2 = 3,$$

also

$$(55.) \quad A_2 = 2, \quad P_2 = 1, \quad Q_2 = -1.$$

Indem man diese Werte in die Gleichung (49.) einsetzt, erhält man

$$(56.) \quad \frac{3x^5 + 2x^4 + 6x^3 - 11x^2 - 12x - 8}{(x-2)^2(x^2+2x+2)^2} = \frac{1}{(x-2)^2} + \frac{2}{x-2} + \frac{2x+3}{(x^2+2x+2)^2} + \frac{x-1}{x^2+2x+2}.$$

In ähnlicher Weise findet man

Aufgabe 6.

$$\frac{2x^5 - 3x^4 + 16x^3 - 5x^2 + 9x + 19}{(x-3)^2(x^2+x+1)^2} = \frac{4}{(x-3)^2} + \frac{1}{x-3} + \frac{2x+3}{(x^2+x+1)^2} + \frac{x-1}{x^2+x+1}.$$

Weitere Übungs-Aufgaben kann sich der Anfänger sehr leicht selbst stellen, indem er beliebig gewählte Partialbrüche auf den gemeinsamen Generalnenner bringt und dadurch die Funktion $\frac{\varphi(x)}{f(x)}$ bildet.

Bei der Zerlegung von $\frac{\varphi(x)}{f(x)}$ in Partialbrüche ist vorausgesetzt, daß man die Wurzeln der Gleichung $f(x) = 0$ bereits ermittelt hat.

§ 37.

Integration der Funktionen $\frac{A}{x-a} dx$ und $\frac{A}{(x-a)^n} dx$.

(Vergl. die Formel-Tabelle Nr. 27, 29, 29a, 87, 88, 90, 92 und 146.)

Die Zerlegung in Partialbrüche macht es möglich, jede gebrochene rationale Funktion zu integrieren, denn man kann sie nach den Ausführungen der vorhergehenden Paragraphen stets (nötigenfalls nach Absonderung einer ganzen rationalen Funktion) in eine Summe verwandeln, deren einzelne Glieder entweder die Form $\frac{A}{x-a}$ oder $\frac{A}{(x-a)^n}$ haben. Diese Ausdrücke kann man aber sehr leicht integrieren.

Setzt man nämlich

$$(1.) \quad x - a = t, \quad \text{also} \quad dx = dt,$$

so wird nach Formel Nr. 12 der Tabelle

$$\int \frac{A}{x-a} dx = A \int \frac{dt}{t} = A \ln t,$$

oder in Übereinstimmung mit Formel Nr. 27 der Tabelle

$$(2.) \quad \int \frac{A}{x-a} dx = A \ln(x-a).$$

Ferner wird, wenn n von 1 verschieden ist, nach Formel Nr. 9 der Tabelle, indem man $m = -n$ setzt,

$$\int \frac{A}{(x-a)^n} dx = A \int \frac{dt}{t^n} = A \int t^{-n} dt = A \frac{t^{-n+1}}{-n+1},$$

oder

$$(3.) \quad \int \frac{A}{(x-a)^n} dx = \frac{-A}{(n-1)(x-a)^{n-1}}.$$

Für $n = 2$ ergibt sich hieraus Formel Nr. 90 der Tabelle, nämlich

$$(3a.) \quad \int \frac{dx}{x^2 + 2bx + b^2} = \int \frac{dx}{(x+b)^2} = -\frac{1}{x+b}.$$

Wendet man dies auf die in § 35 und 36 behandelten Beispiele an, so findet man ohne weiteres die Lösung der folgenden Aufgaben.

Aufgabe 1. $\int \frac{15x^2 - 70x - 95}{x^3 - 6x^2 - 13x + 42} dx = ?$

Auflösung. Nach Aufgabe 1 in § 35 ist

$$\frac{15x^2 - 70x - 95}{x^3 - 6x^2 - 13x + 42} = \frac{3}{x-7} + \frac{5}{x+3} + \frac{7}{x-2},$$

folglich wird

$$\begin{aligned} \int \frac{15x^2 - 70x - 95}{x^3 - 6x^2 - 13x + 42} dx &= \int \frac{3}{x-7} dx + \int \frac{5}{x+3} dx + \int \frac{7}{x-2} dx \\ &= 3 \ln(x-7) + 5 \ln(x+3) + 7 \ln(x-2) \\ &= \ln[(x-7)^3 (x+3)^5 (x-2)^7]. \end{aligned}$$

Aufgabe 2. $\int \frac{x^2 + 1}{x^3 - x} dx = ?$

Auflösung. Nach Aufgabe 2 in § 35 ist

$$\frac{x^2 + 1}{x^3 - x} = -\frac{1}{x} + \frac{1}{x-1} + \frac{1}{x+1},$$

folglich wird

$$\begin{aligned} \int \frac{x^2 + 1}{x^3 - x} dx &= -\int \frac{1}{x} dx + \int \frac{1}{x-1} dx + \int \frac{1}{x+1} dx \\ &= -\ln x + \ln(x-1) + \ln(x+1) \\ &= \ln\left(\frac{x^2 - 1}{x}\right). \end{aligned}$$

Aufgabe 3. $\int \frac{4x^2 - 15x + 19}{(x-1)(x-2)(x-3)} dx = ?$

Auflösung. Nach Aufgabe 3 in § 35 ist

$$\frac{4x^2 - 15x + 19}{(x-1)(x-2)(x-3)} = \frac{4}{x-1} - \frac{5}{x-2} + \frac{5}{x-3},$$

folglich wird

$$\begin{aligned} \int \frac{4x^2 - 15x + 19}{(x-1)(x-2)(x-3)} dx &= 4 \int \frac{dx}{x-1} - 5 \int \frac{dx}{x-2} + 5 \int \frac{dx}{x-3} \\ &= 4 \ln(x-1) - 5 \ln(x-2) + 5 \ln(x-3). \end{aligned}$$

Aufgabe 4. $\int \frac{dx}{1+x-x^2} = ?$

Auflösung. Nach Aufgabe 4 in § 35 ist

$$\frac{1}{1+x-x^2} = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{2}{2x-1+\sqrt{5}} - \frac{2}{2x-1-\sqrt{5}} \right),$$

folglich wird

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{1+x-x^2} &= \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\int \frac{2dx}{2x-1+\sqrt{5}} - \int \frac{2dx}{2x-1-\sqrt{5}} \right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{5}} [\ln(2x-1+\sqrt{5}) - \ln(2x-1-\sqrt{5})] \\ &= \frac{1}{\sqrt{5}} \ln \left(\frac{2x-1+\sqrt{5}}{2x-1-\sqrt{5}} \right). \end{aligned}$$

Aufgabe 5. $\int \frac{4x^4 - x^3 - 46x^2 - 20x + 153}{x^3 - 2x^2 - 9x + 18} dx = ?$

Auflösung. Nach Aufgabe 5 in § 35 ist

$$\frac{4x^4 - x^3 - 46x^2 - 20x + 153}{x^3 - 2x^2 - 9x + 18} = 4x + 7 + \frac{3}{x-2} - \frac{4}{x-3} + \frac{5}{x+3},$$

folglich wird

$$\begin{aligned} \int \frac{4x^4 - x^3 - 46x^2 - 20x + 153}{x^3 - 2x^2 - 9x + 18} dx &= 4 \int x dx + 7 \int dx + 3 \int \frac{dx}{x-2} \\ &\quad - 4 \int \frac{dx}{x-3} + 5 \int \frac{dx}{x+3} \\ &= 2x^2 + 7x + 3 \ln(x-2) - 4 \ln(x-3) + 5 \ln(x+3). \end{aligned}$$

Aufgabe 6. $\int \frac{(13x^2 - 68x + 95)dx}{(x-5)(x^2 - 6x + 13)} = ?$

Auflösung. Nach Aufgabe 6 in § 35 ist

$$\frac{13x^2 - 68x + 95}{(x-5)(x^2 - 6x + 13)} = \frac{10}{x-5} + \frac{3-8i}{2(x-3-2i)} + \frac{3+8i}{2(x-3+2i)},$$

folglich wird

$$\begin{aligned} \int \frac{(13x^2 - 68x + 95)dx}{(x-5)(x^2 - 6x + 13)} &= 10 \int \frac{dx}{x-5} + \frac{3-8i}{2} \int \frac{dx}{x-3-2i} \\ &\quad + \frac{3+8i}{2} \int \frac{dx}{x-3+2i} \\ &= 10 \ln(x-5) + \frac{3-8i}{2} \ln(x-3-2i) \\ &\quad + \frac{3+8i}{2} \ln(x-3+2i). \end{aligned}$$

Dieses Resultat befriedigt deshalb nicht, weil es komplexe Größen enthält, obgleich man es, wie später gezeigt werden soll, auf eine reelle Form bringen kann.

Aufgabe 7. $\int \frac{2x^2 - 10x + 14}{(x-4)(x-3)(x-2)} dx = ?$

Auflösung. Nach Aufgabe 9 in § 35 ist

$$\frac{2x^2 - 10x + 14}{(x-4)(x-3)(x-2)} = \frac{3}{x-4} - \frac{2}{x-3} + \frac{1}{x-2},$$

folglich wird

$$\int \frac{(2x^2 - 10x + 14)dx}{(x-4)(x-3)(x-2)} = 3 \ln(x-4) - 2 \ln(x-3) + \ln(x-2).$$

Aufgabe 8. $\int \frac{-22x + 12}{(x^2 - 4)(x - 4)} dx = ?$

Auflösung. Nach Aufgabe 10 in § 35 ist

$$\frac{-22x + 12}{(x^2 - 4)(x - 4)} = \frac{1}{3} \left(\frac{12}{x-2} + \frac{7}{x+2} - \frac{19}{x-4} \right),$$

folglich wird

$$\int \frac{(-22x + 12)dx}{(x^2 - 4)(x - 4)} = \frac{1}{3} [12 \ln(x-2) + 7 \ln(x+2) - 19 \ln(x-4)].$$

Aufgabe 9. $\int \frac{12x^2 + 36x - 18}{x^3 - 9x} dx = ?$

Auflösung. Nach Aufgabe 11 in § 35 ist

$$\frac{12x^2 + 36x - 18}{x^3 - 9x} = \frac{2}{x} + \frac{11}{x-3} - \frac{1}{x+3},$$

folglich wird

$$\int \frac{(12x^2 + 36x - 18)dx}{x^3 - 9x} = 2 \ln x + 11 \ln(x-3) - \ln(x+3).$$

Aufgabe 10. $\int \frac{8x^2 - 16x + 3}{(x-1)(x^2 - 4x + 2)} dx = ?$

Auflösung. Nach Aufgabe 12 in § 35 ist

$$\frac{8x^2 - 16x + 3}{(x-1)(x^2 - 4x + 2)} = \frac{5}{x-1} + \frac{1}{2\sqrt{2}} \left(\frac{13 + 3\sqrt{2}}{x-2-\sqrt{2}} - \frac{13-3\sqrt{2}}{x-2+\sqrt{2}} \right),$$

folglich wird

$$\begin{aligned} & \int \frac{(8x^2 - 16x + 3)dx}{(x-1)(x^2 - 4x + 2)} \\ &= 5 \ln(x-1) + \frac{1}{2\sqrt{2}} \left[(13 + 3\sqrt{2}) \ln(x-2-\sqrt{2}) \right. \\ & \quad \left. - (13 - 3\sqrt{2}) \ln(x-2+\sqrt{2}) \right] \\ &= 5 \ln(x-1) + \frac{13}{2\sqrt{2}} \ln \left(\frac{x-2-\sqrt{2}}{x-2+\sqrt{2}} \right) + \frac{3}{2} \ln(x^2 - 4x + 2). \end{aligned}$$

Aufgabe 11. $\int \frac{4x^3 - 63x^2 + 338x - 619}{(x-7)(x-5)^3} dx = ?$

Auflösung. Nach Aufgabe 1 in § 36 ist

$$\frac{4x^3 - 63x^2 + 338x - 619}{(x-7)(x-5)^3} = \frac{4}{x-7} + \frac{2}{(x-5)^3} - \frac{3}{(x-5)^2},$$

folglich wird

$$\begin{aligned} \int \frac{4x^3 - 63x^2 + 338x - 619}{(x-7)(x-5)^3} dx &= 4 \int \frac{dx}{x-7} + 2 \int \frac{dx}{(x-5)^3} \\ &\quad - 3 \int \frac{dx}{(x-5)^2} \\ &= 4 \ln(x-7) - \frac{1}{(x-5)^2} + \frac{3}{x-5} \\ &= 4 \ln(x-7) + \frac{3x-16}{(x-5)^2}. \end{aligned}$$

Aufgabe 12. $\int \frac{3x^3 + 10x^2 - x}{(x^2 - 1)^2} dx = ?$

Auflösung. Nach Aufgabe 2 in § 36 ist

$$\frac{3x^3 + 10x^2 - x}{(x^2 - 1)^2} = \frac{3}{(x-1)^2} + \frac{4}{x-1} + \frac{2}{(x+1)^2} - \frac{1}{x+1},$$

folglich wird

$$\begin{aligned} \int \frac{3x^3 + 10x^2 - x}{(x^2 - 1)^2} dx &= 3 \int \frac{dx}{(x-1)^2} + 4 \int \frac{dx}{x-1} + 2 \int \frac{dx}{(x+1)^2} \\ &\quad - \int \frac{dx}{x+1} \\ &= \frac{-3}{x-1} + 4 \ln(x-1) - \frac{2}{x+1} - \ln(x+1) \\ &= \ln\left(\frac{(x-1)^4}{x+1}\right) - \frac{5x+1}{x^2-1}. \end{aligned}$$

Aufgabe 13. $\int \frac{x^4 - x^3 - 16x^2 + 38x - 25}{(x-1)^2(x-2)^3} dx = ?$

Auflösung. Nach Aufgabe 3 in § 36 ist

$$\begin{aligned} \frac{x^4 - x^3 - 16x^2 + 38x - 25}{(x-1)^2(x-2)^3} \\ = \frac{3}{(x-1)^2} + \frac{2}{x-1} - \frac{5}{(x-2)^3} + \frac{4}{(x-2)^2} - \frac{1}{x-2}, \end{aligned}$$

folglich wird

$$\int \frac{(x^4 - x^3 - 16x^2 + 38x - 25)dx}{(x-1)^2(x-2)^3} = -\frac{3}{x-1} + 2\ln(x-1) + \frac{5}{2(x-2)^2} - \frac{4}{x-2} - \ln(x-2).$$

Die einfachsten Fälle der Partialbruch-Zerlegung sind schon im ersten Teile (§ 13) berücksichtigt worden. So ergibt sich z. B. Formel Nr. 29a der Tabelle, nämlich

$$(4.) \quad \int \frac{dx}{x^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \ln \left(\frac{x-a}{x+a} \right) = -\frac{1}{a} \operatorname{Ar} \operatorname{Ctg} \left(\frac{x}{a} \right),$$

ohne weiteres durch Partialbruch-Zerlegung.

In gleicher Weise ergab sich auch Formel Nr. 88 der Tabelle, nämlich

$$(5.) \quad \int \frac{dx}{(x-x_1)(x-x_2)} = \frac{1}{x_1-x_2} \ln \left(\frac{x-x_1}{x-x_2} \right),$$

durch Partialbruch-Zerlegung.

Daraus findet man dann auch Formel Nr. 87 der Tabelle, denn bezeichnet man die Wurzeln der Gleichung

$$(6.) \quad x^2 + 2bx + c = 0$$

mit x_1 und x_2 , so wird

$$(7.) \quad \begin{cases} x_1 = -b + \sqrt{b^2 - c}, & x_2 = -b - \sqrt{b^2 - c}, \\ x_1 - x_2 = 2\sqrt{b^2 - c}, \end{cases}$$

$$(8.) \quad (x-x_1)(x-x_2) = x^2 + 2bx + c,$$

so daß Gleichung (5.) übergeht in

$$(9.) \quad \int \frac{dx}{x^2 + 2bx + c} = \frac{1}{2\sqrt{b^2 - c}} \ln \left(\frac{x+b-\sqrt{b^2-c}}{x+b+\sqrt{b^2-c}} \right).$$

Ebenso erhielt man auch Formel Nr. 92 der Tabelle, nämlich

$$(10.) \quad \int \frac{(Px+Q)dx}{(x-x_1)(x-x_2)} = \frac{1}{x_1-x_2} [(Px_1+Q)\ln(x-x_1) - (Px_2+Q)\ln(x-x_2)]$$

durch Partialbruch-Zerlegung.

§ 38.

Integration der Funktionen

$$\frac{dx}{(x-g)^2+h^2} \text{ und } \frac{dx}{[(x-g)^2+h^2]^n}.$$

(Vergl. die Formel-Tabelle Nr. 89, 147 bis 150.)

Nach Formel Nr. 28 der Tabelle war

$$(1.) \quad \int \frac{dx}{a^2+x^2} = \frac{1}{a} \operatorname{arctg}\left(\frac{x}{a}\right).$$

Auf den Zusammenhang dieser Formel mit Nr. 29 und 29a der Tabelle, nämlich mit

$$(2.) \quad \int \frac{dx}{x^2-a^2} = -\frac{1}{a} \operatorname{Ar} \operatorname{Tg}\left(\frac{x}{a}\right) = \frac{1}{2a} \ln\left(\frac{a-x}{a+x}\right)$$

oder

$$(2a.) \quad \int \frac{dx}{x^2-a^2} = -\frac{1}{a} \operatorname{Ar} \operatorname{Ctg}\left(\frac{x}{a}\right) = \frac{1}{2a} \ln\left(\frac{x-a}{x+a}\right),$$

ist bereits auf Seite 68 und 69 hingewiesen worden.

Aus Formel Nr. 28 der Tabelle ergibt sich Formel Nr. 89, nämlich

$$(3.) \quad \int \frac{dx}{x^2+2bx+c} = \frac{1}{\sqrt{c-b^2}} \operatorname{arc} \operatorname{tg}\left(\frac{x+b}{\sqrt{c-b^2}}\right),$$

indem man das Integral auf die Form

$$\int \frac{d(x+b)}{(x+b)^2+c-b^2}$$

bringt und $c-b^2$ gleich a^2 setzt. Dieses Integral geht in

$$(4.) \quad \int \frac{dx}{(x-g)^2+h^2} = \int \frac{d(x-g)}{(x-g)^2+h^2} = \frac{1}{h} \operatorname{arctg}\left(\frac{x-g}{h}\right)$$

über, wenn man

$$(5.) \quad b = -g, \quad c-b^2 = h^2$$

setzt. Noch unmittelbarer erhält man dieses Resultat durch die Substitution

$$(6.) \quad x-g = ht, \quad dx = hdt,$$

dann wird nämlich in Übereinstimmung mit Gleichung (4.)

250 § 38. Integration der Funktionen $\frac{dx}{(x-g)^2+h^2}$ und $\frac{dx}{[(x-g)^2+h^2]^n}$.

$$(7.) \quad \int \frac{dx}{(x-g)^2+h^2} = \int \frac{h dt}{h^2(t^2+1)} = \frac{1}{h} \int \frac{dt}{1+t^2} = \frac{1}{h} \operatorname{arctg} t \\ = \frac{1}{h} \operatorname{arctg} \left(\frac{x-g}{h} \right).$$

Dieselbe Substitution kann man anwenden, um $\int \frac{dx}{[(x-g)^2+h^2]^n}$ zu berechnen für den Fall, wo $n > 1$ ist; dann erhält man nämlich

$$(8.) \quad \int \frac{dx}{[(x-g)^2+h^2]^n} = \int \frac{h dt}{h^{2n}(1+t^2)^n} = \frac{1}{h^{2n-1}} \int \frac{dt}{(1+t^2)^n}.$$

Nun ist

$$(9.) \quad \frac{1}{(1+t^2)^n} = \frac{1+t^2-t^2}{(1+t^2)^n} = \frac{1}{(1+t^2)^{n-1}} - \frac{t^2}{(1+t^2)^n},$$

folglich wird

$$(10.) \quad \int \frac{dt}{(1+t^2)^n} = \int \frac{dt}{(1+t^2)^{n-1}} - \int \frac{t^2 dt}{(1+t^2)^n}.$$

Setzt man jetzt in Formel Nr. 98 der Tabelle, nämlich in

$$\int u dv = uv - \int v du,$$

$$u = \frac{t}{2}, \quad dv = \frac{2t dt}{(1+t^2)^n} = \frac{d(1+t^2)}{(1+t^2)^n},$$

also

$$du = \frac{1}{2} dt, \quad v = \frac{-1}{(n-1)(1+t^2)^{n-1}},$$

so erhält man

$$(11.) \quad \int \frac{t^2 dt}{(1+t^2)^n} = -\frac{t}{2(n-1)(1+t^2)^{n-1}} + \frac{1}{2(n-1)} \int \frac{dt}{(1+t^2)^{n-1}},$$

und wenn man diese Gleichung von Gleichung (10.) subtrahiert,

$$(12.) \quad \int \frac{dt}{(1+t^2)^n} = +\frac{t}{(2n-2)(1+t^2)^{n-1}} + \frac{2n-3}{2n-2} \int \frac{dt}{(1+t^2)^{n-1}}.$$

Durch diese Formel ist das gesuchte Integral auf ein einfacheres zurückgeführt. Durch wiederholte Anwendung der Formel kommt man schließlich auf

$$\int \frac{dt}{1+t^2} = \operatorname{arctgt}.$$

Beispiel für $n = 3$.

$$\int \frac{dt}{(1+t^2)^3} = \frac{t}{4(1+t^2)^2} + \frac{3}{4} \int \frac{dt}{(1+t^2)^2},$$

$$\int \frac{dt}{(1+t^2)^2} = \frac{t}{2(1+t^2)} + \frac{1}{2} \operatorname{arctgt},$$

also

$$\begin{aligned} \int \frac{dt}{(1+t^2)^3} &= \frac{t}{4(1+t^2)^2} + \frac{3t}{8(1+t^2)} + \frac{3}{8} \operatorname{arctgt} \\ &= \frac{t(3t^2+5)}{8(t^2+1)^2} + \frac{3}{8} \operatorname{arctgt}. \end{aligned}$$

Man kann das gesuchte Integral für die praktische Ausführung der Integration auch auf Formel Nr. 102 der Tabelle zurückführen, indem man

$$(13.) \quad t = \operatorname{tg} z, \quad \text{also} \quad z = \operatorname{arctgt}, \quad dz = \frac{dt}{1+t^2},$$

$$(14.) \quad 1+t^2 = 1+\operatorname{tg}^2 z = \frac{1}{\cos^2 z}, \quad \frac{1}{1+t^2} = \cos^2 z,$$

$$\frac{1}{(1+t^2)^{n-1}} = \cos^{2n-2} z$$

setzt, dann wird mit Rücksicht auf Formel Nr. 102 der Tabelle, wenn man $2n$ mit $2n-2$ vertauscht,

$$\begin{aligned} (15.) \quad \int \frac{dt}{(1+t^2)^n} &= \int \cos^{2n-2} z dz \\ &= \sin z \left[\frac{1}{2n-2} \cos^{2n-3} z + \frac{2n-3}{(2n-2)(2n-4)} \cos^{2n-5} z \right. \\ &\quad \left. + \dots + \frac{(2n-3)(2n-5)\dots 5 \cdot 3}{(2n-2)(2n-4)\dots 6 \cdot 4 \cdot 2} \cos z \right] + \frac{(2n-3)(2n-5)\dots 5 \cdot 3 \cdot 1}{(2n-2)(2n-4)\dots 6 \cdot 4 \cdot 2} z. \end{aligned}$$

Dabei ist

$$(16.) \quad \cos z = \frac{1}{\sqrt{1+t^2}}, \quad \sin z = \frac{t}{\sqrt{1+t^2}}, \quad \sin z \cos z = \frac{t}{1+t^2}.$$

Für $n = 3$ erhält man z. B. wieder

$$\begin{aligned}\int \frac{dt}{(1+t^2)^3} &= \sin z \left(\frac{1}{4} \cos^3 z + \frac{3}{4 \cdot 2} \cos z \right) + \frac{3 \cdot 1}{4 \cdot 2} z \\ &= \frac{t}{1+t^2} \left(\frac{1}{4(1+t^2)} + \frac{3}{8} \right) + \frac{3}{8} \operatorname{arctgt}.\end{aligned}$$

§ 39.

Integration der Funktionen

$$\frac{(Px+Q)dx}{(x-g)^2+h^2} \text{ und } \frac{(Px+Q)dx}{[(x-g)^2+h^2]^n}.$$

(Vergl. die Formel-Tabelle Nr. 151 und 152.)

Setzt man in Formel Nr. 91 der Tabelle, nämlich in

$$\int \frac{(Px+Q)dx}{x^2+2bx+c} = \frac{P}{2} \ln(x^2+2bx+c) + (Q-Pb) \int \frac{dx}{x^2+2bx+c},$$

$$(1.) \quad b = -g, \quad c - b^2 = h^2,$$

so geht sie über in

$$(2.) \quad \int \frac{(Px+Q)dx}{(x-g)^2+h^2} = \frac{P}{2} \ln[(x-g)^2+h^2] + (Pg+Q) \int \frac{dx}{(x-g)^2+h^2};$$

dies gibt nach Formel Nr. 147 der Tabelle

$$(3.) \quad \int \frac{(Px+Q)dx}{(x-g)^2+h^2} = \frac{P}{2} \ln[(x-g)^2+h^2] + \frac{Pg+Q}{h} \operatorname{arctg}\left(\frac{x-g}{h}\right).$$

In ähnlicher Weise kann man $\int \frac{(Px+Q)dx}{[(x-g)^2+h^2]^n}$ auffinden, wenn $n > 1$ vorausgesetzt wird. Es ist nämlich

$$\begin{aligned}(4.) \quad \int \frac{(Px+Q)dx}{[(x-g)^2+h^2]^n} &= \int \frac{P(x-g) + Pg + Q}{[(x-g)^2+h^2]^n} dx \\ &= \frac{P}{2} \int \frac{2(x-g)dx}{[(x-g)^2+h^2]^n} + (Pg+Q) \int \frac{dx}{[(x-g)^2+h^2]^n}.\end{aligned}$$

Setzt man jetzt

$$(5.) \quad (x-g)^2 + h^2 = y, \quad \text{also} \quad 2(x-g)dx = dy,$$

und

$$(6.) \quad x-g = ht, \quad \text{also} \quad dx = hdt,$$

so geht Gleichung (4.) über in

$$\int \frac{(Px + Q)dx}{[(x - g)^2 + h^2]^n} = \frac{P}{2} \int \frac{dy}{y^n} + \frac{Pg + Q}{h^{2n-1}} \int \frac{dt}{(1 + t^2)^n}.$$

dies gibt

$$(7.) \int \frac{(Px + Q)dx}{[(x - g)^2 + h^2]^n} = -\frac{P}{(2n - 2)[(x - g)^2 + h^2]^{n-1}} + \frac{Pg + Q}{h^{2n-1}} \int \frac{dt}{(1 + t^2)^n},$$

wobei das Integral auf der rechten Seite nach Formel Nr. 149 oder 150 der Tabelle berechnet werden kann.

§ 40.

Übungs-Aufgaben.

Aufgabe 1. $\int \frac{(13x^2 - 68x + 95)dx}{(x - 5)(x^2 - 6x + 13)} = ?$

Auflösung. Nach Aufgabe 6 in § 35 ist

$$(1.) \frac{13x^2 - 68x + 95}{(x - 5)(x^2 - 6x + 13)} = \frac{10}{x - 5} + \frac{3x + 7}{x^2 - 6x + 13}.$$

Nun ist nach Formel Nr. 27 der Tabelle

$$(2.) \int \frac{10dx}{x - 5} = 10 \ln(x - 5),$$

und nach Formel Nr. 151 der Tabelle ist

$$(3.) \int \frac{(3x + 7)dx}{x^2 - 6x + 13} = \frac{3}{2} \int \frac{(2x - 6)dx}{x^2 - 6x + 13} + 16 \int \frac{dx}{(x - 3)^2 + 2^2} \\ = \frac{3}{2} \ln(x^2 - 6x + 13) + 8 \operatorname{arctg} \left(\frac{x - 3}{2} \right),$$

folglich wird

$$(4.) \int \frac{(13x^2 - 68x + 95)dx}{(x - 5)(x^2 - 6x + 13)} = 10 \ln(x - 5) + \frac{3}{2} \ln(x^2 - 6x + 13) \\ + 8 \operatorname{arctg} \left(\frac{x - 3}{2} \right).$$

Aufgabe 2. $\int \frac{(6x^2 - 25x + 89)dx}{(x - 3)(x^2 - 4x + 20)} = ?$

Auflösung. Nach Aufgabe 7 in § 35 ist

$$(5.) \frac{6x^2 - 25x + 89}{(x - 3)(x^2 - 4x + 20)} = \frac{4}{x - 3} + \frac{2x - 3}{x^2 - 4x + 20}.$$

Nun ist nach Formel Nr. 27 der Tabelle

$$(6.) \quad \int \frac{4dx}{x-3} = 4\ln(x-3),$$

und nach Formel Nr. 151 der Tabelle ist

$$(7.) \quad \int \frac{(2x-3)dx}{x^2-4x+20} = \int \frac{(2x-4)dx}{x^2-4x+20} + \int \frac{dx}{(x-2)^2+4^2} \\ = \ln(x^2-4x+20) + \frac{1}{4} \operatorname{arctg}\left(\frac{x-2}{4}\right)$$

folglich wird

$$(8.) \quad \int \frac{(6x^2-25x+89)dx}{(x-3)(x^2-4x+20)} = 4\ln(x-3) + \ln(x^2-4x+20) \\ + \frac{1}{4} \operatorname{arctg}\left(\frac{x-2}{4}\right).$$

Aufgabe 3. $\int \frac{7x^2-10x+37}{(x+1)(x^2-4x+13)} dx = ?$

Auflösung. Nach Aufgabe 13 in § 35 ist

$$(9.) \quad \frac{7x^2-10x+37}{(x+1)(x^2-4x+13)} = \frac{3}{x+1} + \frac{4x-2}{x^2-4x+13} \\ = \frac{3}{x+1} + 2 \frac{2x-4}{x^2-4x+13} + \frac{6}{(x-2)^2+3^2},$$

folglich wird

$$(10.) \quad \int \frac{(7x^2-10x+37)dx}{(x+1)(x^2-4x+13)} \\ = 3\ln(x+1) + 2\ln(x^2-4x+13) + 2\operatorname{arctg}\left(\frac{x-2}{3}\right).$$

Aufgabe 4. $\int \frac{7x^3-6x^2+9x+108}{(x^2-4x+13)(x^2+2x+5)} dx = ?$

Auflösung. Nach Aufgabe 8 in § 35 ist

$$(11.) \quad \frac{7x^3-6x^2+9x+108}{(x^2-4x+13)(x^2+2x+5)} = \frac{3x-7}{x^2-4x+13} + \frac{4x+11}{x^2+2x+5} \\ = \frac{3}{2} \cdot \frac{2x-4}{x^2-4x+13} - \frac{1}{(x-2)^2+3^2} \\ + 2 \frac{2x+2}{x^2+2x+5} + \frac{7}{(x+1)^2+2^2},$$

folglich wird

$$(12.) \int \frac{(7x^3 - 6x^2 + 9x + 108)dx}{(x^2 - 4x + 13)(x^2 + 2x + 5)} =$$

$$\frac{3}{2} \ln(x^2 - 4x + 13) - \frac{1}{3} \operatorname{arctg}\left(\frac{x-2}{3}\right)$$

$$+ 2 \ln(x^2 + 2x + 5) + \frac{7}{2} \operatorname{arctg}\left(\frac{x+1}{2}\right).$$

Aufgabe 5. $\int \frac{5x^3 - 12x^2 - 9x + 30}{(x^2 + 4x + 5)(x^2 - 6x + 13)} dx = ?$

Auflösung. Nach Aufgabe 14 in § 35 ist

$$(13.) \frac{5x^3 - 12x^2 - 9x + 30}{(x^2 + 4x + 5)(x^2 - 6x + 13)} = \frac{3x+5}{x^2 + 4x + 5} + \frac{2x-7}{x^2 - 6x + 13}$$

$$= \frac{3}{2} \cdot \frac{2x+4}{x^2 + 4x + 5} - \frac{1}{(x+2)^2 + 1}$$

$$+ \frac{2x-6}{x^2 - 6x + 13} - \frac{1}{(x-3)^2 + 2^2},$$

folglich wird

$$(14.) \int \frac{(5x^3 - 12x^2 - 9x + 30)dx}{(x^2 + 4x + 5)(x^2 - 6x + 13)}$$

$$= \frac{3}{2} \ln(x^2 + 4x + 5) - \operatorname{arctg}(x+2)$$

$$+ \ln(x^2 - 6x + 13) - \frac{1}{2} \operatorname{arctg}\left(\frac{x-3}{2}\right).$$

Aufgabe 6. $\int \frac{(2x+2)dx}{(x-1)(x^2+1)^2} = ?$

Auflösung. Nach Aufgabe 4 in § 36 ist

$$(15.) \frac{2x+2}{(x-1)(x^2+1)^2} = \frac{1}{x-1} - \frac{2x}{(x^2+1)^2} - \frac{x+1}{x^2+1}.$$

Nun ist nach Formel Nr. 27 der Tabelle

$$(16.) \int \frac{dx}{x-1} = \ln(x-1),$$

nach Formel Nr. 152 der Tabelle ist

$$(17.) \int \frac{2xdx}{(x^2+1)^2} = -\frac{1}{x^2+1}$$

und nach Formel Nr. 151 der Tabelle ist

$$(18.) \int \frac{(x+1)dx}{x^2+1} = \frac{1}{2} \ln(x^2+1) + \operatorname{arctg} x.$$

Dieses letzte Resultat hätte man auch mit Hilfe der Formeln Nr. 30 und 18 der Tabelle finden können. Aus den Gleichungen (15.) bis (18.) ergibt sich daher

$$(19.) \int \frac{(2x+2)dx}{(x-1)(x^2+1)^2} = \ln(x-1) + \frac{1}{x^2+1} - \frac{1}{2} \ln(x^2+1) - \operatorname{arctg} x \\ = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{(x-1)^2}{x^2+1} \right) + \frac{1}{x^2+1} - \operatorname{arctg} x.$$

Aufgabe 7. $\int \frac{(3x^5 + 2x^4 + 6x^3 - 11x^2 - 12x - 8)dx}{(x-2)^2(x^2+2x+2)^2} = ?$

Auflösung. Nach Aufgabe 5 in § 36 ist

$$(20.) \frac{3x^5 + 2x^4 + 6x^3 - 11x^2 - 12x - 8}{(x-2)^2(x^2+2x+2)^2} = \frac{1}{(x-2)^2} + \frac{2}{x-2} \\ + \frac{2x+3}{(x^2+2x+2)^2} + \frac{x-1}{x^2+2x+2}.$$

Nun ist nach den Formeln Nr. 146, 27, 151 und 152 der Tabelle

$$(21.) \int \frac{dx}{(x-2)^2} = -\frac{1}{x-2}, \quad \int \frac{2dx}{x-2} = 2 \ln(x-2),$$

$$(22.) \int \frac{(x-1)dx}{x^2+2x+2} = \frac{1}{2} \int \frac{(2x+2)dx}{x^2+2x+2} - 2 \int \frac{dx}{(x+1)^2+1} \\ = \frac{1}{2} \ln(x^2+2x+2) - 2 \operatorname{arctg}(x+1),$$

$$(23.) \int \frac{(2x+3)dx}{(x^2+2x+2)^2} = \int \frac{(2x+2)dx}{(x^2+2x+2)^2} + \int \frac{dx}{[(x+1)^2+1]^2} \\ = -\frac{1}{x^2+2x+2} + \int \frac{dt}{(1+t^2)^2},$$

wobei $x+1$ gleich t gesetzt ist. Dies gibt nach Formel Nr. 149 der Tabelle

$$(24.) \int \frac{dt}{(1+t^2)^2} = \frac{t}{2(1+t^2)} + \frac{1}{2} \int \frac{dt}{1+t^2} \\ = \frac{t}{2(1+t^2)} + \frac{1}{2} \operatorname{arctg} t \\ = \frac{x+1}{2(x^2+2x+2)} + \frac{1}{2} \operatorname{arctg}(x+1),$$

folglich wird

$$(25.) \int \frac{(3x^5 + 2x^4 + 6x^3 - 11x^2 - 12x - 8)dx}{(x-2)^2(x^2 + 2x + 2)^2} =$$

$$-\frac{1}{x-2} + 2\ln(x-2) + \frac{x-1}{2(x^2 + 2x + 2)}$$

$$+ \frac{1}{2}\ln(x^2 + 2x + 2) - \frac{1}{2}\operatorname{arctg}(x+1).$$

Aufgabe 8. $\int \frac{(x+3)dx}{(x^2+x+1)^2} = ?$

Auflösung. Da in diesem Falle

$$(26.) \quad x^2 + x + 1 = (x + \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}$$

ist, so erhält man nach Formel Nr. 152 der Tabelle, indem man

$$(27.) \quad P = 1, \quad Q = 3, \quad g = -\frac{1}{2}, \quad h = \frac{1}{2}\sqrt{3}, \quad n = 2$$

setzt,

$$(28.) \int \frac{(x+3)dx}{(x^2+x+1)^2} = -\frac{1}{2(x^2+x+1)} + \frac{20}{3\sqrt{3}} \int \frac{dt}{(1+t^2)^2},$$

wobei

$$(29.) \quad 2x+1 = t\sqrt{3}$$

gesetzt ist. Dies gibt nach Formel Nr. 149 der Tabelle

$$(30.) \int \frac{dt}{(1+t^2)^2} = \frac{t}{2(1+t^2)} + \frac{1}{2}\operatorname{arctg}t$$

$$= \frac{(2x+1)\sqrt{3}}{8(x^2+x+1)} + \frac{1}{2}\operatorname{arctg}\left(\frac{2x+1}{\sqrt{3}}\right),$$

also

$$(31.) \int \frac{(x+3)dx}{(x^2+x+1)^2} = \frac{5x+1}{3(x^2+x+1)} + \frac{10}{3\sqrt{3}}\operatorname{arctg}\left(\frac{2x+1}{\sqrt{3}}\right).$$

Aufgabe 9. $\int \frac{2x^5 - 3x^4 + 16x^3 - 5x^2 + 9x + 19}{(x-3)^2(x^2+x+1)^2} dx = ?$

Auflösung. Nach Aufgabe 6 in § 36 ist

$$(32.) \quad \frac{2x^5 - 3x^4 + 16x^3 - 5x^2 + 9x + 19}{(x-3)^2(x^2+x+1)^2}$$

$$= \frac{4}{(x-3)^2} + \frac{1}{x-3} + \frac{2x+3}{(x^2+x+1)^2} + \frac{x-1}{x^2+x+1}$$

$$= \frac{4}{(x-3)^2} + \frac{1}{x-3} + \frac{2x+1}{(x^2+x+1)^2} + \frac{2}{[(x+\frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}]^2}$$

$$+ \frac{2x+1}{\frac{1}{2}x^2+x+1} - \frac{1}{2(x+\frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}}.$$

Setzt man wieder

$$g = -\frac{1}{2}, \quad h = \frac{1}{2}\sqrt{3}, \quad 2x + 1 = t\sqrt{3}, \quad x^2 + x + 1 = y,$$

so wird

$$(33.) \quad 3(1 + t^2) = 4(x^2 + x + 1),$$

$$(34.) \quad \int \frac{(2x + 1)dx}{(x^2 + x + 1)^2} = \int \frac{dy}{y^2} = -\frac{1}{y} = -\frac{1}{x^2 + x + 1},$$

und ähnlich wie die Gleichung (30.)

$$(35.) \quad \int \frac{2dx}{[(x + \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}]^2} = \int \frac{16\sqrt{3} \cdot dt}{9(1 + t^2)^2} = \frac{8}{3\sqrt{3}} \left(\frac{t}{1 + t^2} + \operatorname{arctg} t \right) \\ = \frac{4x + 2}{3(x^2 + x + 1)} + \frac{8}{3\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \left(\frac{2x + 1}{\sqrt{3}} \right),$$

$$(36.) \quad \int \frac{(2x + 1)dx}{x^2 + x + 1} = \ln(x^2 + x + 1),$$

$$(37.) \quad \int \frac{dx}{(x + \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}} = \int \frac{4dx}{(2x + 1)^2 + 3} \\ = \frac{2\sqrt{3}}{3} \int \frac{dt}{1 + t^2} = \frac{2}{\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \left(\frac{2x + 1}{3} \right).$$

Deshalb wird

$$(38.) \quad \int \frac{(2x^5 - 3x^4 + 16x^3 - 5x^2 + 9x + 19)dx}{(x - 3)^2(x^2 + x + 1)^2} \\ = -\frac{4}{x - 3} + \ln(x - 3) - \frac{1}{x^2 + x + 1} \\ + \frac{4x + 2}{3(x^2 + x + 1)} + \frac{8}{3\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \left(\frac{2x + 1}{\sqrt{3}} \right) + \frac{1}{2} \ln(x^2 + x + 1) \\ - \frac{3}{\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \left(\frac{2x + 1}{\sqrt{3}} \right) \\ = -\frac{4}{x - 3} + \frac{4x - 1}{3(x^2 + x + 1)} - \frac{1}{3\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \left(\frac{2x + 1}{\sqrt{3}} \right) \\ + \ln(x - 3) + \frac{1}{2} \ln(x^2 + x + 1).$$

Aufgabe 10. $\int \frac{(5x^2 - 8x - 4)dx}{x^3 + 1} = ?$

Auflösung. Hier ist

$$(39.) \quad \frac{5x^2 - 8x - 4}{x^3 + 1} = \frac{A}{x + 1} + \frac{Px + Q}{x^2 - x + 1},$$

oder, wenn man beide Seiten der Gleichung mit

$$x^3 + 1 = (x + 1)(x^2 - x + 1)$$

multipliziert,

$$5x^2 - 8x - 4 = A(x^2 - x + 1) + (Px + Q)(x + 1).$$

Dies gibt für $x = -1$

$$9 = 3A, \text{ oder } A = 3$$

und für $x^2 - x + 1 = 0$, oder $x^2 = x - 1$,

$$-3x - 9 = (2P + Q)x + (-P + Q),$$

also

$$(40.) \quad 2P + Q = -3, \quad -P + Q = -9,$$

$$(41.) \quad P = 2, \quad Q = -7,$$

$$(42.) \quad \frac{5x^2 - 8x - 4}{x^3 + 1} = \frac{3}{x + 1} + \frac{2x - 7}{x^2 - x + 1}.$$

Nun ist nach Formel Nr. 27 der Tabelle

$$(43.) \quad 3 \int \frac{dx}{x + 1} = 3 \ln(x + 1)$$

und nach Formel Nr. 151 der Tabelle

$$(44.) \quad \int \frac{(2x - 7)dx}{x^2 - x + 1} = \int \frac{(2x - 1)dx}{x^2 - x + 1} - 6 \int \frac{dx}{(x - \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}} \\ = \ln(x^2 - x + 1) - 4\sqrt{3} \operatorname{arctg}\left(\frac{2x - 1}{\sqrt{3}}\right),$$

folglich findet man

$$(45.) \quad \int \frac{(5x^2 - 8x - 4)dx}{x^3 + 1} \\ = 3 \ln(x + 1) + \ln(x^2 - x + 1) - 4\sqrt{3} \operatorname{arctg}\left(\frac{2x - 1}{\sqrt{3}}\right).$$

Dem Anfänger wird die Prüfung der vorstehenden Auflösungen durch Differentiation empfohlen.

In manchen Fällen, wo die Integration durch Partialbruch-Zerlegung sehr umständlich oder infolge von alge-

braischen Schwierigkeiten garnicht durchführbar sein würde, gelingt die Integration durch zweckmäßige Umformungen und Substitutionen, wie durch einige Beispiele zur Erläuterung gezeigt werden möge.

Aufgabe 11. $\int \frac{dx}{x(x^3+1)} = ?$

Auflösung. Setzt man in diesem Falle

(46.) $x = \frac{1}{t}, \text{ also } dx = -\frac{dt}{t^2},$

so wird

(47.) $\int \frac{dx}{x(x^3+1)} = -\int \frac{t^2 dt}{t^3+1} = -\frac{1}{3} \ln(t^3+1),$

oder

(48.) $\int \frac{dx}{x(x^3+1)} = -\frac{1}{3} \ln\left(\frac{1}{x^3}+1\right) = -\frac{1}{3} \ln\left(\frac{x^3+1}{x^3}\right)$
 $= \frac{1}{3} \ln\left(\frac{x^3}{x^3+1}\right) = \ln\left(\frac{x}{\sqrt[3]{x^3+1}}\right).$

Man kann dieses Resultat auch in folgender Weise finden. Es ist

$$\frac{1}{x(x^3+1)} = \frac{(x^3+1)-x^3}{x(x^3+1)} = \frac{1}{x} - \frac{x^2}{x^3+1},$$

also

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{x(x^3+1)} &= \int \frac{dx}{x} - \int \frac{x^2 dx}{x^3+1} \\ &= \ln x - \frac{1}{3} \ln(x^3+1) = \ln\left(\frac{x}{\sqrt[3]{x^3+1}}\right). \end{aligned}$$

Aufgabe 12. $\int \frac{dx}{x(x^4+1)} = ?$

Auflösung. Setzt man in diesem Falle

(49.) $x = \frac{1}{t}, \text{ also } dx = -\frac{dt}{t^2},$

so wird

(50.) $\int \frac{dx}{x(x^4+1)} = -\int \frac{t^3 dt}{t^4+1} = -\frac{1}{4} \ln(t^4+1),$

oder

$$\begin{aligned}
 (51.) \quad \int \frac{dx}{x(x^4+1)} &= -\frac{1}{4} \ln\left(\frac{1}{x^4} + 1\right) = -\frac{1}{4} \ln\left(\frac{x^4+1}{x^4}\right) \\
 &= \frac{1}{4} \ln\left(\frac{x^4}{x^4+1}\right) = \ln\left(\frac{x}{\sqrt[4]{x^4+1}}\right).
 \end{aligned}$$

Auch hier findet man dasselbe Resultat aus der Gleichung

$$\frac{1}{x(x^4+1)} = \frac{(x^4+1) - x^4}{x(x^4+1)} = \frac{1}{x} - \frac{x^3}{x^4+1},$$

aus der dann unmittelbar folgt

$$\int \frac{dx}{x(x^4+1)} = \int \frac{dx}{x} - \int \frac{x^3 dx}{x^4+1} = \ln x - \frac{1}{4} \ln(x^4+1) = \ln\left(\frac{x}{\sqrt[4]{x^4+1}}\right).$$

Bezeichnet man in dem Falle, wo $f(x) = 0$ mehrfache Wurzeln hat, (in Übereinstimmung mit § 119 der Differential-Rechnung) den größten gemeinsamen Teiler von $f(x)$ und $f'(x)$ mit $\vartheta(x)$, setzt man also

$$(52.) \quad \vartheta(x) = (x-a)^{\alpha-1}(x-b)^{\beta-1}(x-c)^{\gamma-1} \dots (x-l)^{\lambda-1}$$

und

$$(53.) \quad \rho(x) = \frac{f(x)}{\vartheta(x)} = (x-a)(x-b)(x-c) \dots (x-l),$$

so braucht man, um $\vartheta(x)$ und $\rho(x)$ zu bilden, keineswegs die Wurzeln von $f(x) = 0$ zu kennen, sondern kann sie durch rationale Operationen aus den Polynomen $f(x)$ und $f'(x)$ herleiten. Dann läßt sich die Partialbruch-Zerlegung auch in folgender Weise ausführen*).

Es sei n wieder der Grad von $f(x)$, und m sei der Grad von $\rho(x)$, also die Anzahl der voneinander verschiedenen Wurzeln $a, b, c, \dots l$ der Gleichung $f(x) = 0$. Die echt gebrochene rationale Funktion $\frac{\vartheta(x)}{f(x)}$ konnte dann nach Gleichung (11.) in § 36 auf die Form

*) Der Anfänger darf diese Auseinandersetzung übergehen.

$$(54.) \quad \frac{\varphi(x)}{f(x)} = \frac{A_1}{(x-a)^\alpha} + \frac{A_2}{(x-a)^{\alpha-1}} + \dots + \frac{A_\alpha}{x-a} \\
+ \frac{B_1}{(x-b)^\beta} + \frac{B_2}{(x-b)^{\beta-1}} + \dots + \frac{B_\beta}{x-b} \\
+ \dots \dots \dots \\
+ \frac{L_1}{(x-l)^\lambda} + \frac{L_2}{(x-l)^{\lambda-1}} + \dots + \frac{L_\lambda}{x-l}$$

gebracht werden. Bei der Integration liefern nur die Partialbrüche

$$\frac{A_\alpha}{x-a} + \frac{B_\beta}{x-b} + \dots + \frac{L_\lambda}{x-l}$$

die logarithmischen Glieder

$$A_\alpha \ln(x-a) + B_\beta \ln(x-b) + \dots + L_\lambda \ln(x-l);$$

die übrigen Partialbrüche ergeben bei der Integration echt gebrochene rationale Funktionen, deren Summe wieder eine echt gebrochene rationale Funktion mit dem Generalnenner $\vartheta(x)$ ist. Man findet daher

$$(55.) \quad \int \frac{\varphi(x)dx}{f(x)} = \frac{\psi(x)}{\vartheta(x)} + A_\alpha \ln(x-a) + B_\beta \ln(x-b) + \dots \\
+ L_\lambda \ln(x-l),$$

wobei der Grad von $\vartheta(x)$ gleich $n-m$, und der von

$$(56.) \quad \psi(x) = c_1 x^{n-m-1} + c_2 x^{n-m-2} + \dots + c_{n-m-1} x + c_{n-m}$$

höchstens $n-m-1$ ist. Auch die Summe

$$(57.) \quad \frac{A_\alpha}{x-a} + \frac{B_\beta}{x-b} + \dots + \frac{L_\lambda}{x-l} = \frac{\varrho(x)}{\vartheta(x)}$$

ist eine echt gebrochene rationale Funktion, bei welcher der Grad von $\varrho(x)$ gleich m , und der Grad von

$$(58.) \quad \sigma(x) = k_1 x^{m-1} + k_2 x^{m-2} + \dots + k_{m-1} x + k_m$$

höchstens $m-1$ ist. Die Funktion $\psi(x)$ kann jetzt bestimmt werden, ohne daß eine Integration ausgeführt zu werden braucht; denn aus Gleichung (55.) erhält man

$$(59.) \quad \frac{\varphi(x)}{f(x)} = \frac{\vartheta(x) \cdot \psi'(x) - \psi(x) \cdot \vartheta'(x)}{\vartheta(x)^2} + \frac{\sigma(x)}{\varrho(x)},$$

wobei man noch auf der rechten Seite dieser Gleichung Zähler und Nenner des ersten Gliedes durch den größten

gemeinsamen Teiler $\tau(x)$ von $\vartheta(x)$ und $\vartheta'(x)$, der wieder durch rationale Operationen gefunden wird, dividieren kann. Setzt man dabei

$$(60.) \quad \vartheta(x) = \tau(x) \cdot \vartheta_1(x), \quad \vartheta'(x) = \tau(x) \cdot \vartheta_2(x),$$

so geht Gleichung (59.) über in

$$(59a.) \quad \frac{\varphi(x)}{f(x)} = \frac{\vartheta_1(x) \cdot \psi'(x) - \psi(x) \cdot \vartheta_2(x)}{\vartheta(x) \cdot \vartheta_1(x)} + \frac{\alpha(x)}{\varrho(x)},$$

wobei $\vartheta_1(x)$ ein Teiler von $\varrho(x)$ und deshalb $\vartheta(x) \cdot \vartheta_1(x)$ ein Teiler von $f(x)$ ist. Schafft man noch in Gleichung (59a.) die Nenner fort, indem man beide Seiten der Gleichung mit $f(x) = \vartheta(x) \cdot \varrho(x)$ multipliziert, so müssen die gleichstelligen Koeffizienten auf beiden Seiten der neuen Gleichung einander gleich sein. Dadurch erhält man n lineare Gleichungen mit den n Unbekannten

$$c_1, c_2, \dots, c_{n-m}; \quad k_1, k_2, \dots, k_m,$$

die sich immer auflösen lassen.

Man kann also die Gleichung (59a.) und deshalb auch

$$(61.) \quad \int \frac{\vartheta_1(x) \cdot \psi'(x) - \psi(x) \cdot \vartheta_2(x)}{\vartheta(x) \cdot \vartheta_1(x)} dx = \frac{\psi(x)}{\vartheta(x)}$$

vollständig bilden, und zwar ist dieses Verfahren auch dann noch durchführbar, wenn man die Wurzeln der Gleichung $f(x) = 0$ nicht kennt. Dagegen ist zur Berechnung von $\int \frac{\alpha(x)}{\varrho(x)} dx$ in endlicher geschlossener Form die Kenntnis der Wurzeln a, b, \dots, l erforderlich.

XI. Abschnitt.

Integration der irrationalen Funktionen.

§ 41.

Allgemeine Bemerkungen.

Im ersten Teile der Integral-Rechnung sind bereits irrationale Differential-Funktionen in größerer Anzahl integriert und die Resultate in die Formel-Tabelle aufgenommen worden. (Man vergleiche Nr. 17, 23, 24, 31 bis 42, 84 bis 86a, 119 bis 131a der Formel-Tabelle.)

Dabei wurden in den Formeln Nr. 84 bis 86a die Irrationalitäten

$$\sqrt{a^2 - x^2}, \quad \sqrt{a^2 + x^2}, \quad \sqrt{x^2 - a^2}$$

bezw. mit Hilfe der Substitutionen

$$x = a \sin t, \quad \text{oder} \quad x = a \operatorname{Tgu} u,$$

$$x = a \operatorname{tg} t, \quad x = a \operatorname{Sin} u,$$

$$x = \frac{a}{\cos t}, \quad " \quad x = a \csc u$$

weggeschafft. Dadurch erhielt man unter dem Integralzeichen rationale Funktionen der trigonometrischen Funktionen

$\sin t, \cos t, \operatorname{tg} t, \operatorname{ctg} t,$

bezw. der hyperbolischen Funktionen

Sinu, Cosu, Igu, Etgu.

Setzt man dann noch

$$\operatorname{tg}\left(\frac{t}{2}\right)=z, \quad \text{bezw.} \quad \operatorname{Tg}\left(\frac{u}{2}\right)=z,$$

so erhält man unter dem Integralzeichen eine *rationale* Funktion von z .

In betreff der übrigen irrationalen Differential-Funktionen ist zu bemerken, daß es verhältnismäßig nur wenige Fälle gibt, bei denen sich die Integration durch Anwendung algebraischer Funktionen oder der bisher hier betrachteten transzendenten Funktionen ausführen läßt. In den meisten Fällen werden durch die Integrale algebraischer Differential-Funktionen *neue* (d. h. bisher hier noch nicht betrachtete) transzendente Funktionen erklärt.

Zunächst mögen nur solche *irrationale* Differential-Funktionen in Betracht gezogen werden, welche sich durch eine Substitution auf bereits bekannte Integrale zurückführen lassen; namentlich sollen diejenigen Fälle berücksichtigt werden, in denen die gegebene *irrationale* Differential-Funktion durch Substitution in eine *rationale* umgewandelt und daher nach den Methoden der Partialbruchzerlegung erledigt werden kann.

§ 42.

Integration rationaler Funktionen der Argumente

$$x, \left(\frac{\alpha x + \beta}{\gamma x + \delta}\right)^{\frac{m}{n}}, \left(\frac{\alpha x + \beta}{\gamma x + \delta}\right)^{\frac{p}{q}}, \dots$$

(Vergl. die Formel-Tabelle Nr. 153 und 154.)

Kommen in der Funktion unter dem Integralzeichen keine anderen Irrationalitäten vor als Wurzeln aus x selbst, so läßt sich die Differential-Funktion durch die Substitution

$$(1.) \quad x = t^x$$

sehr leicht *rational* machen, wenn man den Exponenten x so wählt, daß x durch alle auftretenden Wurzel-Exponenten teilbar ist.

Wie dies gemeint ist, möge zunächst ein Beispiel zeigen.

Aufgabe 1.
$$\int \frac{(\sqrt[4]{x^3} - 7\sqrt[3]{x^2} + 12\sqrt{x})dx}{x(\sqrt[3]{x} - \sqrt[6]{x})} = ?$$

Auflösung. Das kleinste gemeinsame Vielfache der Wurzel-Exponenten 2, 3, 4 und 6 ist 12, folglich muß man

$$(2.) \quad x = t^{12}, \quad \text{oder} \quad \sqrt[12]{x} = t$$

setzen und erhält

$$(3.) \quad \sqrt[4]{x^3} = t^9, \quad \sqrt[3]{x^2} = t^8, \quad \sqrt{x} = t^6, \quad \sqrt[3]{x} = t^4, \quad \sqrt[6]{x} = t^2.$$

Dies gibt

$$(4.) \quad \int \frac{(\sqrt[4]{x^3} - 7\sqrt[3]{x^2} + 12\sqrt{x})dx}{x(\sqrt[3]{x} - \sqrt[6]{x})} = 12 \int \frac{(t^9 - 7t^8 + 12t^6)t^{11}dt}{t^{12}(t^4 - t^2)} \\ = 12 \int \frac{(t^6 - 7t^5 + 12t^3)dt}{t^2 - 1}.$$

Nun ist

$$(5.) \quad t^6 - 7t^5 + 12t^3 = (t^2 - 1)(t^4 - 7t^3 + t^2 + 5t + 1) + 5t + 1,$$

also

$$(6.) \quad \frac{t^6 - 7t^5 + 12t^3}{t^2 - 1} = t^4 - 7t^3 + t^2 + 5t + 1 + \frac{5t + 1}{t^2 - 1} \\ = t^4 - 7t^3 + t^2 + 5t + 1 + \frac{3}{t-1} + \frac{2}{t+1},$$

folglich ist

$$(7.) \quad \int \frac{(\sqrt[4]{x^3} - 7\sqrt[3]{x^2} + 12\sqrt{x})dx}{x(\sqrt[3]{x} - \sqrt[6]{x})} = 12 \left[\frac{t^5}{5} - \frac{7t^4}{4} + \frac{t^3}{3} + \frac{5t^2}{2} + t \right. \\ \left. + 3\ln(t-1) + 2\ln(t+1) \right],$$

wobei nach Gleichung (2.)

$$t = \sqrt[12]{x}$$

ist.

Daraus erkennt man schon, daß die oben angegebene Regel ganz allgemein anwendbar ist; denn bezeichnet man mit x das kleinste gemeinsame Vielfache der Zahlen n, q, \dots , die in den Exponenten von x als Nenner auftreten, und setzt man in Übereinstimmung mit Gleichung (1.)

$$(1a.) \quad x = t^x, \quad \text{also} \quad t = \sqrt[x]{x}, \quad dx = xt^{x-1}dt,$$

so erhält man

$$(8.) \quad \int f(x, x^{\frac{m}{n}}, x^{\frac{p}{q}}, \dots) dx = \int f(t^x, t^{\frac{xm}{n}}, t^{\frac{xp}{q}}, \dots) xt^{x-1} dt,$$

wobei die Exponenten $\frac{xm}{n}, \frac{xp}{q}, \dots$ sämtlich ganze Zahlen werden, so daß die Differential-Funktion *rational* wird.

Auf diesen Fall kann man den allgemeineren zurückführen, wo unter dem Integralzeichen eine rationale Funktion der Argumente

$$x, \left(\frac{\alpha x + \beta}{\gamma x + \delta}\right)^{\frac{m}{n}}, \left(\frac{\alpha x + \beta}{\gamma x + \delta}\right)^{\frac{p}{q}}, \dots$$

steht. Setzt man nämlich

$$(9.) \quad \frac{\alpha x + \beta}{\gamma x + \delta} = y,$$

so wird

$$(10.) \quad x = -\frac{\delta y - \beta}{\gamma y - \alpha}, \quad dx = \frac{(\alpha\delta - \beta\gamma)dy}{(\gamma y - \alpha)^2},$$

so daß man erhält

$$(11.) \quad \int f\left[x, \left(\frac{\alpha x + \beta}{\gamma x + \delta}\right)^{\frac{m}{n}}, \left(\frac{\alpha x + \beta}{\gamma x + \delta}\right)^{\frac{p}{q}}, \dots\right] dx = \\ \int f\left(-\frac{\delta y - \beta}{\gamma y - \alpha}, y^{\frac{m}{n}}, y^{\frac{p}{q}}, \dots\right) \cdot \frac{(\alpha\delta - \beta\gamma)dy}{(\gamma y - \alpha)^2}.$$

Ist jetzt κ das kleinste gemeinsame Vielfache der Wurzelexponenten n, q, \dots , so wird die Differential-Funktion *rational* durch die Substitution

$$(12.) \quad y = t^{\kappa}.$$

§ 43.

Übungs-Aufgaben.

Aufgabe 1. $\int \frac{x dx}{\sqrt{x-1}} = ?$

Auflösung. Setzt man hier

$$(1.) \quad \sqrt{x} = t, \quad \text{also} \quad x = t^2, \quad dx = 2t dt,$$

so wird

$$(2.) \quad \int \frac{x dx}{\sqrt{x-1}} = \int \frac{2t^3 dt}{t-1} = 2 \int \left(t^2 + t + 1 + \frac{1}{t-1}\right) dt \\ = 2 \left[\frac{t^3}{3} + \frac{t^2}{2} + t + \ln(t-1) \right] \\ = \frac{1}{3} \left[2x\sqrt{x} + 3x + 6\sqrt{x} + 6\ln(\sqrt{x}-1) \right].$$

Aufgabe 2. $\int \frac{\sqrt{x}}{x-1} dx = ?$

Auflösung. Durch dieselbe Substitution. wie bei der vorhergehenden Aufgabe findet man

$$(3.) \int \frac{\sqrt{x}}{x-1} dx = \int \frac{t \cdot 2t dt}{t^2-1} = 2 \int \frac{t^2 dt}{t^2-1} = 2 \int \frac{(t^2-1+1)dt}{t^2-1},$$

also mit Rücksicht auf Formel Nr. 29a der Tabelle

$$(4.) \int \frac{\sqrt{x}}{x-1} dx = 2 \int \left(1 + \frac{1}{t^2-1}\right) dt = 2t + \ln\left(\frac{t-1}{t+1}\right) \\ = 2\sqrt{x} + \ln\left(\frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+1}\right).$$

Aufgabe 3. $\int \frac{\sqrt[3]{x}}{x-1} dx = ?$

Auflösung. In diesem Falle muß man

$$(5.) \sqrt[3]{x} = t, \quad x = t^3, \quad dx = 3t^2 dt$$

setzen und erhält

$$(6.) \int \frac{\sqrt[3]{x}}{x-1} dx = \int \frac{t \cdot 3t^2 dt}{t^3-1} = 3 \int \frac{t^3 dt}{t^3-1} = 3 \int \frac{(t^3-1+1)dt}{t^3-1} \\ = 3 \int \left(1 + \frac{1}{t^3-1}\right) dt = 3t + 3 \int \frac{dt}{t^3-1}.$$

Um $3 \int \frac{dt}{t^3-1}$ zu ermitteln, wende man Partialbruch-Zerlegung an und setze

$$(7.) \quad \frac{3}{t^3-1} = \frac{A}{t-1} + \frac{Pt+Q}{t^2+t+1};$$

dies gibt durch Fortschaffung der Nenner

$$(8.) \quad 3 = A(t^2+t+1) + (Pt+Q)(t-1),$$

also für $t = 1$

$$(9.) \quad 3 = 3A, \quad \text{oder} \quad A = 1$$

und für $t^2+t+1 = 0$

$$(10.) \quad 3 = (-2P+Q)t + (-P-Q),$$

also

$$(11.) \quad -2P+Q = 0, \quad P+Q = -3, \quad \text{oder} \quad P = -1, \quad Q = -2.$$

Dadurch erhält man nach Formel Nr. 27 und 151 der Tabelle

$$(12.) \quad 3 \int \frac{dt}{t^3 - 1} = \int \frac{dt}{t - 1} - \int \frac{(t + 2)dt}{t^2 + t + 1} \\ = \ln(t - 1) - \frac{1}{2} \ln(t^2 + t + 1) - \sqrt{3} \operatorname{arctg}\left(\frac{2t + 1}{\sqrt{3}}\right),$$

also

$$(13.) \quad \int \frac{\sqrt[3]{x}}{x - 1} dx = 3 \sqrt[3]{x} + \ln(\sqrt[3]{x} - 1) - \frac{1}{2} \ln(\sqrt[3]{x^2} + \sqrt[3]{x} + 1) \\ - \sqrt{3} \operatorname{arctg}\left(\frac{2\sqrt[3]{x} + 1}{\sqrt{3}}\right).$$

Aufgabe 4. $\int x dx \sqrt{a + x} = ?$

Auflösung. Hier ist zu setzen

$$(14.) \quad \sqrt{a + x} = t, \text{ also } a + x = t^2, x = t^2 - a, dx = 2t dt, \\ \text{dann wird}$$

$$(15.) \quad \int x dx \sqrt{a + x} = \int 2(t^2 - a)t^2 dt \\ = 2 \int t^4 dt - 2a \int t^2 dt = \frac{2t^5}{5} - \frac{2at^3}{3},$$

oder

$$(16.) \quad \int x dx \sqrt{a + x} = \frac{2}{15} t^3 (3t^2 - 5a) = \frac{2}{15} (a + x) \sqrt{a + x} (3x - 2a).$$

Man hätte auch die Integration in folgender Weise ausführen können. Man setze

$$(17.) \quad x \sqrt{a + x} = (a + x - a) \sqrt{a + x} = (a + x)^{\frac{3}{2}} - a(a + x)^{\frac{1}{2}},$$

also nach Formel Nr. 9 der Tabelle

$$(18.) \quad \int x dx \sqrt{a + x} = \int (a + x)^{\frac{3}{2}} d(a + x) - a \int (a + x)^{\frac{1}{2}} d(a + x) \\ = \frac{2}{5} (a + x)^{\frac{5}{2}} - \frac{2}{3} a (a + x)^{\frac{3}{2}} \\ = \frac{2}{15} (a + x) \sqrt{a + x} (3x - 2a).$$

Aufgabe 5. $\int \frac{dx}{x \sqrt{x + a}} = ?$

Auflösung. Durch dieselbe Substitution wie bei der vorhergehenden Aufgabe findet man

$$(19.) \quad \int \frac{dx}{x\sqrt{x+a}} = \int \frac{2t dt}{(t^2 - a)t} = 2 \int \frac{dt}{t^2 - a}.$$

Dies gibt nach Formel Nr. 29a der Tabelle

$$(20.) \quad \begin{aligned} \int \frac{dx}{x\sqrt{x+a}} &= \frac{1}{\sqrt{a}} \ln \left(\frac{t - \sqrt{a}}{t + \sqrt{a}} \right) = \frac{1}{\sqrt{a}} \ln \left(\frac{\sqrt{x+a} - \sqrt{a}}{\sqrt{x+a} + \sqrt{a}} \right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{a}} \ln \left(\frac{(\sqrt{x+a} - \sqrt{a})^2}{x} \right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{a}} \ln \left(\frac{x + 2a - 2\sqrt{a(a+x)}}{x} \right). \end{aligned}$$

Aufgabe 6. $\int \sqrt{\frac{a+x}{a-x}} dx = ?$

Auflösung. Es sei

$$(21.) \quad \sqrt{\frac{a+x}{a-x}} = t, \quad \text{also} \quad \frac{a+x}{a-x} = t^2, \quad x = a \frac{t^2 - 1}{t^2 + 1},$$

$$(22.) \quad dx = \frac{4at dt}{(t^2 + 1)^2},$$

dann wird

$$(23.) \quad \begin{aligned} \int \sqrt{\frac{a+x}{a-x}} dx &= 4a \int \frac{t^2 dt}{(t^2 + 1)^2} = 4a \int \frac{(t^2 + 1 - 1) dt}{(t^2 + 1)^2} \\ &= 4a \left[\int \frac{dt}{t^2 + 1} - \int \frac{dt}{(t^2 + 1)^2} \right]. \end{aligned}$$

Nun ist nach Formel Nr. 18 und 149 der Tabelle

$$(24.) \quad \int \frac{dt}{1+t^2} = \operatorname{arctg} t,$$

$$(25.) \quad \int \frac{dt}{(1+t^2)^2} = \frac{t}{2(1+t^2)} + \frac{1}{2} \int \frac{dt}{1+t^2} = \frac{t}{2(1+t^2)} + \frac{1}{2} \operatorname{arctg} t,$$

folglich wird

$$(26.) \quad \int \sqrt{\frac{a+x}{a-x}} dx = 4a \left[\frac{1}{2} \operatorname{arctg} t - \frac{t}{2(1+t^2)} \right],$$

oder, da

$$1+t^2 = 1 + \frac{a+x}{a-x} = \frac{2a}{a-x}, \quad \frac{t}{1+t^2} = \frac{\sqrt{a^2-x^2}}{2a}$$

ist,

$$(27.) \quad \int \sqrt{\frac{a+x}{a-x}} dx = 2a \operatorname{arctg} \sqrt{\frac{a+x}{a-x}} - \sqrt{a^2 - x^2}.$$

Einfacher kann man in diesem Falle die Integration ausführen, indem man

$$(28.) \quad \sqrt{\frac{a+x}{a-x}} = \sqrt{\frac{(a+x)^2}{(a-x)(a+x)}} = \frac{a+x}{\sqrt{a^2-x^2}}$$

setzt; dadurch erhält man nach Formel Nr. 34 und 31 der Tabelle

$$(29.) \quad \begin{aligned} \int \sqrt{\frac{a+x}{a-x}} dx &= a \int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} + \int \frac{x dx}{\sqrt{a^2-x^2}} \\ &= a \arcsin\left(\frac{x}{a}\right) - \sqrt{a^2-x^2}. \end{aligned}$$

Dieses Resultat weicht allerdings in der Form von dem in Gleichung (27.) enthaltenen ab; setzt man aber

$$(30.) \quad \operatorname{arctg} \sqrt{\frac{a+x}{a-x}} = z, \quad \text{oder} \quad \operatorname{tg} z = \sqrt{\frac{a+x}{a-x}},$$

so ist

$$\operatorname{tg}^2 z = \frac{a+x}{a-x}, \quad \text{also} \quad x = a \frac{\operatorname{tg}^2 z - 1}{\operatorname{tg}^2 z + 1},$$

oder

$$(31.) \quad x = a \frac{\sin^2 z - \cos^2 z}{\sin^2 z + \cos^2 z} = -a(\cos^2 z - \sin^2 z) = -a \cos(2z) \\ = a \sin\left(2z - \frac{\pi}{2}\right).$$

Deshalb wird

$$(32.) \quad \arcsin\left(\frac{x}{a}\right) = 2z - \frac{\pi}{2} = 2 \operatorname{arctg} \sqrt{\frac{a+x}{a-x}} - \frac{\pi}{2},$$

so daß die beiden in den Gleichungen (27.) und (29.) angegebenen Resultate sich nur durch eine Integrations-Konstante voneinander unterscheiden.

§ 44.

Zurückführung der Differential-Funktionen von der Form $F(x, \sqrt{Ax^2 + 2Bx + C})dx$ auf Differential-Funktionen von der Form $f(y, \sqrt{y^2 - a^2})dy$, $f(y, \sqrt{a^2 + y^2})dx$, $f(y, \sqrt{a^2 - y^2})dy$.

(Vergl. die Formel-Tabelle Nr. 155 und 156.)

Es sei $F(x, \sqrt{Ax^2 + 2Bx + C})$ eine rationale Funktion von x und $\sqrt{Ax^2 + 2Bx + C}$, dann ergibt sich eine Vereinfachung durch die Umformungen, welche man auch bei der Auflösung der quadratischen Gleichungen anwendet. Dabei mögen zwei Fälle unterschieden werden.

I. Fall. $A > 0$.

Setzt man

$$(1.) \quad y = \frac{Ax + B}{\sqrt{A}}, \quad \text{also} \quad y^2 = Ax^2 + 2Bx + \frac{B^2}{A},$$

so wird

$$(2.) \quad Ax^2 + 2Bx + C = y^2 - \frac{B^2 - AC}{A}.$$

Hierbei wird $\frac{B^2 - AC}{A}$ positiv oder negativ, je nachdem die „Diskriminante“ $B^2 - AC$ positiv oder negativ ist. Um diese beiden Fälle zusammenzufassen, setze man

$$(3.) \quad \frac{B^2 - AC}{A} = \pm a^2;$$

dann wird

$$(4.) \quad Ax^2 + 2Bx + C = y^2 \mp a^2,$$

$$\text{also} \quad \sqrt{Ax^2 + 2Bx + C} = \sqrt{y^2 \mp a^2}.$$

Aus Gleichung (1.) findet man noch

$$(5.) \quad x = \frac{y\sqrt{A} - B}{A}, \quad dx = \frac{dy}{\sqrt{A}},$$

folglich wird

$$(6.) \quad \int F(x, \sqrt{Ax^2 + 2Bx + C})dx = \int F\left(\frac{y\sqrt{A} - B}{A}, \sqrt{y^2 \mp a^2}\right) \frac{dy}{\sqrt{A}}.$$

II. Fall. $A < 0$.

Setzt man

$$(7.) \quad y = \frac{Ax + B}{\sqrt{-A}}, \quad \text{also} \quad -y^2 = Ax^2 + 2Bx + \frac{B^2}{A},$$

so wird

$$(8.) \quad Ax^2 + 2Bx + C = \frac{AC - B^2}{A} - y^2.$$

Hierbei wird $\frac{AC - B^2}{A}$ positiv oder negativ, je nachdem die „Diskriminante“ $B^2 - AC$ positiv oder negativ ist. Um diese beiden Fälle zusammenzufassen, setze man

$$(9.) \quad \frac{AC - B^2}{A} = \frac{B^2 - AC}{-A} = \pm a^2,$$

dann wird

$$(10.) \quad Ax^2 + 2Bx + C = \pm a^2 - y^2,$$

also

$$\sqrt{Ax^2 + 2Bx + C} = \sqrt{\pm a^2 - y^2}.$$

Aus Gleichung (7.) findet man noch

$$(11.) \quad x = \frac{y\sqrt{-A} - B}{A}, \quad dx = -\frac{dy}{\sqrt{-A}},$$

folglich wird

$$(12.) \quad \int \sqrt{Ax^2 + 2Bx + C} dx = -\int F\left(\frac{y\sqrt{-A} - B}{A}, \sqrt{\pm a^2 - y^2}\right) \frac{dy}{\sqrt{-A}}.$$

Gilt in Gleichung (12.) das untere Zeichen, so wird

$$(13.) \quad \sqrt{Ax^2 + 2Bx + C} = \sqrt{-a^2 - y^2} = i\sqrt{a^2 + y^2}$$

für alle reellen Werte von x imaginär, so daß in diesem Falle $F(x, \sqrt{Ax^2 + 2Bx + C})$ eine komplexe Größe ist. Deshalb lassen sich auch bei Ermittlung des gesuchten Integrals komplexe Größen nicht vermeiden. Man kann in diesem Falle auch

$$(14.) \quad \sqrt{Ax^2 + 2Bx + C} = i\sqrt{-(Ax^2 + 2Bx + C)}$$

setzen und erhält dadurch eine Wurzelgröße, auf welche die im Falle I gemachten Voraussetzungen zutreffen.

§ 45.

Übungs-Aufgaben.

(Vergl. die Formel-Tabelle Nr. 157 und 158.)

Aufgabe 1. $\int \frac{dx}{\sqrt{Ax^2 + 2Bx + C}} = ?$

Auflösung. Im Falle I erhält man nach den Formeln Nr. 155, 35 und 36 der Tabelle

$$(1.) \int \frac{dx}{\sqrt{Ax^2 + 2Bx + C}} = \int \frac{dy}{\sqrt{A} \sqrt{y^2 + a^2}} = \frac{1}{\sqrt{A}} \ln \left(\frac{y + \sqrt{y^2 + a^2}}{a} \right) \\ = \frac{1}{\sqrt{A}} [\ln(y + \sqrt{y^2 + a^2}) - \ln a],$$

oder, wenn man die Integrations-Konstante $-\frac{\ln a}{\sqrt{A}}$ fortläßt,

$$(1a.) \int \frac{dx}{\sqrt{Ax^2 + 2Bx + C}} = \frac{1}{\sqrt{A}} \ln(y + \sqrt{y^2 + a^2}) \\ = \frac{1}{\sqrt{A}} \ln \left(\frac{Ax + B}{\sqrt{A}} + \sqrt{Ax^2 + 2Bx + C} \right).$$

Beispiel 1. $A = 4, B = 2, C = -3, B^2 - AC = 16.$

$$(2.) \int \frac{dx}{\sqrt{4x^2 + 4x - 3}} = \frac{1}{2} \ln(2x + 1 + \sqrt{4x^2 + 4x - 3}).$$

Beispiel 2. $A = 1, B = \frac{1}{2}, C = 1, B^2 - AC = -\frac{3}{4}$

$$(3.) \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + x + 1}} = \ln \left(\frac{2x + 1}{2} + \sqrt{x^2 + x + 1} \right).$$

Im Falle II erhält man nach Formel Nr. 156 der Tabelle

$$(4.) \int \frac{dx}{\sqrt{Ax^2 + 2Bx + C}} = - \int \frac{dy}{\sqrt{-A} \sqrt{\pm a^2 - y^2}}.$$

Beschränkt man die Lösung auf den Fall, wo das obere Vorzeichen gilt, so erhält man

$$(4a.) \int \frac{dx}{\sqrt{Ax^2 + 2Bx + C}} = - \frac{1}{\sqrt{-A}} \int \frac{dy}{\sqrt{a^2 - y^2}} \\ = - \frac{1}{\sqrt{-A}} \arcsin \left(\frac{y}{a} \right) \\ = - \frac{1}{\sqrt{-A}} \arcsin \left(\frac{Ax + B}{\sqrt{B^2 - AC}} \right) = \frac{1}{\sqrt{-A}} \arcsin \left(- \frac{Ax + B}{\sqrt{B^2 - AC}} \right).$$

Beispiel 3. $A = -1, B = a, C = 0, B^2 - AC = a^2.$

$$(5.) \int \frac{dx}{\sqrt{2ax - x^2}} = \arcsin \left(\frac{x - a}{a} \right).$$

Gilt das untere Vorzeichen, so wird die Aufgabe auf Fall I zurückgeführt, indem man

$$(6.) \quad \int \frac{dx}{\sqrt{Ax^2 + 2Bx + C}} = \frac{1}{i} \int \frac{dx}{\sqrt{A_1x^2 + 2B_1x + C_1}} \\ = \frac{1}{i\sqrt{A_1}} \ln \left(\frac{A_1x + B_1}{\sqrt{A_1}} + \sqrt{A_1x^2 + 2B_1x + C_1} \right)$$

setzt. Dabei ist

$$(7.) \quad A_1 = -A, \quad B_1 = -B, \quad C_1 = -C.$$

Aufgabe 2. $\int dx \sqrt{Ax^2 + 2Bx + C} = ?$

Auflösung. Im Falle I, nämlich in dem Falle, wo $A > 0$ ist, erhält man nach der Formel Nr. 155 der Tabelle

$$(8.) \quad \int dx \sqrt{Ax^2 + 2Bx + C} = \frac{1}{\sqrt{A}} \int dy \sqrt{y^2 + a^2},$$

also mit Rücksicht auf die Formeln Nr. 129a und 129 der Tabelle

$$(9.) \quad \int dx \sqrt{Ax^2 + 2Bx + C} = \\ \frac{1}{\sqrt{A}} \left[\frac{y}{2} \sqrt{y^2 + a^2} + \frac{a^2}{2} \ln \left(y + \sqrt{y^2 + a^2} \right) \right],$$

also wenn man die Integrations-Konstante $\pm \frac{a^2 \ln a}{2\sqrt{A}}$ fortläßt,

$$(9a) \quad \int dx \sqrt{Ax^2 + 2Bx + C} = \frac{1}{2\sqrt{A}} \left[\frac{Ax + B}{\sqrt{A}} \sqrt{Ax^2 + 2Bx + C} \right. \\ \left. + \frac{AC - B^2}{A} \ln \left(\frac{Ax + B}{\sqrt{A}} + \sqrt{Ax^2 + 2Bx + C} \right) \right].$$

Beispiel 1. $A = 4, B = 2, C = -3, B^2 - AC = 16.$

$$(10.) \quad \int dx \sqrt{4x^2 + 4x - 3} = \frac{1}{4} [(2x + 1) \sqrt{4x^2 + 4x - 3} \\ - 4 \ln(2x + 1 + \sqrt{4x^2 + 4x - 3})].$$

Beispiel 2. $A = 1, B = \frac{1}{2}, C = 1, B^2 - AC = -\frac{3}{4}.$

$$(11.) \quad \int dx \sqrt{x^2 + x + 1} = \frac{1}{2} \left[\frac{2x + 1}{2} \sqrt{x^2 + x + 1} \right. \\ \left. + \frac{3}{4} \ln \left(\frac{2x + 1}{2} + \sqrt{x^2 + x + 1} \right) \right].$$

Im Falle II, nämlich in dem Falle, wo $A < 0$ ist, wird nach Formel Nr. 156 der Tabelle

$$(12.) \int dx \sqrt{Ax^2 + 2Bx + C} = -\frac{1}{\sqrt{-A}} \int dy \sqrt{\pm a^2 - y^2}.$$

Beschränkt man die Lösung auf den Fall, wo das obere Vorzeichen gilt, so findet man nach Formel Nr. 123 der Tabelle

$$\begin{aligned} (13.) \int dx \sqrt{Ax^2 + 2Bx + C} &= \frac{-1}{\sqrt{-A}} \left[\frac{y}{2} \sqrt{a^2 - y^2} + \frac{a^2}{2} \arcsin\left(\frac{y}{a}\right) \right] \\ &= \frac{1}{2\sqrt{-A}} \left[-\frac{Ax + B}{\sqrt{-A}} \sqrt{Ax^2 + 2Bx + C} \right. \\ &\quad \left. + \frac{B^2 - AC}{-A} \arcsin\left(-\frac{Ax + B}{\sqrt{B^2 - AC}}\right) \right]. \end{aligned}$$

Beispiel 3. $A = -1$, $B = a$, $C = 0$, $B^2 - AC = a^2$.

$$\int dx \sqrt{2ax - x^2} = \frac{1}{2} \left[(x - a) \sqrt{2ax - x^2} + a^2 \arcsin\left(\frac{x - a}{a}\right) \right].$$

Diese Beispiele mögen zeigen, wie Integrale von der Form $\int F(x, \sqrt{Ax^2 + 2Bx + C})dx$ durch das in § 44 angegebene Verfahren mitunter auf bereits bekannte Integrale zurückgeführt werden können.

§ 46.

Integration der Differential-Funktion

$F(x, \sqrt{Ax^2 + 2Bx + C})dx$, wenn A positiv ist.

(Vergl. die Formel-Tabelle Nr. 159 und 160.)

Aufgabe 1. $\int f(y, \sqrt{y^2 + c})dy = ?$

Dabei darf c eine positive oder negative GröÙe sein.

Auflösung. Wenn das gesuchte Integral mit keinem bisher entwickelten übereinstimmt, so setze man

$$(1.) \quad \sqrt{y^2 + c} = t - y, \quad \text{oder} \quad t = y + \sqrt{y^2 + c},$$

also

$$(2.) \quad y^2 + c = t^2 - 2ty + y^2, \quad \text{oder} \quad y = \frac{t^2 - c}{2t},$$

$$(3.) \quad \sqrt{y^2 + c} = t - \frac{t^2 - c}{2t} = \frac{t^2 + c}{2t},$$

$$(4.) \quad dy = \frac{(t^2 + c)dt}{2t^2},$$

folglich wird

$$(5.) \quad \int f(y, \sqrt{y^2 + c})dy = \int f\left(\frac{t^2 - c}{2t}, \frac{t^2 + c}{2t}\right) \cdot \frac{(t^2 + c)dt}{2t^2}.$$

Wenn $f(y, \sqrt{y^2 + c})$ eine rationale Funktion von y und $\sqrt{y^2 + c}$ ist, so hat man es durch die angegebene Substitution erreicht, daß die Funktion unter dem Integralzeichen auf der rechten Seite von Gleichung (5.) eine *rationale* Funktion der einzigen Veränderlichen t geworden ist. Diese Substitution wurde bereits zur Herleitung der Formeln Nr. 35 und 36 der Tabelle benutzt.

Nach Gleichung (5.) wird nämlich

$$\int \frac{dy}{\sqrt{y^2 + c}} = \int \frac{(t^2 + c)dt \cdot 2t}{2t^2(t^2 + c)} = \int \frac{dt}{t} = \ln t = \ln(y + \sqrt{y^2 + c}).$$

Aufgabe 2. $\int F(x, \sqrt{Ax^2 + 2Bx + C})dx = ?$

Auflösung. In § 44 wurde gezeigt, wie man das gesuchte Integral in dem Falle, wo $A > 0$ ist, auf ein Integral von der Form $\int f(y, \sqrt{y^2 + c})dy$ zurückführen kann, wobei $c = \pm a^2$ ist (vergl. Formel Nr. 155 der Tabelle). Ist diese Umformung erfolgt, so gelangt man durch die in Aufgabe 1 angegebene Substitution zum Ziele. Man kann aber auch die Umwandlung der vorgelegten *irrationalen* Differentialfunktion in eine *rationale* unmittelbar ausführen, indem man

$$(6.) \quad \sqrt{Ax^2 + 2Bx + C} = t - x\sqrt{A}$$

setzt. Dadurch erhält man

$$(7.) \quad Ax^2 + 2Bx + C = t^2 - 2tx\sqrt{A} + Ax^2,$$

$$\text{oder} \quad 2x(t\sqrt{A} + B) = t^2 - C,$$

$$(8.) \quad x = \frac{t^2 - C}{2(t\sqrt{A} + B)}, \quad dx = \frac{(t^2\sqrt{A} + 2Bt + C\sqrt{A})dt}{2(t\sqrt{A} + B)^2},$$

$$(9.) \quad \sqrt{Ax^2 + 2Bx + C} = t - \frac{(t^2 - C)\sqrt{A}}{2(t\sqrt{A} + B)} = \frac{t^2\sqrt{A} + 2Bt + C\sqrt{A}}{2(t\sqrt{A} + B)}$$

Dies gibt

$$(10.) \quad \int F(x, \sqrt{Ax^2+2Bx+C})dx =$$

$$\int F\left(\frac{t^2-C}{2(t\sqrt{A}+B)}, \frac{t^2\sqrt{A}+2Bt+CV\sqrt{A}}{2(t\sqrt{A}+B)}\right) \cdot \frac{(t^2\sqrt{A}+2Bt+CV\sqrt{A})dt}{2(t\sqrt{A}+B)^2},$$

wobei nach ausgeführter Integration in Übereinstimmung mit Gleichung (6.)

$$(11.) \quad t = x\sqrt{A} + \sqrt{Ax^2+2Bx+C}$$

einzusetzen ist. Wenn $F(x, \sqrt{Ax^2+2Bx+C})$ eine rationale Funktion von x und $\sqrt{Ax^2+2Bx+C}$ ist, so steht unter dem Integralzeichen auf der rechten Seite von Gleichung (10.) jetzt nur noch eine *rationale* Funktion von t , welche nach den Regeln des vorhergehenden Abschnittes integriert werden kann.

Man erkennt, daß die Aufgabe 1 nur ein besonderer Fall der Aufgabe 2 ist, welchen man erhält, indem man die Integrations-Veränderliche mit y bezeichnet und

$$A = 1, \quad B = 0, \quad C = +c$$

setzt.

Übungs-Beispiele.

Aufgabe 3. $\int dy\sqrt{y^2+c} = ?$

Auflösung. Nach Gleichung (5.) erhält man

$$(12.) \quad \begin{aligned} \int dy\sqrt{y^2+c} &= \int \frac{(t^2+c)dt}{2t^2} \cdot \frac{t^2+c}{2t} \\ &= \frac{1}{4} \int \frac{(t^2+c)^2 dt}{t^3} = \frac{1}{4} \int (t + 2ct^{-1} + c^2t^{-3}) dt \\ &= \frac{1}{4} \left(\frac{t^2}{2} + 2c \ln t - \frac{c^2}{2t^2} \right) = \frac{t^4 - c^2}{8t^2} + \frac{c}{2} \ln t. \end{aligned}$$

Dabei ist

$$y = \frac{t^2-c}{2t}, \quad \sqrt{y^2+c} = \frac{t^2+c}{2t},$$

also

$$(13.) \quad y\sqrt{y^2+c} = \frac{t^4-c^2}{4t^2},$$

folglich erhält man bis auf eine Integrations-Konstante in Übereinstimmung mit den Formeln Nr. 129 und 129a der Tabelle

$$(14.) \int dy \sqrt{y^2 + c} = \frac{y}{2} \sqrt{y^2 + c} + \frac{c}{2} \ln(y + \sqrt{y^2 + c}).$$

Aufgabe 4. $\int \frac{xdx}{\sqrt{x^2 + 2x + 2}} = ?$

Auflösung. In diesem Falle ist

$$A = 1, \quad \sqrt{A} = 1, \quad B = 1, \quad C = 2,$$

also

$$(15.) \begin{cases} t = x + \sqrt{x^2 + 2x + 2}, & x = \frac{t^2 - 2}{2(t + 1)}, \\ dx = \frac{(t^2 + 2t + 2)dt}{2(t + 1)^2}, & \sqrt{x^2 + 2x + 2} = \frac{t^2 + 2t + 2}{2(t + 1)}, \end{cases}$$

$$(16.) \int \frac{xdx}{\sqrt{x^2 + 2x + 2}} = \int \frac{(t^2 - 2)(t^2 + 2t + 2)dt}{2(t + 1)^2(t^2 + 2t + 2)} = \frac{1}{2} \int \frac{(t^2 - 2)dt}{(t + 1)^2}.$$

Nun ist, wie man durch Division findet,

$$t^2 - 2 = (t + 1)(t - 1) - 1 = (t + 1)^2 - 2(t + 1) - 1,$$

also

$$(17.) \frac{t^2 - 2}{(t + 1)^2} = 1 - \frac{2}{t + 1} - \frac{1}{(t + 1)^2},$$

folglich wird

$$(18.) \int \frac{xdx}{\sqrt{x^2 + 2x + 2}} = \frac{1}{2} \left[t - 2 \ln(t + 1) + \frac{1}{t + 1} \right] \\ = \frac{t^2 + t + 1}{2(t + 1)} - \ln(t + 1) \\ = \frac{t^2 + 2t + 2}{2(t + 1)} - \frac{1}{2} - \ln(t + 1).$$

Dies gibt mit Rücksicht auf die Gleichungen (15.)

$$(19.) \int \frac{xdx}{\sqrt{x^2 + 2x + 2}} = \sqrt{x^2 + 2x + 2} - \frac{1}{2} - \ln(x + 1 + \sqrt{x^2 + 2x + 2}).$$

Bedeutend leichter findet man dieses Resultat durch Anwendung von Formel Nr. 155 der Tabelle, indem man

$$(20.) \begin{cases} x = y - 1, & \text{also } y = x + 1, \quad dx = dy, \\ \sqrt{x^2 + 2x + 2} = \sqrt{y^2 + 1} \end{cases}$$

setzt; dann wird

$$(21.) \int \frac{xdx}{\sqrt{x^2 + 2x + 2}} = \int \frac{(y - 1)dy}{\sqrt{y^2 + 1}} = \int \frac{ydy}{\sqrt{y^2 + 1}} - \int \frac{dy}{\sqrt{y^2 + 1}},$$

also nach den Formeln Nr. 32 und 35 der Tabelle

$$(22.) \quad \int \frac{x dx}{\sqrt{x^2+2x+2}} = \sqrt{y^2+1} - \ln(y + \sqrt{y^2+1}) \\ = \sqrt{x^2+2x+2} - \ln(x+1 + \sqrt{x^2+2x+2}).$$

Dieses Resultat unterscheidet sich von dem vorher gefundenen nur durch eine Integrations-Konstante.

Aufgabe 5. $\int \frac{x^2 dx}{\sqrt{x^2+2x+2}} = ?$

Auflösung. In ähnlicher Weise wie bei der vorhergehenden Aufgabe findet man hier

$$(23.) \quad \int \frac{x^2 dx}{\sqrt{x^2+2x+2}} = \frac{1}{4} \int \frac{(t^2-2)^2 dt}{(t+1)^3} \\ = \frac{1}{4} \int \left[t - 3 + \frac{2}{t+1} + \frac{4}{(t+1)^2} + \frac{1}{(t+1)^3} \right] dt \\ = \frac{1}{4} \left[\frac{t^2}{2} - 3t + 2\ln(t+1) - \frac{4}{t+1} - \frac{1}{2(t+1)^2} \right] \\ = \frac{1}{8} \left[t^2 - 6t - \frac{8}{t+1} - \frac{1}{(t+1)^2} \right] + \frac{1}{2} \ln(t+1) \\ = \frac{t^4 - 4t^3 - 11t^2 - 14t - 9}{8(t+1)^2} + \frac{1}{2} \ln(t+1) \\ = \frac{t^4 - 4t^3 - 18t^2 - 28t - 16}{8(t+1)^2} + \frac{7}{8} + \frac{1}{2} \ln(t+1).$$

Nun ist

$$t^4 - 4t^3 - 18t^2 - 28t - 16 = (t^2 + 2t + 2)(t^2 - 6t - 8) \\ = (t^2 + 2t + 2)[t^2 - 2 - 6(t+1)],$$

folglich wird mit Rücksicht auf die Gleichungen (15.)

$$(24.) \quad \int \frac{x^2 dx}{\sqrt{x^2+2x+2}} = \frac{1}{2} \frac{t^2+2t+2}{2(t+1)} \left(\frac{t^2-2}{2(t+1)} - 3 \right) \\ + \frac{7}{8} + \frac{1}{2} \ln(t+1) \\ = \frac{x-3}{2} \sqrt{x^2+2x+2} + \frac{7}{8} + \frac{1}{2} \ln(x+1 + \sqrt{x^2+2x+2}).$$

Auch hier ergibt sich das Resultat leichter durch Anwendung der in den Gleichungen (20.) angegebenen Substitution; dann wird

$$(25.) \quad \int \frac{x^2 dx}{\sqrt{x^2 + 2x + 2}} = \int \frac{(y^2 - 2y + 1)dy}{\sqrt{y^2 + 1}} \\ = \int \frac{y^2 dy}{\sqrt{y^2 + 1}} - 2 \int \frac{y dy}{\sqrt{y^2 + 1}} + \int \frac{dy}{\sqrt{y^2 + 1}}.$$

Dies gibt nach Formel Nr. 127, 32 und 35 der Tabelle

$$(26.) \quad \int \frac{x^2 dx}{\sqrt{x^2 + 2x + 2}} = \frac{y}{2} \sqrt{y^2 + 1} - 2 \sqrt{y^2 + 1} \\ + \frac{1}{2} \ln(y + \sqrt{y^2 + 1}). \\ = \frac{x-3}{2} \sqrt{x^2 + 2x + 2} + \frac{1}{2} \ln(x + 1 + \sqrt{x^2 + 2x + 2}).$$

Dieses Resultat unterscheidet sich von dem vorher gefundenen nur durch eine Integrations-Konstante.

In ähnlicher Weise kann man die Aufgaben

$$\int \frac{x^3 dx}{\sqrt{x^2 + 2x + 2}} = ? \quad \int \frac{x^4 dx}{\sqrt{x^2 + 2x + 2}} = ? \quad \dots \quad \int \frac{x^n dx}{\sqrt{x^2 + 2x + 2}} = ?$$

behandeln.

Aufgabe 6. $\int \frac{dx}{x \sqrt{x^2 + 2x + 2}} = ?$

Auflösung. Aus den Gleichungen (15.) ergibt sich hier

$$(27.) \quad \int \frac{dx}{x \sqrt{x^2 + 2x + 2}} = 2 \int \frac{dt}{t^2 - 2},$$

also nach Formel Nr. 29a der Tabelle

$$(28.) \quad \int \frac{dx}{x \sqrt{x^2 + 2x + 2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \ln \left(\frac{t - \sqrt{2}}{t + \sqrt{2}} \right) \\ = \frac{1}{\sqrt{2}} \ln \left(\frac{x - \sqrt{2} + \sqrt{x^2 + 2x + 2}}{x + \sqrt{2} + \sqrt{x^2 + 2x + 2}} \right).$$

Aufgabe 7. $\int \frac{dx}{(x - k) \sqrt{x^2 + c}} = ?$

Auflösung. Aus Gleichung (5.) findet man

$$(29.) \quad \int \frac{dx}{(x - k) \sqrt{x^2 + c}} = 2 \int \frac{dt}{t^2 - 2kt - c}.$$

Dies gibt nach Formel Nr. 87 der Tabelle, indem man b mit $-k$ und c mit $-c$ vertauscht,

$$(30.) \int \frac{dx}{(x-k)\sqrt{x^2+c}} = \frac{1}{\sqrt{k^2+c}} \ln \left(\frac{t-k-\sqrt{k^2+c}}{t-k+\sqrt{k^2+c}} \right).$$

Ist k^2+c negativ, so erhält der gefundene Ausdruck imaginäre Form; dann findet man jedoch aus Gleichung (29.), indem man

$$a = \sqrt{-c}, \text{ also } c = -a^2$$

setzt, nach Formel Nr. 89 der Tabelle

$$(31.) \int \frac{dx}{(x-k)\sqrt{x^2-a^2}} = 2 \int \frac{dt}{t^2-2kt+a^2} = \frac{2}{\sqrt{a^2-k^2}} \operatorname{arctg} \left(\frac{t-k}{\sqrt{a^2-k^2}} \right).$$

Zum Schluß muß man noch

$$t = x + \sqrt{x^2+c}$$

einsetzen.

Aufgabe 8. $\int \frac{dx}{(1-x^2)\sqrt{1+x^2}} = ?$

Nach Gleichung (5.) ist in diesem Falle

$$x = \frac{t^2-1}{2t}, \sqrt{1+x^2} = \frac{t^2+1}{2t}, dx = \frac{(t^2+1)dt}{2t^2},$$

$$1-x^2 = (1+x)(1-x) = \frac{t^2+2t-1}{2t} \cdot \frac{-t^2+2t+1}{2t} = -\frac{t^4-6t^2+1}{4t^2},$$

also

$$(32.) \int \frac{dx}{(1-x^2)\sqrt{1+x^2}} = -4 \int \frac{tdt}{t^4-6t^2+1} = -2 \int \frac{du}{u^2-6u+1},$$

wenn man t^2 mit u bezeichnet. Nun ist nach Formel Nr. 88 der Tabelle

$$(33.) \int \frac{du}{u^2-6u+1} = \int \frac{du}{(u-u_1)(u-u_2)} = \frac{1}{u_1-u_2} \ln \left(\frac{u-u_1}{u-u_2} \right),$$

wobei

$$u_1 = 3 + 2\sqrt{2}, \quad u_2 = 3 - 2\sqrt{2}, \quad u_1 - u_2 = 4\sqrt{2}$$

ist. Dies gibt

$$(34.) \quad \int \frac{dx}{(1-x^2)\sqrt{1+x^2}} = -\frac{1}{2\sqrt{2}} \ln \left(\frac{u-3-2\sqrt{2}}{u-3+2\sqrt{2}} \right) \\ = \frac{1}{2\sqrt{2}} \ln \left(\frac{t^2-3+2\sqrt{2}}{t^2-3-2\sqrt{2}} \right).$$

Um das Endresultat als Funktion von x darzustellen, beachte man, daß

$$\frac{t^2-1}{2t} = x, \quad \frac{-2+2\sqrt{2}}{2t} = \frac{-1+\sqrt{2}}{x+\sqrt{1+x^2}} = (-1+\sqrt{2})(\sqrt{1+x^2}-x),$$

also

$$(35.) \quad \frac{t^2-3+2\sqrt{2}}{2t} = (2-\sqrt{2})x + (-1+\sqrt{2})\sqrt{1+x^2} \\ = (\sqrt{2}-1)(\sqrt{1+x^2}+x\sqrt{2})$$

ist. Ebenso findet man

$$(36.) \quad \frac{t^2-3-2\sqrt{2}}{2t} = (-\sqrt{2}-1)(\sqrt{1+x^2}-x\sqrt{2}),$$

folglich wird

$$(37.) \quad \int \frac{dx}{(1-x^2)\sqrt{1+x^2}} = \frac{1}{2\sqrt{2}} \ln \left[\frac{(\sqrt{2}-1)(\sqrt{1+x^2}+x\sqrt{2})}{(-\sqrt{2}-1)(\sqrt{1+x^2}-x\sqrt{2})} \right] \\ = \frac{1}{2\sqrt{2}} \ln \left[\frac{(\sqrt{2}-1)^2(\sqrt{1+x^2}+x\sqrt{2})^2}{x^2-1} \right] \\ = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\ln \left(\frac{\sqrt{1+x^2}+x\sqrt{2}}{\sqrt{x^2-1}} \right) + \ln(\sqrt{2}-1) \right].$$

Schneller kommt man zum Ziele durch Anwendung von Formel Nr. 85 der Tabelle, indem man

$$(38.) \quad x = \operatorname{tg} t, \quad \text{also} \quad dx = \frac{dt}{\cos^2 t}, \quad \sqrt{1+x^2} = \frac{1}{\cos t}$$

setzt. Dadurch erhält man

$$(39.) \quad \int \frac{dx}{(1-x^2)\sqrt{1+x^2}} = \int \frac{\cos t dt}{\cos^2 t - \sin^2 t} = \int \frac{\cos t dt}{1-2\sin^2 t},$$

oder, wenn man

$$\sqrt{2}\sin t = z, \quad \text{also} \quad \sqrt{2}\cos t dt = dz$$

setzt und Formel Nr. 29a der Tabelle beachtet,

$$(40.) \int \frac{dx}{(1-x^2)\sqrt{1+x^2}} = -\frac{1}{\sqrt{2}} \int \frac{dz}{z^2-1} = -\frac{1}{2\sqrt{2}} \ln\left(\frac{z-1}{z+1}\right);$$

dabei ist

$$z = \sqrt{2} \sin t = \frac{x\sqrt{2}}{\sqrt{1+x^2}},$$

folglich wird

$$(41.) \int \frac{dx}{(1-x^2)\sqrt{1+x^2}} = \frac{1}{2\sqrt{2}} \ln\left(\frac{x\sqrt{2} + \sqrt{1+x^2}}{x\sqrt{2} - \sqrt{1+x^2}}\right) \\ = \frac{1}{\sqrt{2}} \ln\left(\frac{\sqrt{1+x^2} + x\sqrt{2}}{\sqrt{x^2-1}}\right).$$

Dieses Resultat stimmt, abgesehen von der Integrations-Konstanten, mit dem früher gefundenen überein.

§ 47.

Integration der Differential-Funktion

$F(x, \sqrt{Ax^2 + 2Bx + C})dx$, wenn C positiv ist.

(Vergl. die Formel-Tabelle Nr. 161 und 162.)

Aufgabe 1. $\int f(y, \sqrt{a^2 \pm y^2})dy = ?$

Auflösung. Wenn das gesuchte Integral mit keinem bisher entwickelten übereinstimmt, so setze man

$$(1.) \quad \sqrt{a^2 \pm y^2} = ty - a, \quad \text{oder} \quad t = \frac{a + \sqrt{a^2 \pm y^2}}{y},$$

also

$$(2.) \quad a^2 \pm y^2 = t^2 y^2 - 2aty + a^2, \quad \text{oder} \quad y = \frac{2at}{t^2 \mp 1},$$

$$(3.) \quad \sqrt{a^2 \pm y^2} = \frac{2at^2}{t^2 \mp 1} - a = \frac{a(t^2 \pm 1)}{t^2 \mp 1},$$

$$(4.) \quad dy = -\frac{2a(t^2 \pm 1)dt}{(t^2 \mp 1)^2},$$

folglich wird

$$(5.) \quad \int f(y, \sqrt{a^2 \pm y^2})dy = \int f\left(\frac{2at}{t^2 \mp 1}, \frac{a(t^2 \pm 1)}{t^2 \mp 1}\right) \cdot \frac{-2a(t^2 \pm 1)dt}{(t^2 \mp 1)^2}.$$

Wenn $f(y, \sqrt{a^2 \pm y^2})$ eine rationale Funktion von y und $\sqrt{a^2 \pm y^2}$ ist, so hat man es durch die angegebene

Substitution erreicht, daß die Funktion unter dem Integralzeichen auf der rechten Seite von Gleichung (5.) eine *rationale* Funktion der einzigen Veränderlichen t geworden ist. Hiernach wird z. B.

$$(6.) \int \frac{dx}{x\sqrt{a^2-x^2}} = -\frac{1}{a} \int \frac{dt}{t} = -\frac{1}{a} \ln t = -\frac{1}{a} \ln \left(\frac{a + \sqrt{a^2-x^2}}{x} \right),$$

ein Resultat, welches mit Formel Nr. 37 der Tabelle übereinstimmt.

Aufgabe 2. $\int F(x, \sqrt{Ax^2 + 2Bx + C})dx = ?$

Auflösung. In § 44 wurde bereits gezeigt, wie man das gesuchte Integral auf ein Integral von der Form $\int f(y, \sqrt{a^2 \pm y^2})dy$ zurückführen kann (vergl. Formel Nr. 155 und 156 der Tabelle). Ist diese Umformung erfolgt, so gelangt man durch die in Aufgabe 1 angegebene Substitution zum Ziele. Man kann aber auch die Umwandlung der vorgelegten *irrationalen* Differential-Funktion in eine *rationale* unmittelbar ausführen, indem man

$$(7.) \quad \sqrt{Ax^2 + 2Bx + C} = tx - \sqrt{C}$$

setzt. Dadurch erhält man

$$Ax^2 + 2Bx + C = t^2x^2 - 2tx\sqrt{C} + C,$$

oder

$$(8.) \quad Ax + 2B = t^2x - 2t\sqrt{C},$$

also

$$(9.) \quad x = \frac{2(t\sqrt{C} + B)}{t^2 - A}, \quad dx = -\frac{2(t^2\sqrt{C} + 2Bt + A\sqrt{C})dt}{(t^2 - A)^2},$$

$$(10.) \quad \sqrt{Ax^2 + 2Bx + C} = \frac{t^2\sqrt{C} + 2Bt + A\sqrt{C}}{t^2 - A}.$$

Dies gibt

$$(11.) \quad \int F(x, \sqrt{Ax^2 + 2Bx + C})dx =$$

$$\int F\left(\frac{2(t\sqrt{C} + B)}{t^2 - A}, \frac{t^2\sqrt{C} + 2Bt + A\sqrt{C}}{t^2 - A}\right) \cdot \frac{-2(t^2\sqrt{C} + 2Bt + A\sqrt{C})dt}{(t^2 - A)^2},$$

wobei

$$(12.) \quad t = \frac{1}{x}(\sqrt{C} + \sqrt{Ax^2 + 2Bx + C})$$

ist. Wenn $F(x, \sqrt{Ax^2 + 2Bx + C})$ eine rationale Funktion von x und $\sqrt{Ax^2 + 2Bx + C}$ ist, so steht unter dem Integralzeichen auf der rechten Seite von Gleichung (11.) jetzt nur noch eine *rationale* Funktion von t , welche nach den Regeln des vorhergehenden Abschnittes integriert werden kann.

Man erkennt, daß auch hier die Aufgabe 1 nur ein besonderer Fall der Aufgabe 2 ist, den man erhält, indem man die Integrations-Veränderliche mit y bezeichnet und

$$A = \pm 1, \quad B = 0, \quad C = +a^2$$

setzt.

Übungs-Beispiele.

Aufgabe 3. $\int \frac{dx}{\sqrt{Ax^2 + 2Bx + C}} = ?$

Auflösung. Nach Gleichung (11.) erhält man

$$(13.) \quad \int \frac{dx}{\sqrt{Ax^2 + 2Bx + C}} = -2 \int \frac{dt}{t^2 - A}.$$

Ist A positiv, so folgt hieraus nach Formel Nr. 29a der Tabelle

$$(14.) \quad \int \frac{dx}{\sqrt{Ax^2 + 2Bx + C}} = -\frac{1}{\sqrt{A}} \ln \left(\frac{t - \sqrt{A}}{t + \sqrt{A}} \right) \\ = \frac{1}{\sqrt{A}} \ln \left(\frac{\sqrt{C} + \sqrt{Ax^2 + 2Bx + C} + x\sqrt{A}}{\sqrt{C} + \sqrt{Ax^2 + 2Bx + C} - x\sqrt{A}} \right).$$

Dieses Resultat stimmt, abgesehen von einer Integrations-Konstanten, mit dem in § 45, Gleichung (1.) gegebenen (vergl. Formel Nr. 157 der Tabelle) überein, denn es ist

$$(\sqrt{C} + \sqrt{Ax^2 + 2Bx + C} - x\sqrt{A})(Ax + B + \sqrt{A}\sqrt{Ax^2 + 2Bx + C}) \\ = (B + \sqrt{AC})(\sqrt{C} + \sqrt{Ax^2 + 2Bx + C} + x\sqrt{A}),$$

folglich wird

$$(15.) \quad \frac{\sqrt{C} + \sqrt{Ax^2 + 2Bx + C} + x\sqrt{A}}{\sqrt{C} + \sqrt{Ax^2 + 2Bx + C} - x\sqrt{A}} \\ = \frac{Ax + B + \sqrt{A}\sqrt{Ax^2 + 2Bx + C}}{B + \sqrt{AC}}$$

also

$$(16.) \int \frac{dx}{\sqrt{Ax^2+2Bx+C}} \\ = \frac{1}{\sqrt{A}} \ln \left(\frac{Ax+B}{\sqrt{A}} + \sqrt{Ax^2+2Bx+C} \right) - \frac{1}{\sqrt{A}} \ln \left(\frac{B+\sqrt{AC}}{\sqrt{A}} \right).$$

Ist A negativ, so erhält man aus Gleichung (18.) nach Formel Nr. 28 der Tabelle

$$(17.) \int \frac{dx}{\sqrt{Ax^2+2Bx+C}} = -\frac{2}{\sqrt{-A}} \operatorname{arctg} \left(\frac{t}{\sqrt{-A}} \right) \\ = -\frac{2}{\sqrt{-A}} \operatorname{arctg} \left(\frac{\sqrt{C} + \sqrt{Ax^2+2Bx+C}}{x\sqrt{-A}} \right).$$

Auch in diesem Falle kann man die Übereinstimmung mit dem in § 45 Gleichung (4.) gefundenen Resultate (vergl. Formel Nr. 157 der Tabelle) nachweisen. Setzt man nämlich

$$(18.) \quad \varphi = 2 \operatorname{arctg} \left(\frac{t}{\sqrt{-A}} \right), \text{ also } \operatorname{tg} \left(\frac{\varphi}{2} \right) = \frac{t}{\sqrt{-A}},$$

so wird

$$(19.) \quad \sin \varphi = \frac{2 \operatorname{tg} \left(\frac{\varphi}{2} \right)}{1 + \operatorname{tg}^2 \left(\frac{\varphi}{2} \right)} = \frac{2t\sqrt{-A}}{t^2 - A},$$

$$(20.) \quad \cos \varphi = \frac{1 - \operatorname{tg}^2 \left(\frac{\varphi}{2} \right)}{1 + \operatorname{tg}^2 \left(\frac{\varphi}{2} \right)} = -\frac{t^2 + A}{t^2 - A}.$$

Ist der Bogen α erklärt durch die Gleichungen

$$(21.) \quad \sin \alpha = \frac{B}{\sqrt{B^2 - AC}}, \quad \cos \alpha = -\frac{\sqrt{-AC}}{\sqrt{B^2 - AC}},$$

so erhält man

$$(22.) \quad \sin(\alpha - \varphi) = \sin \alpha \cos \varphi - \cos \alpha \sin \varphi \\ = \frac{-B(t^2 + A)}{(t^2 - A)\sqrt{B^2 - AC}} + \frac{\sqrt{-AC} \cdot 2t\sqrt{-A}}{(t^2 - A)\sqrt{B^2 - AC}} \\ = \frac{-2A(t\sqrt{C} + B)}{(t^2 - A)\sqrt{B^2 - AC}} - \frac{B}{\sqrt{B^2 - AC}} \\ = -\frac{Ax + B}{\sqrt{B^2 - AC}}.$$

Fügt man also in Gleichung (17.) die Integrations-Konstante $\frac{\alpha}{\sqrt{-A}}$ hinzu, so erhält man in Übereinstimmung mit Formel Nr. 157 der Tabelle

$$(23.) \int \frac{dx}{\sqrt{Ax^2+2Bx+C}} = \frac{\alpha - \varphi}{\sqrt{-A}} = \frac{1}{\sqrt{-A}} \arcsin\left(-\frac{Ax+B}{\sqrt{B^2-AC}}\right).$$

Aufgabe 4. $\int \frac{xdx}{\sqrt{1+x+x^2}} = ?$

Auflösung. Hier ist

$$(24.) \quad A = 1, \quad B = \frac{1}{2}, \quad C = 1,$$

also

$$(25.) \quad \begin{cases} x = \frac{2t+1}{t^2-1}, & dx = -\frac{2(t^2+t+1)dt}{(t^2-1)^2}, \\ t = \frac{1+\sqrt{1+x+x^2}}{x}, & \sqrt{1+x+x^2} = \frac{t^2+t+1}{t^2-1}. \end{cases}$$

Dies gibt, wenn man die Integrations-Konstante $1 - \frac{1}{2}\ln 3$ hinzufügt,

$$\begin{aligned} (26.) \quad \int \frac{xdx}{\sqrt{1+x+x^2}} &= -2 \int \frac{(2t+1)dt}{(t^2-1)^2} \\ &= \frac{1}{2} \int \left[-\frac{3}{(t-1)^2} + \frac{1}{t-1} + \frac{1}{(t+1)^2} - \frac{1}{t+1} \right] dt \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{3}{t-1} - \frac{1}{t+1} + 2 + \ln\left(\frac{t-1}{t+1}\right) - \ln 3 \right] \\ &= \frac{t^2+t+1}{t^2-1} - \frac{1}{2} \ln\left(\frac{3t^2+6t+3}{t^2-1}\right) \\ &= \sqrt{1+x+x^2} - \frac{1}{2} \ln(2x+1+2\sqrt{1+x+x^2}). \end{aligned}$$

Aufgabe 5. $\int \frac{xdx}{\sqrt{1+x-x^2}} = ?$

Auflösung. Hier ist

$$(27.) \quad A = -1, \quad B = \frac{1}{2}, \quad C = 1,$$

also

$$(28.) \quad \begin{cases} x = \frac{2t+1}{t^2+1}, & dx = -\frac{2(t^2+t-1)dt}{(t^2+1)^2}, \\ t = \frac{1+\sqrt{1+x-x^2}}{x}, & \sqrt{1+x-x^2} = \frac{t^2+t-1}{t^2+1}, \end{cases}$$

$$(29.) \quad \begin{aligned} \int \frac{x dx}{\sqrt{1+x-x^2}} &= -2 \int \frac{(2t+1)dt}{(t^2+1)^2} \\ &= \frac{2}{t^2+1} - 2 \int \frac{dt}{(1+t^2)^2}. \end{aligned}$$

Nun wird nach Formel Nr. 149 der Tabelle

$$(30.) \quad \int \frac{dt}{(1+t^2)^2} = \frac{t}{2(1+t^2)} + \frac{1}{2} \operatorname{arctgt},$$

folglich ist, wenn man die Integrations-Konstante gleich -1 setzt,

$$(31.) \quad \begin{aligned} \int \frac{x dx}{\sqrt{1+x-x^2}} &= \frac{2}{t^2+1} - \frac{t}{t^2+1} - 1 - \operatorname{arctgt} \\ &= -\frac{t^2+t-1}{t^2+1} - \operatorname{arctgt} \\ &= -\sqrt{1+x-x^2} - \operatorname{arctg}\left(\frac{1+\sqrt{1+x-x^2}}{x}\right). \end{aligned}$$

Bedeutend leichter wird die Lösung durch Anwendung der Formel Nr. 156 der Tabelle, indem man

$$(32.) \quad \begin{cases} 2x = -2y + 1, & \text{also } dx = -dy, \\ \sqrt{1+x-x^2} = \sqrt{a^2-y^2}, & 2a = \sqrt{5} \end{cases}$$

setzt; dann erhält man nach Formel Nr. 31 und 34 der Tabelle

$$(33.) \quad \begin{aligned} \int \frac{x dx}{\sqrt{1+x-x^2}} &= \int \frac{(2y-1)dy}{2\sqrt{a^2-y^2}} \\ &= -\sqrt{a^2-y^2} - \frac{1}{2} \arcsin\left(\frac{y}{a}\right) \\ &= -\sqrt{1+x-x^2} + \frac{1}{2} \arcsin\left(\frac{2x-1}{\sqrt{5}}\right). \end{aligned}$$

Um die Übereinstimmung dieses Resultates mit dem früheren nachzuweisen, setze man

$$(34.) \quad \varphi = 2 \operatorname{arctg} \left(\frac{1 + \sqrt{1+x-x^2}}{x} \right),$$

also

$$\operatorname{tg} \left(\frac{\varphi}{2} \right) = \frac{1 + \sqrt{1+x-x^2}}{x},$$

dann wird

$$(35.) \quad \sin \varphi = \frac{2 \operatorname{tg} \left(\frac{\varphi}{2} \right)}{1 + \operatorname{tg}^2 \left(\frac{\varphi}{2} \right)} = \frac{2(2x-1 + \sqrt{1+x-x^2})}{5},$$

$$(36.) \quad \cos \varphi = \frac{1 - \operatorname{tg}^2 \left(\frac{\varphi}{2} \right)}{1 + \operatorname{tg}^2 \left(\frac{\varphi}{2} \right)} = \frac{2x-1 - 4\sqrt{1+x-x^2}}{5}.$$

Erklärt man sodann den Bogen α durch die Gleichungen

$$(37.) \quad \sin \alpha = \frac{1}{\sqrt{5}}, \quad \cos \alpha = -\frac{2}{\sqrt{5}},$$

so wird

$$(38.) \quad \sin(\alpha - \varphi) = \sin \alpha \cos \varphi - \cos \alpha \sin \varphi = \frac{2x-1}{\sqrt{5}}.$$

Fügt man also in Gleichung (31.) die Integrations-Konstante $\frac{\alpha}{2}$ hinzu, so erhält man

$$(39.) \quad \int \frac{x dx}{\sqrt{1+x-x^2}} = -\sqrt{1+x-x^2} + \frac{\alpha - \varphi}{2} \\ = -\sqrt{1+x-x^2} + \frac{1}{2} \arcsin \left(\frac{2x-1}{\sqrt{5}} \right).$$

Aufgabe 6. $\int \frac{dx}{x\sqrt{1+x-x^2}} = ?$

Auflösung. Durch dieselbe Substitution wie bei der vorhergehenden Aufgabe, also durch die Gleichungen (28.), erhält man

$$(40.) \quad \int \frac{dx}{x\sqrt{1+x-x^2}} = -2 \int \frac{dt}{2t+1} = -\ln(2t+1) \\ = -\ln \left(\frac{x+2+2\sqrt{1+x-x^2}}{x} \right).$$

Aufgabe 7. $\int \frac{dx}{(x-k)\sqrt{1-x^2}} = ?$

Auflösung. Hier ist

(41.) $a = 1, A = -1, B = 0, C = 1,$
folglich erhält man nach Formel Nr. 161 oder 162 der Tabelle

(42.) $x = \frac{2t}{t^2+1}, \sqrt{1-x^2} = \frac{t^2-1}{t^2+1}, dx = -\frac{2(t^2-1)dt}{(t^2+1)^2},$

(43.) $\int \frac{dx}{(x-k)\sqrt{1-x^2}} = 2 \int \frac{dt}{kt^2-2t+k},$

oder, wenn man k mit $\frac{1}{r}$ bezeichnet und die Formeln Nr. 87 und 88 der Tabelle berücksichtigt,

(44.) $\int \frac{dx}{(x-k)\sqrt{1-x^2}} = 2r \int \frac{dt}{t^2-2rt+1}$
 $= \frac{r}{\sqrt{r^2-1}} \ln \left(\frac{t-r-\sqrt{r^2-1}}{t-r+\sqrt{r^2-1}} \right),$

wenn $r^2 > 1$ ist; und nach Formel Nr. 89 der Tabelle

(45.) $\int \frac{dx}{(x-k)\sqrt{1-x^2}} = \frac{2r}{\sqrt{1-r^2}} \operatorname{arctg} \left(\frac{t-r}{\sqrt{1-r^2}} \right),$

wenn $r^2 < 1$ ist. Zum Schluß muß man noch

(46.) $t = \frac{1+\sqrt{1-x^2}}{x} \quad \text{und} \quad r = \frac{1}{k}$

einsetzen.

Aufgabe 8. $\int \frac{dx}{(1+x^2)\sqrt{1-x^2}} = ?$

Auflösung. Durch dieselbe Substitution wie bei der vorhergehenden Aufgabe, also durch die Gleichungen (42.), erhält man

(47.) $\int \frac{dx}{(1+x^2)\sqrt{1-x^2}} = -2 \int \frac{(t^2+1)dt}{t^4+6t^2+1}.$

Da die quadratische Gleichung

(48.) $t^4 + 6t^2 + 1 = 0$

die beiden Wurzeln

$$(49.) \quad \begin{cases} t_1^2 = -3 + 2\sqrt{2} = -(\sqrt{2} - 1)^2, \\ t_2^2 = -3 - 2\sqrt{2} = -(\sqrt{2} + 1)^2, \end{cases}$$

hat, so findet man durch Partialbruch-Zerlegung

$$(50.) \quad \frac{-2t^2 - 2}{t^4 + 6t^2 + 1} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{1 - \sqrt{2}}{t^2 + a^2} - \frac{1 + \sqrt{2}}{t^2 + b^2} \right),$$

wobei

$$(51.) \quad a = \sqrt{2} - 1, \quad b = \sqrt{2} + 1$$

gesetzt ist. Dies gibt nach Formel Nr. 28 der Tabelle

$$(52.) \quad \int \frac{dx}{(1+x^2)\sqrt{1-x^2}} = -\frac{1}{\sqrt{2}} \left[\operatorname{arctg}\left(\frac{t}{a}\right) + \operatorname{arctg}\left(\frac{t}{b}\right) \right].$$

Setzt man noch

$$(53.) \quad \operatorname{arctg}\left(\frac{t}{a}\right) = \varphi, \quad \operatorname{arctg}\left(\frac{t}{b}\right) = \psi,$$

so wird

$$(54.) \quad \operatorname{tg} \varphi = \frac{t}{a} = \frac{t}{\sqrt{2}-1}, \quad \operatorname{tg} \psi = \frac{t}{b} = \frac{t}{\sqrt{2}+1}$$

also

$$(55.) \quad \operatorname{tg}(\varphi + \psi) = \frac{\operatorname{tg} \varphi + \operatorname{tg} \psi}{1 - \operatorname{tg} \varphi \operatorname{tg} \psi} = \frac{2t\sqrt{2}}{1-t^2} = -\frac{x\sqrt{2}}{\sqrt{1-x^2}},$$

folglich wird

$$(56.) \quad \int \frac{dx}{(1+x^2)\sqrt{1-x^2}} = -\frac{1}{\sqrt{2}}(\varphi + \psi) = -\frac{1}{\sqrt{2}} \operatorname{arctg}\left(\frac{x\sqrt{2}}{\sqrt{1-x^2}}\right).$$

Einfacher findet man dieses Resultat durch Einführung trigonometrischer Funktionen, also durch die Substitution

$$(57.) \quad x = \sin t, \quad \sqrt{1-x^2} = \cos t.$$

Vergl. § 12, Gleichung (3.).

§ 48.

Integration der Differential-Funktion

$F(x, \sqrt{Ax^2 + 2Bx + C})dx$, wenn $B^2 - AC$ positiv ist.

(Vergl. die Formel-Tabelle Nr. 163.)

Die Wurzeln der quadratischen Gleichung

$$(1.) \quad Ax^2 + 2Bx + C = 0$$

sind bekanntlich

$$(2.) \quad x_1 = \frac{-B + \sqrt{B^2 - AC}}{A}; \quad x_2 = \frac{-B - \sqrt{B^2 - AC}}{A}.$$

Unter der Voraussetzung, daß $B^2 - AC > 0$ ist, werden beide Wurzeln x_1 und x_2 reell. Setzt man in diesem Falle

$$(3.) \quad x_1 = -\frac{\beta}{\alpha}, \quad x_2 = -\frac{\delta}{\gamma}, \quad \text{wobei} \quad \alpha\gamma = A$$

sein möge, so wird

$$(4.) \quad Ax^2 + 2Bx + C = A(x - x_1)(x - x_2) \\ = \alpha\gamma\left(x + \frac{\beta}{\alpha}\right)\left(x + \frac{\delta}{\gamma}\right) = (\alpha x + \beta)(\gamma x + \delta).$$

Jetzt möge die neue Integrations-Veränderliche t durch die Gleichung

$$(5.) \quad \sqrt{Ax^2 + 2Bx + C} = t(\alpha x + \beta)$$

eingeführt werden. Dadurch erhält man

$$Ax^2 + 2Bx + C = (\alpha x + \beta)(\gamma x + \delta) = t^2(\alpha x + \beta)^2,$$

oder

$$(6.) \quad \gamma x + \delta = t^2(\alpha x + \beta),$$

$$(7.) \quad x = \frac{\beta t^2 - \delta}{\gamma - \alpha t^2}, \quad dx = \frac{2(\beta\gamma - \alpha\delta)t dt}{(\gamma - \alpha t^2)^2},$$

$$(8.) \quad t = \sqrt{\frac{\gamma x + \delta}{\alpha x + \beta}}, \quad \sqrt{Ax^2 + 2Bx + C} = \frac{(\beta\gamma - \alpha\delta)t}{\gamma - \alpha t^2}.$$

Dies gibt

$$(9.) \quad \int F(x, \sqrt{Ax^2 + 2Bx + C})dx = \\ \int F\left(\frac{\beta t^2 - \delta}{\gamma - \alpha t^2}, \frac{(\beta\gamma - \alpha\delta)t}{\gamma - \alpha t^2}\right) \cdot \frac{2(\beta\gamma - \alpha\delta)t dt}{(\gamma - \alpha t^2)^2},$$

wobei

$$(10.) \quad t = \sqrt{\frac{\gamma x + \delta}{\alpha x + \beta}}, \quad \sqrt{Ax^2 + 2Bx + C} = \sqrt{(\alpha x + \beta)(\gamma x + \delta)}.$$

Übungs-Beispiele.

Aufgabe 1. $\int \frac{dx}{\sqrt{(\alpha x + \beta)(\gamma x + \delta)}} = ?$

Auflösung. Aus Gleichung (9.) folgt

$$(11.) \quad \int \frac{dx}{\sqrt{(\alpha x + \beta)(\gamma x + \delta)}} = 2 \int \frac{dt}{\gamma - \alpha t^2}.$$

Setzt man hierbei $\frac{\gamma}{\alpha} = \pm k^2$, je nachdem $\frac{\gamma}{\alpha}$ positiv oder negativ ist, so erhält man für das obere Vorzeichen nach Formel Nr. 29a der Tabelle

$$(12.) \quad \int \frac{dx}{\sqrt{(\alpha x + \beta)(\gamma x + \delta)}} = -\frac{2}{\alpha} \int \frac{dt}{t^2 - k^2} = -\frac{1}{\alpha k} \ln \left(\frac{t - k}{t + k} \right) \\ = \frac{1}{\sqrt{\alpha \gamma}} \ln \left(\frac{\sqrt{\alpha(\gamma x + \delta)} + \sqrt{\gamma(\alpha x + \beta)}}{\sqrt{\alpha(\gamma x + \delta)} - \sqrt{\gamma(\alpha x + \beta)}} \right).$$

Für das untere Vorzeichen wird nach Formel Nr. 28 der Tabelle

$$(13.) \quad \int \frac{dx}{\sqrt{(\alpha x + \beta)(\gamma x + \delta)}} = -\frac{2}{\alpha} \int \frac{dt}{t^2 + k^2} = -\frac{2}{\alpha k} \operatorname{arctg} \left(\frac{t}{k} \right) \\ = -\frac{2}{\sqrt{-\alpha \gamma}} \operatorname{arctg} \sqrt{\frac{-\alpha(\gamma x + \delta)}{\gamma(\alpha x + \beta)}}.$$

Aufgabe 2. $\int \frac{x dx}{\sqrt{rx - x^2}} = ?$

Auflösung. In diesem Falle kann man setzen

$$(14.) \quad \alpha x + \beta = x, \quad \gamma x + \delta = r - x,$$

also

$$(15.) \quad \alpha = 1, \quad \beta = 0, \quad \gamma = -1, \quad \delta = r, \quad \beta\gamma - \alpha\delta = -r,$$

$$(16.) \quad \begin{cases} x = \frac{r}{t^2 + 1}, \quad \sqrt{rx - x^2} = \frac{rt}{t^2 + 1}, \\ dx = -\frac{2rt dt}{(t^2 + 1)^2}, \quad t = \sqrt{\frac{r - x}{x}}, \end{cases}$$

folglich erhält man mit Rücksicht auf Formel Nr. 149 der Tabelle

$$(17.) \int \frac{x dx}{\sqrt{rx-x^2}} = -2r \int \frac{dt}{(t^2+1)^2} = -2r \left[\frac{t}{2(1+t^2)} + \frac{1}{2} \operatorname{arctg} t \right] \\ = -\sqrt{rx-x^2} - r \operatorname{arctg} \sqrt{\frac{r-x}{x}}.$$

In ähnlicher Weise kann man $\int \frac{x^2 dx}{\sqrt{rx-x^2}}, \int \frac{x^3 dx}{\sqrt{rx-x^2}}, \dots$ berechnen.

Aufgabe 3. $\int \frac{dx}{x\sqrt{rx-x^2}} = ?$

Auflösung. Durch dieselbe Substitution wie bei der vorhergehenden Aufgabe, also durch die Gleichungen (16.), erhält man hier

$$(18.) \int \frac{dx}{x\sqrt{rx-x^2}} = -\frac{2}{r} \int \frac{dt}{t} = -\frac{2t}{r} \\ = -\frac{2}{r} \sqrt{\frac{r-x}{x}} = -\frac{2\sqrt{rx-x^2}}{rx}.$$

Aufgabe 4. $\int \frac{dx}{(x+1)\sqrt{1-x^2}} = ?$

Hier ist

$$(19.) \quad ax + \beta = 1 + x, \quad \text{also} \quad \gamma x + \delta = 1 - x,$$

$$(20.) \quad \alpha = 1, \quad \beta = 1, \quad \gamma = -1, \quad \delta = 1, \quad \beta\gamma - \alpha\delta = -2,$$

$$(21.) \quad x = -\frac{t^2-1}{t^2+1}, \quad \sqrt{1-x^2} = \frac{2t}{t^2+1}, \quad dx = -\frac{4tdt}{(t^2+1)^2},$$

$$(22.) \quad t = \sqrt{\frac{1-x}{1+x}}, \quad x+1 = \frac{2}{t^2+1}.$$

Dies gibt

$$(23.) \quad \int \frac{dx}{(x+1)\sqrt{1-x^2}} = -\int \frac{dt}{t} = -t = -\sqrt{\frac{1-x}{1+x}}.$$

Aufgabe 5. $\int \frac{dx}{(x-1)\sqrt{1-x^2}} = ?$

In ähnlicher Weise wie bei der vorhergehenden Aufgabe findet man

$$(24.) \quad \int \frac{dx}{(x-1)\sqrt{1-x^2}} = \int \frac{dt}{t^2} = -\frac{1}{t} = -\sqrt{\frac{1+x}{1-x}}.$$

Aufgabe 6. $\int \frac{dx}{(x+1)\sqrt{x^2-1}} = ?$

Auflösung. Hier sei

$$\alpha x + \beta = x + 1, \quad \text{also} \quad \gamma x + \delta = x - 1, \\ \alpha = 1, \quad \beta = 1, \quad \gamma = 1, \quad \delta = -1, \quad \beta\gamma - \alpha\delta = 2,$$

$$(25.) \quad x = \frac{t^2 + 1}{1 - t^2}, \quad \sqrt{x^2 - 1} = \frac{2t}{1 - t^2}, \quad dx = \frac{4t dt}{(1 - t^2)^2}.$$

$$(26.) \quad t = \sqrt{\frac{x-1}{x+1}}, \quad x+1 = \frac{2}{1-t^2}.$$

Dies gibt

$$(27.) \quad \int \frac{dx}{(x+1)\sqrt{x^2-1}} = \int dt = t = \sqrt{\frac{x-1}{x+1}}.$$

Aufgabe 7. $\int \frac{dx}{(x-1)\sqrt{x^2-1}} = ?$

Auflösung. In ähnlicher Weise wie bei der vorhergehenden Aufgabe findet man

$$(28.) \quad \int \frac{dx}{(x-1)\sqrt{x^2-1}} = \int \frac{dt}{t^2} = -\frac{1}{t} = -\sqrt{\frac{x+1}{x-1}}.$$

Aufgabe 8. $\int \frac{dx}{(x-k)\sqrt{rx-x^2}} = ?$

Auflösung. Auch hier findet die durch die Gleichungen (16.) angegebene Substitution Anwendung, und zwar erhält man, wenn man

$$(29.) \quad r = kg$$

setzt,

$$(30.) \quad \int \frac{dx}{(x-k)\sqrt{rx-x^2}} = -2 \int \frac{dt}{r-k(t^2+1)} = -2 \int \frac{dt}{kg-k(t^2+1)} \\ = \frac{2}{k} \int \frac{dt}{t^2 - g + 1}.$$

Dies gibt für $g > 1$ nach Formel Nr. 29a der Tabelle

$$(31.) \quad \int \frac{dx}{(x-k)\sqrt{rx-x^2}} = \frac{1}{k\sqrt{g-1}} \ln \left(\frac{t - \sqrt{g-1}}{t + \sqrt{g-1}} \right).$$

Dieses Resultat kann man noch auf die Form

$$(32.) \quad \int \frac{dx}{(x-k)\sqrt{rx-x^2}} = \frac{1}{\sqrt{k(r-k)}} \ln \left(\frac{\sqrt{k(r-x)} - \sqrt{x(r-k)}}{\sqrt{k(r-x)} + \sqrt{x(r-k)}} \right)$$

bringen. Ist $g < 1$, so findet man nach Formel Nr. 28 der Tabelle

$$(33.) \quad \int \frac{dx}{(x-k)\sqrt{rx-x^2}} = \frac{2}{k\sqrt{1-g}} \operatorname{arctg} \left(\frac{t}{\sqrt{1-g}} \right),$$

also

$$(34.) \quad \int \frac{dx}{(x-k)\sqrt{rx-x^2}} = \frac{2}{\sqrt{k(k-r)}} \operatorname{arctg} \left(\frac{\sqrt{k(r-x)}}{\sqrt{x(k-r)}} \right).$$

Aufgabe 9. $\int \frac{dx}{(1+x^2)\sqrt{1-x^2}} = ?$

Auflösung. Man könnte hier dieselbe Substitution anwenden wie in Aufgabe 4; man kann aber auch setzen:

$$(35.) \quad ax + \beta = 1 - x, \quad \gamma x + \delta = 1 + x,$$

also

$$(36.) \quad a = -1, \quad \beta = 1, \quad \gamma = 1, \quad \delta = 1, \quad \beta\gamma - \alpha\delta = 2,$$

$$(37.) \quad x = \frac{t^2 - 1}{t^2 + 1}, \quad t = \sqrt{\frac{1+x}{1-x}}, \quad dx = \frac{4tdt}{(t^2 + 1)^2},$$

$$(38.) \quad \sqrt{1-x^2} = \frac{2t}{t^2 + 1}, \quad 1+x^2 = \frac{2(t^4 + 1)}{(t^2 + 1)^2}.$$

Daraus folgt

$$(39.) \quad \int \frac{dx}{(1+x^2)\sqrt{1-x^2}} = \int \frac{(t^2 + 1)dt}{t^4 + 1}.$$

Die Wurzeln der Gleichung

$$(40.) \quad t^4 + 1 = (t^2 - i)(t^2 + i) = 0,$$

nämlich

$$(41.) \quad t_1 = \frac{1+i}{\sqrt{2}}, \quad t_2 = \frac{1-i}{\sqrt{2}}, \quad t_3 = -\frac{1+i}{\sqrt{2}}, \quad t_4 = -\frac{1-i}{\sqrt{2}},$$

sind sämtlich komplex. Indem man je zwei konjugiert

komplexe Faktoren von $t^4 + 1$ miteinander multipliziert, erhält man die reellen Produkte

$$(42.) \quad (t - t_1)(t - t_2) = t^2 - t\sqrt{2} + 1,$$

$$(43.) \quad (t - t_3)(t - t_4) = t^2 + t\sqrt{2} + 1$$

und die Partialbruch-Zerlegung

$$(44.) \quad \frac{t^2 + 1}{t^4 + 1} = \frac{Pt + Q}{t^2 - t\sqrt{2} + 1} + \frac{Rt + S}{t^2 + t\sqrt{2} + 1} \\ = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{t^2 - t\sqrt{2} + 1} + \frac{1}{t^2 + t\sqrt{2} + 1} \right).$$

Deshalb findet man nach Formel Nr. 89 der Tabelle

$$(45.) \quad \int \frac{dx}{(1+x^2)\sqrt{1-x^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} [\operatorname{arctg}(t\sqrt{2}-1) + \operatorname{arctg}(t\sqrt{2}+1)].$$

Dieser Ausdruck läßt sich noch wesentlich vereinfachen. Setzt man nämlich

$$(46.) \quad \operatorname{arctg}(t\sqrt{2}-1) = \xi, \quad \operatorname{arctg}(t\sqrt{2}+1) = \eta,$$

so wird

$$(47.) \quad \operatorname{tg} \xi = t\sqrt{2}-1, \quad \operatorname{tg} \eta = t\sqrt{2}+1,$$

$$(48.) \quad \operatorname{tg}(\xi + \eta) = \frac{\operatorname{tg} \xi + \operatorname{tg} \eta}{1 - \operatorname{tg} \xi \operatorname{tg} \eta} = \frac{2t\sqrt{2}}{2 - 2t^2} = \frac{t\sqrt{2}}{t^2 - 1}.$$

Nun ist nach den Gleichungen (37.) und (38.)

$$x = \frac{t^2 - 1}{t^2 + 1}, \quad \sqrt{1-x^2} = \frac{2t}{t^2 + 1}, \quad \text{also} \quad \frac{\sqrt{1-x^2}}{x} = \frac{2t}{t^2 - 1},$$

folglich wird

$$(49.) \quad \operatorname{tg}(\xi + \eta) = -\frac{\sqrt{1-x^2}}{x\sqrt{2}}, \quad \xi + \eta = -\operatorname{arctg}\left(\frac{\sqrt{1-x^2}}{x\sqrt{2}}\right),$$

$$(50.) \quad \int \frac{dx}{(1+x^2)\sqrt{1-x^2}} = \frac{\xi + \eta}{\sqrt{2}} = -\frac{1}{\sqrt{2}} \operatorname{arctg}\left(\frac{\sqrt{1-x^2}}{x\sqrt{2}}\right).$$

In § 47, Aufgabe 8 hatte sich ergeben

$$(51.) \quad \int \frac{dx}{(1+x^2)\sqrt{1-x^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \operatorname{arctg}\left(\frac{x\sqrt{2}}{\sqrt{1-x^2}}\right).$$

Die Übereinstimmung dieser beiden Resultate findet man leicht, indem man

§ 49. $\int F(x, \sqrt{Ax^2+2Bx+C})dx$, wenn $A < 0$, $C < 0$, $B^2 - AC < 0$. 299

$$(52.) \quad \operatorname{arctg}\left(\frac{\sqrt{1-x^2}}{x\sqrt{2}}\right) = \varphi, \quad \text{also} \quad \operatorname{tg} \varphi = \frac{\sqrt{1-x^2}}{x\sqrt{2}}$$

setzen; dann wird

$$(53.) \quad \operatorname{ctg} \varphi = \frac{x\sqrt{2}}{\sqrt{1-x^2}} = \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{2} - \varphi\right), \quad \frac{\pi}{2} - \varphi = \operatorname{arctg}\left(\frac{x\sqrt{2}}{\sqrt{1-x^2}}\right).$$

Fügt man also in Gleichung (50.) die Integrations-Konstante $\frac{\pi}{2\sqrt{2}}$ hinzu, so erhält man in Übereinstimmung mit Gleichung (51.)

$$(54.) \quad \int \frac{dx}{(1+x^2)\sqrt{1-x^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\frac{\pi}{2} - \operatorname{arctg}\left(\frac{\sqrt{1-x^2}}{x\sqrt{2}}\right) \right] \\ = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{\pi}{2} - \varphi \right) = \frac{1}{\sqrt{2}} \operatorname{arctg}\left(\frac{x\sqrt{2}}{\sqrt{1-x^2}}\right).$$

Es war schon damals hervorgehoben worden, daß eine einfachere Lösung dieser Aufgabe durch die in § 12 angegebene Methode, nämlich durch Einführung trigonometrischer Funktionen, gefunden wird.

§ 49.

Integration der Differential-Funktion

$F(x, \sqrt{Ax^2+2Bx+C})dx$, wenn die drei Größen A , C und $B^2 - AC$ negativ sind.

Es sei jetzt

$$(1.) \quad B^2 - AC < 0, \quad \text{also} \quad AC > B^2 > 0;$$

die beiden Größen A und C haben daher dasselbe Vorzeichen, so daß die Voraussetzung

$$(2.) \quad A < 0$$

die andere

$$(3.) \quad C < 0$$

notwendigerweise herbeiführt. Nun wird

$$(4.) \quad Ax^2 + 2Bx + C = \frac{1}{A}[A^2x^2 + 2ABx + B^2 + AC - B^2] \\ = \frac{1}{A}[(Ax + B)^2 + (AC - B^2)];$$

folglich ist in diesem Falle der Ausdruck in der eckigen Klammer *beständig positiv*, was auch x sein mag, also $Ax^2+2Bx+C$ *beständig negativ*, denn A ist negativ. Deshalb wird die Funktion $F(x, \sqrt{Ax^2+2Bx+C})$ selbst eine *komplexe* GröÙe, wenn die Ungleichungen (1.), (2.) und (3.) gelten, weil $\sqrt{Ax^2+2Bx+C}$ stets *imaginär* sein muß. Es ist daher nicht möglich, $\int F(x, \sqrt{Ax^2+2Bx+C})dx$ in *reeller* Form darzustellen. Unter diesen Umständen wird man, wie schon in § 44 hervorgehoben wurde, am besten

$$(5.) \quad \int F(x, \sqrt{Ax^2+2Bx+C})dx = \int F(x, i\sqrt{A_1x^2+2B_1x+C_1})dx$$

setzen, wobei

$$(6.) \quad A_1 = -A, \quad B_1 = -B, \quad C_1 = -C$$

ist. Man kann dann das in § 46 und § 47 angegebene Verfahren benutzen.

§ 50.

Normalintegrale von der Form $\int F(x, \sqrt{Ax^2+2Bx+C})dx^*$.

Ist $F(x, \sqrt{X})$ eine (ganze oder gebrochene) rationale Funktion von x und \sqrt{X} , wobei man der Kürze wegen $Ax^2 + 2Bx + C$ mit X bezeichnet hat, so kann man $F(x, \sqrt{X})$ immer auf die Form

$$(1.) \quad F(x, \sqrt{X}) = \frac{g(x) + h(x) \cdot \sqrt{X}}{\varphi(x) + \psi(x) \cdot \sqrt{X}}$$

bringen, so daß $g(x)$, $h(x)$, $\varphi(x)$, $\psi(x)$ ganze rationale Funktionen von x sind. Daraus folgt

*) Der Anfänger darf die Ausführungen dieses Paragraphen übergehen.

$$(2.) \quad F(x, \sqrt{X}) = \frac{[g(x) + h(x) \cdot \sqrt{X}] \cdot [\varphi(x) - \psi(x) \cdot \sqrt{X}]}{[\varphi(x) + \psi(x) \cdot \sqrt{X}] \cdot [\varphi(x) - \psi(x) \cdot \sqrt{X}]} \\ = \frac{G(x) + H(x) \cdot \sqrt{X}}{\varphi(x)^2 - \psi(x)^2 \cdot X},$$

wenn man

$$(3.) \quad \begin{cases} g(x)\varphi(x) - h(x)\psi(x) \cdot X = G(x), \\ h(x)\varphi(x) - g(x)\psi(x) = H(x) \end{cases}$$

setzt. Bezeichnet man noch den Nenner $\varphi(x)^2 - \psi(x)^2 \cdot X$ mit $N(x)$, so ergibt sich

$$(4.) \quad F(x, \sqrt{X}) = \frac{G(x)}{N(x)} + \frac{H(x)}{N(x)} \cdot \sqrt{X} = \frac{G(x)}{N(x)} + \frac{H(x)X}{N(x) \cdot \sqrt{X}}.$$

Die gebrochene rationale Funktion $\frac{G(x)}{N(x)}$ kann man nach den Angaben des vorhergehenden Abschnittes durch Partialbruch-Zerlegung integrieren. Ebenso kann man $\frac{H(x) \cdot X}{N(x)}$ (nötigenfalls nach Absonderung einer ganzen rationalen Funktion) in Partialbrüche von der Form

$$\frac{K}{(x - k)^n} \quad \text{und} \quad \frac{Px + Q}{[(x - g)^2 + h^2]^n}$$

zerlegen. Deshalb kommt es im wesentlichen nur auf die Berechnung der folgenden vier *Normalintegrale* an:

$$(5.) \quad \begin{cases} J_1 = \int \frac{dx}{\sqrt{X}}, & J_2 = \int \frac{x^m dx}{\sqrt{X}}, & J_3 = \frac{dx}{(x - k)^n \sqrt{X}}, \\ J_4 = \int \frac{(Px + Q)dx}{[(x - g)^2 + h^2]^n \sqrt{X}}. \end{cases}$$

Diese Betrachtung bleibt auch noch richtig, wenn X eine ganze rationale Funktion beliebig hohen Grades ist. Ist im besonderen X eine ganze rationale Funktion zweiten Grades, so wird es im allgemeinen zweckmäßig sein, die in § 44 angegebene Umformung vorzunehmen, so daß die Berechnung des Normalintegrals J_1 nur auf die in den Formeln Nr. 34, 35 und 36 der Tabelle berechneten Integrale

$$(6.) \quad \int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin\left(\frac{x}{a}\right) \text{ bzw. } \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} = \ln\left(\frac{x + \sqrt{x^2 \pm a^2}}{a}\right)$$

zurückkommt. In gleicher Weise geben nach dieser Umformung die Formeln Nr. 31, 32, 33, 119, 126 und 126a der Tabelle an, wie das Normalintegral J_2 , nämlich

$$\int \frac{x^m dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} \quad \text{und} \quad \int \frac{x^m dx}{\sqrt{x^2 + a^2}},$$

berechnet wird. Auch J_3 kann man in dem Falle, wo $k = 0$ ist, mit Anwendung der Formeln Nr. 37 bis 42, 125, 131 und 131a der Tabelle berechnen. Ist aber $k \geq 0$, so setze man zur Berechnung von $\int \frac{dx}{(x-k)^n \sqrt{a^2 + x^2}}$

$$(7.) \quad x = \frac{kz + a^2}{z - k}, \quad \text{also} \quad x - k = \frac{k^2 + a^2}{z - k},$$

$$(8.) \quad dx = -\frac{(k^2 + a^2)dz}{(z - k)^2}, \quad \sqrt{a^2 + x^2} = \frac{\sqrt{(k^2 + a^2)(a^2 + z^2)}}{z - k},$$

$$(9.) \quad z = \frac{kx + a^2}{x - k}, \quad \sqrt{a^2 + z^2} = \frac{\sqrt{(k^2 + a^2)(a^2 + x^2)}}{x - k}.$$

Dies gibt

$$(10.) \quad \int \frac{dx}{(x-k)^n \sqrt{a^2 + x^2}} = -\frac{1}{(k^2 + a^2)^{n-1} \sqrt{k^2 + a^2}} \int \frac{(z-k)^{n-1} dz}{\sqrt{a^2 + z^2}}.$$

Das Normalintegral J_3 ist also auf die Normalintegrale J_1 und J_2 zurückgeführt.

In ähnlicher Weise setze man zur Berechnung von $\int \frac{dx}{(x-k)^n \sqrt{x^2 - a^2}}$

$$(11.) \quad x = \frac{kz - a^2}{z - k}, \quad \text{also} \quad x - k = \frac{k^2 - a^2}{z - k},$$

$$(12.) \quad dx = -\frac{(k^2 - a^2)dz}{(z - k)^2}, \quad \sqrt{x^2 - a^2} = \frac{\sqrt{(k^2 - a^2)(z^2 - a^2)}}{z - k},$$

$$(13.) \quad z = \frac{kx - a^2}{x - k}, \quad \sqrt{z^2 - a^2} = \frac{\sqrt{(k^2 - a^2)(x^2 - a^2)}}{x - k}.$$

Ist $k^2 > a^2$, so wird daher

$$(14.) \quad \int \frac{dx}{(x-k)^n \sqrt{x^2 - a^2}} = -\frac{1}{(k^2 - a^2)^{n-1} \sqrt{k^2 - a^2}} \int \frac{(z-k)^{n-1} dz}{\sqrt{z^2 - a^2}},$$

und für $k^2 < a^2$ wird

$$(15.) \int \frac{dx}{(x-k)^n \sqrt{x^2 - a^2}} = - \frac{1}{(k^2 - a^2)^{n-1} \sqrt{a^2 - k^2}} \int \frac{(z-k)^{n-1} dz}{\sqrt{a^2 - z^2}}.$$

Die in den Gleichungen (11.), (12.) und (13.) angegebene Substitution führt auch zur Umformung von $\int \frac{dx}{(x-k)^n \sqrt{a^2 - x^2}}$; es wird nämlich

$$(16.) \quad \begin{cases} \sqrt{a^2 - x^2} = \frac{\sqrt{(k^2 - a^2)(a^2 - z^2)}}{z - k}, \\ \sqrt{a^2 - z^2} = \frac{\sqrt{(k^2 - a^2)(a^2 - x^2)}}{x - k}, \end{cases}$$

also für $k^2 > a^2$

$$(17.) \int \frac{dx}{(x-k)^n \sqrt{a^2 - x^2}} = - \frac{1}{(k^2 - a^2)^{n-1} \sqrt{k^2 - a^2}} \int \frac{(z-k)^{n-1} dz}{\sqrt{a^2 - z^2}},$$

und für $k^2 < a^2$

$$(18.) \int \frac{dx}{(x-k)^n \sqrt{a^2 - x^2}} = - \frac{1}{(k^2 - a^2)^{n-1} \sqrt{a^2 - k^2}} \int \frac{(z-k)^{n-1} dz}{\sqrt{z^2 - a^2}}.$$

Das Normalintegral J_4 kann bei Anwendung komplexer Größen durch Integrale von der Form J_3 dargestellt werden. Will man aber komplexe Größen ganz vermeiden, so wird man entweder die in § 46, 47 und 48 angegebenen Methoden anwenden, oder man wird im allgemeinen noch zweckmäßiger nach den Angaben in § 12 (vergl. Formel Nr. 84, 85 und 86 der Tabelle) trigonometrische Funktionen einführen, nachdem man durch die lineare Substitution

$$(19.) \quad x = \frac{\alpha z + \beta}{z + 1}$$

und durch passende Bestimmung der Größen α und β das Integral auf Integrale von der Form

$$\int \frac{(Pz + Q) dz}{(z^2 + p^2)^n \sqrt{Z}}$$

zurückgeführt hat, wobei Z einen der drei Werte $a^2 + z^2$, $z^2 - a^2$ oder $a^2 - z^2$ haben soll. Durch die Substitution

$$(20.) \quad z = a \operatorname{tg} t, \quad dz = \frac{a dt}{\cos^2 t}, \quad \sqrt{a^2 + z^2} = \frac{a}{\cos t}$$

erhält man dann

$$\begin{aligned}
 (21.) \quad \int \frac{(Pz + Q)dz}{(z^2 + p^2)^n \sqrt{a^2 + z^2}} &= \int \frac{(Pasint + Q \cos t) \cos^{2n-2} t \cdot dt}{(a^2 \sin^2 t + p^2 \cos^2 t)^n} \\
 &= -Pa \int \frac{\cos^{2n-2} t d(\cos t)}{[a^2 + (p^2 - a^2) \cos^2 t]^n} \\
 &\quad + Q \int \frac{(1 - \sin^2 t)^{n-1} d(\sin t)}{[a^2 - p^2 \sin^2 t + p^2]^n}.
 \end{aligned}$$

Durch die Substitution

$$(22.) \quad z = \frac{a}{\cos t}, \quad dz = \frac{a \sin t dt}{\cos^2 t}, \quad \sqrt{z^2 - a^2} = a \tan t$$

erhält man

$$\begin{aligned}
 (23.) \quad \int \frac{(Pz + Q)dz}{(z^2 + p^2)^n \sqrt{z^2 - a^2}} &= \int \frac{(Pa + Q \cos t) \cos^{2n-2} t \cdot dt}{(a^2 + p^2 \cos^2 t)^n} \\
 &= Pa \int \frac{d(\tan t)}{[(a^2 + p^2) + a^2 \tan^2 t]^n} \\
 &\quad + Q \int \frac{(1 - \sin^2 t)^{n-1} \cdot d(\sin t)}{[(a^2 + p^2) - p^2 \sin^2 t]^n}.
 \end{aligned}$$

Durch die Substitution

$$(24.) \quad z = a \sin t, \quad dz = a \cos t dt, \quad \sqrt{a^2 - z^2} = a \cos t$$

findet man

$$\begin{aligned}
 (25.) \quad \int \frac{(Pz + Q)dz}{(z^2 + p^2)^n \sqrt{a^2 - z^2}} &= \int \frac{(Pasint + Q)dt}{(a^2 \sin^2 t + p^2)^n} \\
 &= -Pa \int \frac{d(\cos t)}{[(a^2 + p^2) - a^2 \cos^2 t]^n} + Q \int \frac{(1 + \tan^2 t)^{n-1} d(\tan t)}{[(a^2 + p^2) \tan^2 t + p^2]^n}.
 \end{aligned}$$

Außerdem kann man zur Berechnung des Integrals J_4 auch Rekursionsformeln herleiten von der Form

$$\begin{aligned}
 (26.) \quad \int \frac{(Pz + Q)dz}{(z^2 + p^2)^n \sqrt{Z}} \\
 = \frac{(Rz + S)\sqrt{Z}}{(z^2 + p^2)^{n-1}} + \int \frac{(P_1 z + Q_1)dz}{(z^2 + p^2)^{n-1} \sqrt{Z}} + \int \frac{(P_2 z + Q_2)dz}{(z^2 + p^2)^{n-2} \sqrt{Z}},
 \end{aligned}$$

wobei man die unbestimmten Koeffizienten R, S, P_1, Q_1, P_2, Q_2 dadurch ermittelt, daß man beide Seiten der Gleichung (26.) differentiirt und nach Fortschaffung der Nenner die gleichstelligen Koeffizienten einander gleichsetzt.

§ 51.

Integration einer Differential-Funktion von der Form

$$F(x, \sqrt{ax+\beta}, \sqrt{\gamma x+\delta})dx.$$

(Vergl. die Formel-Tabelle Nr. 164.)

Ist $F(x, \sqrt{ax+\beta}, \sqrt{\gamma x+\delta})$ eine rationale Funktion von x , $\sqrt{ax+\beta}$ und $\sqrt{\gamma x+\delta}$, so kann man die Ermittlung von $\int F(x, \sqrt{ax+\beta}, \sqrt{\gamma x+\delta})dx$ auf die vorstehenden Methoden zurückführen. Setzt man nämlich

$$(1.) \quad \sqrt{ax+\beta} = t, \text{ also } ax+\beta = t^2, \\ \text{so wird}$$

$$(2.) \quad x = \frac{t^2 - \beta}{\alpha}, \quad dx = \frac{2t dt}{\alpha}, \quad \gamma x + \delta = \frac{\gamma t^2 + \alpha\delta - \beta\gamma}{\alpha},$$

$$(3.) \quad \int F(x, \sqrt{ax+\beta}, \sqrt{\gamma x+\delta})dx = \\ \int F\left(\frac{t^2 - \beta}{\alpha}, t, \sqrt{\frac{\gamma t^2 + \alpha\delta - \beta\gamma}{\alpha}}\right) \frac{2t dt}{\alpha},$$

d. h. man hat das Integral auf die Form

$$\int F_1(t, \sqrt{At^2 + Bt + C})dt$$

gebracht und kann die früher angegebenen Regeln zu seiner Berechnung anwenden. Dabei ist

$$(4.) \quad A = \frac{\gamma}{\alpha}, \quad B = 0, \quad C = \frac{\alpha\delta - \beta\gamma}{\alpha}.$$

Beispiel. $\int \frac{\sqrt{x-a}}{\sqrt{b-x}} dx = ?$

Auflösung. Hier ist

$$(5.) \quad \sqrt{x-a} = t, \quad x-a = t^2, \quad x = a + t^2,$$

$$(6.) \quad dx = 2t dt, \quad b-x = b-a-t^2.$$

Unter der Voraussetzung, daß $b-a > 0$ ist, setzt man

$$(7.) \quad \sqrt{b-a} = c, \text{ also } b-a = c^2$$

und erhält nach Formel Nr. 120 der Tabelle

$$(8.) \quad \int \frac{\sqrt{x-a} \cdot dx}{\sqrt{b-x}} = \int \frac{2t^2 dt}{\sqrt{c^2 - t^2}} = -t\sqrt{c^2 - t^2} + c^2 \arcsin\left(\frac{t}{c}\right) \\ = -\sqrt{(x-a)(b-x)} + (b-a) \arcsin\left(\sqrt{\frac{x-a}{b-a}}\right).$$

XII. Abschnitt.

Theorie der bestimmten Integrale.

§ 52.

Integrale zwischen unendlichen Grenzen.

(Vergl. die Formel-Tabelle Nr. 165 und 166.)

Bei der Erklärung des bestimmten Integrals durch Formel Nr. 4 der Tabelle, nämlich durch die Gleichung

$$(1.) \quad \int_a^b F'(x) dx = F(b) - F(a),$$

war bisher vorausgesetzt worden, daß die Grenzen a und b endliche, konstante Größen seien. Jetzt kann man sich aber vorstellen, daß die obere Grenze b nicht mehr eine konstante, sondern eine veränderliche Größe sei, welche schließlich bis ins Unbegrenzte wächst. Demgemäß möge

$\int_a^\infty F'(x) dx$ durch die Gleichung

$$(2.) \quad \int_a^\infty F'(x) dx = \lim_{b=\infty} \int_a^b F'(x) dx = \lim_{b=\infty} F(b) - F(a)$$

erklärt werden.

Auch die geometrische Deutung des bestimmten Integrals als Flächeninhalt einer ebenen Figur bleibt in diesem Grenzfalle noch bestehen, die ebene Figur aber, deren Flächeninhalt durch das Integral ausgedrückt wird, erstreckt sich in diesem Falle längs der X -Achse bis ins Unendliche. Es war schon früher (§ 19, Aufgabe 8) gezeigt worden, daß der Flächeninhalt der Figur trotzdem einen endlichen Wert haben kann.

In gleicher Weise kann auch die untere Grenze a veränderlich sein und bis ins Unbegrenzte abnehmen. Demgemäß möge $\int_{-\infty}^b F'(x)dx$ durch die Gleichung

$$(3.) \quad \int_{-\infty}^b F'(x)dx = \lim_{a=-\infty} \int_a^b F'(x)dx = F(b) - \lim_{a=-\infty} F(a)$$

erklärt werden.

Aus den folgenden Beispielen kann man ersehen, daß hierbei drei Fälle zu unterscheiden sind:

- I. Das Integral zwischen unendlichen Grenzen wird selbst *unendlich groß*;
- II. das Integral behält einen *endlichen* Wert;
- III. das Integral wird *unbestimmt*.

Beispiele.

$$1.) \quad \int_0^{\infty} e^x dx = \lim_{b=\infty} [e^x]_0^b = \lim_{b=\infty} e^b - 1 = \infty.$$

Dagegen wird, wenn man a gleich $-c$ setzt,

$$1a.) \quad \int_{-\infty}^b e^x dx = \lim_{a=-\infty} [e^x]_a^b = e^b - \lim_{a=-\infty} e^a = e^b - \lim_{c=\infty} \frac{1}{e^c} = e^b.$$

Man kann diese Resultate auch geometrisch deuten als Flächeninhalt der ebenen Figur, welche oben durch die *Exponentiallinie* mit der Gleichung

$$y = e^x$$

(vergl. D.-R., 12. Auflage, Seite 417, Fig. 82) und unten durch die X -Achse begrenzt wird.

$$2.) \quad \int_0^{\infty} e^{-x} dx = - \lim_{b=\infty} [e^{-x}]_0^b = 1 - \lim_{b=\infty} \left(\frac{1}{e^b} \right) = 1.$$

$$3.) \quad \int_0^{\infty} \frac{dx}{a^2 + x^2} = \frac{1}{a} \lim_{b=\infty} \left[\operatorname{arctg} \left(\frac{x}{a} \right) \right]_0^b = \frac{1}{a} \lim_{b=\infty} \operatorname{arctg} \left(\frac{b}{a} \right) = \frac{\pi}{2a}.$$

$$\begin{aligned}
 4.) \quad \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{a^2 + x^2} &= \lim_{\substack{c=+\infty \\ b=-\infty}} \int_b^c \frac{dx}{a^2 + x^2} = \frac{1}{a} \lim_{\substack{c=+\infty \\ b=-\infty}} \left[\operatorname{arctg}\left(\frac{x}{a}\right) \right]_b^c \\
 &= \frac{1}{a} \left[\lim_{c=+\infty} \operatorname{arctg}\left(\frac{c}{a}\right) - \lim_{b=-\infty} \operatorname{arctg}\left(\frac{b}{a}\right) \right] \\
 &= \frac{1}{a} \left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} \right) = \frac{\pi}{a}.
 \end{aligned}$$

Aus diesem Beispiele sieht man, wie die Definitionen (2.) und (3.) zu vereinigen sind, wenn gleichzeitig beide Grenzen unendlich werden. Im übrigen kann man die letzte Aufgabe auch durch Zerlegung des Integrals auf die vorhergehende Aufgabe zurückführen. Es ist nämlich, wenn man $x = -y$ setzt,

$$\begin{aligned}
 \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{a^2 + x^2} &= \int_{-\infty}^0 \frac{dx}{a^2 + x^2} + \int_0^{+\infty} \frac{dx}{a^2 + x^2} \\
 &= - \int_{+\infty}^0 \frac{dy}{a^2 + y^2} + \int_0^{+\infty} \frac{dx}{a^2 + x^2} \\
 &= 2 \int_0^{\infty} \frac{dx}{a^2 + x^2} = \frac{\pi}{a}.
 \end{aligned}$$

$$5.) \quad \int_1^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x}} = \lim_{b=\infty} [2\sqrt{x}]_1^b = 2 \lim_{b=\infty} \sqrt{b} - 2 = \infty.$$

$$6.) \quad \int_1^{\infty} \frac{dx}{x\sqrt{x}} = -2 \lim_{b=\infty} \left[\frac{1}{\sqrt{x}} \right]_1^b = 2 - 2 \lim_{b=\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{b}} \right) = 2.$$

$$7.) \quad \int_a^{\infty} \frac{dx}{x} = \lim_{b=\infty} [\ln x]_a^b = \lim_{b=\infty} \ln\left(\frac{b}{a}\right) = \infty.$$

$$8.) \quad \int_0^{\infty} \cos x dx = \lim_{b=\infty} [\sin x]_0^b = \lim_{b=\infty} \sin b.$$

Dieser Ausdruck nähert sich keiner bestimmten Grenze; in diesem Falle wird also das Integral *unbestimmt*, wenn

man die obere (oder untere) Grenze unendlich groß werden läßt.

$$9.) \quad \int_0^{\infty} \sin x dx = \lim_{b=\infty} [-\cos x]_0^b = 1 - \lim_{b=\infty} \cos b.$$

Dieser Ausdruck wird ebenfalls unbestimmt. Davon kann man sich auch durch die geometrische Deutung überzeugen, denn das $\int_0^b \sin x dx$ stellt den Flächeninhalt der ebenen Figur dar, welche von der *Sinuslinie* mit der Gleichung

$$y = \sin x$$

(vergl. D.-R., 12. Auflage, Seite 417, Figur 81) und der *X*-Achse begrenzt wird. Dabei sind die Teile *über* der *X*-Achse mit *positivem* und die *unter* der *X*-Achse mit *negativem* Zeichen in Rechnung zu ziehen.

Auch bei der Kubatur der Rotationskörper war ein bestimmtes Integral, dessen obere Grenze unendlich wurde, bereits aufgetreten. In § 25, Aufgabe 13 erhielt man für das Volumen des Körpers, welcher durch Rotation der *Zissoide* um die Asymptote $x = 2a$ entsteht, einen Wert, der auch dann noch endlich bleibt, wenn die Integrations-Veränderliche y unendlich groß wird. Es war nämlich

$$x = 2a \sin^2 \varphi, \quad y = 2a \frac{\sin^3 \varphi}{\cos \varphi}, \quad x - 2a = -2a \cos^2 \varphi,$$

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_0^y (x - 2a)^2 dy \\ &= 8a^3 \pi \left[-\frac{1}{3} \cos^6 \varphi \sin \varphi - \frac{1}{6} \cos^8 \varphi \sin \varphi + \frac{1}{4} \cos \varphi \sin \varphi + \frac{1}{4} \varphi \right]. \end{aligned}$$

Für $\lim y = \infty$ wird $\varphi = \frac{\pi}{2}$, also,

$$V = \pi \int_0^{\infty} (x - 2a)^2 dy = a^3 \pi^2.$$

§ 53.

**Integration von Differential-Funktionen,
die an den Grenzen des Integrals unstetig werden.**

(Vergl. die Formel-Tabelle Nr. 167 bis 169.)

Bei der Erklärung des bestimmten Integrals durch Formel Nr. 4 der Tabelle, nämlich durch die Gleichung

$$(1.) \quad \int_a^b F'(x) dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a),$$

war bisher auch die Voraussetzung gemacht worden, daß $F'(x)$ in dem Intervalle von a bis b stetig und endlich sei. Jetzt möge aber $F'(x)$ stetig und endlich sein nur für

$$a \leq x < b,$$

während

$$(2.) \quad F'(b) = \pm \infty$$

ist. Bezeichnet man dann mit β eine beliebig kleine positive Größe, so gilt für

$$\int_a^{b-\beta} F'(x) dx = F(b - \beta) - F(a)$$

noch die frühere Erklärung des bestimmten Integrals, wie klein β auch sein mag. Dem entsprechend möge $\int_a^b F'(x) dx$ erklärt werden durch die Gleichung

$$(3.) \quad \int_a^b F'(x) dx = \lim_{\beta \rightarrow 0} \int_a^{b-\beta} F'(x) dx = \lim_{\beta \rightarrow 0} F(b - \beta) - F(a).$$

Es sei z. B.

$$F'(x) = \frac{1}{\sqrt{b-x}}, \quad \text{also} \quad F'(b) = \pm \infty,$$

dann wird

$$\begin{aligned} \int_a^b F'(x) dx &= \int_a^b \frac{dx}{\sqrt{b-x}} = -2 \lim_{\beta \rightarrow 0} [\sqrt{b-x}]_a^{b-\beta} \\ &= -2 \left(\lim_{\beta \rightarrow 0} \sqrt{\beta} - \sqrt{b-a} \right) = 2\sqrt{b-a}. \end{aligned}$$

Bleibt $F'(x)$ stetig und endlich für

$$a < x \leq b,$$

während

$$(4.) \quad F'(a) = \pm \infty$$

ist, so bezeichne man mit α eine beliebig kleine positive Größe, dann gilt für

$$\int_{a+\alpha}^b F'(x) dx = F(b) - F(a + \alpha)$$

noch die frühere Erklärung des bestimmten Integrals, wie klein auch α sein mag. Dem entsprechend möge $\int_a^b F'(x) dx$ erklärt werden durch die Gleichung

$$(5.) \quad \int_a^b F'(x) dx = \lim_{\alpha \rightarrow 0} \int_{a+\alpha}^b F'(x) dx = F(b) - \lim_{\alpha \rightarrow 0} F(a + \alpha).$$

Es kann auch vorkommen, daß beide Fälle vereinigt sind, daß also

$$(6.) \quad F'(a) = \pm \infty \quad \text{und} \quad F'(b) = \pm \infty,$$

daß $F'(x)$ aber stetig und endlich ist für

$$a < x < b;$$

dann wird $\int_a^b F'(x) dx$ erklärt durch die Gleichung

$$(7.) \quad \int_a^b F'(x) dx = \lim_{\substack{\alpha \rightarrow 0 \\ \beta \rightarrow 0}} \int_{a+\alpha}^{b-\beta} F'(x) dx = \lim_{\beta \rightarrow 0} F(b - \beta) - \lim_{\alpha \rightarrow 0} F(a + \alpha).$$

Beispiele von derartigen Integralen waren bei der Quadratur der Kurven mehrfach aufgetreten. So ergab sich bei Aufgabe 8 in § 19 für den Flächeninhalt der ebenen Figur, welche oben von der *verallgemeinerten Hyperbel*

$$y = \sqrt[n]{2p} \cdot x^{-\frac{m}{n}}$$

begrenzt wird,

$$(8.) \quad F = \int_{x_1}^{x_2} y dx = \frac{n \sqrt[n]{2p}}{n - m} \left(x_2^{\frac{n-m}{n}} - x_1^{\frac{n-m}{n}} \right).$$

Ist $n > m > 0$, so wird $\lim_{x_1=0} x_1^{\frac{n-m}{n}} = 0$, und man erhält für

$$(9.) \quad F = \int_0^{x_2} y dx = \frac{n \sqrt[n]{2p}}{n-m} x_2^{\frac{n-m}{n}} = \frac{nx_2 y_2}{n-m}$$

einen endlichen Wert, obgleich y unendlich groß wird für $x = 0$, so daß sich der Flächenstreifen längs der Y -Achse ins Unendliche erstreckt.

Ferner fand man bei Aufgabe 12 in § 19 für den Flächeninhalt der ebenen Figur, welche von der *Zissoide* mit den Gleichungen

$$(10.) \quad x = 2a \sin^2 \varphi, \quad y = 2a \frac{\sin^3 \varphi}{\cos \varphi}$$

begrenzt wird,

$$(11.) \quad F = \int_0^x y dx = 8a^2 \int_0^\varphi \sin^4 \varphi d\varphi \\ = a^2 [3\varphi - \cos \varphi (2\sin^3 \varphi + 3\sin \varphi)].$$

Für $x = 2a$ oder $\varphi = \frac{\pi}{2}$ wird y unendlich groß, so daß sich der Flächenstreifen längs der Asymptote $x = 2a$ ins Unendliche erstreckt. Trotzdem bleibt

$$(12.) \quad F = \int_0^{2a} y dx = a^2 \lim_{\varphi=\frac{\pi}{2}} [3\varphi - \cos \varphi (2\sin^3 \varphi + 3\sin \varphi)] = \frac{3a^2 \pi}{2}$$

endlich.

Man erkennt aus den angeführten Beispielen, daß bei dieser Erklärung der Flächeninhalt einer ebenen Figur, die sich in der Richtung der Y -Achse ins Unendliche erstreckt, noch durch ein bestimmtes Integral ausgedrückt werden kann, bei dem die Funktion unter dem Integralzeichen an einer der beiden Grenzen unendlich groß wird. Und umgekehrt kann ein derartiges Integral als der Flächeninhalt einer Figur, die sich in der Richtung der Y -Achse ins Unendliche erstreckt, geometrisch gedeutet werden.

Übungs-Beispiele.

$$1.) \int_a^b \frac{dx}{\sqrt[3]{(x-a)^2}} = \lim_{\substack{\alpha=0 \\ a+\alpha}} \int_{a+\alpha}^b (x-a)^{-\frac{2}{3}} dx = 3 \lim_{\alpha=0} [\sqrt[3]{x-a}]_{a+\alpha}^b \\ = 3 \sqrt[3]{b-a} - 3 \lim_{\alpha=0} \sqrt[3]{\alpha} = 3 \sqrt[3]{b-a}.$$

$$2.) \int_a^b \frac{dx}{\sqrt{x^2-a^2}} = \lim_{\substack{\alpha=0 \\ a+\alpha}} \int_{a+\alpha}^b \frac{dx}{\sqrt{x^2-a^2}} = \lim_{\alpha=0} \left[\ln \left(\frac{x + \sqrt{x^2-a^2}}{a} \right) \right]_{a+\alpha}^b \\ = \ln \left(\frac{b + \sqrt{b^2-a^2}}{a} \right) - \lim_{\alpha=0} \ln \left(\frac{a + \alpha + \sqrt{2a\alpha + \alpha^2}}{a} \right) \\ = \ln \left(\frac{b + \sqrt{b^2-a^2}}{a} \right)$$

$$3.) \int_a^b \frac{dx}{\sqrt{(x-a)(b-x)}} = \lim_{\substack{\alpha=0 \\ \beta=0 \\ a+\alpha}}^{\substack{b-\beta \\ a+\alpha}} \frac{dx}{\sqrt{(x-a)(b-x)}}.$$

Hier ist

$$\int \frac{dx}{\sqrt{(x-a)(b-x)}} = \int \frac{dx}{\sqrt{-ab + (a+b)x - x^2}} \\ = \int \frac{dx}{\sqrt{\left(\frac{a+b}{2}\right)^2 - ab - \left[\left(\frac{a+b}{2}\right)^2 - (a+b)x + x^2\right]}},$$

oder, wenn man

$$x - \frac{a+b}{2} = t, \quad \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 - ab = \left(\frac{b-a}{2}\right)^2 = c^2,$$

also

$$dx = dt, \quad 2c = b-a$$

setzt,

$$\int \frac{dx}{\sqrt{(x-a)(b-x)}} = \int \frac{dt}{\sqrt{c^2 - t^2}} = \arcsin\left(\frac{t}{c}\right) \\ = \arcsin\left(\frac{2x - a - b}{b - a}\right).$$

Deshalb wird

$$\begin{aligned} \int_a^b \frac{dx}{\sqrt{(x-a)(b-x)}} &= \lim_{\substack{\alpha=0 \\ \beta=0}} \left[\arcsin \left(\frac{2x-a-b}{b-a} \right) \right]_{a+\alpha}^{b-\beta} \\ &= \lim_{\beta=0} \arcsin \left(\frac{b-2\beta-a}{b-a} \right) - \lim_{\alpha=0} \arcsin \left(\frac{a+2\alpha-b}{b-a} \right) \\ &= \arcsin(+1) - \arcsin(-1) = 2\arcsin 1 = \pi. \\ 4.) \quad \int_0^b \frac{dx}{x^2-b^2} &= \lim_{\beta=0} \left[\frac{1}{2b} \ln \left(\frac{b-x}{b+x} \right) \right]_0^{b-\beta} = \frac{1}{2b} \lim_{\beta=0} \ln \left(\frac{\beta}{2b-\beta} \right) = -\infty. \end{aligned}$$

§ 54.

Integration von Differential-Funktionen, die zwischen den Integrations-Grenzen unendlich werden.

(Vergl. die Formel-Tabelle Nr. 170.)

Wird die Funktion $F'(x)$ für $x=c$ unendlich groß, wobei c zwischen den Integrations-Grenzen a und b liegen möge, während $F'(x)$ stetig und endlich bleibt für

$$a \leq x < c \quad \text{und für} \quad c < x \leq b,$$

dann würde nach der bisherigen Definition des bestimmten Integrals $\int_a^b F'(x)dx$ zunächst keinen Sinn haben; es soll daher erklärt werden durch die Gleichung

$$\begin{aligned} (1.) \quad \int_a^b F'(x)dx &= \lim_{\gamma=0} \int_a^{c-\gamma} F'(x)dx + \lim_{\delta=0} \int_{c+\delta}^b F'(x)dx \\ &= F(b) - F(a) + \lim_{\gamma=0} F(c-\gamma) - \lim_{\delta=0} F(c+\delta), \end{aligned}$$

wobei γ und δ beliebig kleine positive Größen sind.

Übungs-Aufgaben.

Aufgabe 1. Der Gleichung


$$(2.) \quad x^2 y^3 = 1, \quad \text{oder} \quad y = \frac{1}{\sqrt[3]{x^2}}$$

entspricht eine Kurve (Fig. 107), welche die Y-Achse zur Asymptote und außerdem zur Symmetrie-Achse hat; man soll den Flächeninhalt der Figur berechnen, welche oben

durch diese Kurve, unten durch die X -Achse, links durch die Ordinate $x = -1$ und rechts durch die Ordinate $x = +2$ begrenzt wird.

Auflösung. Längs der Y -Achse erstreckt sich die Figur ins Unendliche, denn für $x=0$ wird $y = \infty$, folglich ist in diesem Falle

Fig. 107.



$$\begin{aligned}
 (3.) \quad F &= \lim_{\gamma \rightarrow 0} \int_{-1}^{-\gamma} y dx + \lim_{\delta \rightarrow 0} \int_{+\delta}^{+2} y dx \\
 &= \lim_{\gamma \rightarrow 0} \int_{-1}^{-\gamma} x^{-\frac{2}{3}} dx + \lim_{\delta \rightarrow 0} \int_{+\delta}^{+2} x^{-\frac{2}{3}} dx \\
 &= 3 \lim_{\gamma \rightarrow 0} [\sqrt[3]{x}]_{-1}^{-\gamma} + 3 \lim_{\delta \rightarrow 0} [\sqrt[3]{x}]_{+\delta}^{+2},
 \end{aligned}$$

also

$$(4.) \quad F = 3[1 - \lim_{\gamma \rightarrow 0} \sqrt[3]{\gamma} + \sqrt[3]{2} - \lim_{\delta \rightarrow 0} \sqrt[3]{\delta}] = 3(1 + \sqrt[3]{2}).$$


Man erhält also für den Flächeninhalt der Figur, die sich längs der Y -Achse bis ins Unendliche erstreckt, einen endlichen Wert.

Aufgabe 2. Der Gleichung

$$(5.) \quad x^2 y = 1, \text{ oder } y = \frac{1}{x^2}$$

Fig. 108.

entspricht eine Kurve (Fig. 108), welche gleichfalls die Y -Achse zur Asymptote und zur Symmetrie-Achse hat; man soll den Flächeninhalt der ebenen Figur berechnen, welche oben durch diese Kurve, unten durch die X -Achse, links durch



die Ordinate $x = -1$ und rechts durch die Ordinate $x = +2$ begrenzt wird.

Auflösung. Längs der Y -Achse erstreckt sich die Figur bis ins Unendliche, denn für $x = 0$ wird $y = \infty$, folglich wird auch in diesem Falle

$$\begin{aligned}
 (6.) \quad F &= \lim_{\gamma=0} \int_{-1}^{-\gamma} \frac{dx}{x^2} + \lim_{\delta=0} \int_{+\delta}^{+2} \frac{dx}{x^2} \\
 &= \lim_{\gamma=0} \left[-\frac{1}{x} \right]_{-1}^{-\gamma} + \lim_{\delta=0} \left[-\frac{1}{x} \right]_{+\delta}^{+2} \\
 &= \lim_{\gamma=0} \frac{1}{\gamma} - 1 - \frac{1}{2} + \lim_{\delta=0} \frac{1}{\delta} = \infty.
 \end{aligned}$$

Man hätte einen *Fehler* gemacht, wenn man geschrieben hätte

$$F = \int_{-1}^{+2} \frac{dx}{x^2} = \left[-\frac{1}{x} \right]_{-1}^{+2} = -\frac{1}{2} - 1 = -\frac{3}{2}.$$

Man sieht, daß die geometrische Deutung des bestimmten Integrals, wie sie früher unter Ausschluß von Unstetigkeiten gegeben wurde, bei der Erklärung des bestimmten Integrals durch Gleichung (1.) auch dann noch bestehen bleibt, wenn $F'(x)$ für einzelne Werte von x zwischen den Grenzen a und b unstetig oder unendlich groß wird. In dem Falle nämlich, wo $F'(x)$ für n verschiedene Werte von x zwischen den Grenzen a und b unstetig wird, muß man $\int_a^b F'(x) dx$ in $n + 1$ Integrale zerlegen und bei jedem einzelnen das in Gleichung (1.) angedeutete Grenzverfahren anwenden.

Aufgabe 3. $\int_{-a}^{+b} \frac{dx}{x} = ? \quad (a > 0, b > 0.)$

Auflösung. Da die Funktion unter dem Integralzeichen für $x = 0$ unendlich groß wird, so muß man das Integral wieder in zwei andere zerlegen. Man setzt also

$$\begin{aligned}
 (7.) \quad \int_{-a}^{+b} \frac{dx}{x} &= \lim_{\gamma=0} \int_{-a}^{-\gamma} \frac{dx}{x} + \lim_{\delta=0} \int_{+\delta}^{+b} \frac{dx}{x} \\
 &= \lim_{\gamma=0} \ln\left(\frac{\gamma}{a}\right) + \lim_{\delta=0} \ln\left(\frac{b}{\delta}\right) \\
 &= \ln\left(\frac{b}{a}\right) + \lim_{\delta=0} \ln\left(\frac{\gamma}{\delta}\right).
 \end{aligned}$$

In diesem Falle hängt der Wert des bestimmten Integrals von dem Grenzwert des Verhältnisses $\frac{\gamma}{\delta}$ ab. Da dieser Grenzwert, je nachdem man über γ und δ verfügt, unendlich viele Werte haben darf, so hat auch das Integral unendlich viele Werte. Für $\lim \frac{\gamma}{\delta} = 1$ wird

$$(8.) \quad \int_{-a}^{+b} \frac{dx}{x} = \ln\left(\frac{b}{a}\right) + \ln 1 = \ln\left(\frac{b}{a}\right).$$

Dieser Wert heißt nach *Cauchy* „der *Hauptwert*“ des vorliegenden bestimmten Integrals.

Aufgabe 4. $\int_a^b \frac{dx}{\sqrt[5]{(x-c)^4}} = ?$ wenn $a < c < b$.

Auflösung. Indem man wieder die Zerlegung des Integrals ausführt, findet man

$$\begin{aligned}
 (9.) \quad \int_a^b \frac{dx}{\sqrt[5]{(x-c)^4}} &= \int_a^b (x-c)^{-\frac{4}{5}} dx \\
 &= \lim_{\gamma=0} \int_a^{c-\gamma} (x-c)^{-\frac{4}{5}} dx + \lim_{\delta=0} \int_{c+\delta}^b (x-c)^{-\frac{4}{5}} dx \\
 &= 5 \lim_{\gamma=0} [\sqrt[5]{x-c}]_a^{c-\gamma} + 5 \lim_{\delta=0} [\sqrt[5]{x-c}]_{c+\delta}^b \\
 &= 5 \left[\lim_{\gamma=0} \sqrt[5]{c-\gamma} - \sqrt[5]{a-c} + \sqrt[5]{b-c} - \lim_{\delta=0} \sqrt[5]{\delta} \right] \\
 &= 5(\sqrt[5]{b-c} + \sqrt[5]{c-a}).
 \end{aligned}$$

§ 55.

Näherungsmethoden durch Einführung einfacherer Funktionen.

(Vergl. die Formel-Tabelle Nr. 171.)

In vielen Fällen, wo das *unbestimmte* Integral einer Differential-Funktion schwer zu ermitteln ist, kann man den Wert des *bestimmten* Integrals durch andere Hilfsmittel genau oder doch mit großer Annäherung berechnen.


Von diesen Hilfsmitteln sollen hier einige angeführt werden.

Aus der geometrischen Deutung eines bestimmten Integrals $\int_a^b f(x)dx$ als Flächeninhalt einer ebenen Figur, welche oben begrenzt ist durch die Kurve $y = f(x)$, rechts und links durch die Ordinaten $x = b$, bzw. $x = a$ und unten durch die X -Achse (vergl. Formel Nr. 4 der Tabelle), ergibt sich sofort der folgende

Satz 1. Sind $y_1 = \varphi(x)$ und $y = f(x)$ zwei Funktionen, welche zwischen den Grenzen $x = a$ und $x = b$ sich durch Kurven geometrisch darstellen lassen, und bleibt in diesem Intervalle $\varphi(x)$ beständig gleich oder kleiner als $f(x)$, so ist auch

$$(1.) \quad \int_a^b \varphi(x)dx < \int_a^b f(x)dx;$$

Fig. 109.



denn, wie man aus Fig. 109 ersieht, hat die von der Kurve $y = f(x)$ begrenzte Figur A_1B_1BA einen größeren Flächeninhalt als die von der anderen Kurve $y_1 = \varphi(x)$ begrenzte Figur A_1B_1DC . Dabei ist zunächst vorausgesetzt, daß die Kurven beide über

der X -Achse liegen; der Satz bleibt aber auch dann noch richtig, wenn diese Voraussetzung *nicht* erfüllt ist.

Man kann den Beweis auch unabhängig von der geometrischen Deutung des bestimmten Integrals führen, indem

man dasselbe als den Grenzwert einer Summe betrachtet, bei der die Anzahl der summierten Glieder immer größer und die einzelnen Glieder immer kleiner werden. Die Glieder der beiden Summen, die man miteinander vergleicht, gehen dadurch über in $\varphi(x)dx$ und $f(x)dx$. Aus

$$(2.) \quad \varphi(x)dx \leq f(x)dx$$

folgt dann auch die Ungleichheit der Summen, also

$$\int_a^b \varphi(x)dx < \int_a^b f(x)dx.$$

Satz 2. *Liegt die Funktion $f(x)$ für alle Werte von x innerhalb des Intervalles von a bis b der Größe nach beständig zwischen den Funktionen $\varphi(x)$ und $\psi(x)$, ist also*

$$(3.) \quad \varphi(x) \leq f(x) \leq \psi(x),$$

so ist auch

$$(4.) \quad \int_a^b \varphi(x)dx < \int_a^b f(x)dx < \int_a^b \psi(x)dx.$$

Dieser Satz ergibt sich unmittelbar aus Satz 1.

Übungs-Beispiele.

Aufgabe 1. $\int_0^{0,5} \frac{dx}{\sqrt{1-x^3}} = ?$

Auflösung. Da x zwischen den Grenzen 0 und 0,5 liegt, so gelten die folgenden Ungleichungen:

$$0 \leq x \leq 0,5,$$

$$0 \leq x^3 \leq 0,5x^2,$$

$$1 \geq 1 - x^3 \geq 1 - 0,5x^2,$$

$$1 \geq \sqrt{1-x^3} \geq \sqrt{1-0,5x^2},$$

$$1 \leq \frac{1}{\sqrt{1-x^3}} \leq \frac{1}{\sqrt{1-0,5x^2}},$$

folglich wird

$$(5.) \quad \int_0^{0,5} dx < \int_0^{0,5} \frac{dx}{\sqrt{1-x^3}} < \int_0^{0,5} \frac{dx}{\sqrt{1-0,5x^2}}.$$

Dabei ist nach Formel Nr. 34 der Tabelle, wenn man $a = \sqrt{2}$ setzt,

$$(6.) \int_0^{0,5} \frac{dx}{\sqrt{1-0,5x^2}} = \sqrt{2} \int_0^{0,5} \frac{dx}{\sqrt{2-x^2}} \\ = \sqrt{2} \left[\arcsin \left(\frac{x}{\sqrt{2}} \right) \right]_0^{0,5} = \sqrt{2} \arcsin \left(\frac{1}{2\sqrt{2}} \right).$$

Nach D.-R., 12. Auflage, Formel Nr. 112 der Tabelle wird ferner

$$(7.) \arcsin x = \frac{x}{1} + \frac{1}{2} \frac{x^3}{3} + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4} \frac{x^5}{5} + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6} \frac{x^7}{7} + \dots,$$

also

$$(8.) \sqrt{2} \arcsin \left(\frac{1}{2\sqrt{2}} \right) \\ = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \frac{1}{3 \cdot 2^4} + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4} \frac{1}{5 \cdot 2^7} + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6} \frac{1}{7 \cdot 2^{10}} + \dots \\ = 0,511\,050\,29,$$

folglich geht die Ungleichung (5.) über in

$$(9.) \quad 0,5 < \int_0^{0,5} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} < 0,511\,050\,29.$$

Aufgabe 2. $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1+x^3}} = ?$

Auflösung. Hier gelten die Ungleichungen

$$0 \leq x \leq 1,$$

$$0 \leq x^3 \leq x^2,$$

$$1 \leq 1+x^3 \leq 1+x^2,$$

$$1 \leq \sqrt{1+x^3} \leq \sqrt{1+x^2},$$

$$1 \leq \frac{1}{\sqrt{1+x^3}} \leq \frac{1}{\sqrt{1+x^2}},$$

folglich wird

$$(10.) \int_0^1 dx > \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1+x^3}} > \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1+x^2}} = \left[\ln \left(x + \sqrt{1+x^2} \right) \right]_0^1$$

oder, da

$$\sqrt{2} = 1,414\,214,$$

$$(11.) \quad 1 > \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1+x^3}} > \ln(1 + \sqrt{2}) > \ln(2,4) = \ln\left(\frac{12}{5}\right).$$

Dabei ist

$$\ln 12 = \ln 3 + \ln 4 = 2,484\,906\,65,$$

$$\ln 5 = 1,609\,437\,91,$$

$$\ln\left(\frac{12}{5}\right) = 0,875\,468\,74;$$

dies gibt

$$(12.) \quad 1 > \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1+x^3}} > 0,875\,468\,74.$$

Aufgabe 3. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\varphi}{\sqrt{1 - \sin^2\alpha \sin^2\varphi}} = ?$

Auflösung. Hier gelten die Ungleichungen

$$0 \leq \sin^2\varphi \leq 1,$$

$$0 \leq \sin^2\alpha \sin^2\varphi \leq \sin^2\alpha,$$

$$1 \geq 1 - \sin^2\alpha \sin^2\varphi \geq 1 - \sin^2\alpha = \cos^2\alpha,$$

$$1 \geq \sqrt{1 - \sin^2\alpha \sin^2\varphi} \geq \cos\alpha, \quad (\text{für } 0 < \alpha < \frac{\pi}{2})$$

$$1 \leq \frac{1}{\sqrt{1 - \sin^2\alpha \sin^2\varphi}} \leq \frac{1}{\cos\alpha},$$

folglich wird

$$(13.) \quad \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi < \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\varphi}{\sqrt{1 - \sin^2\alpha \sin^2\varphi}} < \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\varphi}{\cos\alpha},$$

oder

$$(14.) \quad \frac{\pi}{2} < \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\varphi}{\sqrt{1 - \sin^2\alpha \sin^2\varphi}} < \frac{\pi}{2\cos\alpha}.$$

Ist z. B. $\alpha = \frac{\pi}{6}$ oder 30° , so wird

$$\sin\alpha = \frac{1}{2}, \quad \cos\alpha = \frac{\sqrt{3}}{2},$$

also

$$(15.) \quad \frac{\pi}{2} < \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\varphi}{\sqrt{1 - \frac{1}{4} \sin^2 \varphi}} < \frac{\pi}{\sqrt{3}}.$$

Je kleiner der Winkel α ist, desto enger sind die Grenzen, zwischen denen das Integral liegt.

§ 56.

Mittelwertsätze.

(Vergl. die Formel-Tabelle Nr. 172 bis 175.)

Es sei jetzt

$$(1.) \quad f(x) = g(x) \cdot h(x),$$

wobei die stetige Funktion $h(x)$ in dem Intervalle von a bis b zunächst *beständig positiv* oder doch wenigstens *nicht negativ* sein möge; es sei also $h(x) \geq 0$. Ferner erreiche die in diesem Intervalle stetige Funktion $g(x)$ ihren *kleinsten* Wert K für $x = x_1$ und ihren *größten* Wert G für $x = x_2$, wobei x_1 und x_2 zwischen den Grenzen a und b liegen oder auch mit diesen Grenzen zusammenfallen sollen; es ist also

$$(2.) \quad g(x_1) = K \quad \text{und} \quad g(x_2) = G$$

und

$$(3.) \quad K \leq g(x) \leq G.$$

Da $h(x) \geq 0$ ist, wird

$$(4.) \quad K \cdot h(x) dx \leq g(x) \cdot h(x) dx = f(x) dx \leq G \cdot h(x) dx;$$

folglich ist nach Satz 2 in § 55

$$(5.) \quad K \int_a^b h(x) dx < \int_a^b g(x) \cdot h(x) dx < G \int_a^b h(x) dx.$$

Erklärt man also die Größe M durch die Gleichung

$$(6.) \quad \int_a^b f(x) dx = \int_a^b g(x) \cdot h(x) dx = M \int_a^b h(x) dx,$$

so folgt aus Ungleichung (5.)

$$(7.) \quad K < M < G,$$

oder

$$(7a.) \quad g(x_1) < M < g(x_2).$$

Nach einem bekannten Satze über stetige Funktionen muß es daher zwischen x_1 und x_2 einen Wert von x geben — er heiße ξ —, für welchen

$$(8.) \quad M = g(\xi)$$

wird. Da ξ zwischen x_1 und x_2 liegt, so muß ξ auch zwischen a und b liegen; es ist also

$$(9.) \quad a \leq \xi \leq b.$$

Erklärt man also eine Größe Θ durch die Gleichung

$$(10.) \quad \Theta = \frac{\xi - a}{b - a},$$

so wird

$$0 \leq \Theta \leq +1,$$

und man erhält

$$(11.) \quad \xi = a + \Theta(b - a), \quad M = g[a + \Theta(b - a)].$$

Deshalb geht Gleichung (6.) über in

$$(12.) \quad \int_a^b g(x) \cdot h(x) dx = g[a + \Theta(b - a)] \int_a^b h(x) dx.$$

Indem man beide Seiten dieser Gleichung mit -1 multipliziert, folgt

$$(12a.) \quad - \int_a^b g(x) \cdot h(x) dx = \int_a^b g(x) [-h(x)] dx \\ = g[a + \Theta(b - a)] \int_a^b [-h(x)] dx,$$

oder mit anderen Worten, die Gleichung (12.) bleibt auch dann noch richtig, wenn die stetige Funktion $h(x)$ in dem Intervalle von a bis b *niemals positiv* wird, wenn also $h(x) \leq 0$ ist. Es genügt also für die Gültigkeit des in Gleichung (12.) enthaltenen Satzes, welcher „*der erste Mittelwertsatz*“ der Integral-Rechnung genannt wird, die Voraussetzung, daß $h(x)$ zwischen den Grenzen a und b das Vorzeichen nicht wechselt.

Aus Gleichung (12.) folgen noch unmittelbar die Formeln

$$(13.) \quad \int_0^x g(x) \cdot h(x) dx = g(\Theta x) \int_0^x h(x) dx,$$

$$(14.) \quad \int_a^{a+c} g(x) \cdot h(x) dx = g(a + \Theta c) \int_a^{a+c} h(x) dx.$$

Setzt man

$$h(x) = 1, \quad \text{also} \quad \int_a^b h(x) dx = \int_a^b dx = b - a,$$

so geht Gleichung (12.) über in


$$(15.) \quad \int_a^b g(x) dx = (b - a)g[a + \Theta(b - a)],$$

oder, wenn man die Buchstaben g und f miteinander vertauscht, in

$$(15a.) \quad \int_a^b f(x) dx = (b - a)f[a + \Theta(b - a)].$$

Für diesen besonderen Fall des ersten Mittelwertsatzes ergibt sich unmittelbar die folgende geometrische Deutung. Der Gleichung $y = f(x)$ entspreche die Kurve AB , dann ist der Flächeninhalt der ebenen Figur

Fig. 110.



$$(16.) \quad A_1B_1BA = \int_a^b f(x) dx.$$

Da nun der Kurvenbogen AB stetig ist, so gibt es zwischen A und B *mindestens einen* Punkt P , welcher die Eigenschaft besitzt, daß die Gerade RS , welche durch P zur X -Achse parallel gezogen ist, ein Rechteck $A B_1SR$ bestimmt, welches mit A_1B_1BA gleichen Flächeninhalt besitzt. Macht man nämlich

$$OQ = a + \Theta(b - a),$$

so wird in diesem Rechteck

$$A_1B_1 = b - a, \quad QP = f[a + \Theta(b - a)],$$

also

$$(17.) \quad A_1B_1BA = \int_a^b f(x) dx = A_1B_1SR = (b - a)f[a + \Theta(b - a)].$$

Bezeichnet man das unbestimmte Integral von $g(x) \cdot h(x) dx$ mit $\varphi(x)$ und das von $h(x) dx$ mit $\psi(x)$, so wird

$$(18.) \quad g(x) \cdot h(x) = \varphi'(x), \quad h(x) = \psi'(x), \quad g(x) = \frac{\varphi'(x)}{\psi'(x)},$$

$$(19.) \quad \int_a^b g(x) \cdot h(x) dx = \varphi(b) - \varphi(a),$$

$$(20.) \quad \int_a^b h(x) dx = \psi(b) - \psi(a).$$

Durch Einsetzen dieser Werte in die Gleichung (12.) erhält man

$$(21.) \quad \varphi(b) - \varphi(a) = g[a + \Theta(b - a)] \cdot [\psi(b) - \psi(a)],$$

also

$$(22.) \quad \frac{\varphi(b) - \varphi(a)}{\psi(b) - \psi(a)} = \frac{\varphi'[a + \Theta(b - a)]}{\psi'[a + \Theta(b - a)]}.$$

Damit ist der Mittelwertsatz auf eine Form gebracht, die übereinstimmt mit dem zweiten Mittelwertsatz der Differential-Rechnung. Vertauscht man nämlich den Buchstaben ψ mit g , so erhält man genau wieder wie damals

$$(23.) \quad \frac{\varphi(b) - \varphi(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{\varphi'[a + \Theta(b - a)]}{g'[a + \Theta(b - a)]}.$$

(Vergl. D.-R., 12. Auflage, § 37 und Formel Nr. 87 der Tabelle.)

Ein zweiter Mittelwertsatz möge hergeleitet werden, wobei die Forderung, daß $h(x)$ in dem Intervall sein Zeichen nicht wechselt, aufgehoben wird. Dagegen möge bei $\int_a^b g(x) h(x) dx$ vorausgesetzt werden, daß die Funktionen $g(x)$ und $h(x)$ innerhalb der Grenzen a und b eindeutig, endlich und stetig seien, und daß $h'(x)$ in dem Intervall das Zeichen nicht wechsle. Ist $h'(x) \geq 0$, so nimmt $h(x)$ in dem Intervall niemals ab, und ist $h'(x) \leq 0$, so nimmt $h(x)$ in dem Intervall niemals zu, wenn x zunimmt. Man nennt die Funktion in dem Intervall „monoton“, wenn eine dieser beiden Voraussetzungen erfüllt ist. Bezeichnet man dann das unbestimmte Integral von $g(x) dx$ mit $G(x)$, setzt man also

$$(24.) \quad \int g(x) dx = G(x),$$

so kann dieser Fall durch partielle Integration auf den vorigen zurückgeführt werden. Indem man nämlich

$$u = h(x), \quad dv = g(x) dx, \quad \text{also} \quad du = h'(x) dx, \quad v = G(x)$$

setzt, findet man durch partielle Integration

$$(25.) \quad \int_a^b g(x) \cdot h(x) dx = [G(x) \cdot h(x)]_a^b - \int_a^b G(x) h'(x) dx.$$

Nach den vorangestellten Voraussetzungen darf man bei dem Integral auf der rechten Seite der Gleichung den ersten Mittelwertsatz anwenden und findet, wenn man $a + \Theta(b - a) = \xi$ setzt,

$$(26.) \quad \int_a^b G(x) \cdot h'(x) dx = G(\xi) \int_a^b h'(x) dx = G(\xi) [h(b) - h(a)].$$

Deshalb geht Gleichung (25.) über in

$$(27.) \quad \int_a^b g(x) \cdot h(x) dx = G(b) \cdot h(b) - G(a) \cdot h(a) - G(\xi) \cdot h(b) + G(\xi) \cdot h(a) \\ = h(a) [G(\xi) - G(a)] + h(b) [G(b) - G(\xi)],$$

oder, wenn man Gleichung (24.) beachtet,

$$(28.) \quad \int_a^b g(x) \cdot h(x) dx = h(a) \int_a^{\xi} g(x) dx + h(b) \int_{\xi}^b g(x) dx.$$

Vorausgesetzt ist dabei also, daß $h'(x)$ zwischen a und b das Vorzeichen nicht wechselt.

Der in dieser Formel enthaltene Satz wird der „*zweite Mittelwertsatz*“ der Integral-Rechnung genannt.

Ist z. B. $g(x) = 1$, so erhält man als einen besonders wichtigen Fall

$$(29.) \quad \int_a^b h(x) dx = (\xi - a)h(a) + (b - \xi)h(b).$$

§ 57.

Neuer Beweis des *Taylor*schen Lehrsatzes.

Aus den Sätzen, welche in den vorhergehenden Paragraphen hergeleitet worden sind, ergibt sich ein äußerst einfacher Beweis des *Taylor*schen Lehrsatzes.

Die Funktion $f(x)$ sei mit ihren $n + 1$ ersten Ableitungen stetig und endlich für alle Werte von x zwischen a und $a + h$, dann findet man durch partielle Integration, nämlich nach der Formel

$$(1.) \quad \int u dv = uv - \int v du,$$

durch Einsetzen der Grenzen

$$(1a.) \quad \int_{x_1}^{x_2} u dv = [uv]_{x_1}^{x_2} - \int_{x_1}^{x_2} v du.$$

Setzt man hierbei

$$u = f'(a + h - t), \quad dv = dt,$$

also

$$du = -f''(a + h - t)dt, \quad v = t,$$

so findet man aus Gleichung (1a.) für die Grenzen 0 und t

$$(2.) \quad \int_0^t f'(a + h - t)dt = t f'(a + h - t) + \int_0^t f''(a + h - t)t dt.$$

Für

$$u = f''(a + h - t), \quad dv = t dt$$

erhält man

$$du = -f'''(a + h - t)dt, \quad v = \frac{t^2}{2!},$$

$$(3.) \quad \int_0^t f''(a + h - t)t dt = \frac{t^2}{2!} f''(a + h - t) + \int_0^t f'''(a + h - t) \frac{t^2}{2!} dt.$$

Wenn man in dieser Weise fortfährt, findet man die Gleichungen

$$(4.) \quad \int_0^t f'''(a + h - t) \frac{t^2}{2!} dt = \frac{t^3}{3!} f'''(a + h - t) + \int_0^t f^{(4)}(a + h - t) \frac{t^3}{3!} dt,$$

.....

$$(5.) \quad \int_0^t f^{(n)}(a + h - t) \frac{t^{n-1}}{(n-1)!} dt = \frac{t^n}{n!} f^{(n)}(a + h - t) + \int_0^t f^{(n+1)}(a + h - t) \frac{t^n}{n!} dt.$$

Durch Addition der Gleichungen (2.) bis (5.) ergibt sich daher

$$(6.) \quad \int_0^t f'(a + h - t)dt = \frac{t}{1!} f'(a + h - t) + \frac{t^2}{2!} f''(a + h - t) + \frac{t^3}{3!} f'''(a + h - t) + \dots + \frac{t^n}{n!} f^{(n)}(a + h - t) + \int_0^t f^{(n+1)}(a + h - t) \frac{t^n}{n!} dt.$$

Beachtet man, daß

$$(7.) \quad \int_0^t f''(a+h-t)dt = -f(a+h-t) + f(a+h)$$

ist, so geht Gleichung (6.) für $t=h$ über in

$$(8.) \quad f(a+h) = f(a) + \frac{f'(a)}{1!}h + \frac{f''(a)}{2!}h^2 + \frac{f'''(a)}{3!}h^3 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}h^n + R,$$

wobei

$$(9.) \quad R = \int_0^h f^{(n+1)}(a+h-t) \frac{t^n}{n!} dt$$

ist. Nach dem ersten Mittelwertsatz der Integral-Rechnung (Formel Nr. 172a der Tabelle) ist daher, wenn man $1-\Theta$ mit Θ_1 bezeichnet,

$$(10.) \quad R = f^{(n+1)}(a+h-\Theta h) \int_0^h \frac{t^n}{n!} dt = \frac{f^{(n+1)}(a+\Theta_1 h)}{(n+1)!} h^{n+1}.$$

Aus $0 \leq \Theta \leq +1$ folgt hierbei, daß auch
 $0 \leq \Theta_1 \leq +1$.

Setzt man zum Schlusse noch $a=x$ und schreibt Θ statt Θ_1 , so erhält Gleichung (8.) die Form

$$(11.) \quad f(x+h) = f(x) + \frac{f'(x)}{1!}h + \frac{f''(x)}{2!}h^2 + \frac{f'''(x)}{3!}h^3 + \dots + \frac{f^{(n)}(x)}{n!}h^n + R,$$

wo

$$(12.) \quad R = \frac{f^{(n+1)}(x+\Theta h)}{(n+1)!} h^{n+1}$$

ist. Dieses Resultat stimmt genau mit D.-R., 12. Auflage, Formel Nr. 91 der Tabelle überein.

§ 58.

Gliedweise Integration unendlicher Reihen.

(Vergl. die Formel-Tabelle Nr. 176.)

Sind in der unendlichen Reihe

$$(1.) \quad f(x) = u_0 + u_1 + u_2 + u_3 + \dots$$

die einzelnen Glieder

$$(2.) \quad u_0 = f_0(x), \quad u_1 = f_1(x), \quad u_2 = f_2(x), \quad u_3 = f_3(x), \dots$$

stetige Funktionen von x , so war in § 57 der Differential-Rechnung (12. Auflage, Seite 281) der Begriff der *gleichmäßigen Konvergenz* folgendermaßen erklärt worden:

„Die Reihe

$$f_0(x) + f_1(x) + f_2(x) + \dots$$

heißt in dem Intervalle von a bis b *gleichmäßig konvergent*, wenn die Funktionen $f_0(x)$, $f_1(x)$, $f_2(x)$, ... in diesem Intervalle endlich und stetig sind, und wenn zu jeder beliebig kleinen Größe ε eine ganze Zahl m so bestimmt werden kann, daß für $n \geq m$ der absolute Betrag von $S_{n+p}(x) - S_n(x)^*$ und deshalb auch der absolute Betrag von $R_n(x)$ kleiner bleiben als ε , welchen Wert x auch in dem Intervalle von a bis b haben mag.“

Für die Summe $f(x)$ einer solchen gleichmäßig konvergenten Reihe gilt dann auch der Satz, daß sie selbst in dem Intervalle von a bis b eine stetige Funktion ist. (D.-R., 12. Auflage, S. 283.)

Dabei ist

$$(3.) \quad R_n(x) = f(x) - [f_0(x) + f_1(x) + f_2(x) + \dots + f_{n-1}(x)],$$

oder

$$(4.) \quad f(x) = f_0(x) + f_1(x) + f_2(x) + \dots + f_{n-1}(x) + R_n(x).$$

Daraus folgt

$$(5.) \quad \int_a^b f(x) dx = \int_a^b f_0(x) dx + \int_a^b f_1(x) dx + \int_a^b f_2(x) dx + \dots + \int_a^b f_{n-1}(x) dx + \int_a^b R_n(x) dx.$$

Da die Funktionen $f(x)$, $f_0(x)$, $f_1(x)$, $f_2(x)$, ... $f_{n-1}(x)$ in dem Intervalle von a bis b stetig sind, so ergibt sich aus Gleichung (3.), daß auch $R_n(x)$ für die betrachteten Werte von x eine stetige Funktion ist; deshalb kann man für die Berechnung von $\int_a^b R_n(x) dx$ den in Formel Nr. 173 der Tabelle ausgesprochenen Mittelwertsatz anwenden, nach welchem

$$(6.) \quad \int_a^b R_n(x) dx = (b - a) R_n[a + \Theta(b - a)]$$

*) $S_n(x)$ bezeichnet dabei die Summe der n ersten Glieder.

ist. Macht man die Voraussetzung, daß die vorgelegte Reihe in dem Intervalle von a bis b gleichmäßig konvergent ist, so wird $R_n(x)$ für alle Werte von x zwischen a und b beliebig klein, wenn n (gleich oder) größer als m ist, folglich wird auch $R_n[a + \Theta(b-a)]$, und da $b-a$ eine endliche Größe ist, auch $\int_a^b R_n(x)dx$ beliebig klein. Man findet

also $\int_a^b f(x)dx$, indem man die einzelnen Glieder der Reihe $u_0 = f_0(x)$, $u_1 = f_1(x)$, $u_2 = f_2(x)$, ... integriert, denn der Rest $\int_a^b R_n(x)dx$, welchen man bei Berücksichtigung von n Gliedern vernachlässigt, wird für hinreichend große Werte von n beliebig klein. Dadurch erhält man den folgenden

Satz. Sind die Funktionen $u_0, u_1, u_2, u_3, \dots$ für alle Werte von x zwischen a und b stetig, und ist die Reihe

$$u_0 + u_1 + u_2 + u_3 + \dots$$

in dem betrachteten Intervalle gleichmäßig konvergent und ihre Summe gleich $f(x)$, so ist auch die Reihe

$$\int_a^b u_0 dx + \int_a^b u_1 dx + \int_a^b u_2 dx + \dots$$

konvergent, und ihre Summe ist gleich $\int_a^b f(x)dx$.

Man darf noch die obere Grenze mit x bezeichnen, so daß sich ergibt

$$(7.) \quad \int_a^x f(x)dx = \int_a^x u_0 dx + \int_a^x u_1 dx + \int_a^x u_2 dx + \dots$$

Dabei ist die Reihe, durch welche $\int_a^x f(x)dx$ dargestellt wird, in demselben Intervalle gleichmäßig konvergent wie die ursprüngliche Reihe.

Dieser Satz hat schon in der Differential-Rechnung bei der Methode der unbestimmten Koeffizienten Anwendung gefunden (D.-R., 12. Auflage, § 48).

Damals setzte man

$$(8.) \quad f(x) = A + A_1 x + A_2 x^2 + A_3 x^3 + \dots + A_n x^n + R,$$

also

$$(9.) \quad f'(x) = A_1 + 2A_2 x + 3A_3 x^2 + \dots + nA_n x^{n-1} + \frac{dR}{dx}.$$

Wie die Gleichung (9.) aus Gleichung (8.) hervorgeht durch *Differentiation* der einzelnen Glieder, so findet man umgekehrt die Gleichung (8.) aus Gleichung (9.) durch *Integration* der einzelnen Glieder zwischen den Grenzen 0 und x , und zwar erhält man dadurch $f(x) - f(0)$, woraus sich für A der Wert $f(0)$ ergibt. Dabei erhielt man den Satz: Ist für hinreichend große Werte von n die Größe $\frac{dR}{dx}$ beliebig klein, so gilt dasselbe auch von R .

Man erkennt, daß dieser Satz nur ein besonderer Fall des eben bewiesenen Satzes ist; denn er ergibt sich aus dem allgemeinen Satze, wenn man die Glieder mit steigenden Potenzen von x an die Stelle der Funktionen u setzt.

Die Beispiele, welche bei der Methode der unbestimmten Koeffizienten in der Differential-Rechnung gegeben wurden, nämlich die Entwicklung von

$$(10.) \ln(1+x) = \frac{x}{1} - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots \text{ für } -1 < x \leq +1,$$

$$(11.) \operatorname{arctg} x = \frac{x}{1} - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots \text{ für } -1 \leq x \leq +1,$$

$$(12.) \arcsin x = \frac{x}{1} + \frac{1}{2} \frac{x^3}{3} + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4} \frac{x^5}{5} + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6} \frac{x^7}{7} + \dots$$

$$\text{für } -1 \leq x \leq +1$$

nach steigenden Potenzen von x , eignen sich daher auch als Beispiele für den vorliegenden Satz.

Aufgabe 1. Man soll die Länge des Bogens bei der *Lemniscate*

$$(13.) r^2 = a^2 \cos(2\varphi)$$

berechnen (Fig. 111).

Auflösung. Aus Gleichung


(13.) folgt

$$r dr = -a^2 \sin(2\varphi) d\varphi,$$

oder

$$(14.) \frac{d\varphi}{dr} = -\frac{r}{a^2 \sin(2\varphi)},$$

Fig. 111.



$$(15.) \left(\frac{ds}{dr}\right)^2 = 1 + r^2 \left(\frac{d\varphi}{dr}\right)^2 = 1 + \frac{r^4}{a^4 \sin^2(2\varphi)} = 1 + \frac{r^4}{a^4 - r^4} = \frac{a^4}{a^4 - r^4},$$

$$(16.) \quad ds = \frac{a^2 dr}{\sqrt{a^4 - r^4}}, \quad s = a^2 \int_0^r \frac{dr}{\sqrt{a^4 - r^4}}.$$

Setzt man

$$r = at, \quad \text{also} \quad dr = a dt,$$

so wird

$$(17.) \quad s = a \int_0^t \frac{dt}{\sqrt{1 - t^4}}.$$

Da $t^4 \leq 1$ ist, so wird nach dem binomischen Lehrsatz

$$(18.) \quad \frac{1}{\sqrt{1 - t^4}} = (1 - t^4)^{-\frac{1}{2}} = 1 + \frac{1}{2} t^4 + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4} t^8 + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6} t^{12} + \dots,$$

also

$$(19.) \quad s = a \left(\frac{t}{1} + \frac{1}{2} \frac{t^5}{5} + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4} \frac{t^9}{9} + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6} \frac{t^{13}}{13} + \dots \right) \\ = a \left(\frac{r}{a} + \frac{1}{2} \frac{r^5}{5a^5} + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4} \frac{r^9}{9a^9} + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6} \frac{r^{13}}{13a^{13}} + \dots \right).$$

Aufgabe 2. $\int_{0,5}^4 \frac{dx}{\sqrt{1 + x^3}} = ?$

Auflösung. Nach dem binomischen Lehrsatz ist

$$(20.) \quad \frac{1}{\sqrt{1 + x^3}} = (1 + x^3)^{-\frac{1}{2}} = 1 - \frac{1}{2} x^3 + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4} x^6 - \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6} x^9 + \dots,$$

solange $-1 < x < +1$ ist. Deshalb kann man diese Entwicklung nur benutzen, um

$$\int_{0,5}^1 \frac{dx}{\sqrt{1 + x^3}} = \lim_{\gamma \rightarrow 0} \int_{0,5}^{1-\gamma} \frac{dx}{\sqrt{1 + x^3}}$$

zu berechnen; dabei findet man aus Gleichung (20.)

$$(21.) \quad \int_{0,5}^1 \frac{dx}{\sqrt{1 + x^3}} =$$

$$\lim_{\gamma \rightarrow 0} \left[\frac{x}{1} - \frac{1}{2} \frac{x^4}{4} + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4} \frac{x^7}{7} - \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6} \frac{x^{10}}{10} + \dots \right]_{0,5}^{1-\gamma}.$$

Da die Reihe in der eckigen Klammer auch noch für $x = 1$ konvergent bleibt, so erhält man

$$(22.) \int_{0,5}^1 \frac{dx}{\sqrt{1+x^3}} = 1 - \frac{1}{2 \cdot 4} + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4 \cdot 7} - \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 10} + \dots$$

$$- \frac{1}{2} + \frac{1}{2 \cdot 4 \cdot 2^4} - \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4 \cdot 7 \cdot 2^7} + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 10 \cdot 2^{10}} - \dots$$

$$= \frac{1}{2} - \frac{1}{2 \cdot 4} \cdot \frac{15}{16} + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4 \cdot 7} \cdot \frac{127}{128} - \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 10} \cdot \frac{1023}{1024} + \dots$$

Die Entwicklung in Gleichung (20.) gilt nicht mehr, wenn $x > 1$ ist. Nach dem binomischen Lehrsatz wird aber, wenn $|b| > |a|$ ist,

$$(23.) (a+b)^m = b^m + \binom{m}{1} ab^{m-1} + \binom{m}{2} a^2 b^{m-2} + \binom{m}{3} a^3 b^{m-3} + \dots$$

Setzt man also in dem Falle, wo $x > 1$ ist,

$$(24.) \quad a = 1, \quad b = x^3,$$

so wird die Bedingung, daß $|b| > |a|$ sein soll, erfüllt, und man erhält

$$(25.) (1+x^3)^m = x^{3m} + \binom{m}{1} x^{3m-3} + \binom{m}{2} x^{3m-6} + \binom{m}{3} x^{3m-9} + \dots,$$

also für $m = -\frac{1}{2}$

$$(26.) \frac{1}{\sqrt{1+x^3}} = \frac{1}{\sqrt{x^3}} - \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{x^9}} + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4} \frac{1}{\sqrt{x^{15}}} - \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6} \frac{1}{\sqrt{x^{21}}} + \dots$$

Diese Reihe konvergiert gleichmäßig für $x > 1$, folglich ergibt die gliedweise Integration

$$(27.) \int_1^4 \frac{dx}{\sqrt{1+x^3}} = \lim_{\delta \rightarrow 0} \left[\int_{1+\delta}^4 \frac{dx}{\sqrt{x^3}} - \frac{1}{2} \int_{1+\delta}^4 \frac{dx}{\sqrt{x^9}} + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4} \int_{1+\delta}^4 \frac{dx}{\sqrt{x^{15}}} \right.$$

$$\left. - \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6} \int_{1+\delta}^4 \frac{dx}{\sqrt{x^{21}}} + \dots \right],$$

oder

$$(28.) \int_1^4 \frac{dx}{\sqrt{1+x^3}} = \lim_{\delta \rightarrow 0} \left[-\frac{2}{\sqrt{x}} + \frac{1}{2} \frac{2}{7\sqrt{x^7}} - \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4} \frac{2}{13\sqrt{x^{13}}} \right.$$

$$\left. + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6} \frac{2}{19\sqrt{x^{19}}} - \dots \right]_{1+\delta}^4.$$

Da die Reihe in der eckigen Klammer auch noch für $x = 1$ konvergent bleibt, so erhält man

$$\begin{aligned}
 (29.) \quad \int_1^4 \frac{dx}{\sqrt{1+x^3}} &= - \left(1 - \frac{1}{2} \frac{1}{7 \cdot 4^3} + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4} \frac{1}{13 \cdot 4^6} \right. \\
 &\quad \left. - \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6} \frac{1}{19 \cdot 4^9} + \dots \right) \\
 &\quad + 2 \left(1 - \frac{1}{2 \cdot 7} + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4 \cdot 13} - \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 19} + \dots \right) \\
 &= 2 \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2 \cdot 7} \frac{2^7 - 1}{2^7} + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4 \cdot 13} \frac{2^{13} - 1}{2^{13}} \right. \\
 &\quad \left. - \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 19} \frac{2^{19} - 1}{2^{19}} + \dots \right).
 \end{aligned}$$

Durch Addition der Gleichungen (22.) und (29.) erhält man schließlich das gesuchte Integral

$$(30.) \quad \int_{0,5}^4 \frac{dx}{\sqrt{1+x^3}} = \int_{0,5}^1 \frac{dx}{\sqrt{1+x^3}} + \int_1^4 \frac{dx}{\sqrt{1+x^3}}.$$

§ 59.

Berechnung der elliptischen Normalintegrale erster und zweiter Gattung.

(Vergl. die Formel-Tabelle Nr. 177 bis 180.)

Das in dem vorhergehenden Paragraphen angegebene Verfahren kann man auch zur Berechnung der *elliptischen Normalintegrale erster und zweiter Gattung* benutzen. Das elliptische Normalintegral *erster Gattung*, auf welches sehr viele Aufgaben der Geometrie, Physik und Mechanik führen, hat die Form

$$\int_0^x \frac{dx}{\sqrt{(1-x^2)(1-k^2x^2)}},$$

wobei $k^2 < 1$ und $x \leq 1$ sein mögen. Dann erhält man zunächst nach dem binomischen Lehrsatz

$$(1.) \quad \frac{1}{\sqrt{1-k^2x^2}} = 1 + \frac{1}{2} k^2 x^2 + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4} k^4 x^4 + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6} k^6 x^6 + \dots,$$

oder, wenn man der Kürze wegen, wie in Formel Nr. 121 der Tabelle,

$$(2.) \quad c_1 = \frac{1}{2}, \quad c_2 = \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4}, \quad \dots c_n = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \dots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \dots (2n)}$$

setzt,

$$(3.) \quad \frac{1}{\sqrt{1-k^2x^2}} = 1 + c_1 k^2 x^2 + c_2 k^4 x^4 + c_3 k^6 x^6 + \dots$$

Nach Satz 8 in § 58 der Differential-Rechnung (12. Auflage, S. 291) ist diese Potenzreihe *gleichmäßig konvergent* für $-1 \leq x \leq +1$, folglich ist auch die Reihe

$$(4.) \quad \frac{1}{\sqrt{(1-x^2)(1-k^2x^2)}} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} + c_1 k^2 \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} + c_2 k^4 \frac{x^4}{\sqrt{1-x^2}} + c_3 k^6 \frac{x^6}{\sqrt{1-x^2}} + \dots$$

in demselben Intervalle gleichmäßig konvergent. Deshalb wird

$$(5.) \quad \int_0^x \frac{dx}{\sqrt{(1-x^2)(1-k^2x^2)}} = \int_0^x \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} + c_1 k^2 \int_0^x \frac{x^2 dx}{\sqrt{1-x^2}} + c_2 k^4 \int_0^x \frac{x^4 dx}{\sqrt{1-x^2}} + c_3 k^6 \int_0^x \frac{x^6 dx}{\sqrt{1-x^2}} + \dots$$

$$= \int_0^x \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} + \sum_{n=1}^{\infty} c_n k^{2n} \int_0^x \frac{x^{2n} dx}{\sqrt{1-x^2}}.$$

Nun ist aber nach Formel Nr. 121 der Tabelle

$$(6.) \quad \int_0^x \frac{x^{2n} dx}{\sqrt{1-x^2}} = c_n \arcsin x - G_n(x) \cdot \sqrt{1-x^2}$$

wobei

$$G_1(x) = \frac{x}{2} = c_1 x,$$

$$G_2(x) = \frac{x^3}{4} + \frac{3 \cdot x}{4 \cdot 2} = c_2 \left(\frac{1}{c_1} \frac{x^3}{3} + \frac{x}{1} \right),$$

$$G_3(x) = \frac{x^5}{6} + \frac{5 \cdot x^3}{6 \cdot 4} + \frac{5 \cdot 3 \cdot x}{6 \cdot 4 \cdot 2} = c_3 \left(\frac{1}{c_2} \frac{x^5}{5} + \frac{1}{c_1} \frac{x^3}{3} + \frac{x}{1} \right),$$

.....
allgemein

$$(7.) \quad G_n(x) = \frac{x^{2n-1}}{2n} + \frac{(2n-1)x^{2n-3}}{(2n)(2n-2)} + \dots + \frac{(2n-1)(2n-3)\dots 3 \cdot x}{(2n)(2n-2)\dots 4 \cdot 2}$$

$$= c_n \left(\frac{1}{c_{n-1}} \frac{x^{2n-1}}{2n-1} + \frac{1}{c_{n-2}} \frac{x^{2n-3}}{2n-3} + \dots + \frac{1}{c_1} \frac{x^3}{3} + \frac{x}{1} \right).$$

Deshalb erhält man

$$(8.) \quad \int_0^x \frac{dx}{V(1-x^2)(1-k^2x^2)} = \left(1 + \sum_{n=1}^{\infty} c_n^2 k^{2n} \right) \arcsin x$$

$$- \sqrt{1-x^2} \sum_{n=1}^{\infty} c_n k^{2n} G_n(x).$$

Von besonderem Interesse ist der Wert dieses Integrals, den man für $x=1$ erhält und mit K bezeichnet. Es wird nämlich

$$(9.) \quad K = \int_0^1 \frac{dx}{V(1-x^2)(1-k^2x^2)} = \lim_{\beta \rightarrow 0} \int_0^{1-\beta} \frac{dx}{V(1-x^2)(1-k^2x^2)}$$

$$= \frac{\pi}{2} \left(1 + \sum_{n=1}^{\infty} c_n^2 k^{2n} \right),$$

oder

$$(10.) \quad K = \frac{\pi}{2} \left[1 + \left(\frac{1}{2} \right)^2 k^2 + \left(\frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4} \right)^2 k^4 + \left(\frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6} \right)^2 k^6 + \dots \right].$$

Noch häufiger wird man durch Aufgaben aus der Geometrie, Physik und Mechanik auf elliptische Integrale zweiter Gattung geführt, die man auf die Normalform

$$\int_0^x \frac{\sqrt{1-k^2x^2}}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

bringen kann. Hier wird nach dem binomischen Lehrsatz

$$(11.) \quad \sqrt{1-k^2x^2} = 1 - \frac{1}{2} k^2 x^2 - \frac{1}{2 \cdot 4} k^4 x^4 - \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4 \cdot 6} k^6 x^6 - \dots$$

$$= 1 - c_1 \frac{k^2 x^2}{1} - c_2 \frac{k^4 x^4}{3} - c_3 \frac{k^6 x^6}{5} - \dots,$$

oder

$$(12.) \quad \sqrt{1-k^2x^2} = 1 - \sum_{n=1}^{\infty} c_n \frac{k^{2n} x^{2n}}{2n-1},$$

also

$$(13.) \quad \frac{\sqrt{1-k^2x^2}}{\sqrt{1-x^2}} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{c_n k^{2n}}{2n-1} \frac{x^{2n}}{\sqrt{1-x^2}}.$$

Da diese Reihe zwischen den Grenzen 0 und x *gleichmäßig konvergent* ist, so erhält man

$$(14.) \quad \int_0^x \frac{\sqrt{1-k^2x^2}}{\sqrt{1-x^2}} dx = \int_0^x \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{c_n k^{2n}}{2n-1} \int_0^x \frac{x^{2n} dx}{\sqrt{1-x^2}},$$

also nach Formel Nr. 121 der Tabelle, nämlich nach Gleichung (6.),

$$(15.) \quad \int_0^x \frac{\sqrt{1-k^2x^2}}{\sqrt{1-x^2}} dx = \left(1 - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{c_n^2 k^{2n}}{2n-1}\right) \arcsin x \\ + \sqrt{1-x^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{c_n k^{2n}}{2n-1} G_n(x).$$

Für $x = 1$ ergibt sich hieraus der Wert des Integrals, den man mit E bezeichnet, nämlich

$$(15a.) \quad E = \int_0^1 \frac{\sqrt{1-k^2x^2}}{\sqrt{1-x^2}} dx = \frac{\pi}{2} \left(1 - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{c_n^2 k^{2n}}{2n-1}\right) \\ = \frac{\pi}{2} \left(1 - c_1^2 k^2 - \frac{1}{3} c_2^2 k^4 - \frac{1}{5} c_3^2 k^6 - \dots\right).$$

Auf ein solches Integral wird man z. B. bei der Rektifikation der Ellipse

$$(16.) \quad b^2 x^2 + a^2 y^2 - a^2 b^2 = 0$$

geführt (vgl. Aufgabe 2 in § 27). Aus Gleichung (16.) folgt nämlich

$$(17.) \quad \frac{dy}{dx} = -\frac{bx}{a\sqrt{a^2-x^2}}, \quad \left(\frac{ds}{dx}\right)^2 = \frac{a^4 - e^2 x^2}{a^2(a^2 - x^2)},$$

also

$$(18.) \quad s = \frac{1}{a} \int_0^x \frac{dx \sqrt{a^4 - e^2 x^2}}{\sqrt{a^2 - x^2}}.$$

Setzt man jetzt

$$(19.) \quad x = at, \quad e = ak,$$

so wird

$$(20.) \quad s = a \int_0^t \frac{dt \sqrt{1 - k^2 t^2}}{\sqrt{1 - t^2}},$$

wobei die Bedingungen

$$(21.) \quad t \leq 1 \quad \text{und} \quad k < 1$$

wirklich erfüllt sind. Der Bogen s wird also, vom Faktor a abgesehen, dem in Gleichung (15.) berechneten elliptischen Normalintegral zweiter Gattung gleich, nur muß man die Integrations-Veränderliche x mit $t = \frac{x}{a}$ vertauschen.

§ 60.

Berechnung der elliptischen Normalintegrale erster und zweiter Gattung durch trigonometrische Reihen.

(Vergl. die Formel-Tabelle Nr. 181 bis 184.)

Die in den Gleichungen (8.), (10.), (15.) und (15a.) des vorhergehenden Paragraphen angegebenen Reihen konvergieren nur langsam. Für die numerische Berechnung sind daher die folgenden Entwicklungen, die stärker konvergierende Reihenentwicklungen liefern, geeigneter. Setzt man

$$(1.) \quad x = \sin \varphi; \quad k = \sin \alpha,$$

also

$$(2.) \quad dx = \cos \varphi d\varphi, \quad \sqrt{1 - x^2} = \cos \varphi, \quad \frac{dx}{\sqrt{1 - x^2}} = d\varphi,$$

so wird

$$(3.) \quad \int_0^x \frac{dx}{\sqrt{(1 - x^2)(1 - k^2 x^2)}} = \int_0^\varphi \frac{d\varphi}{\sqrt{1 - \sin^2 \alpha \sin^2 \varphi}} = F(k, \varphi)$$

und

$$(4.) \quad \int_0^x \frac{\sqrt{1 - k^2 x^2}}{\sqrt{1 - x^2}} dx = \int_0^\varphi \sqrt{1 - \sin^2 \alpha \sin^2 \varphi} \cdot d\varphi = E(k, \varphi).$$

Um die Differentialfunktion zu entwickeln, formt man zunächst den Radikanden etwas um. Aus der bekannten Formel

$$\cos^2 \beta + \sin^2 \beta = 1$$

ergibt sich

$$\cos^4\beta + 2\cos^2\beta\sin^2\beta + \sin^4\beta = 1,$$

oder

$$(5.) \quad \cos^4\beta + \sin^4\beta = 1 - 2\sin^2\beta\cos^2\beta = 1 - \frac{\sin^2(2\beta)}{2}.$$

Daraus folgt

$$\begin{aligned} & (\cos^2\beta + \sin^2\beta \cdot e^{2\varphi i})(\cos^2\beta + \sin^2\beta \cdot e^{-2\varphi i}) \\ &= \cos^4\beta + \sin^4\beta + \cos^2\beta\sin^2\beta(e^{2\varphi i} + e^{-2\varphi i}) \\ &= 1 + \frac{1}{2}\sin(2\beta)(e^{2\varphi i} - 2 + e^{-2\varphi i}) = 1 - \sin^2(2\beta)\sin^2\varphi, \end{aligned}$$

oder

$$(6.) \quad 1 - \sin^2(2\beta)\sin^2\varphi = \cos^4\beta(1 + \operatorname{tg}^2\beta \cdot e^{2\varphi i})(1 + \operatorname{tg}^2\beta \cdot e^{-2\varphi i}),$$

oder, wenn man $2\beta = \alpha$, also $\beta = \frac{\alpha}{2}$ setzt,

$$(7.) \quad 1 - \sin^2\alpha\sin^2\varphi =$$

$$\cos^4\left(\frac{\alpha}{2}\right)\left[1 + \operatorname{tg}^2\left(\frac{\alpha}{2}\right) \cdot e^{2\varphi i}\right] \cdot \left[1 + \operatorname{tg}^2\left(\frac{\alpha}{2}\right) \cdot e^{-2\varphi i}\right].$$

Wenn α zwischen 0 und $\frac{\pi}{2}$ liegt, so ist $\operatorname{tg}^2\left(\frac{\alpha}{2}\right) < 1$; außerdem ist der absolute Betrag von

$$e^{\pm 2\varphi i} = \cos(2\varphi) \pm i\sin(2\varphi)$$

$\sqrt{\cos^2(2\varphi) + \sin^2(2\varphi)} = 1$, folglich kann man

$$\left[1 + \operatorname{tg}^2\left(\frac{\alpha}{2}\right) \cdot e^{+2\varphi i}\right]^m \text{ und } \left[1 + \operatorname{tg}^2\left(\frac{\alpha}{2}\right) \cdot e^{-2\varphi i}\right]^m$$

nach dem binomischen Lehrsatz entwickeln und erhält, wenn man der Kürze wegen $\operatorname{tg}\left(\frac{\alpha}{2}\right)$ mit ε bezeichnet,

$$(1 + \varepsilon^2 e^{2\varphi i})^m = 1 + \binom{m}{1}\varepsilon^2 e^{2\varphi i} + \binom{m}{2}\varepsilon^4 e^{4\varphi i} + \binom{m}{3}\varepsilon^6 e^{6\varphi i} + \dots,$$

$$(1 + \varepsilon^2 e^{-2\varphi i})^m = 1 + \binom{m}{1}\varepsilon^2 e^{-2\varphi i} + \binom{m}{2}\varepsilon^4 e^{-4\varphi i} + \binom{m}{3}\varepsilon^6 e^{-6\varphi i} + \dots$$

Indem man diese beiden Gleichungen miteinander multipliziert und dabei die Regeln anwendet, welche (in D.-R., 12. Auflage, § 56 und 107, vergl. auch D.-R., 12. Auflage, Formel Nr. 119 der Tabelle) für die Multiplikation zweier unbedingt konvergenten Reihen

$u_0 + u_1 + u_2 + \dots$ und $v_0 + v_1 + v_2 + \dots$
gegeben worden sind, so erhält man, weil

$$e^{\lambda \varphi i} + e^{-\lambda \varphi i} = 2 \cos(\lambda \varphi)$$

ist, die Gleichung

$$\begin{aligned} (8.) \quad & (1 + \varepsilon^2 e^{2\varphi i})^m (1 + \varepsilon^2 e^{-2\varphi i})^m = \\ & 1 + \binom{m}{1} \varepsilon^2 \cdot 2 \cos(2\varphi) + \varepsilon^4 \left[\binom{m}{2} 2 \cos(4\varphi) + \binom{m}{1}^2 \right] \\ & + \varepsilon^6 \left[\binom{m}{3} 2 \cos(6\varphi) + \binom{m}{1} \binom{m}{2} 2 \cos(2\varphi) \right] \\ & + \varepsilon^8 \left[\binom{m}{4} 2 \cos(8\varphi) + \binom{m}{1} \binom{m}{3} 2 \cos(4\varphi) + \binom{m}{2}^2 \right] \\ & + \varepsilon^{10} \left[\binom{m}{5} 2 \cos(10\varphi) + \binom{m}{1} \binom{m}{4} 2 \cos(6\varphi) + \binom{m}{2} \binom{m}{3} 2 \cos(2\varphi) \right] \\ & + \dots, \end{aligned}$$

oder, wenn man die Glieder vereinigt, welche mit $\cos(2\lambda\varphi)$ multipliziert sind, und Gleichung (7.) beachtet,

$$(9.) \quad (1 - \sin^2 \alpha \sin^2 \varphi)^m = A_0 + 2A_1 \cos(2\varphi) + 2A_2 \cos(4\varphi) + 2A_3 \cos(6\varphi) + \dots$$

Dabei wird, wenn man $\binom{m}{0} = 1$ setzt,

$$\begin{aligned} (10.) \quad A_0 &= \cos^{4m} \left(\frac{\alpha}{2} \right) \left[1 + \binom{m}{1}^2 \varepsilon^4 + \binom{m}{2}^2 \varepsilon^8 + \binom{m}{3}^2 \varepsilon^{12} + \dots \right] \\ &= \cos^{4m} \left(\frac{\alpha}{2} \right) \sum_{n=0}^{\infty} \binom{m}{n}^2 \varepsilon^{4n}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (11.) \quad A_1 &= \cos^{4m} \left(\frac{\alpha}{2} \right) \left[\binom{m}{1} \varepsilon^2 + \binom{m}{1} \binom{m}{2} \varepsilon^6 + \binom{m}{2} \binom{m}{3} \varepsilon^{10} + \dots \right] \\ &= \cos^{4m} \left(\frac{\alpha}{2} \right) \sum_{n=0}^{\infty} \binom{m}{n} \binom{m}{n+1} \varepsilon^{2+4n}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (12.) \quad A_2 &= \cos^{4m} \left(\frac{\alpha}{2} \right) \left[\binom{m}{2} \varepsilon^4 + \binom{m}{1} \binom{m}{3} \varepsilon^8 + \binom{m}{2} \binom{m}{4} \varepsilon^{12} + \dots \right] \\ &= \cos^{4m} \left(\frac{\alpha}{2} \right) \sum_{n=0}^{\infty} \binom{m}{n} \binom{m}{n+2} \varepsilon^{4+4n}, \end{aligned}$$

allgemein

$$\begin{aligned}
 (13.) \quad A_r &= \cos^{4m} \left(\frac{\alpha}{2} \right) \left[\binom{m}{v} \varepsilon^{2v} + \binom{m}{1} \binom{m}{v+1} \varepsilon^{2v+4} \right. \\
 &\quad \left. + \binom{m}{2} \binom{m}{v+2} \varepsilon^{2v+8} + \dots \right] \\
 &= \cos^{4m} \left(\frac{\alpha}{2} \right) \sum_{n=0}^{\infty} \binom{m}{n} \binom{m}{v+n} \varepsilon^{2v+4n}.
 \end{aligned}$$

Wenn $\varepsilon = \operatorname{tg} \left(\frac{\alpha}{2} \right)$ hinreichend klein ist, so sind die Größen A , wie sich zeigen läßt, durch stark konvergente Reihen ausgedrückt.

Die durch Gleichung (9.) dargestellte Reihe ist *gleichmäßig konvergent**, so daß man $\int_0^{\varphi} (1 - \sin^2 \alpha \sin^2 \varphi)^m d\varphi$ erhält, indem man die einzelnen Glieder der Reihe integriert. Dies gibt

$$\begin{aligned}
 (14.) \quad \int_0^{\varphi} (1 - \sin^2 \alpha \sin^2 \varphi)^m d\varphi = \\
 A_0 \varphi + \frac{A_1}{1} \sin(2\varphi) + \frac{A_2}{2} \sin(4\varphi) + \frac{A_3}{3} \sin(6\varphi) + \dots
 \end{aligned}$$

In dieser Formel sind auch die „*elliptischen Normalintegrale erster und zweiter Gattung*“, nämlich die Integrale

$$\int_0^x \frac{dx}{\sqrt{(1-x^2)(1-k^2x^2)}} = \int_0^{\varphi} \frac{d\varphi}{\sqrt{1 - \sin^2 \alpha \sin^2 \varphi}} = F(k, \varphi)$$

und

$$\int_0^x \frac{\sqrt{1-k^2x^2}}{\sqrt{1-x^2}} dx = \int_0^{\varphi} \sqrt{1 - \sin^2 \alpha \sin^2 \varphi} d\varphi = E(k, \varphi)$$

als besondere Fälle enthalten.

Zur Entwicklung des elliptischen Normalintegrals *erster Gattung* $F(k, \varphi)$ hat man in den Gleichungen (8.) bis (14.) $m = -\frac{1}{2}$ zu setzen und erhält

*) Der Beweis für die gleichmäßige Konvergenz möge hier übergangen werden.

$$(15.) \quad \binom{m}{1} = -\frac{1}{2} = -c_1, \quad \binom{m}{2} = +\frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4} = +c_2, \dots$$

$$\binom{m}{n} = \pm \frac{1 \cdot 3 \dots (2n-1)}{2 \cdot 4 \dots (2n)} = \pm c_n.$$

Setzt man in diesem Falle

$$A_0 = a_0, \quad A_1 = -a_1, \quad A_2 = +a_2, \quad \dots \quad A_n = (-1)^n a_n,$$

so geht Gleichung (14.) über in

$$(16.) \quad F(k, \varphi) = \int_0^\varphi \frac{d\varphi}{\sqrt{1 - \sin^2 \alpha \sin^2 \varphi}}$$

$$= a_0 \varphi - \frac{a_1}{1} \sin(2\varphi) + \frac{a_2}{2} \sin(4\varphi) - \frac{a_3}{3} \sin(6\varphi) + \dots,$$

wobei nach Gleichung (10.) bis (13.), wenn man $c_0 = 1$ setzt,

$$(17.) \quad a_0 = \frac{1}{\cos^2\left(\frac{\alpha}{2}\right)} (1 + c_1^2 \varepsilon^4 + c_2^2 \varepsilon^8 + c_3^2 \varepsilon^{12} + \dots)$$

$$= (1 + \varepsilon^2) \sum_{n=0}^{n=\infty} c_n^2 \varepsilon^{4n},$$

$$(18.) \quad a_1 = \frac{1}{\cos^2\left(\frac{\alpha}{2}\right)} (c_1 \varepsilon^2 + c_1 c_2 \varepsilon^6 + c_2 c_3 \varepsilon^{10} + \dots)$$

$$= (1 + \varepsilon^2) \sum_{n=0}^{n=\infty} c_n c_{n+1} \varepsilon^{2+4n},$$

$$(19.) \quad a_2 = \frac{1}{\cos^2\left(\frac{\alpha}{2}\right)} (c_2 \varepsilon^4 + c_1 c_3 \varepsilon^8 + c_2 c_4 \varepsilon^{12} + \dots)$$

$$= (1 + \varepsilon^2) \sum_{n=0}^{n=\infty} c_n c_{n+2} \varepsilon^{4+4n},$$

.....

Allgemein ist

$$(20.) \quad a_v = (1 + \varepsilon^2) \sum_{n=0}^{n=\infty} c_n c_{n+v} \varepsilon^{2v+4n}.$$

Man braucht aber nur a_0 und a_1 durch diese Reihen zu berechnen, denn unter der Voraussetzung, daß man die durch Reihenentwicklung dargestellten Funktionen differenzieren darf, indem man die einzelnen Glieder der Reihe differenziert, folgt aus der Gleichung

$$(21.) \frac{1}{\sqrt{1 - \sin^2 \alpha \sin^2 \varphi}} = a_0 - 2a_1 \cos(2\varphi) + 2a_2 \cos(4\varphi) - 2a_3 \cos(6\varphi) + \dots$$

durch Differentiation

$$(22.) \frac{\sin^2 \alpha \sin \varphi \cos \varphi}{\sqrt{(1 - \sin^2 \alpha \sin^2 \varphi)^3}} = 4a_1 \sin(2\varphi) - 8a_2 \sin(4\varphi) + 12a_3 \sin(6\varphi) - + \dots$$

Wenn man beide Seiten dieser Gleichung mit

$$(23.) \frac{2(1 - \sin^2 \alpha \sin^2 \varphi)}{\sin^2 \alpha} = \frac{2 - \sin^2 \alpha + \sin^2 \alpha \cos(2\varphi)}{\sin^2 \alpha} \\ = \frac{2 - \sin^2 \alpha}{\sin^2 \alpha} + \cos(2\varphi)$$

multipliziert und der Kürze wegen

$$(24.) \frac{2 - \sin^2 \alpha}{\sin^2 \alpha} = \frac{1 + \epsilon^4}{2\epsilon^2} = \zeta$$

setzt, so erhält man, weil $2\sin(2\lambda\varphi)\cos(2\varphi)$ bekanntlich gleich $\sin(2\lambda + 2)\varphi + \sin(2\lambda - 2)\varphi$ ist,

$$(25.) \frac{\sin(2\varphi)}{\sqrt{1 - \sin^2 \alpha \sin^2 \varphi}} = -(-4a_1\zeta + 4a_2)\sin(2\varphi) \\ + (2a_1 - 8a_2\zeta + 6a_3)\sin(4\varphi) \\ - (4a_2 - 12a_3\zeta + 8a_4)\sin(6\varphi) \\ + (6a_3 - 16a_4\zeta + 10a_5)\sin(8\varphi) \\ - + \dots$$

Andererseits ergibt sich, indem man beide Seiten der Gleichung (21.) mit $\sin(2\varphi)$ multipliziert und die bekannte Formel

$$2\sin(2\varphi)\cos(2\lambda\varphi) = \sin(2\lambda + 2)\varphi - \sin(2\lambda - 2)\varphi$$

anwendet,

$$(26.) \frac{\sin(2\varphi)}{\sqrt{1 - \sin^2 \alpha \sin^2 \varphi}} = -(a_2 - a_0)\sin(2\varphi) + (a_3 - a_1)\sin(4\varphi) \\ - (a_4 - a_2)\sin(6\varphi) + (a_5 - a_3)\sin(8\varphi) - + \dots$$

Aus der Vergleichung der Koeffizienten in diesen beiden Entwicklungen von $\frac{\sin(2\varphi)}{\sqrt{1 - \sin^2 \alpha \sin^2 \varphi}}$ findet man

$$a_2 - a_0 = -4a_1\zeta + 4a_2,$$

$$a_3 - a_1 = 2a_1 - 8a_2\zeta + 6a_3,$$

$$a_4 - a_2 = 4a_2 - 12a_3\zeta + 8a_4,$$

$$a_5 - a_3 = 6a_3 - 16a_4\zeta + 10a_5,$$

.....

folglich wird

$$(27.) \quad \begin{cases} 3a_2 = 4a_1\zeta - a_0, \\ 5a_3 = 8a_2\zeta - 3a_1, \\ 7a_4 = 12a_3\zeta - 5a_2, \\ 9a_5 = 16a_4\zeta - 7a_3, \\ \dots \end{cases}$$

allgemein erhält man also für $n \geq 2$

$$(28.) \quad (2n-1)a_n = 4(n-1)a_{n-1}\zeta - (2n-3)a_{n-2}.$$

Zur Entwicklung des *elliptischen Normalintegrals zweiter Gattung* muß man, wie aus Gleichung (4.) hervorgeht, in den Gleichungen (8.) bis (14.) $m = +\frac{1}{2}$ setzen und erhält

$$(29.) \quad \binom{m}{1} = \frac{1}{2}, \binom{m}{2} = -\frac{1}{2 \cdot 4} = -\frac{c_1}{4}, \binom{m}{3} = +\frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4 \cdot 6} = +\frac{c_2}{6}, \dots$$

allgemein

$$(30.) \quad \binom{m}{n} = (-1)^{n-1} \frac{c_{n-1}}{2n}.$$

Setzt man in diesem Falle

$$(31.) \quad A_0 = b_0, A_1 = +b_1, A_2 = -b_2, A_3 = +b_3, \dots A_n = (-1)^{n-1} b_n,$$

so gehen die Gleichungen (9.) und (14.) über in

$$(32.) \quad \sqrt{1 - \sin^2 \alpha \sin^2 \varphi} = b_0 + 2b_1 \cos(2\varphi) - 2b_2 \cos(4\varphi) + 2b_3 \cos(6\varphi) - + \dots$$

$$(33.) \quad E(k, \varphi) = \int_0^\varphi \sqrt{1 - \sin^2 \alpha \sin^2 \varphi} \cdot d\varphi \\ = b_0 \varphi + \frac{b_1}{1} \sin(2\varphi) - \frac{b_2}{2} \sin(4\varphi) + \frac{b_3}{3} \sin(6\varphi) - + \dots,$$

Dabei ist nach Gleichung (10.)

$$(34.) \quad b_0 = \cos^2\left(\frac{\alpha}{2}\right) \left(1 + \frac{\varepsilon^4}{2^2} + \frac{c_1^2}{4^2} \varepsilon^8 + \frac{c_2^2}{6^2} \varepsilon^{12} + \dots\right) \\ = \frac{1}{1 + \varepsilon^2} \left(1 + \varepsilon^4 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{c_n^2 \varepsilon^{4n}}{(2n+2)^2}\right).$$

Man kann aber die Größe b_0 auch durch a_0 und a_1 ausdrücken. Es ist nämlich nach den Gleichungen (17.) und (18.)

$$(17a.) \quad a_0 = (1 + \varepsilon^2) \sum_{n=0}^{\infty} c_n^2 \varepsilon^{4n} = (1 + \varepsilon^2) \left(1 + \varepsilon^4 \sum_{n=0}^{\infty} c_{n+1}^2 \varepsilon^{4n}\right),$$

$$(18a.) \quad a_1 = (1 + \varepsilon^2) \varepsilon^2 \sum_{n=0}^{\infty} c_n c_{n+1} \varepsilon^{4n};$$

ferner ist

$$(35.) \quad k^2 = \sin^2 \alpha = \frac{4 \operatorname{tg}^2\left(\frac{\alpha}{2}\right)}{\left[1 + \operatorname{tg}^2\left(\frac{\alpha}{2}\right)\right]^2} = \frac{4\varepsilon^2}{(1 + \varepsilon^2)^2},$$

$$(36.) \quad 2 - k^2 = \frac{2(1 + \varepsilon^4)}{(1 + \varepsilon^2)^2}.$$

Daraus folgt

$$(37.) \quad (2 - k^2)a_0 = \frac{2}{1 + \varepsilon^2} \left[1 + \varepsilon^4 \sum_{n=0}^{\infty} (c_{n+1}^2 + c_n^2) \varepsilon^{4n}\right],$$

$$(38.) \quad k^2 a_1 = \frac{2\varepsilon^4}{1 + \varepsilon^2} \sum_{n=0}^{\infty} 2c_n c_{n+1} \varepsilon^{4n},$$

also

$$(39.) \quad (2 - k^2)a_0 - k^2 a_1 = \frac{2}{1 + \varepsilon^2} \left[1 + \varepsilon^4 \sum_{n=0}^{\infty} (c_n - c_{n+1})^2 \varepsilon^{4n}\right].$$

Nun ist aber

$$(40.) \quad c_{n+1} = \frac{2n+1}{2n+2} c_n, \quad \text{also} \quad c_n - c_{n+1} = \frac{c_n}{2n+2};$$

deshalb geht Gleichung (39.) über in

$$(41.) \quad (2 - k^2)a_0 - k^2 a_1 = \frac{2}{1 + \varepsilon^2} \left[1 + \varepsilon^4 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{c_n^2}{(2n+2)^2} \varepsilon^{4n}\right] = 2b_0.$$

Auch die anderen Koeffizienten b_1, b_2, b_3, \dots kann man sehr einfach durch die Größen a_0, a_1, a_2, \dots ausdrücken.

Setzt man wieder voraus, daß man die durch Reihenentwicklung dargestellten Funktionen gliedweise differenzieren darf, so findet man durch Differentiation der Gleichung (32.)

$$(42.) \quad -\frac{\sin^2 \alpha \sin \varphi \cos \varphi}{\sqrt{1 - \sin^2 \alpha \sin^2 \varphi}} = -4b_1 \sin(2\varphi) + 8b_2 \sin(4\varphi) - 12b_3 \sin(6\varphi) + \dots;$$

außerdem folgt aus Gleichung (26.)

$$(43.) \quad -\frac{\sin^2 \alpha \sin \varphi \cos \varphi}{\sqrt{1 - \sin^2 \alpha \sin^2 \varphi}} = \frac{k^2}{2} [(a_2 - a_0) \sin(2\varphi) - (a_3 - a_1) \sin(4\varphi) + (a_4 - a_2) \sin(6\varphi) - \dots],$$

folglich erhält man

$$8b_1 = k^2(a_0 - a_2), \quad 16b_2 = k^2(a_1 - a_3), \quad 24b_3 = k^2(a_2 - a_4), \dots,$$

allgemein

$$(44.) \quad 8nb_n = k^2(a_{n-1} - a_{n+1}).$$

Setzt man also

$$a_0 - a_2 = 2^2 \cdot B_1, \quad a_1 - a_3 = 4^2 \cdot B_2, \quad a_2 - a_4 = 6^2 \cdot B_3, \dots,$$

allgemein

$$(45.) \quad a_{n-1} - a_{n+1} = (2n)^2 B_n,$$

so wird

$$(46.) \quad b_1 = \frac{k^2}{2} \cdot B_1, \quad b_2 = \frac{k^2}{2} \cdot B_2, \quad b_3 = \frac{k^2}{2} \cdot B_3, \dots, \quad b_n = \frac{k^2}{2} \cdot B_n,$$

folglich geht Gleichung (33.) über in

$$(47.) \quad E(k, \varphi) = \int_0^\varphi \sqrt{1 - \sin^2 \alpha \sin^2 \varphi} \cdot d\varphi \\ = b_0 \varphi + \frac{k^2}{2} [B_1 \sin(2\varphi) - B_2 \sin(4\varphi) + B_3 \sin(6\varphi) - \dots].$$

Von besonderem Interesse sind die Werte der beiden Integrale $F(k, \varphi)$ und $E(k, \varphi)$ für $\varphi = \frac{\pi}{2}$, die man bezw. mit K und E bezeichnet. Nach den Gleichungen (16.), (33.) und (41.) wird

$$(48.) \quad K = F\left(k, \frac{\pi}{2}\right) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\varphi}{\sqrt{1 - \sin^2 \alpha \sin^2 \varphi}} = \frac{a_0 \pi}{2},$$

$$(49.) \quad E = E\left(k, \frac{\pi}{2}\right) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 - \sin^2 \alpha \sin^2 \varphi} \cdot d\varphi = \frac{b_0 \pi}{2} \\ = \frac{\pi}{4} [(2 - k^2)a_0 - k^2 a_1].$$

Eine kurzgefaßte Tabelle der Größen K und E , $F(k, \varphi)$ und $E(k, \varphi)$ ist in den Anhang dieses Bandes aufgenommen*).

Fig. 112.





Fig. 113.



*) Eine ausführliche Tabelle der Größen K und E , $F(k, \varphi)$ und $E(k, \varphi)$ findet sich in der äußerst nützlichen Formel-Sammlung von *Jahnke und Emde*: „Funktionentafeln mit Formeln und Kurven“. Berlin und Leipzig 1909.

Über den Verlauf der Funktion $y = F(k, \varphi)$ gibt die Figur 112 Auskunft, wobei $k = \sin \alpha$, und die gezeichneten Kurven, von unten nach oben gerechnet, den Werten $\alpha = 0^\circ, 15^\circ, 30^\circ, 45^\circ, 60^\circ, 75^\circ$ und 90° entsprechen. Über den Verlauf der Funktion $y = E(k, \varphi)$ gibt Figur 113 Auskunft, wobei $k = \sin \alpha$, und die gezeichneten Kurven, von oben nach unten gerechnet, ebenfalls den Werten $\alpha = 0^\circ, 15^\circ, 30^\circ, 45^\circ, 60^\circ, 75^\circ$ und 90° entsprechen.

Beispiel.

Die angeführten Reihen konvergieren um so schlechter, je mehr sich $k = \sin \alpha$ dem Werte 1 nähert. Wenn also in dem folgenden Beispiele

$$(50.) \quad k = 0,8, \quad \varepsilon = \frac{1 - \sqrt{1 - k^2}}{k} = 0,5$$

gesetzt wird, so möge hervorgehoben werden, daß die Rechnung für kleinere Werte von k noch kürzer wird. Hier erhält man

$$\begin{array}{ll} 1 + \varepsilon^2 = 1,25 & \varepsilon^{12} = 0,000\,244\,14 \\ (1 + \varepsilon^2)\varepsilon^2 = 0,312\,5 & \varepsilon^{16} = 0,000\,015\,26 \\ \varepsilon^4 = 0,062\,5 & \varepsilon^{20} = 0,000\,000\,95 \\ \varepsilon^8 = 0,003\,906\,25 & \varepsilon^{24} = 0,000\,000\,06; \end{array}$$

ferner ist

$$\begin{array}{ll} c_1^2 = 0,25 & c_1 c_2 = 0,187\,5 \\ c_2^2 = 0,140\,625 & c_2 c_3 = 0,117\,187\,5 \\ c_3^2 = 0,097\,656\,25 & c_3 c_4 = 0,085\,449\,22 \\ c_4^2 = 0,074\,768\,07 & c_4 c_5 = 0,067\,291\,26 \\ c_5^2 = 0,060\,562\,14 & c_5 c_6 = 0,055\,515\,29 \\ c_6^2 = 0,050\,889\,02 & c_6 c_7 = 0,047\,254\,09. \end{array}$$

Daraus folgt

$$(51.) \quad a_0 = (1 + \varepsilon^2)(1 + c_1^2 \varepsilon^4 + c_2^2 \varepsilon^8 + \dots) = 1,270\,249\,20,$$

$$(52.) \quad a_1 = (1 + \varepsilon^2)\varepsilon^2(c_1 + c_1 c_2 \varepsilon^4 + c_2 c_3 \varepsilon^8 + \dots) = 0,160\,062\,02.$$

Aus den Gleichungen (27.), nämlich aus den Formeln

$$(53.) \quad 3a_2 = 4a_1 \zeta - a_0, \quad 5a_3 = 8a_2 \zeta - 3a_1, \quad 7a_4 = 12a_3 \zeta - 5a_2, \dots,$$

wobei

$$(54.) \quad \zeta = \frac{2 - k^2}{k^2} = \frac{2 - 0,64}{0,64} = \frac{17}{8}$$

ist, findet man

$$(55.) \quad \left\{ \begin{array}{ll} a_2 = 0,030\,092\,65 & a_8 = 0,000\,003\,86 \\ a_3 = 0,006\,277\,80 & a_9 = 0,000\,000\,91 \\ a_4 = 0,001\,374\,39 & a_{10} = 0,000\,000\,21 \\ a_5 = 0,000\,309\,41 & a_{11} = 0,000\,000\,05 \\ a_6 = 0,000\,070\,93 & a_{12} = 0,000\,000\,01. \\ a_7 = 0,000\,016\,47 \end{array} \right.$$

Es darf nicht verschwiegen werden, daß man diese Werte aus den Gleichungen (27.) nur dann findet, wenn man noch einige Dezimalstellen mehr berücksichtigt. Bei derartigen rekurrierenden Formeln werden nämlich die Fehler, welche durch die Vernachlässigung der folgenden Dezimalstellen entstehen, im allgemeinen bei jedem späteren Gliede größer. Wenn z. B. die letzte Dezimalstelle in a_0 und a_1 auch nur um 2 Einheiten unsicher ist, so wird in der Gleichung

$$3a_2 = 4a_1\zeta - a_0$$

a_1 (und deshalb auch der Fehler von a_1) mit $4\zeta = 8,5$ multipliziert, so daß $3a_2$ um 19 Einheiten, a_2 selbst um $\frac{19}{3}$ Einheiten in der letzten Dezimalstelle unsicher ist. Die Größe a_3 wird um etwa 23, a_4 um etwa 172 Einheiten unsicher. So steigert sich die Unsicherheit mit jedem späteren Gliede außerordentlich schnell, weshalb die vorstehenden Resultate nach Gleichung (20.), nämlich nach der Formel

$$a_v = (1 + \varepsilon^2) \sum_{n=0}^{n=\infty} c_n c_{v+n} \varepsilon^{2v+4n}$$

berechnet sind. Sodann findet man aus den Gleichungen

$$2b_0 = (2 - k^2)a_0 - k^2a_1 = 1,36 \cdot a_0 - 0,64a_1,$$

$$4B_1 = a_0 - a_2, \quad 16B_2 = a_1 - a_3, \quad 36B_3 = a_2 - a_4, \dots$$

$$(56.) \quad \left\{ \begin{array}{ll} b_0 = 0,812\,549\,61 & B_5 = 0,000\,013\,03 \\ B_1 = 0,310\,039\,14 & B_6 = 0,000\,002\,03 \\ B_2 = 0,009\,611\,51 & B_7 = 0,000\,000\,34 \\ B_3 = 0,000\,797\,73 & B_8 = 0,000\,000\,06 \\ B_4 = 0,000\,093\,26 & B_9 = 0,000\,000\,01. \end{array} \right.$$

Daraus folgt dann

$$(57.) \quad K = F\left(k, \frac{\pi}{2}\right) = \frac{a_0\pi}{2} = 1,995\,302\,78,$$

$$(58.) \quad E = E\left(k, \frac{\pi}{2}\right) = \frac{b_0\pi}{2} = 1,276\,349\,94.$$

Soll z. B. bei der Rektifikation der Ellipse mit den Halbachsen

$$a = 10, \quad b = 6$$

der Quadrant q berechnet werden, so erhält man $e = 8$, also $k = \frac{e}{a} = 0,8$ und nach Gleichung (20.) des vorhergehenden Paragraphen

$$(59.) \quad q = a \int_0^1 \frac{dt \sqrt{1 - k^2 t^2}}{\sqrt{1 - t^2}} = aE\left(k, \frac{\pi}{2}\right) = 12,763\,499\,4.$$

Zur Prüfung dieses Resultates beachte man, daß der Quadrant des Kreises mit dem Halbmesser a gleich 15,707 963 3, und der Quadrant des Kreises mit dem Halbmesser b gleich 9,424 778 0 ist. Der Quadrant der Ellipse liegt, wie durch das oben gefundene Resultat bestätigt wird, zwischen diesen beiden Werten.

§ 61.

Vereinfachung der numerischen Rechnung durch die *Landensche* Transformation.

(Vergl. die Formel-Tabelle Nr. 185 und 186.)

Es sei wieder

$$(1.) \quad F(k, \varphi) = \int_0^\varphi \frac{d\varphi}{\sqrt{1 - \sin^2 \alpha \sin^2 \varphi}},$$

dann führe man eine neue Integrations-Veränderliche ψ ein durch die Gleichung

$$(2.) \quad \operatorname{tg} \varphi = \frac{\sin(2\psi)}{\sin \alpha + \cos(2\psi)}, \text{ oder } \sin(2\psi - \varphi) = \sin \alpha \sin \varphi.$$

Dies gibt durch Differentiation

$$(3.) \quad \frac{d\varphi}{\cos^2\varphi} = (1 + \operatorname{tg}^2\varphi)d\varphi = \frac{2[1 + \sin\alpha \cos(2\psi)]d\psi}{[\sin\alpha + \cos(2\psi)]^2},$$

also

$$(4.) \quad d\varphi = \frac{2[1 + \sin\alpha \cos(2\psi)]d\psi}{\sin^2\alpha + 2\sin\alpha \cos(2\psi) + 1},$$

$$(5.) \quad 1 - \sin^2\alpha \sin^2\varphi = 1 - \frac{\sin^2\alpha \operatorname{tg}^2\varphi}{1 + \operatorname{tg}^2\varphi} \\ = 1 - \frac{\sin^2\alpha \sin^2(2\psi)}{\sin^2\alpha + 2\sin\alpha \cos(2\psi) + 1} \\ = \frac{[\sin\alpha \cos(2\psi) + 1]^2}{\sin^2\alpha + 2\sin\alpha \cos(2\psi) + 1}.$$

Dabei ist

$$\sin^2\alpha + 2\sin\alpha \cos(2\psi) + 1 = (1 + \sin\alpha)^2 - 4\sin\alpha \sin^2\psi.$$

Da

$$(1 - \sin\alpha)^2 = 1 - 2\sin\alpha + \sin^2\alpha > 0$$

ist, so wird

$$1 + 2\sin\alpha + \sin^2\alpha = (1 + \sin\alpha)^2 > 4\sin\alpha,$$

folglich kann man

$$(6.) \quad \frac{2\sqrt{\sin\alpha}}{1 + \sin\alpha} = \sin\beta, \quad \text{also} \quad \frac{4\sin\alpha}{(1 + \sin\alpha)^2} = \sin^2\beta$$

setzen und findet aus den Gleichungen (4.) und (5.)

$$(7.) \quad d\varphi = \frac{2[1 + \sin\alpha \cos(2\psi)]d\psi}{(1 + \sin\alpha)^2(1 - \sin^2\beta \sin^2\psi)},$$

$$(8.) \quad \sqrt{1 - \sin^2\alpha \sin^2\varphi} = \frac{1 + \sin\alpha \cos(2\psi)}{(1 + \sin\alpha)\sqrt{1 - \sin^2\beta \sin^2\psi}}.$$

Dies gibt

$$(9.) \quad \frac{d\varphi}{\sqrt{1 - \sin^2\alpha \sin^2\varphi}} = \frac{2}{1 + \sin\alpha} \frac{d\psi}{\sqrt{1 - \sin^2\beta \sin^2\psi}}.$$

Da $\psi = 0$ wird für $\varphi = 0$, so erhält man

$$(10.) \quad \int_0^\varphi \frac{d\varphi}{\sqrt{1 - \sin^2\alpha \sin^2\varphi}} = \frac{2}{1 + \sin\alpha} \int_0^\psi \frac{d\psi}{\sqrt{1 - \sin^2\beta \sin^2\psi}},$$

oder, wenn man $\sin\alpha$ mit k und $\sin\beta$ mit k_1 bezeichnet,

$$(10a.) \quad F(k, \varphi) = \frac{2}{1+k} F(k_1, \psi),$$

wobei man den Wert von ψ aus Gleichung (2.) findet.

Das Integral $F(k_1, \psi)$ ist mühsamer zu berechnen, weil $k_1 > k$ ist. Es ist nämlich

$\sin \alpha < 1$, also $1 + \sin \alpha < 2$, $(1 + \sin \alpha)^2 < 4$,
folglich wird

$$\sin^2 \beta = \frac{4 \sin \alpha}{(1 + \sin \alpha)^2} > \frac{4 \sin \alpha}{4} = \sin \alpha > \sin^2 \alpha.$$

Deshalb denkt man sich in Gleichung (10a.) die Größen $k_1 = \sin \beta$ und ψ gegeben und bringt diese Gleichung auf die Form

$$(10b.) \quad F(k_1, \psi) = \frac{1+k}{2} F(k, \varphi),$$

d. h. man führt das mühsamer zu berechnende Integral $F(k_1, \psi)$ auf das einfachere $F(k, \varphi)$ zurück. Dabei berechnet man die Werte von φ und $\sin \alpha$ aus den Gleichungen (2.) und (6.), und zwar findet man aus Gleichung (6.)

$$\cos^2 \beta = 1 - \sin^2 \beta = \frac{(1 - \sin \alpha)^2}{(1 + \sin \alpha)^2},$$

oder, da man den Wert von β zwischen 0 und $\frac{\pi}{2}$ annehmen darf,

$$(11.) \quad \cos \beta = \frac{1 - \sin \alpha}{1 + \sin \alpha}, \text{ also } \sin \alpha = \frac{1 - \cos \beta}{1 + \cos \beta} = \operatorname{tg}^2 \left(\frac{\beta}{2} \right),$$

oder

$$(12.) \quad k = \frac{1 - \sqrt{1 - k_1^2}}{1 + \sqrt{1 - k_1^2}}.$$

Setzt man z. B., dem Beispiele im vorhergehenden Paragraphen entsprechend,

$k_1 = \sin \beta = 0,8$, also $\cos \beta = 0,6$,
so wird

$$k = \sin \alpha = \frac{1 - \cos \beta}{1 + \cos \beta} = \frac{0,4}{1,6} = 0,25,$$

$$\varepsilon = \operatorname{tg} \left(\frac{\alpha}{2} \right) = \frac{1 - \sqrt{1 - k^2}}{k} = \frac{1 - \sqrt{0,9375}}{0,25} = 4 - \sqrt{15},$$

$$\varepsilon = 0,125 \, 016 \, 654, \quad \varepsilon^2 = 0,016 \, 133 \, 230,$$

$$\varepsilon^4 = 0,000 \, 260 \, 281, \quad \varepsilon^8 = 0,000 \, 000 \, 068.$$

Man darf deshalb bei der Berechnung der Größen $a_0, a_1, a_2, \dots, b_0, b_1, b_2, \dots$, selbst wenn man 9 Dezimalstellen berücksichtigt, alle Glieder vernachlässigen, die mit ε^{12} oder mit einer höheren Potenz von ε multipliziert sind.

Durch wiederholte Anwendung dieser Substitution wird man auf immer kleinere Werte von $k = \sin \alpha$ geführt, und zwar nehmen diese Werte sehr schnell ab. Für $\lim k = \lim \sin \alpha = 0$ wird

$$(13.) \lim_{k=0} F(k, \varphi) = \lim_{\alpha=0} \int_0^{\varphi} \frac{d\varphi}{\sqrt{1 - \sin^2 \alpha \sin^2 \varphi}} = \int_0^{\varphi} d\varphi = \varphi;$$

d. h. für kleine Werte von α ist $F(k, \varphi)$ nur wenig von φ selbst verschieden.

Dieselben Formeln führen auch zu einer Reduktion des elliptischen Integrals zweiter Gattung $E(k_1, \psi)$. Nach Gleichung (2.) ist nämlich

$$\cos^2 \varphi = \frac{1}{1 + \operatorname{tg}^2 \varphi} = \frac{[\sin \alpha + \cos(2\psi)]^2}{\sin^2 \alpha + 2 \sin \alpha \cos(2\psi) + 1};$$

deshalb folgt aus den Gleichungen (5.) und (6.)

$$\begin{aligned} \sqrt{1 - \sin^2 \alpha \sin^2 \varphi} + \sin \alpha \cos \varphi &= \frac{\sin^2 \alpha + 2 \sin \alpha \cos(2\psi) + 1}{\sqrt{\sin^2 \alpha + 2 \sin \alpha \cos(2\psi) + 1}} \\ &= \sqrt{\sin^2 \alpha + 2 \sin \alpha \cos(2\psi) + 1} \\ &= (1 + \sin \alpha) \sqrt{1 - \sin^2 \beta \sin^2 \psi}, \end{aligned}$$

und aus Gleichung (7.)

$$(\sqrt{1 - \sin^2 \alpha \sin^2 \varphi} + \sin \alpha \cos \varphi) d\varphi = \frac{2[1 + \sin \alpha \cos(2\psi)] d\psi}{(1 + \sin \alpha) \sqrt{1 - \sin^2 \beta \sin^2 \psi}}.$$

Dabei ist

$$\begin{aligned} 2[1 + \sin \alpha \cos(2\psi)] &= 2 + 2 \sin \alpha - 4 \sin \alpha \sin^2 \psi \\ &= (1 + \sin \alpha)[2 - (1 + \sin \alpha) \sin^2 \beta \sin^2 \psi] \\ &= (1 + \sin \alpha)[(1 + \sin \alpha)(1 - \sin^2 \beta \sin^2 \psi) \\ &\quad + (1 - \sin \alpha)], \end{aligned}$$

folglich wird

$$\begin{aligned} (14.) \int_0^{\varphi} (\sqrt{1 - \sin^2 \alpha \sin^2 \varphi} + \sin \alpha \cos \varphi) d\varphi \\ = (1 + \sin \alpha) \int_0^{\psi} \sqrt{1 - \sin^2 \beta \sin^2 \psi} d\psi + (1 - \sin \alpha) \int_0^{\psi} \frac{d\psi}{\sqrt{1 - \sin^2 \beta \sin^2 \psi}}, \end{aligned}$$

oder

$$(14a.) \quad E(k, \varphi) + k \sin \varphi = (1+k)E(k_1, \psi) + (1-k)F(k_1, \psi).$$

Mit Rücksicht auf Gleichung (10.) findet man hieraus

$$E(k, \varphi) + k \sin \varphi = (1+k)E(k_1, \psi) + \frac{1-k^2}{2}F(k, \varphi),$$

also

$$(15.) \quad E(k_1, \psi) = \frac{1}{1+k}E(k, \varphi) - \frac{1-k}{2}F(k, \varphi) - \frac{k}{1+k}\sin \varphi.$$

Durch diese Formel kann man $E(k_1, \psi)$ zurückführen auf die Berechnung von $F(k, \varphi)$ und $E(k, \varphi)$, wobei der Wert von k nach Gleichung (12.) wesentlich kleiner ist als der Wert von k_1 .

§ 62.

Differentiation der Integrale.

(Vergl. die Formel-Tabelle Nr. 187 bis 189.)

Nach Formel Nr. 4 der Tabelle war ein bestimmtes Integral durch die Gleichung

$$(1.) \quad J = \int_a^b F'(x) dx = F(b) - F(a)$$

erklärt worden. Betrachtet man a und b als veränderlich, so ist J eine Funktion von a und b , und man erhält durch Differentiation

$$(2.) \quad \frac{\partial J}{\partial a} = -F'(a), \quad \frac{\partial J}{\partial b} = F'(b),$$

also

$$(3.) \quad dJ = \int_a^b F''(x) dx = -F''(a)da + F''(b)db,$$

oder, wenn man $F''(x)$ mit $f(x)$ bezeichnet,

$$(3a.) \quad dJ = \int_a^b f(x) dx = -f(a)da + f(b)db.$$

Ist die Funktion unter dem Integralzeichen außer von x noch abhängig von einem variablen Parameter t , ist also

$$(4.) \quad F'(x) = f(x, t), \quad J = \int_a^b f(x, t) dx;$$

so ist auch *das bestimmte Integral J eine Funktion von t , und zwar von t allein, wenn die Integrationsgrenzen a und b zunächst als konstant betrachtet werden.* Das Integral J geht über in $J + \Delta J$, wenn t um Δt wächst; es wird also

$$(5.) \quad J + \Delta J = \int_a^b f(x, t + \Delta t) dx.$$

Aus den Gleichungen (4.) und (5.) folgt daher

$$(6.) \quad \begin{aligned} \Delta J &= \int_a^b f(x, t + \Delta t) dx - \int_a^b f(x, t) dx, \\ &= \int_a^b [f(x, t + \Delta t) - f(x, t)] dx. \end{aligned}$$

Nach Formel Nr. 88 der Differential-Rechnung (12. Auflage) ist

$$f(a + h) - f(a) = h \cdot f'(a + \Theta h),$$

wobei Θ zwischen 0 und 1 liegt. Wenn man nun unter der Voraussetzung, daß $f(x, t)$ für die betrachteten Werte von t eine stetige und differentiierbare Funktion von t ist,

$$\frac{\partial f(x, t)}{\partial t} \quad \text{mit} \quad f_2(x, t)$$

bezeichnet und in der vorstehenden Formel a mit t , h mit Δt , $f(a)$ mit $f(x, t)$, also $f'(a)$ mit $f_2(x, t)$ vertauscht, so erhält man

$$f(x, t + \Delta t) - f(x, t) = \Delta t \cdot f_2(x, t + \Theta \cdot \Delta t).$$

Deshalb geht Gleichung (6.) über in

$$\Delta J = \int_a^b \Delta t \cdot f_2(x, t + \Theta \cdot \Delta t) dx,$$

oder wenn man beide Seiten der Gleichung durch Δt dividiert,

$$(7.) \quad \begin{aligned} \frac{\Delta J}{\Delta t} &= \int_a^b f_2(x, t + \Theta \cdot \Delta t) dx \\ &= \int_a^b f_2(x, t) dx + \int_a^b [f_2(x, t + \Theta \cdot \Delta t) - f_2(x, t)] dx. \end{aligned}$$

Läßt man jetzt Δt verschwindend klein werden, so wird, wenn auch $f_2(x, t)$ für die betrachteten Werte von t

stetig ist, das zweite Integral auf der rechten Seite von Gleichung (7.) verschwindend klein, so daß man an der Grenze

$$(8.) \quad \frac{\partial J}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t} \int_a^b f(x, t) dx = \int_a^b \frac{\partial f(x, t)}{\partial t} dx$$

erhält. Dies gibt den

Satz. *Ein bestimmtes Integral wird nach einem variablen Parameter t , den die Funktion $f(x, t)$ unter dem Integralzeichen enthält, differenziert, indem man diese Funktion nach t differenziert.*

Voraussetzung ist dabei, daß die Funktionen $f(x, t)$ und $\frac{\partial f(x, t)}{\partial t}$ für die betrachteten Werte von t stetig sind.

Betrachtet man jetzt noch den Fall, wo die Integrationsgrenzen a und b veränderlich sind, so wird J eine Funktion der drei Veränderlichen a , b und t , woraus sich für das totale Differential der Wert

$$dJ = \frac{\partial J}{\partial a} da + \frac{\partial J}{\partial b} db + \frac{\partial J}{\partial t} dt$$

ergibt.

Sind insbesondere die Integrationsgrenzen a und b gleichfalls Funktionen von t , so wird nach D.-R. (12. Auflage), Formel Nr. 231 der Tabelle

$$(9.) \quad \frac{dJ}{dt} = \frac{\partial J}{\partial a} \frac{da}{dt} + \frac{\partial J}{\partial b} \frac{db}{dt} + \frac{\partial J}{\partial t},$$

oder mit Rücksicht auf die Gleichungen (2.) und (8.)

$$(10.) \quad \begin{aligned} \frac{dJ}{dt} &= \frac{d}{dt} \int_a^b f(x, t) dx \\ &= -f(a, t) \cdot \frac{da}{dt} + f(b, t) \cdot \frac{db}{dt} + \int_a^b \frac{\partial f(x, t)}{\partial t} dx. \end{aligned}$$

Ist J das *unbestimmte* Integral einer Differential-Funktion $f(x, t)dx$, welche noch einen variablen Parameter t enthält, so kann die Integrations-Konstante C gleichfalls noch von dem Parameter t abhängig sein, so daß man erhält

$$(11.) \quad J = \int f(x, t) dx + \varphi(t),$$

wobei $\varphi(t)$ eine ganz beliebige Funktion von t ist. Wächst t um Δt , so geht J über in

$$(12.) \quad J + \Delta J = \int f(x, t + \Delta t) dx + \varphi(t + \Delta t);$$

folglich wird

$$(13.) \quad \Delta J = \int [f(x, t + \Delta t) - f(x, t)] dx + \varphi(t + \Delta t) - \varphi(t),$$

also

$$(14.) \quad \frac{\partial J}{\partial t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta J}{\Delta t} = \int \frac{\partial f(x, t)}{\partial t} dx + \varphi'(t).$$

Da $\varphi(t)$ eine ganz beliebige Funktion von t ist, so gilt dasselbe von $\varphi'(t)$, d. h. $\varphi'(t)$ spielt auch in Gleichung (14.) die Rolle einer beliebigen Integrations-Konstanten, so daß der Satz, der vorhin für die Differentiation eines *bestimmten* Integrals nach einem variablen Parameter ausgesprochen worden ist, in gleicher Weise auch für die Differentiation eines *unbestimmten* Integrals gilt.

§ 63.

Berechnung bestimmter Integrale durch Differentiation.

(Vergl. die Formel-Tabelle Nr. 190 und 191.)

Aus Formel Nr. 28 der Tabelle, nämlich aus

$$(1.) \quad \int \frac{dx}{a^2 + x^2} = \frac{1}{a} \operatorname{arctg}\left(\frac{x}{a}\right),$$

folgt durch Vertauschung von a^2 mit t

$$(2.) \quad \int_0^{\infty} \frac{dx}{x^2 + t} = \frac{1}{\sqrt{t}} \left[\operatorname{arctg}\left(\frac{x}{\sqrt{t}}\right) \right]_0^{\infty} = \frac{1}{\sqrt{t}} \cdot \frac{\pi}{2}.$$

Indem man beide Seiten dieser Gleichung nach dem *Parameter* t differentiiert und mit -1 multipliziert, erhält man nach Formel Nr. 188 der Tabelle

$$(3.) \quad \int_0^{\infty} \frac{dx}{(x^2 + t)^2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{t\sqrt{t}} \cdot \frac{\pi}{2}.$$

Wenn man beide Seiten dieser Gleichung nochmals nach t differentiiert und durch -2 dividiert, so ergibt sich

$$(4.) \quad \int_0^{\infty} \frac{dx}{(x^2 + t)^3} = \frac{1.3}{2.4} \frac{1}{t^2\sqrt{t}} \cdot \frac{\pi}{2}.$$

Durch Fortsetzung dieses Verfahrens findet man

$$(5.) \quad \int_0^{\infty} \frac{dx}{(x^2 + t)^4} = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6} \cdot \frac{1}{t^3 \sqrt{t}} \cdot \frac{\pi}{2},$$

$$(6.) \quad \int_0^{\infty} \frac{dx}{(x^2 + t)^n} = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \dots (2n-3)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \dots (2n-2)} \cdot \frac{1}{t^{n-1} \sqrt{t}} \cdot \frac{\pi}{2},$$

oder

$$(6a.) \quad \int_0^{\infty} \frac{dx}{(a^2 + x^2)^n} = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \dots (2n-3)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \dots (2n-2)} \cdot \frac{1}{a^{2n-1}} \cdot \frac{\pi}{2}.$$

Aus

$$(7.) \quad \int e^{-tx} dx = -\frac{1}{t} \cdot e^{-tx} = -\frac{1}{t \cdot e^{tx}}$$

folgt für positive Werte von t

$$(8.) \quad \int_0^{\infty} e^{-tx} dx = \frac{1}{t}.$$

Indem man beide Seiten dieser Gleichung nach dem *Parameter* t differenziert und mit -1 multipliziert, erhält man nach Formel Nr. 188 der Tabelle

$$(9.) \quad \int_0^{\infty} e^{-tx} \cdot x dx = \frac{1}{t^2},$$

und wenn man dieses Verfahren wiederholt,

$$(10.) \quad \int_0^{\infty} e^{-tx} \cdot x^2 dx = \frac{1 \cdot 2}{t^3},$$

$$(11.) \quad \int_0^{\infty} e^{-tx} \cdot x^3 dx = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{t^4},$$

$$(12.) \quad \int_0^{\infty} e^{-tx} \cdot x^n dx = \frac{n!}{t^{n+1}}.$$

§ 64.

Berechnung der Werte von einigen bestimmten Integralen.

(Vergl. die Formel-Tabelle Nr. 192 bis 197.)

Zur Berechnung eines *bestimmten* Integrals ist es nicht immer erforderlich, vorher das *unbestimmte* Integral zu ermitteln; es sind dabei vielmehr häufig Vereinfachungen möglich, wie man aus den folgenden Beispielen ersehen kann.

$$\text{Aufgabe 1.} \quad \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n} x dx = ?$$

Auflösung. Nach Formel Nr. 102 der Tabelle ist

$$(1.) \quad \int \cos^{2n} x dx = \sin x \left[\frac{1}{2n} \cos^{2n-1} x + \frac{2n-1}{2n(2n-2)} \cos^{2n-3} x + \dots \right. \\ \left. + \frac{(2n-1)(2n-3)\dots 5 \cdot 3}{2n(2n-2)\dots 6 \cdot 4 \cdot 2} \cos x \right] + \frac{(2n-1)(2n-3)\dots 5 \cdot 3 \cdot 1}{2n(2n-2)\dots 6 \cdot 4 \cdot 2} x;$$

da nun

$$(2.) \quad \sin 0 = 0, \quad \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$$

ist, so wird

$$(3.) \quad \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n} x dx = \frac{(2n-1)(2n-3)\dots 5 \cdot 3 \cdot 1}{2n(2n-2)\dots 6 \cdot 4 \cdot 2} \cdot \frac{\pi}{2}.$$

$$\text{Aufgabe 2.} \quad \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n} x dx = ?$$

Auflösung. In ähnlicher Weise wie bei der vorigen Aufgabe ergibt sich aus Formel Nr. 105 der Tabelle, nämlich aus

$$(4.) \quad \int \sin^{2n} x dx = -\cos x \left[\frac{1}{2n} \sin^{2n-1} x + \frac{2n-1}{2n(2n-2)} \sin^{2n-3} x + \dots \right. \\ \left. + \frac{(2n-1)(2n-3)\dots 5 \cdot 3}{2n(2n-2)\dots 6 \cdot 4 \cdot 2} \sin x \right] + \frac{(2n-1)(2n-3)\dots 5 \cdot 3 \cdot 1}{2n(2n-2)\dots 6 \cdot 4 \cdot 2} x,$$

das bestimmte Integral

$$(5.) \quad \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n} x dx = \frac{(2n-1)(2n-3)\dots 5 \cdot 3 \cdot 1}{2n(2n-2)\dots 6 \cdot 4 \cdot 2} \cdot \frac{\pi}{2}.$$

Die Formeln Nr. 102 und 105 der Tabelle, deren Herleitung erst durch wiederholte Anwendung der partiellen Integration ermöglicht wurde, braucht man aber gar nicht einmal zur Berechnung dieser bestimmten Integrale; man findet vielmehr weit einfacher aus Formel Nr. 101 der Tabelle, nämlich aus

$$(6.) \quad \int \cos^{2n} x dx = \frac{1}{2n} \cos^{2n-1} x \sin x + \frac{2n-1}{2n} \int \cos^{2n-2} x dx,$$

durch Einsetzen der Grenzen das bestimmte Integral

$$(7.) \quad \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n} x dx = \frac{1}{2n} [\cos^{2n-1} x \sin x]_0^{\frac{\pi}{2}} + \frac{2n-1}{2n} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n-2} x dx$$

$$= \frac{2n-1}{2n} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n-2} x dx,$$

weil das erste Glied auf der rechten Seite von Gleichung (7.) an der oberen und an der unteren Grenze verschwindet. Indem man n mit $n-1$ vertauscht, geht Gleichung (7.) über in

$$(8.) \quad \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n-2} x dx = \frac{2n-3}{2n-2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n-4} x dx.$$

In dieser Weise kann man fortfahren, bis man endlich die Formeln

$$(9.) \quad \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 x dx = \frac{3}{4} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 x dx, \quad (10.) \quad \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 x dx = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} dx = \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2}$$

erhält. Aus diesen Gleichungen ergibt sich dann wieder dasselbe Resultat wie in Gleichung (3.)

Ebenso liefert die Formel Nr. 104 der Tabelle, nämlich

$$(10.) \quad \int \sin^{2n} x dx = -\frac{1}{2n} \sin^{2n-1} x \cos x + \frac{2n-1}{2n} \int \sin^{2n-2} x dx,$$

durch Einsetzen der Grenzen die Gleichungen

$$(11.) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n} x dx = -\frac{1}{2n} [\sin^{2n-1} x \cos x]_0^{\frac{\pi}{2}} + \frac{2n-1}{n} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n-2} x dx$$

$$= \frac{2n-1}{2n} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n-2} x dx,$$

$$(12.) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n-2} x dx = \frac{2n-3}{2n-2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n-4} x dx,$$

.....

$$(13.) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 x dx = \frac{3}{4} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x dx,$$

$$(14.) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x dx = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} dx = \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2}.$$

Aus diesen Gleichungen ergibt sich wieder dasselbe Resultat wie in Gleichung (5.).

Aufgabe 3. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n+1} x dx = ?$

Auflösung. Setzt man in Formel Nr. 101 der Tabelle $m = 2n + 1$, so erhält man

$$(15.) \int \cos^{2n+1} x dx = \frac{1}{2n+1} \cos^{2n} x \sin x + \frac{2n}{2n+1} \int \cos^{2n-1} x dx,$$

also

$$(16.) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n+1} x dx = \frac{1}{2n+1} [\cos^{2n} x \sin x]_0^{\frac{\pi}{2}} + \frac{2n}{2n+1} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n-1} x dx$$

$$= \frac{2n}{2n+1} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n-1} x dx.$$

Ebenso wird

$$(17.) \quad \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n-1} x dx = \frac{2n-2}{2n-1} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n-3} x dx,$$

.....

$$(18.) \quad \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^3 x dx = \frac{2}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx = \frac{2}{3} [\sin x]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{2}{3},$$

folglich wird

$$(19.) \quad \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n+1} x dx = \frac{2n(2n-2) \dots 4 \cdot 2}{(2n+1)(2n-1) \dots 5 \cdot 3 \cdot 1}.$$

Ebenso findet man aus Formel Nr. 104 der Tabelle

$$(20.) \quad \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n+1} x dx = \frac{2n(2n-2) \dots 4 \cdot 2}{(2n+1)(2n-1) \dots 5 \cdot 3 \cdot 1}.$$

In ähnlicher Weise liefern die Formeln Nr. 108 und 111 der Tabelle, nämlich die Gleichungen

$$(21.) \quad \int \sin^m x \cos^n x dx = -\frac{1}{m+n} \sin^{m-1} x \cos^{n+1} x \\ + \frac{m-1}{m+n} \int \sin^{m-2} x \cos^n x dx,$$

$$(22.) \quad \int \sin^m x \cos^n x dx = \frac{1}{m+n} \sin^{m+1} x \cos^{n-1} x \\ + \frac{n-1}{m+n} \int \sin^m x \cos^{n-2} x dx,$$

ein einfaches Verfahren für die Berechnung von $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^m x \cos^n x dx$.

Aus Gleichung (21.) folgt nämlich, wenn $m > 1$ ist,

$$(23.) \quad \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^m x \cos^n x dx = \frac{m-1}{m+n} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{m-2} x \cos^n x dx.$$

Je nachdem m gerade oder ungerade ist, wird durch wiederholte Anwendung dieser Vereinfachung das gesuchte Integral schließlich entweder auf das bereits ermittelte

Integral $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x dx$, oder auf

$$(24.) \quad \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x \sin x dx = - \left[\frac{\cos^{n+1} x}{n+1} \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{1}{n+1}$$

zurückgeführt.

Aus Gleichung (22.) folgt, wenn $n > 1$ ist,

$$(25.) \quad \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^m x \cos^n x dx = \frac{n-1}{m+n} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^m x \cos^{n-2} x dx.$$

Je nachdem n gerade oder ungerade ist, wird durch wiederholte Anwendung dieser Gleichung das gesuchte Integral schließlich entweder auf das bereits ermittelte

Integral $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^m x dx$, oder auf

$$(26.) \quad \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^m x \cos x dx = \left[\frac{\sin^{m+1} x}{m+1} \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{1}{m+1}$$

zurückgeführt.

Diese Resultate kann man auch zur Berechnung der Zahl π benutzen. Es ist nämlich für $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$

$$(27.) \quad 0 \leq \sin x \leq 1, \text{ also } \sin^{2n+1} x \leq \sin^{2n} x \leq \sin^{2n-1} x,$$

und deshalb nach den in § 55 ausgeführten Sätzen

$$(28.) \quad \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n+1} x dx < \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n} x dx < \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n-1} x dx,$$

oder

$$(29.) \quad \frac{2n(2n-2) \dots 4 \cdot 2}{(2n+1)(2n-1) \dots 5 \cdot 3} < \frac{(2n-1)(2n-3) \dots 5 \cdot 3 \cdot 1}{2n(2n-2) \dots 6 \cdot 4 \cdot 2} \cdot \frac{\pi}{2}$$

und

$$(30.) \quad \frac{(2n-1)(2n-3) \dots 5 \cdot 3 \cdot 1}{2n(2n-2) \dots 6 \cdot 4 \cdot 2} \cdot \frac{\pi}{2} < \frac{(2n-2)(2n-4) \dots 4 \cdot 2}{(2n-1)(2n-3) \dots 5 \cdot 3}.$$

Daraus folgt

$$(31.) \quad \frac{\pi}{2} > \frac{2}{1} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{6}{5} \cdot \frac{6}{7} \cdots \frac{2n-2}{2n-1} \cdot \frac{2n}{2n-1} \cdot \frac{2n}{2n+1}$$

und

$$(32.) \quad \frac{\pi}{2} < \frac{2}{1} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{6}{5} \cdot \frac{6}{7} \cdots \frac{2n-2}{2n-1} \cdot \frac{2n}{2n-1}.$$

Die rechten Seiten dieser beiden Ungleichungen unterscheiden sich voneinander nur durch den Faktor $\frac{2n}{2n+1}$, der sich für unbegrenzt wachsendes n der Grenze 1 nähert, folglich ist

$$(33.) \quad \frac{\pi}{2} = \lim_{n=\infty} \frac{2}{1} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{6}{5} \cdot \frac{6}{7} \cdots \frac{2n-2}{2n-1} \cdot \frac{2n}{2n-1}.$$

Diese Formel rührt von Wallis her und ist bereits vor Entdeckung der Differential- und Integral-Rechnung gefunden worden.

Aufgabe 4. Man soll das Integral

$$\int_0^m \left(1 - \frac{x}{m}\right)^m x^{p-1} dx$$

berechnen, wenn m eine positive ganze Zahl ist, während p zwar positiv ist, aber auch eine gebrochene Zahl sein darf.

Auflösung. Obgleich die Funktion unter dem Integralzeichen für $p < +1$ an der unteren Grenze unendlich groß wird, findet man auch in diesem Falle für das gesuchte Integral im Sinne von § 52 einen endlichen Wert. Setzt man nämlich in der Formel (Nr. 98 der Tabelle)

$$(34.) \quad \int u dv = uv - \int v du$$

$$u = \left(1 - \frac{x}{m}\right)^m, \quad dv = x^{p-1} dx,$$

also

$$du = -\frac{m}{m} \left(1 - \frac{x}{m}\right)^{m-1} dx, \quad v = \frac{x^p}{p},$$

so wird, wenn man die Grenzen (nach der Anweisung von § 52) einsetzt,

$$\begin{aligned}
 (35.) \quad \int_0^m \left(1 - \frac{x}{m}\right)^m x^{p-1} dx &= \left[\left(1 - \frac{x}{m}\right)^m \frac{x^p}{p} \right]_0^m \\
 &\quad + \frac{m}{mp} \int_0^m \left(1 - \frac{x}{m}\right)^{m-1} x^p dx \\
 &= \frac{m}{mp} \int_0^m \left(1 - \frac{x}{m}\right)^{m-1} x^p dx.
 \end{aligned}$$

Setzt man sodann in Gleichung (34.)

$$u = \left(1 - \frac{x}{m}\right)^{m-1}, \quad dv = x^p dx,$$

also

$$du = -\frac{m-1}{m} \left(1 - \frac{x}{m}\right)^{m-2} dx, \quad v = \frac{x^{p+1}}{p+1},$$

so findet man

$$\begin{aligned}
 (36.) \quad \int_0^m \left(1 - \frac{x}{m}\right)^{m-1} x^p dx &= \left[\left(1 - \frac{x}{m}\right)^{m-1} \frac{x^{p+1}}{p+1} \right]_0^m \\
 &\quad + \frac{m-1}{m(p+1)} \int_0^m \left(1 - \frac{x}{m}\right)^{m-2} x^{p+1} dx \\
 &= \frac{m-1}{m(p+1)} \int_0^m \left(1 - \frac{x}{m}\right)^{m-2} x^{p+1} dx.
 \end{aligned}$$

Ist m größer als 2, so kann man in dieser Weise fortfahren und findet

$$(37.) \quad \int_0^m \left(1 - \frac{x}{m}\right)^{m-2} x^{p+1} dx = \frac{m-2}{m(p+2)} \int_0^m \left(1 - \frac{x}{m}\right)^{m-3} x^{p+2} dx,$$

.

$$(38.) \quad \int_0^m \left(1 - \frac{x}{m}\right)^2 x^{p+m-3} dx = \frac{2}{m(p+m-2)} \int_0^m \left(1 - \frac{x}{m}\right) x^{p+m-2} dx,$$

$$\begin{aligned}
 (39.) \quad \int_0^m \left(1 - \frac{x}{m}\right) x^{p+m-2} dx &= \frac{1}{m(p+m-1)} \int_0^m x^{p+m-1} dx \\
 &= \frac{1}{m(p+m-1)(p+m)} [x^{p+m}]_0^m \\
 &= \frac{m^{p+m}}{m(p+m-1)(p+m)}.
 \end{aligned}$$

Aus den Gleichungen (35.) bis (39.) folgt daher

$$(40.) \quad \int_0^m \left(1 - \frac{x}{m}\right)^m x^{p-1} dx = \frac{m(m-1)(m-2)\dots 3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot m^{p+m}}{m^m p(p+1)(p+2)\dots(p+m)} \\ = \frac{m! m^p}{p(p+1)(p+2)\dots(p+m)}.$$

Aufgabe 5*). Man soll den Wert des Integrals

$$\int_0^\infty \frac{x^{p-1} dx}{1+x}$$

berechnen, wenn $0 < p < 1$ ist.

Auflösung. Das vorgelegte Integral spielt bei verschiedenen Untersuchungen eine wichtige Rolle. Seine Berechnung bietet eine gewisse Schwierigkeit, weil die Funktion $\frac{x^{p-1}}{1+x}$ unter dem Integralzeichen für $x=0$ unendlich groß wird, und weil die obere Grenze des Integrals selbst unendlich groß ist. Das gesuchte Integral hat trotzdem im Sinne von § 51 und § 52 einen endlichen Wert, wie sogleich gezeigt werden soll.

Unter der Voraussetzung, daß p eine *rationale* Zahl ist, darf man

$$(41.) \quad p = \frac{m}{2n}, \text{ also } 2np = m$$

setzen, wobei $m < 2n$ ist und m und n *positive ganze Zahlen* sind; und zwar darf man annehmen, daß der Nenner eine *gerade* Zahl $2n$ ist; denn wäre das nicht der Fall, so könnte man den Zähler und den Nenner von p mit 2 multiplizieren. Einen anderen Faktor (außer 2) sollen aber m und $2n$ nicht *gemein* haben. Setzt man jetzt

$$(42.) \quad x = z^{2n}, \text{ also } dx = 2nz^{2n-1}dz, x^{p-1} = z^{m-2n},$$

so wird

$$(43.) \quad \int_0^\infty \frac{x^{p-1} dx}{1+x} = \int_0^\infty \frac{2nz^{m-1} dz}{1+z^{2n}}.$$

*) Der Anfänger darf die Behandlung dieser Aufgabe übergehen.

Dadurch ist die Funktion unter dem Integralzeichen eine *rationale* Funktion von z geworden, die man nach den Regeln der Partialbruchzerlegung integrieren kann. Die $2n$ Wurzeln der Gleichung

$$z^{2n} = -1 = e^{\pi i} = \cos \pi + i \sin \pi$$

sind nach D.-R., 12. Auflage, Formel Nr. 179 der Tabelle, wenn man der Kürze wegen

$$(44.) \quad \frac{(2h+1)\pi}{2n} = \varphi_h$$

setzt,

$$(45.) \quad z_h = e^{\varphi_h i} = \cos \varphi_h + i \sin \varphi_h$$

für $h = 0, 1, 2, 3, \dots, 2n-1$. Deshalb wird nach den Regeln der Partialbruchzerlegung

$$\frac{\varphi(z)}{f(z)} = \frac{2nz^{m-1}}{1+z^{2n}} = \sum_{h=0}^{h=2n-1} \frac{G_h + H_h i}{z - e^{\varphi_h i}},$$

$$G_h + H_h i = \frac{\varphi(e^{\varphi_h i})}{f'(e^{\varphi_h i})} = \frac{2ne^{(m-1)\varphi_h i}}{2ne^{(2n-1)\varphi_h i}} = -e^{m\varphi_h i},$$

weil

$$e^{2n\varphi_h i} = e^{(2h+1)\pi i} = -1$$

ist. Dies gibt

$$(46.) \quad \frac{2nz^{m-1}}{1+z^{2n}} = - \sum_{h=0}^{h=2n-1} \frac{e^{m\varphi_h i}}{z - e^{\varphi_h i}}.$$

Dieser Ausdruck läßt sich wieder auf eine reelle Form bringen. Da nämlich $e^{2\pi i} = 1$ wird, ist

$$(47.) \quad z_{2n-h-1} = e^{\frac{(4n-2h-1)\pi i}{2n}} = e^{-\frac{(2h+1)\pi i}{2n}},$$

d. h. die Wurzeln z_h und z_{2n-h-1} sind konjugiert komplexe Größen, und zwar wird

$$(48.) \quad z_h = \cos \varphi_h + i \sin \varphi_h, \quad z_{2n-h-1} = \cos \varphi_h - i \sin \varphi_h,$$

$$(49.) \quad (z - z_h)(z - z_{2n-h-1}) = (z - \cos \varphi_h)^2 + \sin^2 \varphi_h \\ = z^2 - 2z \cos \varphi_h + 1.$$

Gleichung (46.) geht daher über in

$$(50.) \quad \frac{2nz^{m-1}}{1+z^{2n}} = - \sum_{h=0}^{h=n-1} \left(\frac{e^{m\varphi_h i}}{z - e^{\varphi_h i}} + \frac{e^{-m\varphi_h i}}{z - e^{-\varphi_h i}} \right) \\ = - \sum_{h=0}^{h=n-1} \frac{2(z - \cos \varphi_h) \cos(m\varphi_h) - 2 \sin(m\varphi_h) \sin \varphi_h}{(z - \cos \varphi_h)^2 + \sin^2 \varphi_h}.$$

Indem man beide Seiten dieser Gleichung mit dz multipliziert und dann integriert, erhält man mit Hilfe der Formeln Nr. 43 und 18 der Tabelle

$$(51.) \int \frac{2nz^{n-1}dz}{1+z^{2n}} = - \sum_{h=0}^{h=n-1} \cos(m\varphi_h) \ln[(z - \cos\varphi_h)^2 + \sin^2\varphi_h] \\ + 2 \sum_{h=0}^{h=n-1} \sin(m\varphi_h) \operatorname{arctg} \left(\frac{z - \cos\varphi_h}{\sin\varphi_h} \right);$$

denn, wenn man

$$(z - \cos\varphi_h)^2 + \sin^2\varphi_h = y \quad \text{und} \quad z - \cos\varphi_h = t \sin\varphi_h$$

setzt, wird

$$\int \frac{2(z - \cos\varphi_h)dz}{(z - \cos\varphi_h)^2 + \sin^2\varphi_h} = \int \frac{dy}{y} = \ln y, \\ \int \frac{\sin\varphi_h dz}{(z - \cos\varphi_h)^2 + \sin^2\varphi_h} = \int \frac{dt}{1+t^2} = \operatorname{arctg} t.$$

Beim Einsetzen der Grenzen in Gleichung (51.) wird

$$(52.) \lim_{z=0} \ln[(z - \cos\varphi_h)^2 + \sin^2\varphi_h] = \lim_{z=0} \ln[z^2 - 2z\cos\varphi_h + 1] \\ = \ln 1 = 0.$$

Sodann wird, wenn man $z = \frac{1}{u}$ setzt,

$$(53.) \sum_{h=0}^{h=n-1} \cos(m\varphi_h) \ln(z^2 - 2z\cos\varphi_h + 1) \\ = \sum_{h=0}^{h=n-1} \cos(m\varphi_h) \ln \left(\frac{1 - 2u\cos\varphi_h + u^2}{u^2} \right) \\ = \sum_{h=0}^{h=n-1} \cos(m\varphi_h) \ln(1 - 2u\cos\varphi_h + u^2) - 2\ln u \sum_{h=0}^{h=n-1} \cos(m\varphi_h).$$

Aus der bekannten Formel

$$2\cos a \sin b = \sin(a+b) - \sin(a-b)$$

folgt hierbei, wenn man $a = m\varphi_h$ und $b = p\pi$ setzt*) und beachtet, daß $m = 2np$, also $m\varphi_h = (2h+1)p\pi$ wird,

$$2\sin(p\pi) \cos(m\varphi_h) = 2\sin(p\pi) \cos(2h+1)p\pi \\ = \sin(2h+2)p\pi - \sin(2hp\pi),$$

also für $h = 0, 1, 2, \dots, n-1$

*) Diese und einige der folgenden Untersuchungen werden etwas einfacher, wenn man die algebraischen Sätze über die Wurzeln der Gleichung $z^{2n} + 1 = 0$ zu Hilfe nimmt.

wobei der Wert der rechten Seite noch auszurechnen ist.
Aus der bekannten Formel

$$2 \sin a \sin b = \cos(a - b) - \cos(a + b)$$

folgt hierbei, wenn man wieder $a = m\varphi_h$ und $b = p\pi$ setzt,

$$(62.) \quad 2 \sin(m\varphi_h) \sin(p\pi) = 2 \sin(2h + 1)p\pi \sin(p\pi) = \\ \cos(2hp\pi) - \cos(2h + 2)p\pi,$$

also für $h = 0, 1, 2, \dots, n - 1$

$$2 \left(\frac{\pi}{2} - \varphi_0 \right) \sin(p\pi) \sin(m\varphi_0) = \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2n} \right) [1 - \cos(2p\pi)],$$

$$2 \left(\frac{\pi}{2} - \varphi_1 \right) \sin(p\pi) \sin(m\varphi_1) = \left(\frac{\pi}{2} - \frac{3\pi}{2n} \right) [\cos(2p\pi) - \cos(4p\pi)],$$

$$2 \left(\frac{\pi}{2} - \varphi_2 \right) \sin(p\pi) \sin(m\varphi_2) = \left(\frac{\pi}{2} - \frac{5\pi}{2n} \right) [\cos(4p\pi) - \cos(6p\pi)],$$

.....

$$2 \left(\frac{\pi}{2} - \varphi_{n-1} \right) \sin(p\pi) \sin(m\varphi_{n-1}) = \\ \left(\frac{\pi}{2} - \frac{(2n-1)\pi}{2n} \right) [\cos(2n-2)p\pi - \cos(2np\pi)].$$

Durch Addition dieser Gleichungen findet man

$$(63.) \quad 2 \sin(p\pi) \sum_{h=0}^{h=n-1} \left(\frac{\pi}{2} - \varphi_h \right) \sin(m\varphi_h) = \\ \frac{(n-1)\pi}{2n} [1 + \cos(2np\pi)] - \frac{\pi}{n} \sum_{h=1}^{h=n-1} \cos(2hp\pi).$$

Dabei ist

$$(64.) \quad \cos(2np\pi) = \cos(m\pi) = (-1)^m.$$

Um noch $\sum \cos(2hp\pi)$ zu berechnen, setzt man in

$$2 \cos a \sin b = \sin(a + b) - \sin(a - b),$$

$a = 2hp\pi$ und $b = p\pi$, und erhält

$$2 \sin(p\pi) \cos(2hp\pi) = \sin(2h + 1)p\pi - \sin(2h - 1)p\pi,$$

also für $h = 1, 2, 3, \dots, n - 1$

$$2 \sin(p\pi) \cos(2p\pi) = \sin(3p\pi) - \sin(p\pi),$$

$$2 \sin(p\pi) \cos(4p\pi) = \sin(5p\pi) - \sin(3p\pi),$$

$$2 \sin(p\pi) \cos(6p\pi) = \sin(7p\pi) - \sin(5p\pi),$$

.....

$$2 \sin(p\pi) \cos(2n-2)p\pi = \sin(2n-1)p\pi - \sin(2n-3)p\pi.$$

Durch Addition dieser Gleichungen erhält man

$$2 \sin(p\pi) \sum_{h=1}^{h=n-1} \cos(2hp\pi) = \sin(2n-1)p\pi - \sin(p\pi).$$

Dabei ist

$$\sin(2n-1)p\pi = \sin(2np\pi) \cos(p\pi) - \cos(2np\pi) \sin(p\pi),$$

oder, da

$$\sin(2np\pi) = \sin(m\pi) = 0, \quad \cos(2np\pi) = \cos(m\pi) = (-1)^m$$

ist,

$$\sin(2n-1)p\pi = -(-1)^m \sin(p\pi),$$

also

$$2 \sin(p\pi) \sum_{h=1}^{h=n-1} \cos(2hp\pi) = -\sin(p\pi)[(-1)^m + 1],$$

oder, da $\sin(p\pi) \geq 0$ ist,

$$(65.) \quad 2 \sum_{h=0}^{h=n-1} \cos(2hp\pi) = -[1 + (-1)^m].$$

Deshalb geht Gleichung (63.) über in

$$(66.) \quad 2 \sin(p\pi) \sum_{h=0}^{h=n-1} \left(\frac{\pi}{2} - \varphi_h \right) \sin(m\varphi_h) \\ = \frac{(n-1)\pi}{2n} [1 + (-1)^m] + \frac{\pi}{2n} [1 + (-1)^m] \\ = \frac{\pi}{2} [1 + (-1)^m].$$

Da $\sin(p\pi) \geq 0$ ist, findet man daher aus Gleichung (61.) den gesuchten Grenzwert, nämlich

$$(67.) \quad 2 \lim_{z \rightarrow 1} \sum_{h=0}^{h=n-1} \sin(m\varphi_h) \operatorname{arctg} \left(\frac{z - \cos \varphi_h}{\sin \varphi_h} \right) \\ = -\frac{\pi}{2 \sin(p\pi)} [1 + (-1)^m].$$

Es bleibt noch übrig, den Wert der Summe für $z = \infty$ zu berechnen. Dabei ergibt sich

$$(68.) \quad 2 \lim_{z \rightarrow \infty} \sum_{h=0}^{h=n-1} \sin(m\varphi_h) \operatorname{arctg} \left(\frac{z - \cos \varphi_h}{\sin \varphi_h} \right) \\ = 2 \sum_{h=0}^{h=n-1} \sin(m\varphi_h) \operatorname{arctg} \infty = \pi \sum_{h=0}^{h=n-1} \sin(m\varphi_h).$$

Nun ist aber nach Gleichung (62.)

$$2 \sin(m\varphi_h) \sin(p\pi) = \cos(2hp\pi) - \cos(2h+2)p\pi,$$

folglich erhält man für $h = 0, 1, 2, \dots, n-1$

$$2\sin(p\pi)\sin(m\varphi_0) = 1 - \cos(2p\pi),$$

$$2\sin(p\pi)\sin(m\varphi_1) = \cos(2p\pi) - \cos(4p\pi),$$

$$2\sin(p\pi)\sin(m\varphi_2) = \cos(4p\pi) - \cos(6p\pi),$$

$$\begin{aligned} \dots\dots\dots \\ 2\sin(p\pi)\sin(m\varphi_{n-1}) &= \cos(2n-2)p\pi - \cos(2np\pi) \\ &= \cos(2n-2)p\pi - \cos(m\pi) \\ &= \cos(2n-2)p\pi - (-1)^m. \end{aligned}$$

Durch Addition dieser Gleichungen findet man daher

$$2\sin(p\pi) \sum_{h=0}^{h=n-1} \sin(m\varphi_h) = 1 - (-1)^m,$$

oder, da $\sin(p\pi) \geq 0$ ist,

$$(69.) \quad \sum_{h=0}^{h=n-1} \sin(m\varphi_h) = \frac{1 - (-1)^m}{2\sin(p\pi)}.$$

Deshalb geht Gleichung (68.) über in

$$\begin{aligned} (70.) \quad 2 \lim_{z \rightarrow \infty} \sum_{h=0}^{h=n-1} \sin(m\varphi_h) \arctg\left(\frac{z - \cos \varphi_h}{\sin \varphi_h}\right) \\ = \frac{\pi}{2\sin(p\pi)} [1 - (-1)^m], \end{aligned}$$

womit der letzte der vier zu bestimmenden Grenzwerte gefunden ist. Berücksichtigt man also die Gleichungen (52.), (57.), (67.) und (70.), so folgt aus Gleichung (51.)

$$\begin{aligned} (71.) \quad \int_0^{\infty} \frac{2nz^{m-1}dz}{1+z^{2n}} \\ = \frac{\pi}{2\sin(p\pi)} [1 - (-1)^m] + \frac{\pi}{2\sin(p\pi)} [1 + (-1)^m] = \frac{\pi}{\sin(p\pi)}, \end{aligned}$$

oder das gesuchte Integral

$$(72.) \quad \int_0^{\infty} \frac{x^{p-1}dx}{1+x} = \frac{\pi}{\sin(p\pi)}.$$

Aufgabe 6*). Man soll das Integral

$$\int_0^1 \frac{(x^{p-1} - x^{-p})dx}{1-x}$$

berechnen, wenn wieder $0 < p < +1$ ist.

*) Der Anfänger darf die Behandlung dieser Aufgabe übergehen.

Auflösung. Unter der Voraussetzung, daß auch hier p eine *rationale* Zahl ist, darf man wieder

$$(73.) \quad p = \frac{m}{2n}, \text{ also } 2np = m$$

setzen, wobei $m < 2n$ ist, und m und n *positive ganze Zahlen* sind. Dann sei wieder

$$x = z^{2n}, \text{ also } dx = 2nz^{2n-1}dz, \quad x^{p-1} = z^{m-2n}, \quad x^{-p} = z^{-m},$$

also

$$(74.) \quad \int_0^1 \frac{(x^{p-1} - x^{-p})dx}{1-x} = \int_0^1 \frac{2n(z^{m-1} - z^{2n-m-1})dz}{1-z^{2n}}.$$

Jetzt steht wieder unter dem Integralzeichen eine echt gebrochene *rationale* Funktion $\frac{\varphi(z)}{f(z)}$, die man mit Hilfe der Partialbruchzerlegung integrieren kann. Die Wurzeln der Gleichung $z^{2n} = 1$ sind

$$z_h = e^{\frac{h\pi i}{n}} \quad \text{für } h = 0, 1, 2, \dots, 2n-1;$$

deshalb wird

$$\frac{\varphi(z)}{f(z)} = \frac{2n(z^{m-1} - z^{2n-m-1})}{1-z^{2n}} = \sum_{h=0}^{h=2n-1} \frac{G_h + H_h i}{z - z_h}.$$

Da $z_h^{2n} = 1$ ist, wird dabei

$$G_h + H_h i = \frac{\varphi(z_h)}{f'(z_h)} = - \frac{z_h^{m-1} - z_h^{2n-m-1}}{z_h^{2n-1}} = - (z_h^m - z_h^{-m}),$$

oder, wenn man der Kürze wegen

$$(75.) \quad \frac{h\pi}{n} = \varphi_h, \text{ also } z_h = e^{\varphi_h i}$$

setzt,

$$G_h + H_h i = - (e^{m\varphi_h i} - e^{-m\varphi_h i}) = - 2i \sin(m\varphi_h).$$

Dies gibt

$$(76.) \quad \frac{2n(z^{m-1} - z^{2n-m-1})}{1-z^{2n}} = - 2i \sum_{h=0}^{h=2n-1} \frac{\sin(m\varphi_h)}{z - z_h}.$$

Da Zähler und Nenner des Bruches auf der linken Seite dieser Gleichung den gemeinsamen Faktor $1 - z^2$ haben, verschwinden auf der rechten Seite dieser Gleichung die Partialbrüche für $h = 0$ und $h = n$. Dabei ist $z_0 = +1$

und $z_n = -1$. Die Zurückführung auf reelle Größen wird dadurch herbeigeführt, daß

$$(77.) \quad z_{2n-h} = e^{\frac{(2n-h)\pi i}{n}} = e^{-\frac{h\pi i}{n}} = e^{-\varphi_h i}$$

ist, daß also

$$(77a.) \quad z_h = \cos \varphi_h + i \sin \varphi_h \quad \text{und} \quad z_{2n-h} = \cos \varphi_h - i \sin \varphi_h$$

konjugiert komplexe Größen sind. Deshalb wird

$$\begin{aligned} \frac{\sin(m\varphi_h)}{z - z_h} + \frac{\sin(m\varphi_{2n-h})}{z - z_{2n-h}} &= \sin(m\varphi_h) \left(\frac{1}{z - z_h} - \frac{1}{z - z_{2n-h}} \right) \\ &= \sin(m\varphi_h) \frac{2i \sin \varphi_h}{(z - \cos \varphi_h)^2 + \sin^2 \varphi_h}, \end{aligned}$$

und Gleichung (76.) geht über in

$$(78.) \quad \frac{2n(z^m - z^{2n-m-1})}{1 - z^{2n}} = 4 \sum_{h=1}^{h=n-1} \frac{\sin(m\varphi_h) \sin \varphi_h}{(z - \cos \varphi_h)^2 + \sin^2 \varphi_h}.$$

Setzt man

$$z - \cos \varphi_h = t \sin \varphi_h,$$

so wird

$$\int \frac{\sin \varphi_h \cdot dz}{(z - \cos \varphi_h)^2 + \sin^2 \varphi_h} = \int \frac{dt}{1+t^2} = \operatorname{arctg} t.$$

Deshalb findet man, indem man beide Seiten der Gleichung (78.) mit dz multipliziert und dann integriert,

$$\begin{aligned} (79.) \quad \int_0^1 \frac{2n(z^m - z^{2n-m-1})dz}{1 - z^{2n}} &= 4 \left[\sum_{h=1}^{h=n-1} \sin(m\varphi_h) \operatorname{arctg} \left(\frac{z - \cos \varphi_h}{\sin \varphi_h} \right) \right]_0^1 \\ &= 4 \sum_{h=1}^{h=n-1} \sin(m\varphi_h) \left[\operatorname{arctg} \left(\frac{1 - \cos \varphi_h}{\sin \varphi_h} \right) + \operatorname{arctg}(\operatorname{ctg} \varphi_h) \right]. \end{aligned}$$

Zur Vereinfachung dieses Ausdruckes setze man

$$(80.) \quad \operatorname{arctg} \left(\frac{1 - \cos \varphi_h}{\sin \varphi_h} \right) = \alpha_h \quad \text{und} \quad \operatorname{arctg}(\operatorname{ctg} \varphi_h) = \beta_h,$$

dann wird

$$\operatorname{tg} \alpha_h = \frac{1 - \cos \varphi_h}{\sin \varphi_h} = \operatorname{tg} \left(\frac{\varphi_h}{2} \right), \quad \text{also} \quad \alpha_h = \frac{\varphi_h}{2},$$

$$\operatorname{tg} \beta_h = \operatorname{ctg} \varphi_h = \operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{2} - \varphi_h \right), \quad \text{also} \quad \beta_h = \frac{\pi}{2} - \varphi_h.$$

$$\alpha_h + \beta_h = \frac{\pi}{2} - \frac{\varphi_h}{2},$$

folglich wird

$$(81.) \int_0^1 \frac{2n(z^{2n} - z^{2n-m-1})dz}{1 - z^{2n}} = 2 \sum_{h=1}^{h=n-1} (\pi - \varphi_h) \sin(m\varphi_h).$$

Zur Berechnung der rechten Seite beachte man, daß

$$m\varphi_h = \frac{mh\pi}{n} = 2hp\pi$$

ist, und daß deshalb

$$(82.) \quad 2\sin(p\pi) \sin(m\varphi_h) = 2\sin(p\pi) \sin(2hp\pi) \\ = \cos(2h-1)p\pi - \cos(2h+1)p\pi$$

wird. Dies gibt für $h = 1, 2, 3, \dots (n-1)$

$$2(\pi - \varphi_1) \sin(p\pi) \sin(m\varphi_1) = \left(\pi - \frac{\pi}{n}\right) [\cos(p\pi) - \cos(3p\pi)],$$

$$2(\pi - \varphi_2) \sin(p\pi) \sin(m\varphi_2) = \left(\pi - \frac{2\pi}{n}\right) [\cos(3p\pi) - \cos(5p\pi)],$$

$$2(\pi - \varphi_3) \sin(p\pi) \sin(m\varphi_3) = \left(\pi - \frac{3\pi}{n}\right) [\cos(5p\pi) - \cos(7p\pi)].$$

$$\dots \dots \dots \\ 2(\pi - \varphi_{n-1}) \sin(p\pi) \sin(m\varphi_{n-1}) \\ = \left(\pi - \frac{(n-1)\pi}{n}\right) [\cos(2n-3)p\pi - \cos(2n-1)p\pi].$$

Durch Summation folgt hieraus

$$(83.) \quad 2\sin(p\pi) \sum_{h=1}^{h=n-1} (\pi - \varphi_h) \sin(m\varphi_h) \\ = \pi \cos(p\pi) - \frac{\pi}{n} \sum_{h=1}^{h=n} \cos(2h-1)p\pi,$$

wobei jetzt nur noch die einfachere rechts stehende Summe zu berechnen ist. Aus

$$2\sin(p\pi) \cos(2h-1)p\pi = \sin(2hp\pi) - \sin(2h-2)p\pi,$$

ergibt sich

$$2\sin(p\pi) \cos(p\pi) = \sin(2p\pi),$$

$$2\sin(p\pi) \cos(3p\pi) = \sin(4p\pi) - \sin(2p\pi),$$

$$2\sin(p\pi) \cos(5p\pi) = \sin(6p\pi) - \sin(4p\pi),$$

$$\dots \dots \dots$$

$$2\sin(p\pi) \cos(2n-1)p\pi = \sin(2np\pi) - \sin(2n-2)p\pi,$$

folglich wird, da $\sin(2np\pi) = \sin(m\pi) = 0$ ist,

$$2\sin(p\pi) \sum_{h=1}^{h=n} \cos(2h-1)p\pi = 0, \text{ also auch } \sum_{h=1}^{h=n} \cos(2h-1)p\pi = 0,$$

da $\sin(p\pi) \geq 0$ ist. Gleichung (83.) geht daher über in

$$(84.) \quad 2 \sin(p\pi) \sum_{h=1}^{h=n-1} (\pi - \varphi_h) \sin(m\varphi_h) = \pi \cos(p\pi),$$

oder

$$(85.) \quad 2 \sum_{h=1}^{h=n-1} (\pi - \varphi_h) \sin(m\varphi_h) = \pi \operatorname{ctg}(p\pi).$$

Deshalb findet man aus Gleichung (81.) und (74.)

$$(86.) \quad \int_0^1 \frac{2n(z^{m-1} - z^{2n-m-1})dz}{1 - z^{2n}} = \int_0^1 \frac{(x^{p-1} - x^{-p})dx}{1 - x} = \pi \operatorname{ctg}(p\pi).$$

§ 65.

Darstellung der Funktionen $\operatorname{tg} x$, $\operatorname{ctg} x$, **$\frac{1}{\sin x}$ und $\frac{1}{\cos x}$ durch unendliche Partialbruch-Reihen.**

(Vergl. die Formel-Tabelle Nr. 198 bis 201.)

Die im vorigen Paragraphen zuletzt gefundene Formel

$$(1.) \quad \int_0^1 \frac{(x^{p-1} - x^{-p})dx}{1 - x} = \pi \operatorname{ctg}(p\pi) \quad \text{für } 0 < p < +1$$

kann man zur Herleitung einer bemerkenswerten Reihenentwicklung der Funktionen $\operatorname{tg} x$, $\operatorname{ctg} x$, $\frac{1}{\sin x}$ und $\frac{1}{\cos x}$ benutzen. Bekanntlich ist

$$1 + x + x^2 + \dots + x^{v-1} = \frac{1 - x^v}{1 - x},$$

oder

$$\frac{1}{1 - x} = 1 + x + x^2 + \dots + x^{v-1} + \frac{x^v}{1 - x},$$

also

$$(2.) \quad \frac{x^{p-1} - x^{-p}}{1 - x} = (x^{p-1} - x^{-p}) + (x^p - x^{1-p}) + (x^{1+p} - x^{2-p}) \\ + \dots + (x^{v+p-2} - x^{v-p-1}) + \frac{x^v(x^{p-1} - x^{-p})}{1 - x}.$$

Multipliziert man beide Seiten dieser Gleichung mit dx und integriert zwischen den Grenzen 0 und 1, so erhält man mit Rücksicht auf Gleichung (1.)

$$\pi \operatorname{ctg}(p\pi) = \left[\left(\frac{x^p}{p} - \frac{x^{1-p}}{1-p} \right) + \left(\frac{x^{1+p}}{1+p} - \frac{x^{2-p}}{2-p} \right) + \left(\frac{x^{2+p}}{2+p} - \frac{x^{3-p}}{3-p} \right) \right. \\ \left. + \dots + \left(\frac{x^{v+p-1}}{v+p-1} - \frac{x^{v-p}}{v-p} \right) \right]_0^1 + R,$$

oder

$$(3.) \pi \operatorname{ctg}(p\pi) = \left(\frac{1}{p} - \frac{1}{1-p} \right) + \left(\frac{1}{1+p} - \frac{1}{2-p} \right) + \left(\frac{1}{2+p} - \frac{1}{3-p} \right) \\ + \dots + \left(\frac{1}{v+p-1} - \frac{1}{v-p} \right) + R,$$

wobei

$$(4.) \quad R = \int_0^1 \frac{x^v(x^{p-1} - x^{-p})dx}{1-x}$$

ist. Da $0 < p < +1$ ist, darf man zur Berechnung von R wieder

$$(5.) \quad p = \frac{m}{2n}, \text{ also } 2np = m$$

setzen, wobei $m < 2n$, und m und n positive ganze Zahlen sind. Sodann sei wieder

$$(6.) \quad x = z^{2n}, \text{ also } dx = 2nz^{2n-1}dz, \quad x^{p-1} = z^{m-2n}, \quad x^{-p} = z^{-m};$$

dies gibt

$$(7.) \quad R = 2n \int_0^1 \frac{z^{2nv}(z^{m-1} - z^{2n-m-1})dz}{1-z^{2n}}.$$

Die Funktion $f(z)$ unter dem Integralzeichen kann man schreiben:

$$f(z) = \frac{z^{2nv+m-1}(1 - z^{2n-2m})}{1 - z^{2n}}.$$

Danach muß man jetzt zwei Fälle unterscheiden, je nachdem n größer oder kleiner als m ist. Im ersten Falle ($n > m$) wird die Funktion $f(z)$, wenn man Zähler und Nenner durch $1 - z^2$ dividiert,

$$(8.) \quad f(z) = \frac{z^{2nv+m-1}(1 + z^2 + z^4 + \dots + z^{2n-2m-2})}{1 + z^2 + z^4 + \dots + z^{2n-2}},$$

und daraus ergibt sich, daß $f(z)$ für alle Werte von z zwischen 0 und 1 gleich oder größer ist als Null. Dabei ist $1 + z^2 + z^4 + \dots + z^{2n-2m-2} \leq n - m$, $1 + z^2 + z^4 + \dots + z^{2n-2} \geq 1$, folglich wird

$$(9.) \quad 0 \leq f(z) \leq (n-m)z^{2nv+m-1},$$

also

$$(10.) \quad 0 < R < 2n(n-m) \int_0^1 z^{2nv+m-1} dz = \frac{2n(n-m)}{2nv+m}.$$

Für hinreichend große Werte von v wird daher R beliebig klein.

Im zweiten Falle ($n < m$) wird

$$(11.) \quad f(z) = \frac{z^{2nv+2n-m-1}(z^{2m-2n}-1)}{1-z^{2n}} \\ = -\frac{z^{2nv+2n-m-1}(1+z^2+z^4+\dots+z^{2m-2n-2})}{1+z^2+z^4+\dots+z^{2n-2}},$$

und daraus ergibt sich, daß in diesem Falle $f(z)$ für alle Werte von z zwischen 0 und 1 gleich oder kleiner ist als Null. Dabei wird

$$(12.) \quad 0 \geq f(z) \geq -(m-n)z^{2nv+2n-m-1},$$

folglich ist

$$(13.) \quad 0 > R > -2n(m-n) \int_0^1 z^{2nv+2n-m-1} dz = -\frac{2n(m-n)}{2n(v+1)-m}.$$

Also auch in diesem Falle wird der absolute Betrag von R beliebig klein für hinreichend große Werte von v . Man darf daher das Restglied R in Gleichung (3.) vernachlässigen, wenn man v ins Unbegrenzte wachsen läßt; es wird also für rationale Werte von p

$$(14.) \quad \pi \operatorname{ctg}(p\pi) = \frac{1}{p} - \left(\frac{1}{1-p} - \frac{1}{1+p} \right) - \left(\frac{1}{2-p} - \frac{1}{2+p} \right) \\ - \left(\frac{1}{3-p} - \frac{1}{3+p} \right) - \dots$$

Dies gibt, wenn man $p\pi$ gleich x setzt,

$$(15.) \quad \operatorname{ctg} x = \frac{1}{x} - \left(\frac{1}{\pi-x} - \frac{1}{\pi+x} \right) - \left(\frac{1}{2\pi-x} - \frac{1}{2\pi+x} \right) \\ - \left(\frac{1}{3\pi-x} - \frac{1}{3\pi+x} \right) - \dots,$$

und wenn man $p\pi = \frac{\pi}{2} - x$ setzt,

$$(16.) \quad \operatorname{tg} x = \left(\frac{1}{\frac{\pi}{2} - x} - \frac{1}{\frac{\pi}{2} + x} \right) + \left(\frac{1}{\frac{3\pi}{2} - x} - \frac{1}{\frac{3\pi}{2} + x} \right) \\ + \left(\frac{1}{\frac{5\pi}{2} - x} - \frac{1}{\frac{5\pi}{2} + x} \right) + \dots$$

Da p zwischen 0 und 1 liegt, so gilt Gleichung (15.) zunächst nur für Werte von x zwischen 0 und π . Vertauscht man aber x mit $\pi + x$, so hat die linke Seite der Gleichung wieder den Wert $\operatorname{ctg} x$, während sich auf der rechten Seite nur die Reihenfolge der Glieder ändert. Deshalb gilt Gleichung (15.) für alle endlichen Werte von x mit Ausnahme der Werte 0, $\pm \pi$, $\pm 2\pi$, $\pm 3\pi$, ...

In ähnlicher Weise kann man zeigen, daß Gleichung (16.) für alle endlichen Werte von x gilt mit Ausnahme der Werte $\pm \frac{\pi}{2}$, $\pm \frac{3\pi}{2}$, $\pm \frac{5\pi}{2}$, ...

Aus der trigonometrischen Formel

$$\frac{1}{\sin x} = \frac{\sin^2\left(\frac{x}{2}\right) + \cos^2\left(\frac{x}{2}\right)}{2 \sin\left(\frac{x}{2}\right) \cos\left(\frac{x}{2}\right)} = \frac{1}{2} \operatorname{tg}\left(\frac{x}{2}\right) + \frac{1}{2} \operatorname{ctg}\left(\frac{x}{2}\right)$$

folgt sodann noch

$$(17.) \quad \frac{1}{\sin x} = \frac{1}{x} + \left(\frac{1}{\pi - x} - \frac{1}{\pi + x} \right) - \left(\frac{1}{2\pi - x} - \frac{1}{2\pi + x} \right) \\ + \left(\frac{1}{3\pi - x} - \frac{1}{3\pi + x} \right) - + \dots,$$

und wenn man x mit $\frac{\pi}{2} - x$ vertauscht,

$$(18.) \quad \frac{1}{\cos x} = \left(\frac{1}{\frac{\pi}{2} - x} + \frac{1}{\frac{\pi}{2} + x} \right) - \left(\frac{1}{\frac{3\pi}{2} - x} + \frac{1}{\frac{3\pi}{2} + x} \right) \\ + \left(\frac{1}{\frac{5\pi}{2} - x} + \frac{1}{\frac{5\pi}{2} + x} \right) - + \dots$$

Die Gleichungen (15.) bis (18.) geben für die transzendenten Funktionen $\operatorname{ctg} x$, $\operatorname{tg} x$, $\frac{1}{\sin x}$, $\frac{1}{\cos x}$ eine Darstellung durch unendliche Partialbruch-Reihen, die der Partialbruchzerlegung bei den gebrochenen rationalen Funktionen analog ist.

§ 66.

Darstellung der Koeffizienten einer trigonometrischen oder *Fourierschen* Reihe.

(Vergl. die Formel-Tabelle Nr. 202 und 203.)

Sind die beiden positiven ganzen Zahlen m und n voneinander verschieden, so wird

$$(1.) \quad \int_0^{\pi} \cos(m-n)x \cdot dx = \frac{1}{m-n} [\sin(m-n)x]_0^{\pi} = 0,$$

$$(2.) \quad \int_0^{\pi} \cos(m+n)x \cdot dx = \frac{1}{m+n} [\sin(m+n)x]_0^{\pi} = 0.$$

Beachtet man die beiden bekannten Formeln

$$(3.) \quad \begin{cases} \cos(a-b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b, \\ \cos(a+b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b, \end{cases}$$

so findet man durch Addition und Subtraktion der Gleichungen (1.) und (2.) für $m \geq n$

$$(4.) \quad \int_0^{\pi} \cos(mx) \cos(nx) dx = 0,$$

$$(5.) \quad \int_0^{\pi} \sin(mx) \sin(nx) dx = 0.$$

Dagegen geht Gleichung (1.) für $m = n$ über in

$$(1a.) \quad \int_0^{\pi} \cos(m-n)x \cdot dx = \int_0^{\pi} dx = \pi,$$

während Gleichung (2.) auch noch für $m = n$ richtig bleibt; folglich wird für $m = n > 1$

$$(6.) \quad \int_0^{\pi} \cos(mx) \cos(nx) dx = \int_0^{\pi} \cos^2(nx) dx = \frac{\pi}{2},$$

$$(7.) \quad \int_0^{\pi} \sin(mx) \sin(nx) dx = \int_0^{\pi} \sin^2(nx) dx = \frac{\pi}{2}.$$

Diese Formeln kann man zur Berechnung der zunächst noch unbekannten Koeffizienten $a_0, a_1, a_2, a_3, \dots$ der *trigonometrischen* Reihe

$$(8.) \quad f(x) = \frac{1}{2}a_0 + a_1 \cos x + a_2 \cos(2x) + \dots + a_n \cos(nx) + \dots$$

benutzen, wenn man weiß, daß sich die Funktion $f(x)$ für Werte von x zwischen 0 und π in eine solche Reihe entwickeln läßt, und daß die Reihe gleichmäßig konvergent ist.

Multipliziert man nämlich Gleichung (8.) mit dx und integriert auf beiden Seiten zwischen den Grenzen 0 und π , so erhält man, da die Reihe gleichmäßig konvergent ist und deshalb gliedweise integriert werden darf,

$$(9.) \quad \int_0^\pi f(x) dx = \frac{a_0}{2} \int_0^\pi dx = \frac{a_0 \pi}{2}, \quad \text{oder} \quad a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi f(x) dx,$$

denn $\int_0^\pi \cos(nx) dx$ verschwindet für $n > 0$. Multipliziert man beide Seiten der Gleichung (8.) mit $\cos(nx) dx$ und integriert zwischen den Grenzen 0 und π , so erhält man mit Rücksicht auf die Gleichungen (4.) und (6.)

$$(10.) \quad \int_0^\pi f(x) \cos(nx) dx = a_n \int_0^\pi \cos^2(nx) dx = a_n \frac{\pi}{2},$$

oder

$$(10a.) \quad a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi f(x) \cos(nx) dx.$$

Betrachtet man auch Werte von x , die außerhalb des Intervalles von 0 bis π liegen, so erkennt man, daß $f(x)$ eine *gerade* Funktion ist, die sich nicht ändert, wenn man x mit $-x$ oder mit $2\pi - x$ vertauscht, d. h. es ist

$$(11.) \quad f(2\pi - x) = f(-x) = f(x);$$

deshalb findet man aus Gleichung (9.) und (10a.), indem man die Integrations-Veränderliche t nennt und dann $t = 2\pi - x$ setzt,

$$(12.) \quad a_1 = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi f(t) dt = - \frac{2}{\pi} \int_{2\pi}^\pi f(2\pi - x) dx = \frac{2}{\pi} \int_\pi^{2\pi} f(x) dx,$$

$$\begin{aligned}
 (13.) \quad a_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(t) \cos(nt) dt = -\frac{2}{\pi} \int_{2\pi}^{\pi} f(2\pi - x) \cos(nx) dx \\
 &= \frac{2}{\pi} \int_{\pi}^{2\pi} f(x) \cos(nx) dx;
 \end{aligned}$$

folglich ergibt sich durch Addition der Gleichungen (9.) und (12.), bezw. der Gleichungen (10a.) und (13.)

$$(14.) \quad a_0 = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) dx, \quad a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos(nx) dx.$$

Weiß man, daß sich $f(x)$ in eine gleichmäßig konvergente Reihe von der Form

$$(15.) \quad f(x) = b_1 \sin x + b_2 \sin(2x) + \dots + b_n \sin(nx) + \dots$$

entwickeln läßt, solange x zwischen den Grenzen 0 und π liegt, so darf die Reihe gliedweise integriert werden, und man erhält mit Rücksicht auf die Gleichungen (5.) und (7.)

$$(16.) \quad \int_0^{\pi} f(x) \sin(nx) dx = b_n \int_0^{\pi} \sin^2(nx) dx = b_n \cdot \frac{\pi}{2},$$

oder

$$(16a.) \quad b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin(nx) dx.$$

In diesem Falle kann man $f(x)$ als eine *ungerade* Funktion betrachten, die nur ihr Zeichen wechselt, wenn man x mit $-x$ oder mit $2\pi - x$ vertauscht, d. h. es ist

$$(17.) \quad f(2\pi - x) = f(-x) = -f(x).$$

Deshalb findet man aus Gleichung (16a.), indem man die Integrations-Veränderliche t nennt und dann $t = 2\pi - x$ setzt,

$$\begin{aligned}
 (18.) \quad b_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(t) \sin(nt) dt = -\frac{2}{\pi} \int_{2\pi}^{\pi} f(x) \sin(nx) dx \\
 &= \frac{2}{\pi} \int_{\pi}^{2\pi} f(x) \sin(nx) dx,
 \end{aligned}$$

also durch Addition zu Gleichung (16a.)

$$(19.) \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \sin(nx) dx.$$

Weiß man endlich, daß sich $f(x)$ in eine gleichmäßig konvergente Reihe von der Form

$$(20.) \quad f(x) = \frac{1}{2}a_0 + a_1 \cos x + a_2 \cos(2x) + \dots \\ + b_1 \sin x + b_2 \sin(2x) + \dots$$

entwickeln läßt, solange x zwischen den Grenzen 0 und 2π liegt, so wird mit Rücksicht darauf, daß

$$(21.) \quad \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} [\sin(m+n)x + \sin(m-n)x] dx = \int_0^{2\pi} \sin(mx) \cos(nx) dx = 0$$

ist, gleichviel ob m und n voneinander verschieden sind oder nicht,

$$(22.) \quad a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos(nx) dx, \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \sin(nx) dx.$$

Dies gibt den Satz: *In jeder trigonometrischen Reihe*

$$\frac{1}{2}a_0 + \sum_{n=1}^{n=\infty} [a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)],$$

welche in dem Intervalle von 0 bis 2π gleichmäßig konvergent ist und dort eine Funktion von $f(x)$ darstellt, haben die Koeffizienten a_n und b_n die Werte

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos(nx) dx, \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \sin(nx) dx.$$

Aus den bekannten Gleichungen

$$\cos(x \pm 2\pi) = \cos x, \quad \sin(x \pm 2\pi) = \sin x, \\ \cos(2x \pm 4\pi) = \cos(2x), \quad \sin(2x \pm 4\pi) = \sin(2x),$$

ergibt sich, daß eine solche, im Intervalle von 0 bis 2π gleichmäßig konvergente trigonometrische Reihe auch für alle Werte von x gleichmäßig konvergent ist und ihren Wert nicht ändert, wenn man die Veränderliche x um ein Vielfaches von 2π vermehrt oder vermindert, d. h. die Werte der Funktion $f(x)$, welche für alle Werte von x durch die Reihe erklärt ist, wiederholen sich periodisch. Deshalb nennt man solche Reihen auch „*periodische Reihen*“ und benutzt sie zur Darstellung solcher Vorgänge, die sich periodisch

wiederholen, wie z. B. bei Dampfmaschinen, Dynamo-Maschinen usw.

Dabei ist es nicht erforderlich, daß die Periode gerade 2π ist. Indem man x mit $\frac{2\pi x}{c}$ vertauscht, geht Gleichung (20.) über in

$$(23.) \quad f(x) = \frac{1}{2}a_0 + a_1 \cos\left(\frac{2\pi x}{c}\right) + a_2 \cos\left(\frac{4\pi x}{c}\right) + \dots \\ + b_1 \sin\left(\frac{2\pi x}{c}\right) + b_2 \sin\left(\frac{4\pi x}{c}\right) + \dots$$

Die Gleichungen (14.) und (19.) gehen dann über in

$$(24.) \quad a_0 = \frac{2}{c} \int_0^c f(x) dx, \quad a_n = \frac{2}{c} \int_0^c f(x) \cos\left(\frac{2n\pi x}{c}\right) dx,$$

$$(25.) \quad b_n = \frac{2}{c} \int_0^c f(x) \sin\left(\frac{2n\pi x}{c}\right) dx.$$

Dadurch erreicht man es, daß die Periode gleich c wird. Auch den Beginn der Periode, die sogenannte „*Phasen-Konstante*“, kann man noch beliebig festsetzen. Soll nämlich die Periode nicht mit x gleich Null, sondern mit x gleich a beginnen und das Intervall von a bis b umfassen, so vertausche man in Gleichung (20.) x mit $\frac{2\pi(x-a)}{b-a}$.

Dadurch erhält man

$$(26.) \quad f(x) = \frac{1}{2}a_0 + a_1 \cos\left(\frac{2\pi(x-a)}{b-a}\right) + a_2 \cos\left(\frac{4\pi(x-a)}{b-a}\right) + \dots \\ + b_1 \sin\left(\frac{2\pi(x-a)}{b-a}\right) + b_2 \sin\left(\frac{4\pi(x-a)}{b-a}\right) + \dots$$

Diese Gleichung geht aber dadurch, daß man die Y -Achse um die Strecke a parallel zu sich selbst verschiebt und $b-a$ gleich c setzt, wieder in die Gleichung (23.) über. Durch eine Verschiebung der Koordinaten-Achsen wird man häufig eine Vereinfachung der trigonometrischen Reihe erreichen.

Eine solche Vereinfachung der trigonometrischen Reihe tritt z. B. ein, wenn die Funktion $f(x)$ eine *gerade* oder eine *ungerade* Funktion ist; denn es gelten die folgenden Sätze:

1. Ist $f(x)$ eine gerade Funktion, ist also

$$f(-x) = +f(x),$$

so findet man aus Gleichung (20.) oder (23.), daß in diesem Falle die Koeffizienten b_1, b_2, b_3, \dots sämtlich gleich Null sind. Deshalb wird unter dieser Voraussetzung

$$(27.) \quad f(x) = \frac{1}{2}a_0 + a_1 \cos\left(\frac{2\pi x}{c}\right) + a_2 \cos\left(\frac{4\pi x}{c}\right) + \dots$$

2. Ist dagegen $f(x)$ eine ungerade Funktion, ist also

$$f(-x) = -f(x),$$

so findet man aus Gleichung (20.) oder (23.), daß in diesem Falle die Koeffizienten a_0, a_1, a_2, \dots sämtlich gleich Null sind. Deshalb wird unter dieser Voraussetzung

$$(28.) \quad f(x) = b_1 \sin\left(\frac{2\pi x}{c}\right) + b_2 \sin\left(\frac{4\pi x}{c}\right) + \dots$$

Die trigonometrischen Reihen werden auch *Fouriersche* Reihen genannt, weil *Fourier* in seiner „Théorie analytique de la chaleur“ zuerst die Behauptung aufgestellt hat, daß sich jede, in einem bestimmten Intervalle von a bis b willkürlich gegebene, eindeutige Funktion durch eine solche Entwicklung darstellen läßt; und zwar ist es dabei sogar noch zulässig, daß die willkürlich gegebene Funktion an einzelnen Stellen des betrachteten Intervalls von a bis b sich sprungweise ändert, und daß die dazwischen liegenden, stetig verlaufenden Stücke, geometrisch dargestellt, verschiedenartigen Kurven angehören, wenn nur die Integrale

$$\int_0^c f(x) dx, \quad \int_0^c f(x) \cos\left(\frac{2n\pi x}{c}\right) dx, \quad \int_0^c f(x) \sin\left(\frac{2n\pi x}{c}\right) dx$$

berechnet werden können. Das wird z. B. der Fall sein, wenn die Funktion $f(x)$ aus Stücken besteht, von denen sich jedes als eine ganze rationale Funktion von x darstellen läßt.

Bei dem elementaren Charakter des Buches möge die strenge Untersuchung der Bedingungen, unter denen sich die verschiedenen analytischen Gesetze der einzelnen Stücke durch die trigonometrische Reihe als ein einziges zusammen-

fassen lassen, übergangen werden. Dagegen möge für die Anwendungen der Weg eingeschlagen werden, daß zunächst für die willkürlich erklärte Funktion die Koeffizienten

$$a_0, a_1, a_2, \dots \text{ und } b_1, b_2, b_3, \dots$$

nach den Gleichungen (22.), bezw. nach den Gleichungen (24.) und (25.) berechnet werden, und daß man dann prüft, ob die auf diese Weise erhaltene Reihe konvergent ist. Dabei werden die Formeln Nr. 126 und 127 der Differential-Rechnung (12. Auflage) häufig gute Dienste leisten. Nach diesen Formeln gelten die folgenden Sätze:

1. Wenn die Größen $a_0, a_1, a_2, a_3, \dots$ positiv sind und, beständig abnehmend, die Null zur Grenze haben, so ist die Reihe

$$\frac{1}{2}a_0 + a_1 \cos x + a_2 \cos(2x) + a_3 \cos(3x) + \dots$$

konvergent für alle Werte von x , welche von $0, \pm 2\pi, \pm 4\pi, \dots$ verschieden sind; und die Reihe

$$\frac{1}{2}a_0 - a_1 \cos x + a_2 \cos(2x) - a_3 \cos(3x) + \dots$$

ist konvergent für alle Werte von x , welche von $\pm \pi, \pm 3\pi, \pm 5\pi, \dots$ verschieden sind.

2. Wenn die Größen b_1, b_2, b_3, \dots positiv sind und, beständig abnehmend, die Null zur Grenze haben, so sind die Reihen

$$b_1 \sin x + b_2 \sin(2x) + b_3 \sin(3x) + b_4 \sin(4x) + \dots$$

und

$$b_1 \sin x - b_2 \sin(2x) + b_3 \sin(3x) - b_4 \sin(4x) + \dots$$

für alle Werte von x konvergent.

Schließlich wird man dann noch untersuchen müssen, ob eine so gefundene konvergente Reihenentwicklung die willkürlich erklärte Funktion für die betrachteten Werte von x auch wirklich darstellt. Zu diesem Zwecke wird es in den meisten Fällen genügen, diejenige Kurve punktweise zu konstruieren, die man erhält, wenn man von der unendlichen Reihe nur eine beschränkte Anzahl von Gliedern berücksichtigt.

Wie das gemeint ist, mögen die Beispiele in dem folgenden Paragraphen zeigen.

§ 67.


Übungs-Beispiele.

Aufgabe 1. Die zu entwickelnde Funktion entspreche einer Kurve, zusammengesetzt aus den Geraden (Fig. 114)

$$(1.) \quad \begin{cases} y = +a & \text{für } x = kc \text{ bis } x = (k + \frac{1}{2})c, \\ y = -a & \text{für } x = (k + \frac{1}{2})c \text{ bis } x = (k + 1)c, \end{cases}$$

wo k alle ganzzahligen Werte annehmen soll.

Fig. 114.



Auflösung. Da in diesem Falle $f(x)$ eine *ungerade* Funktion ist, so hat sie die Form

$$(2.) \quad f(x) = b_1 \sin\left(\frac{2\pi x}{c}\right) + b_2 \sin\left(\frac{4\pi x}{c}\right) + b_3 \sin\left(\frac{6\pi x}{c}\right) + \dots,$$

wobei nach Formel Nr. 203 der Tabelle

$$(3.) \quad b_n = \frac{2}{c} \int_0^{\frac{c}{2}} a \sin\left(\frac{2n\pi x}{c}\right) dx - \frac{2}{c} \int_{\frac{c}{2}}^c a \sin\left(\frac{2n\pi x}{c}\right) dx$$

wird. Setzt man hierbei noch

$$x - \frac{c}{2} = t, \quad \text{also} \quad x = \frac{c}{2} + t,$$

so erhält man

$$\begin{aligned} (4.) \quad \sin\left(\frac{2n\pi x}{c}\right) &= \sin\left(n\pi + \frac{2n\pi t}{c}\right) \\ &= \sin(n\pi) \cos\left(\frac{2n\pi t}{c}\right) + \cos(n\pi) \sin\left(\frac{2n\pi t}{c}\right) \\ &= (-1)^n \sin\left(\frac{2n\pi t}{c}\right), \end{aligned}$$

und deshalb

$$\begin{aligned}
 (5.) \quad \int_{\frac{c}{2}}^c \sin\left(\frac{2n\pi x}{c}\right) dx &= (-1)^n \int_0^{\frac{c}{2}} \sin\left(\frac{2n\pi t}{c}\right) dt \\
 &= (-1)^n \int_0^{\frac{c}{2}} \sin\left(\frac{2n\pi x}{c}\right) dx;
 \end{aligned}$$

folglich wird

$$\begin{aligned}
 (6.) \quad b_n &= \frac{2a}{c} \int_0^{\frac{c}{2}} [1 - (-1)^n] \sin\left(\frac{2n\pi x}{c}\right) dx \\
 &= \frac{2a}{c} [1 - (-1)^n] \left[-\frac{c}{2n\pi} \cos\left(\frac{2n\pi x}{c}\right) \right]_0^{\frac{c}{2}} \\
 &= \frac{a}{n\pi} [1 - (-1)^n] [1 - \cos(n\pi)].
 \end{aligned}$$

Dies gibt

$$(7.) \quad b_{2\alpha} = 0, \quad b_{2\alpha+1} = \frac{a(1+1)(1+1)}{(2\alpha+1)\pi} = \frac{4a}{(2\alpha+1)\pi},$$

also

$$(8.) \quad f(x) = \frac{4a}{\pi} \left[\sin\left(\frac{2\pi x}{c}\right) + \frac{1}{3} \sin\left(\frac{6\pi x}{c}\right) + \frac{1}{5} \sin\left(\frac{10\pi x}{c}\right) + \dots \right]$$

Da die Koeffizienten $1, \frac{1}{3}, \frac{1}{5}, \frac{1}{7}, \dots$, beständig abnehmend, die Null zur Grenze haben, so ist die Reihe konvergent. Konstruiert man die Kurve punktweise, indem man zuerst nur 3, dann 4, 5, 6 usw. Glieder der Reihe berücksichtigt, so findet man, daß sich die Kurve der in Figur 114 gezeichneten gebrochenen Linie immer mehr nähert. Setzt man z. B.

$$c = 64, \quad \frac{4a}{\pi} = 12, \quad \text{also} \quad a = 3\pi = 9,425,$$

so findet man, wenn man 6 Glieder der Reihe berücksichtigt,

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8
$f(x)$	0	6,549	10,455	10,997	9,643	8,543	8,737	9,651	10,119
$f(x) - a$	0	-2,876	+1,030	+1,572	+0,218	-0,882	-0,688	+0,226	+0,694


x	9	10	11	12	13	14	15	16	17
$f(x)$	9,707	9,027	8,897	9,407	9,899	9,788	9,238	8,928	9,238
$f(x) - a$	+0,282	-0,398	-0,528	-0,018	+0,474	+0,363	-0,187	-0,497	-0,187

Weiter braucht man die Tabelle nicht fortzusetzen, da in dem Intervalle von $x = 16$ bis $x = 32$ dieselben Werte von $f(x)$ in entgegengesetzter Reihenfolge wiederkehren. Ferner ist

$$f(64 - x) = f(-x) = -f(x);$$

deshalb erhält $f(x)$ in dem Intervalle von $x = 32$ bis $x = 64$, abgesehen vom Vorzeichen, dieselben Werte wie in dem Intervalle von $x = 0$ bis $x = 32$. Über den Verlauf der Kurve bei Berücksichtigung von 6 Gliedern der Reihe gibt Figur 115 Aufschluß.

Fig. 115.



Verschiebt man in der vorstehenden Aufgabe die Y -Achse parallel mit sich selbst um die Strecke $x = \frac{c}{4}$, setzt man also

$$x = x' + \frac{c}{4},$$

so wird die Y -Achse Symmetrie-Achse, und die Funktion

$$f(x) = f\left(x' + \frac{c}{4}\right)$$

wird eine gerade Funktion von x' , die man auf die Form

$$(9.) \quad f\left(x' + \frac{c}{4}\right)$$

$$= \frac{1}{2}a_0 + a_1 \cos\left(\frac{2\pi x'}{c}\right) + a_2 \cos\left(\frac{4\pi x'}{c}\right) + a_3 \cos\left(\frac{6\pi x'}{c}\right) + \dots$$

bringen kann. Dabei ist

$$(10.) \quad a_0 = \frac{2}{c} \int_0^c f\left(x' + \frac{c}{4}\right) dx' = \frac{2a}{c} \left[\int_0^{\frac{c}{4}} dx - \int_{\frac{c}{4}}^{\frac{3c}{4}} dx + \int_{\frac{3c}{4}}^c dx \right]$$

$$= \frac{2a}{c} \left(\frac{c}{4} - \frac{3c}{4} + \frac{c}{4} + c - \frac{3c}{4} \right) = 0;$$

$$(11.) \quad a_n = \frac{2}{c} \int_0^c f\left(x' + \frac{c}{4}\right) \cos\left(\frac{2n\pi x'}{c}\right) dx'$$

$$= \frac{2a}{c} \left[\int_0^{\frac{c}{4}} \cos\left(\frac{2n\pi x}{c}\right) dx - \int_{\frac{c}{4}}^{\frac{3c}{4}} \cos\left(\frac{2n\pi x}{c}\right) dx + \int_{\frac{3c}{4}}^c \cos\left(\frac{2n\pi x}{c}\right) dx \right]$$

$$= \frac{a}{n\pi} \left\{ \left[\sin\left(\frac{2n\pi x}{c}\right) \right]_0^{\frac{c}{4}} - \left[\sin\left(\frac{2n\pi x}{c}\right) \right]_{\frac{c}{4}}^{\frac{3c}{4}} + \left[\sin\left(\frac{2n\pi x}{c}\right) \right]_{\frac{3c}{4}}^c \right\}$$

$$= \frac{a}{n\pi} \left[\sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) - 0 - \sin\left(\frac{3n\pi}{2}\right) + \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) + \sin(2n\pi) - \sin\left(\frac{3n\pi}{2}\right) \right],$$

folglich wird

$$(12.) \quad \begin{cases} a_{2\alpha} = 0, \\ a_{2\alpha+1} = \frac{a}{(2\alpha+1)\pi} [(-1)^\alpha + (-1)^\alpha + (-1)^\alpha + (-1)^\alpha] \\ \quad = (-1)^\alpha \frac{4a}{(2\alpha+1)\pi}. \end{cases}$$

Dies gibt

$$(13.) \quad f(x) = f\left(x' + \frac{c}{4}\right)$$

$$= \frac{4a}{\pi} \left[\cos\left(\frac{2\pi x'}{c}\right) - \frac{1}{3} \cos\left(\frac{6\pi x'}{c}\right) + \frac{1}{5} \cos\left(\frac{10\pi x'}{c}\right) - + \dots \right].$$


Dieses Resultat hätte man auch unmittelbar aus Gleichung (8.) finden können, denn es ist

$$(14.) \quad \left\{ \begin{array}{l} \sin\left(\frac{2\pi x'}{c} + \frac{\pi}{2}\right) = \cos\left(\frac{2\pi x'}{c}\right), \\ \sin\left(\frac{6\pi x'}{c} + \frac{3\pi}{2}\right) = -\cos\left(\frac{6\pi x'}{c}\right), \\ \sin\left(\frac{10\pi x'}{c} + \frac{5\pi}{2}\right) = \cos\left(\frac{10\pi x'}{c}\right), \\ \sin\left(\frac{14\pi x'}{c} + \frac{7\pi}{2}\right) = -\cos\left(\frac{14\pi x'}{c}\right), \\ \dots \end{array} \right.$$

Aufgabe 2. Die zu entwickelnde Funktion entspreche einer Kurve (vergl. Fig. 116), zusammengesetzt aus den geraden Linien

$$(15.) \quad \left\{ \begin{array}{ll} y = +mx & \text{für } -\frac{c}{4} \leq x \leq +\frac{c}{4}, \\ y = -m\left(x - \frac{c}{2}\right) & \text{„ } +\frac{c}{4} \leq x \leq +\frac{3c}{4}, \\ y = +m(x - c) & \text{„ } +\frac{3c}{4} \leq x \leq +\frac{5c}{4}, \\ y = -m\left(x - \frac{3c}{2}\right) & \text{„ } +\frac{5c}{4} \leq x \leq +\frac{7c}{4}, \\ \dots \end{array} \right.$$

Fig. 116.



Auflösung. Auch in diesem Falle ist $f(x)$ eine *ungerade* Funktion, so daß man wieder erhält

$$f(x) = b_1 \sin\left(\frac{2\pi x}{c}\right) + b_2 \sin\left(\frac{4\pi x}{c}\right) + b_3 \sin\left(\frac{6\pi x}{c}\right) + \dots,$$

wobei nach Formel Nr. 203 der Tabelle

$$\begin{aligned}
 b_n &= \frac{2}{c} \int_0^c f(x) \sin\left(\frac{2n\pi x}{c}\right) dx \\
 &= \frac{2m}{c} \left[\int_0^{\frac{c}{4}} x \sin\left(\frac{2n\pi x}{c}\right) dx - \int_{\frac{c}{4}}^{\frac{3c}{4}} \left(x - \frac{c}{2}\right) \sin\left(\frac{2n\pi x}{c}\right) dx \right. \\
 &\quad \left. + \int_{\frac{3c}{4}}^c (x - c) \sin\left(\frac{2n\pi x}{c}\right) dx \right].
 \end{aligned}$$

Setzt man jetzt

$$x - \frac{c}{2} = t \quad \text{und} \quad x - c = u,$$

so wird

$$\begin{aligned}
 \sin\left(\frac{2n\pi x}{c}\right) &= \sin\left(\frac{2n\pi t}{c} + n\pi\right) \\
 &= \sin\left(\frac{2n\pi t}{c}\right) \cos(n\pi) + \cos\left(\frac{2n\pi t}{c}\right) \sin(n\pi) \\
 &= (-1)^n \sin\left(\frac{2n\pi t}{c}\right)
 \end{aligned}$$

und

$$\sin\left(\frac{2n\pi x}{c}\right) = \sin\left(\frac{2n\pi u}{c} + 2n\pi\right) = \sin\left(\frac{2n\pi u}{c}\right),$$

also

$$\begin{aligned}
 (16.) \quad b_n &= \frac{2m}{c} \left[\int_0^{\frac{c}{4}} x \sin\left(\frac{2n\pi x}{c}\right) dx - (-1)^n \int_{-\frac{c}{4}}^0 t \sin\left(\frac{2n\pi t}{c}\right) dt \right. \\
 &\quad \left. + \int_{-\frac{c}{4}}^0 u \sin\left(\frac{2n\pi u}{c}\right) du \right] \\
 &= \frac{2m}{c} [1 - (-1)^n] \int_{-\frac{c}{4}}^{\frac{c}{4}} x \sin\left(\frac{2n\pi x}{c}\right) dx \\
 &= \frac{2m}{c} [1 - (-1)^n] \cdot \left[-\frac{cx}{2n\pi} \cos\left(\frac{2n\pi x}{c}\right) \right. \\
 &\quad \left. + \frac{c^2}{4n^2\pi^2} \sin\left(\frac{2n\pi x}{c}\right) \right]_{-\frac{c}{4}}^{+\frac{c}{4}},
 \end{aligned}$$

folglich wird

$$(17.) \quad b_{2\alpha} = 0, \quad b_{2\alpha+1} = \frac{4m}{c} \cdot \frac{2c^2}{4(2\alpha+1)^2\pi^2} \sin\left(\frac{(2\alpha+1)\pi}{2}\right) \\ = (-1)^\alpha \frac{2mc}{(2\alpha+1)^2\pi^2}.$$

Dies gibt

$$(18.) \quad b_1 = \frac{2mc}{\pi^2}, \quad b_3 = -\frac{2mc}{9\pi^2}, \quad b_5 = +\frac{2mc}{25\pi^2}, \dots,$$

also

$$(19.) \quad f(x) = \frac{2mc}{\pi^2} \left[\sin\left(\frac{2\pi x}{c}\right) - \frac{1}{9} \sin\left(\frac{6\pi x}{c}\right) + \frac{1}{25} \sin\left(\frac{10\pi x}{c}\right) - \dots \right]$$

Da die Reihe

$$\frac{1}{1} + \frac{1}{9} + \frac{1}{25} + \frac{1}{49} + \dots$$

konvergent ist, so konvergiert auch die Reihe in Gleichung (19.). Konstruiert man die Kurve punktweise, indem man zuerst nur die ersten 3, dann 4, 5, 6 usw. Glieder berücksichtigt, so sieht man, daß sich die Kurve der in Figur 116 gezeichneten gebrochenen Linie immer mehr nähert. Setzt man z. B.

$$c = 64, \quad \frac{2mc}{\pi^2} = 12, \quad \text{also} \quad m = \frac{3\pi^2}{32} = 0,925\,275,$$

so findet man, wenn man 6 Glieder der Reihe berücksichtigt.

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8
$f(x)$	0	0,887	1,822	2,794	3,745	4,640	5,514	6,432	7,411
$f(x) - mx$	0	-0,038	-0,029	+0,018	+0,044	+0,014	-0,038	-0,045	+0,009

x	9	10	11	12	13	14	15	16	17
$f(x)$	8,338	9,290	10,128	11,012	12,031	13,108	13,972	14,306	13,972
$f(x) - mx$	+0,061	+0,038	-0,050	-0,091	+0,003	+0,155	+0,092	-0,499	+0,092

Auch hier braucht man die Tabelle nicht weiter fortzusetzen, da in dem Intervalle von $x = 16$ bis $x = 32$ dieselben Werte von $f(x)$ in entgegengesetzter Reihenfolge wiederkehren, und da $f(x)$ in dem Intervalle von $x = 32$ bis $x = 64$, abgesehen vom Vorzeichen, dieselben Werte hat wie in dem Intervalle von $x = 0$ bis $x = 32$.

Die Abweichungen der Kurve bei Berücksichtigung der ersten 6 Glieder von der in Figur 116 gezeichneten gebrochenen Linie sind so gering, daß sie in einer Figur im Maßstabe der anderen Figuren kaum zum Ausdruck gebracht werden können. Dem Leser wird empfohlen, bei diesem oder auch bei den anderen Beispielen die aufeinander folgenden Näherungskurven zu zeichnen, die man erhält, wenn man die Reihe nach dem 1^{ten}, 2^{ten}, 3^{ten}, ... Gliede abbricht.

Verschiebt man auch in dieser Aufgabe die Y -Achse parallel mit sich selbst um die Strecke $\frac{c}{4}$, setzt man also

$$x = x' + \frac{c}{4},$$

so wird die Y -Achse Symmetrie-Achse, und die Funktion

$$f(x) = f\left(x' + \frac{c}{4}\right)$$

wird wieder eine *gerade* Funktion von x' , die man auf die Form

$$(20.) \quad f\left(x' + \frac{c}{4}\right) = \frac{1}{2}a_0 + a_1 \cos\left(\frac{2\pi x'}{c}\right) + a_2 \cos\left(\frac{4\pi x'}{c}\right) + a_3 \cos\left(\frac{6\pi x'}{c}\right) + \dots$$

bringen kann. Aus den Gleichungen (14.) folgt dabei unmittelbar, daß

$$(21.) \quad f\left(x' + \frac{c}{4}\right) = \frac{2mc}{\pi^2} \left[\cos\left(\frac{2\pi x'}{c}\right) + \frac{1}{9} \cos\left(\frac{6\pi x'}{c}\right) + \frac{1}{25} \cos\left(\frac{10\pi x'}{c}\right) + \dots \right].$$

Aufgabe 3. Es sei die Kurve (vergl. Fig. 117), die der zu entwickelnden Funktion entspricht, aus den geraden Linien

$$(22.) \quad \begin{cases} y = mx & \text{für } -\frac{c}{2} \leq x \leq +\frac{c}{2}, \\ y = m(x - c) & \text{für } +\frac{c}{2} \leq x \leq +\frac{3c}{2}, \\ \dots & \dots \end{cases}$$

zusammengesetzt.


Auflösung. Da die Funktion wieder eine *ungerade* ist, so wird

$$(23.) \quad f(x) = b_1 \sin\left(\frac{2\pi x}{c}\right) + b_2 \sin\left(\frac{4\pi x}{c}\right) + b_3 \sin\left(\frac{6\pi x}{c}\right) + \dots$$

Dabei ist nach Formel Nr. 203 der Tabelle

$$(24.) \quad b_n = \frac{2}{c} \int_0^c f(x) \sin\left(\frac{2n\pi x}{c}\right) dx,$$

Fig. 117.



oder, weil die Funktion die Periode c hat,

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{2}{c} \int_{-\frac{c}{2}}^{+\frac{c}{2}} f(x) \sin\left(\frac{2n\pi x}{c}\right) dx = \frac{2m}{c} \int_{-\frac{c}{2}}^{+\frac{c}{2}} x \sin\left(\frac{2n\pi x}{c}\right) dx \\ &= \frac{2m}{c} \left[-\frac{cx}{2n\pi} \cos\left(\frac{2n\pi x}{c}\right) + \frac{c^2}{4n^2\pi^2} \sin\left(\frac{2n\pi x}{c}\right) \right]_{-\frac{c}{2}}^{+\frac{c}{2}}, \end{aligned}$$

also

$$\begin{aligned} (25.) \quad b_n &= \frac{2m}{c} \left[-\frac{c^2}{4n\pi} \cos(n\pi) - \frac{c^2}{4n\pi} \cos(n\pi) \right] \\ &= -\frac{cm}{n\pi} (-1)^n = (-1)^{n-1} \frac{cm}{n\pi}. \end{aligned}$$

Dies gibt

$$(26.) \quad f(x) = \frac{cm}{\pi} \left[\sin\left(\frac{2\pi x}{c}\right) - \frac{1}{2} \sin\left(\frac{4\pi x}{c}\right) + \frac{1}{3} \sin\left(\frac{6\pi x}{c}\right) - \dots \right].$$

Da die Koeffizienten $1, -\frac{1}{2}, +\frac{1}{3}, -\frac{1}{4}, \dots$ beständig abnehmend, die Null zur Grenze haben, so ist die Reihe nach dem oben angeführten Satze konvergent. Konstruiert man die Kurve punktweise, indem man zuerst nur die ersten 3, dann 4, 5, 6 usw. Glieder berücksichtigt, so findet man, daß sich die Kurve der in Figur 118 gezeichneten gebrochenen Linie immer mehr nähert. Setzt man z. B.

$$c = 64, \quad \frac{cm}{\pi} = 12, \quad \text{also} \quad m = \frac{3\pi}{16} = 0,589\,049,$$

so findet man, wenn man 6 Glieder der Reihe berücksichtigt,


x	0	1	2	3	4	5	6	7	8
$f(x)$	0	0,039	0,294	0,897	1,848	3,009	4,159	5,074	5,617
$f(x) - mx$	0	-0,550	-0,884	-0,870	-0,508	+0,064	+0,625	+0,951	+0,904

x	9	10	11	12	13	14	15	16	17
$f(x)$	5,791	5,748	5,728	5,981	6,658	7,754	9,097	10,400	11,365
$f(x) - mx$	+0,490	-0,143	-0,751	-1,088	-1,000	-0,492	+0,262	+0,975	+1,351

x	18	19	20	21	22	23	24	25	26
$f(x)$	11,799	11,704	11,294	10,943	11,061	11,939	13,617	15,814	17,957
$f(x) - mx$	+1,197	+0,512	-0,487	-1,427	-1,898	-1,609	-0,521	+1,087	+2,642

x	27	28	29	30	31	32	33	34	35
$f(x)$	19,311	19,162	17,030	12,824	6,898	0	-6,898	-12,824	-17,030
$f(x) - mx$	+3,406	+2,669	-0,052	-4,847	-11,362	0			

Fig. 118.



Figur 118 zeigt den Verlauf der Kurve, die trotz der Berücksichtigung der ersten 6 Glieder noch ziemlich starke Abweichungen von der gebrochenen Linie in Figur 117 zeigt, weil die in Gleichung (26.) aufgeführte Reihe nur schwach konvergiert.


Aufgabe 4. Die Kurve (Fig. 119), die der zu entwickelnden Funktion entspricht, sei zusammengesetzt aus den Geraden

$$(27.) \quad \begin{cases} y = -a & \text{für } -4b \leq x \leq -3b, \\ y = \frac{a}{b}(x+2b) & \text{„ } -3b \leq x \leq -b, \\ y = +a & \text{„ } -b \leq x \leq +b, \\ y = -\frac{a}{b}(x-2b) & \text{„ } +b \leq x \leq +3b, \\ y = -a & \text{„ } +3b \leq x \leq +4b. \end{cases}$$

Von da ab kehren dieselben Werte periodisch wieder.
Die Länge der Periode ist dabei

$$(28.) \quad c = 8b.$$

Fig. 119.



Auflösung. In dieser Aufgabe ist $f(x)$ eine *gerade* Funktion. Deshalb wird

$$(29.) \quad f(x) = \frac{1}{2}a_0 + a_1 \cos\left(\frac{2\pi x}{c}\right) + a_2 \cos\left(\frac{4\pi x}{c}\right) + \dots$$

Dabei ist nach Formel Nr. 203 der Tabelle

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{2}{c} \int_0^c f(x) dx = \frac{2}{c} \int_{-4b}^{+4b} f(x) dx \\ &= -\frac{2a}{c} \int_{-4b}^{-3b} dx + \frac{2a}{bc} \int_{-3b}^{-b} (x+2b) dx + \frac{2a}{c} \int_{-b}^{+b} dx - \frac{2a}{bc} \int_{+b}^{+3b} (x-2b) dx \\ &\quad - \frac{2a}{c} \int_{+3b}^{+4b} dx \\ &= \frac{2a}{c} \left(\left[-x \right]_{-4b}^{-3b} + \left[x \right]_{-b}^{+b} + \left[-x \right]_{+3b}^{+4b} \right) + \frac{2a}{bc} \left(\left[\frac{x^2}{2} + 2bx \right]_{-3b}^{-b} \right. \\ &\quad \left. - \left[\frac{x^2}{2} - 2bx \right]_{+b}^{+3b} \right), \end{aligned}$$

also

$$(30.) \quad a_0 = \frac{2a}{c}(-b + 2b - b) + \frac{2a}{bc}\left(-\frac{3b^2}{2} + \frac{3b^2}{2} + \frac{3b^2}{2} - \frac{3b^2}{2}\right) = 0.$$

Ferner ist mit Rücksicht auf Gleichung (28.)

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2}{c} \int_{-4b}^{+4b} f(x) \cos\left(\frac{n\pi x}{4b}\right) dx \\ &= -\frac{a}{4b} \int_{-4b}^{-3b} \cos\left(\frac{n\pi x}{4b}\right) dx + \frac{a}{4b^2} \int_{-3b}^{-b} (x+2b) \cos\left(\frac{n\pi x}{4b}\right) dx \\ &\quad + \frac{a}{4b} \int_{-b}^{+b} \cos\left(\frac{n\pi x}{4b}\right) dx - \frac{a}{4b^2} \int_{+b}^{+3b} (x-2b) \cos\left(\frac{n\pi x}{4b}\right) dx \\ &\quad - \frac{a}{4b} \int_{+3b}^{+4b} \cos\left(\frac{n\pi x}{4b}\right) dx, \end{aligned}$$

oder wenn man bei den Integralen mit negativen Grenzen x mit $-x'$ vertauscht,

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{a}{4b} \left[\int_{+4b}^{+3b} \cos\left(\frac{n\pi x'}{4b}\right) dx' - \int_{+b}^0 \cos\left(\frac{n\pi x'}{4b}\right) dx' + \int_0^b \cos\left(\frac{n\pi x}{4b}\right) dx \right. \\ &\quad \left. - \int_{+3b}^{+4b} \cos\left(\frac{n\pi x}{4b}\right) dx \right] \\ &\quad + \frac{a}{4b^2} \left[\int_{+3b}^{+b} (x'-2b) \cos\left(\frac{n\pi x'}{4b}\right) dx' - \int_{+b}^{+3b} (x-2b) \cos\left(\frac{n\pi x}{4b}\right) dx \right], \end{aligned}$$

oder

$$\begin{aligned} (31.) \quad a_n &= \frac{a}{2b} \left[\int_0^{+b} \cos\left(\frac{n\pi x}{4b}\right) dx - \int_{+3b}^{+4b} \cos\left(\frac{n\pi x}{4b}\right) dx \right. \\ &\quad \left. - \frac{a}{2b^2} \int_{+b}^{+3b} (x-2b) \cos\left(\frac{n\pi x}{4b}\right) dx \right]. \end{aligned}$$

Zur Ermittlung des letzten Integrals wendet man partielle Integration an, indem man

$$u = x - 2b, \quad dv = \cos\left(\frac{n\pi x}{4b}\right) dx,$$

also

$$du = dx, \quad v = \frac{4b}{n\pi} \sin\left(\frac{n\pi x}{4b}\right)$$

setzt. Dadurch erhält man

$$\begin{aligned} \int (x - 2b) \cos\left(\frac{n\pi x}{4b}\right) dx &= \frac{4b}{n\pi} (x - 2b) \sin\left(\frac{n\pi x}{4b}\right) \\ &\quad - \frac{4b}{n\pi} \int \sin\left(\frac{n\pi x}{4b}\right) dx \\ &= \frac{4b}{n\pi} \left[(x - 2b) \sin\left(\frac{n\pi x}{4b}\right) + \frac{4b}{n\pi} \cos\left(\frac{n\pi x}{4b}\right) \right]. \end{aligned}$$

Deshalb wird

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2a}{n\pi} \left(\left[\sin\left(\frac{n\pi x}{4b}\right) \right]_0^{4b} - \left[\sin\left(\frac{n\pi x}{4b}\right) \right]_{3b}^{4b} \right) \\ &\quad - \frac{2a}{nb\pi} \left[(x - 2b) \sin\left(\frac{n\pi x}{4b}\right) + \frac{4b}{n\pi} \cos\left(\frac{n\pi x}{4b}\right) \right]_b^{3b} \\ &= \frac{2a}{n\pi} \left[\sin\left(\frac{n\pi}{4}\right) + \sin\left(\frac{3n\pi}{4}\right) \right] - \frac{2a}{n\pi} \left[\sin\left(\frac{3n\pi}{4}\right) \right. \\ &\quad \left. + \sin\left(\frac{n\pi}{4}\right) \right] - \frac{8a}{n^2\pi^2} \left[\cos\left(\frac{3n\pi}{4}\right) - \cos\left(\frac{n\pi}{4}\right) \right], \end{aligned}$$

oder

$$(32.) \quad a_n = \frac{8a}{n^2\pi^2} \left[\cos\left(\frac{n\pi}{4}\right) - \cos\left(\frac{3n\pi}{4}\right) \right] = \frac{16a}{n^2\pi^2} \sin\left(\frac{n\pi}{4}\right) \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right).$$

Dies gibt für $n = 2\alpha$

$$(33.) \quad a_{2\alpha} = \frac{16a}{4\alpha^2\pi^2} \sin\left(\frac{\alpha\pi}{2}\right) \sin(\alpha\pi) = 0,$$

und für $n = 2\alpha + 1$

$$(34.) \quad a_{2\alpha+1} = \frac{16a}{(2\alpha+1)^2\pi^2} \sin\left(\frac{2\alpha+1}{4}\pi\right) \sin\left(\frac{2\alpha+1}{2}\pi\right),$$

also, da

$$\sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = \sin\left(\frac{3\pi}{4}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad \sin\left(\frac{5\pi}{4}\right) = \sin\left(\frac{7\pi}{4}\right) = -\frac{1}{\sqrt{2}},$$

$$\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = +1, \quad \sin\left(\frac{3\pi}{2}\right) = -1$$

ist,

$$(35.) \quad a_1 = + \frac{8a\sqrt{2}}{\pi^2}, \quad a_3 = - \frac{8a\sqrt{2}}{9\pi^2}, \quad a_5 = - \frac{8a\sqrt{2}}{25\pi^2}, \\ a_7 = + \frac{8a\sqrt{2}}{49\pi^2}, \quad a_9 = + \frac{8a\sqrt{2}}{81\pi^2}, \quad a_{11} = - \frac{8a\sqrt{2}}{121\pi^2}, \dots$$

Man erhält also

$$(36.) \quad f(x) = \frac{8a\sqrt{2}}{\pi^2} \left[\cos\left(\frac{2\pi x}{c}\right) - \frac{1}{9} \cos\left(\frac{6\pi x}{c}\right) - \frac{1}{25} \cos\left(\frac{10\pi x}{c}\right) \right. \\ \left. + \frac{1}{49} \cos\left(\frac{14\pi x}{c}\right) + \frac{1}{81} \cos\left(\frac{18\pi x}{c}\right) - \frac{1}{121} \cos\left(\frac{22\pi x}{c}\right) - + \dots \right].$$

Bemerkenswert ist hierbei, daß auf *zwei* negative immer *zwei* positive Glieder folgen.

Verschiebt man in dieser Aufgabe die Y -Achse parallel mit sich um die Strecke $x = -2b$, setzt man also

$$x = x' - 2b$$

so wird

$$f(x) = f(x' - 2b)$$

eine *ungerade* Funktion von x' , die man auf die Form

$$(37.) \quad f(x' - 2b) = b_1 \sin\left(\frac{2\pi x'}{c}\right) + b_2 \sin\left(\frac{4\pi x'}{c}\right) \\ + b_3 \sin\left(\frac{6\pi x'}{c}\right) + \dots$$

bringen kann. Dabei wird, da $c = 8b$ ist,

$$\cos\left(\frac{2\pi x'}{c} - \frac{\pi}{2}\right) = + \sin\left(\frac{2\pi x'}{c}\right), \\ \cos\left(\frac{6\pi x'}{c} - \frac{3\pi}{2}\right) = - \sin\left(\frac{6\pi x'}{c}\right), \\ \cos\left(\frac{10\pi x'}{c} - \frac{5\pi}{2}\right) = + \sin\left(\frac{10\pi x'}{c}\right), \\ \cos\left(\frac{14\pi x'}{c} - \frac{7\pi}{2}\right) = - \sin\left(\frac{14\pi x'}{c}\right), \\ \dots \dots \dots$$

folglich geht Gleichung (36.) über in

$$(38.) \quad f(x' - 2b) = \frac{8a\sqrt{2}}{\pi^2} \left[\sin\left(\frac{2\pi x'}{c}\right) + \frac{1}{9} \sin\left(\frac{6\pi x'}{c}\right) \right. \\ \left. - \frac{1}{25} \sin\left(\frac{10\pi x'}{c}\right) - \frac{1}{49} \sin\left(\frac{14\pi x'}{c}\right) + \frac{1}{81} \sin\left(\frac{18\pi x'}{c}\right) \right. \\ \left. + \frac{1}{121} \sin\left(\frac{22\pi x'}{c}\right) - \dots \right].$$

Da die Reihe $\frac{1}{1} - \frac{1}{9} - \frac{1}{25} + \frac{1}{49} + \frac{1}{81} - \frac{1}{121} - + + \dots$,
 bzw. $\frac{1}{1} + \frac{1}{9} - \frac{1}{25} - \frac{1}{49} + \frac{1}{81} + \frac{1}{121} - - \dots$ stark konvergiert, so gilt dasselbe von den Reihen in den Gleichungen (36.) und (38.). Konstruiert man die Kurve punktweise unter Berücksichtigung der ersten 6 Glieder, so erhält man eine sehr starke Annäherung an die in Figur 119 gezeichnete gebrochene Linie. Es sei z. B.

$$\frac{8a\sqrt{2}}{\pi^2} = 12, \text{ also } a = \frac{3\pi^2}{2\sqrt{2}} = \frac{\pi^2}{4} \sqrt{18} = 10,468\,296,$$

dann findet man unter Berücksichtigung von 6 Gliedern der Reihe

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8
$f(x)$	0	1,384	2,670	3,881	5,139	6,532	7,981	9,252	10,116
$f(x) - mx$	0	+0,075	+0,053	-0,045	-0,096	-0,011	+0,129	+0,092	-0,353

x	9	10	11	12	13	14	15	16	
$f(x)$	10,507	10,558	10,483	10,435	10,443	10,468	10,479	10,481	
$f(x) - a$	+0,038	+0,089	+0,015	-0,033	-0,025	-0,000	+0,011	0,012	

Die Abweichungen der Kurve bei Berücksichtigung der ersten 6 Glieder von der in Figur 119 gezeichneten gebrochenen Linie sind so gering, daß sie in einer Figur im Maßstab der anderen Figuren kaum zum Ausdruck gebracht werden können.

§ 68.

Berechnung bestimmter Integrale bei Anwendung mehrdeutiger Substitutionen.

Führt man in ein bestimmtes Integral $\int_a^b f(x) dx$ durch die Substitution

$$(1) \quad y = \varphi(x)$$

eine neue Integrations-Veränderliche y ein, so muß man auch die Integrationsgrenzen ändern, und zwar ist in dem

vorliegenden Falle die untere Grenze $\varphi(a)$ und die obere $\varphi(b)$. Bei der Ausrechnung ist aber noch besondere Vorsicht erforderlich, wenn die Gleichung (1.) in bezug auf x mehrdeutig ist. Ein einfaches Beispiel möge zeigen, wie bei solchen mehrdeutigen Substitutionen leicht Fehler entstehen.

Es ist

$$(2.) \quad \int_1^7 (x^2 - 6x + 13) dx = \left[\frac{1}{3} x^3 - 3x^2 + 13x \right]_1^7 = 48.$$

Wendet man die Substitution

$$(3.) \quad 2y = x^2 - 6x + 13$$

an, so wird $y = 4$ für $x = 1$ und $y = 10$ für $x = 7$. Da nun

$$(4.) \quad x = 3 \pm \sqrt{2y - 4}, \quad \text{also} \quad dx = \pm \frac{dy}{\sqrt{2y - 4}}$$

ist, so wird man geneigt sein, entweder

$$(5.) \quad \int_1^7 (x^2 - 6x + 13) dx = + \int_4^{10} \frac{2y dy}{\sqrt{2y - 4}},$$

oder

$$(6.) \quad \int_1^7 (x^2 - 6x + 13) dx = - \int_4^{10} \frac{2y dy}{\sqrt{2y - 4}}$$

zu setzen. Tatsächlich sind aber die Gleichungen (5.) und (6.) *beide unrichtig*, wie man schon daraus erkennt, daß

$$(7.) \quad \pm \int_4^{10} \frac{2y dy}{\sqrt{2y - 4}} = \pm \frac{1}{3} [(2y + 8)\sqrt{2y - 4}]_4^{10} = \pm \frac{80}{3}$$

ist, während das gesuchte Integral nach Gleichung (2.) den Wert 48 hat.

Zur Lösung des Widerspruches beachte man, daß nach Gleichung (4.) zu jedem Werte von y *zwei* Werte von x gehören, von denen der eine, nämlich

$$(8.) \quad x = 3 + \sqrt{2y - 4},$$

immer *größer* als 3 ist, während der andere, nämlich

$$(9.) \quad x = 3 - \sqrt{2y - 4},$$

immer *kleiner* als 3 ist. Diesen beiden verschiedenen Werten von x , welche zu demselben Werte von y gehören, entsprechen die beiden verschiedenen Werte von dx , und zwar erkennt man aus den Gleichungen (4.), daß den Werten von x , welche größer als 3 sind,

$$(10.) \quad dx = + \frac{dy}{\sqrt{2y - 4}}$$

zugeordnet werden muß, während den Werten von x , welche *kleiner* als 3 sind, der Wert

$$(11.) \quad dx = - \frac{dy}{\sqrt{2y - 4}}$$

entspricht. Dieses Verhalten muß bei der Umformung des gesuchten Integrals berücksichtigt werden, weil der Wert $x = 3$ *zwischen* den Grenzen 1 und 7 liegt, und deshalb bei der Berechnung des gesuchten Integrals sowohl Werte von x vorkommen, welche *kleiner* als 3 sind, als auch solche, welche *größer* als 3 sind, so daß man nicht *durchweg denselben* Wert von dx benutzen darf. Man muß vielmehr das gesuchte Integral in zwei andere Integrale zerlegen, indem man

$$(12.) \quad \int_1^7 (x^2 - 6x + 13) dx = \int_1^3 (x^2 - 6x + 13) dx + \int_3^7 (x^2 - 6x + 13) dx$$

setzt. Bei dem ersten Integrale auf der rechten Seite dieser Gleichung ist $x \leq 3$, folglich muß man bei diesem

$$dx = - \frac{dy}{\sqrt{2y - 4}}$$

setzen. Bei dem zweiten Integrale ist $x \geq 3$, folglich muß man dabei

$$dx = + \frac{dy}{\sqrt{2y - 4}}$$

setzen. Da nun noch $y = 2$ wird für $x = 3$, so erhält man

$$(13.) \quad \int_1^7 (x^2 - 6x + 13) dx = - \int_4^2 \frac{2y dy}{\sqrt{2y - 4}} = \int_2^4 \frac{2y dy}{\sqrt{2y - 4}},$$

$$(14.) \quad \int_3^7 (x^2 - 6x + 13) dx = + \int_2^{10} \frac{2y dy}{\sqrt{2y-4}}.$$

Durch Addition dieser beiden Gleichungen ergibt sich

$$(15.) \quad \int_1^7 (x^2 - 6x + 13) dx = \int_2^4 \frac{2y dy}{\sqrt{2y-4}} + \int_2^{10} \frac{2y dy}{\sqrt{2y-4}}.$$

Nun ist nach den Ausführungen in § 53

$$(16.) \quad \int_2^4 \frac{2y dy}{\sqrt{2y-4}} = \lim_{\alpha=0} \int_{2+\alpha}^4 \frac{2y dy}{\sqrt{2y-4}} \\ = \frac{1}{3} \lim_{\alpha=0} [(2y+8)\sqrt{2y-4}]_{2+\alpha}^4 = \frac{1}{3} [(2y+8)\sqrt{2y-4}]_2^4 = \frac{32}{3},$$


$$(17.) \quad \int_2^{10} \frac{2y dy}{\sqrt{2y-4}} = \lim_{\alpha=0} \int_{2+\alpha}^{10} \frac{2y dy}{\sqrt{2y-4}} \\ = \frac{1}{3} \lim_{\alpha=0} [(2y+8)\sqrt{2y-4}]_{2+\alpha}^{10} = \frac{1}{3} [(2y+8)\sqrt{2y-4}]_2^{10} = \frac{112}{3};$$

man erhält also in Übereinstimmung mit Gleichung (2.)

$$(18.) \quad \int_1^7 (x^2 - 6x + 13) dx = \frac{32}{3} + \frac{112}{3} = 48.$$

Um die vorstehende Untersuchung auf graphischem Wege zu veranschaulichen, sei in Figur 120 die Kurve ge-

Fig. 120.



zeichnet, welche der Substitutions-Gleichung

$$(19.) \quad 2y = x^2 - 6x + 13$$

entspricht. Für alle Werte von x , welche kleiner als 3 sind,

fällt die Kurve, folglich ist $\frac{dy}{dx}$

für diese Werte von x negativ.

Für alle Werte von x dagegen, welche größer als 3 sind, steigt

die Kurve, folglich ist $\frac{dy}{dx}$ für

diese Werte von x *positiv*. Deshalb darf man nicht in dem ganzen Intervalle von $x = 1$ bis $x = 7$ die Größe

$$\frac{dy}{dx} = \pm \sqrt{2y-4}$$

mit demselben Vorzeichen nehmen; es gilt vielmehr für alle Werte von $x = 1$ bis $x = 3$ das *untere* Zeichen und für alle Werte von $x = 3$ bis $x = 7$ das *obere* Zeichen.

Aus Figur 120 erkennt man auch leicht, weshalb die Gleichungen (5.) und (6.) fehlerhaft sind.

Das gesuchte Integral gibt nämlich den doppelten Flächeninhalt der Figur A_1B_1BA , denn es ist

$$(20.) \quad 2A_1B_1BA = 2 \int_1^7 y dx = \int_1^7 (x^2 - 6x + 13) dx,$$

während

$$(21.) \quad \int_4^{10} \frac{2y dy}{\sqrt{2y-4}} = 2 \int_5^7 y dx = \int_5^7 (x^2 - 6x + 13) dx = 2C_1B_1BC$$

und

$$(22.) \quad - \int_4^{10} \frac{2y dy}{\sqrt{2y-4}} = 2 \int_1^{-1} y dx \\ = - \int_{-1}^{+1} (x^2 - 6x + 13) dx = -2D_1A_1AD$$

sein würde. Die doppelte Fläche A_1B_1BA erhält man also aus $\int \frac{2y dy}{\sqrt{2y-4}}$ nur dadurch, daß man y von $A_1A = 4$ bis $T_1T = 2$ abnehmen und dann von $T_1T = 2$ bis $B_1B = 10$ zunehmen läßt.

Um den allgemeinen Fall zu behandeln, nehme man an, daß in dem Integral $\int_a^b f[\varphi(x)] dx$ statt der Integrations-Veränderlichen x durch die Gleichung

$$(23.) \quad y = \varphi(x)$$

die neue Integrations-Veränderliche y substituiert werde.

setzt. Dadurch erhält man nach Einführung der neuen Integrations-Veränderlichen y

$$(30.) \int_a^g [\varphi(x)] dx = \int_{\varphi(a)}^{\varphi(g)} f(y) \cdot w_1'(y) dy, \quad [\text{nach Gl. (25.)}]$$

$$(31.) \int_g^h [\varphi(x)] dx = \int_{\varphi(g)}^{\varphi(h)} f(y) \cdot w_2'(y) dy, \quad [\text{nach Gl. (26.)}]$$

$$(32.) \int_h^k [\varphi(x)] dx = \int_{\varphi(h)}^{\varphi(k)} f(y) \cdot w_3'(y) dy, \quad [\text{nach Gl. (27.)}]$$

$$(33.) \int_k^b [\varphi(x)] dx = \int_{\varphi(k)}^{\varphi(b)} f(y) \cdot w_4'(y) dy; \quad [\text{nach Gl. (28.)}]$$

das gesuchte Integral wird daher

$$(34.) \int_a^b [\varphi(x)] dx = \int_{\varphi(a)}^{\varphi(g)} f(y) \cdot w_1'(y) dy + \int_{\varphi(g)}^{\varphi(h)} f(y) \cdot w_2'(y) dy \\ + \int_{\varphi(h)}^{\varphi(k)} f(y) \cdot w_3'(y) dy + \int_{\varphi(k)}^{\varphi(b)} f(y) \cdot w_4'(y) dy.$$

Beispiel. Macht man bei der Rektifikation der Astroide

$$(35.) \quad x = a \cos^3 t, \quad y = a \sin^3 t$$

(vergl. Fig. 84 bei Aufgabe 6 in § 27) den Punkt A mit den Koordinaten $x = a$, $y = 0$ zum Anfangspunkte des Bogens, so wächst der Bogen gleichzeitig mit t , so daß ds und dt ständig gleiches Zeichen haben. Aus den Gleichungen

$$(36.) \quad dx = -3a \cos^2 t \sin t dt, \quad dy = 3a \sin^2 t \cos t dt,$$

$$(37.) \quad ds^2 = 9a^2 \sin^2 t \cos^2 t dt^2$$

folgt daher

$$(38.) \quad ds = \pm 3a \sin t \cos t dt = \pm 3a \sin t d(\sin t),$$

wobei das Zeichen so zu wählen ist, daß $\frac{ds}{dt}$ positiv wird.

Den ganzen Umfang der Astroide erhält man, wenn t alle Werte von 0 bis 2π durchläuft. Man muß deshalb das Intervall von 0 bis 2π in vier gleiche Teile zerlegen und muß in jedem dieser Teile abwechselnd das positive

und das negative Vorzeichen nehmen, da $\sin t$ und $\cos t$ im ersten und dritten Quadranten *gleiches*, im zweiten und vierten Quadranten dagegen *ungleiches* Vorzeichen haben. Dadurch erhält man für den ganzen Umfang

$$(39.) \quad U = + 3a \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin t \cos t dt - 3a \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \sin t \cos t dt \\ + 3a \int_{\pi}^{\frac{3\pi}{2}} \sin t \cos t dt - 3a \int_{\frac{3\pi}{2}}^{2\pi} \sin t \cos t dt,$$

oder

$$(40.) \quad U = \frac{3a}{2} [\sin^2 t]_0^{\frac{\pi}{2}} - \frac{3a}{2} [\sin^2 t]_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} + \frac{3a}{2} [\sin^2 t]_{\pi}^{\frac{3\pi}{2}} - \frac{3a}{2} [\sin^2 t]_{\frac{3\pi}{2}}^{2\pi} \\ = \frac{3a}{2} (1 - 0) - \frac{3a}{2} (0 - 1) + \frac{3a}{2} (1 - 0) - \frac{3a}{2} (0 - 1) = 6a.$$


§ 69.

Messungsmethoden zur Berechnung bestimmter Integrale.

(Vergl. die Formel-Tabelle Nr. 204 und 205.)

Soll der Flächeninhalt $F = A_1 B_1 B A$ einer ebenen Figur berechnet werden, welche oben durch den Kurvenbogen AB (Fig. 122) mit der Gleichung

Fig. 122.



$$(1.) \quad y = f(x),$$

unten von der X -Achse, links und rechts von den Ordinaten $x = a$ und $x = b$ begrenzt wird, so kann man

$$(2.) \quad F = A_1 B_1 B A = \int_a^b f(x) dx$$

näherungsweise auch durch *lineare Messungen*

finden. Man braucht dann die Funktion

$$(3.) \quad F(x) = \int f(x) dx$$

gar nicht zu bestimmen, ja es braucht nicht einmal die Funktion $y = f(x)$ analytisch bekannt zu sein, sondern die Kurve kann irgendwie graphisch gegeben sein.

Teilt man nämlich die Strecke A_1B_1 in n gleiche Teile h und legt durch die Teilpunkte Parallele zur Y -Achse, so wird die Figur in n schmale Streifen zerlegt. Diese Streifen kann man näherungsweise als Paralleltrapeze betrachten, indem man die einzelnen Kurvenbogen durch gerade Linien ersetzt. Dies gibt, wenn man

$$(4.) \quad f(a) = y_0, \quad f(a+h) = y_1, \quad f(a+2h) = y_2, \dots \\ f(a+nh) = f(b) = y_n$$

setzt,

$$(5.) \quad A_1C_1CA = \frac{h}{2}(y_0 + y_1), \quad C_1D_1DC = \frac{h}{2}(y_1 + y_2),$$

$$D_1E_1ED = \frac{h}{2}(y_2 + y_3), \dots N_1B_1BN = \frac{h}{2}(y_{n-1} + y_n),$$

also

$$(6.) \quad A_1B_1BA = \int_a^b f(x) dx = \frac{h}{2}(y_0 + 2y_1 + 2y_2 + \dots + 2y_{n-1} + y_n) \\ = \frac{h}{2}[f(a) + 2f(a+h) + 2f(a+2h) + \dots + 2f(b-h) + f(b)].$$

Je größer die Anzahl n der Streifen wird, um so genauer wird das Resultat; wächst n ins Unendliche, so wird der gefundene Ausdruck dem gesuchten Integral bzw. dem gesuchten Flächeninhalt sogar genau gleich, da das Integral als Grenzwert einer solchen Summe für $\lim n = \infty$ erklärt ist.

Beispiel.

Es ist

$$(7.) \quad \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} = [\operatorname{arctg} x]_0^1 = \operatorname{arctg} 1 = \frac{\pi}{4}.$$

Für $n = 8$, $h = \frac{1}{8}$ wird in diesem Falle

$$\frac{\pi}{4} = \frac{1}{16} \left[f(0) + 2f\left(\frac{1}{8}\right) + 2f\left(\frac{2}{8}\right) + \dots + 2f\left(\frac{7}{8}\right) + f(1) \right],$$

oder, da $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$ ist,

$$\pi = \frac{1}{4} \left(1 + \frac{128}{65} + \frac{128}{68} + \frac{128}{73} + \frac{128}{80} + \frac{128}{89} + \frac{128}{100} + \frac{128}{113} + \frac{1}{2} \right)$$

$$= \frac{1}{4} + \frac{32}{65} + \frac{8}{17} + \frac{32}{73} + \frac{2}{5} + \frac{32}{89} + \frac{8}{25} + \frac{32}{113} + \frac{1}{8}.$$

Nun ist

$$\begin{aligned} 1 : 4 &= 0,25 \\ 32 : 65 &= 0,492\,307\,69 \\ 8 : 17 &= 0,470\,588\,24 \\ 32 : 73 &= 0,438\,356\,16 \\ 2 : 5 &= 0,4 \\ 32 : 89 &= 0,359\,550\,56 \\ 8 : 25 &= 0,32 \\ 32 : 113 &= 0,283\,185\,84 \\ 1 : 8 &= 0,125; \end{aligned}$$

folglich erhält man *näherungsweise*

$$\pi = 3,138\,988\,49.$$

Der gefundene Wert ist also um 0,002 604 16 *kleiner* als der wahre Wert der Zahl

$$\pi = 3,141\,592\,65.$$

Bei dem angegebenen Verfahren ist an die Stelle des Kurvenbogens AB ein der Kurve *einbeschriebenes* Polygon getreten. Man kann mit gleichem Rechte auch ein der Kurve *umschriebenes* Polygon in Betracht ziehen, indem man in den Punkten C, E, G, \dots (Fig. 122) an die Kurve Tangenten legt und z. B. die beiden Streifen A_1C_1CA und C_1D_1DC durch das Paralleltapez $A_1D_1D'A'$ (Fig. 123) ersetzt. Dabei wird

$$(8.) \quad A_1A' + D_1D' = 2C_1C = 2f(a+h),$$

also


$$(9.) \quad A_1D_1D'A' = 2h \cdot f(a+h).$$

Ebenso findet man für die beiden folgenden Streifen den Näherungswert

$$(10.) \quad 2h \cdot f(a+3h),$$

usw.

Fig. 123.



Unter der Voraussetzung, daß die Anzahl der Streifen eine *gerade* ist — sie heiße jetzt $2n$ —, findet man daher für den Flächeninhalt der ganzen Figur den Näherungswert

$$(11.) \quad F = 2h[f(a+h) + f(a+3h) + \dots + f(b-h)] \\ = 2h(y_1 + y_3 + y_5 + \dots + y_{2n-1}),$$

wo wieder

$$f(a+h) = y_1, \quad f(a+3h) = y_3, \quad f(a+5h) = y_5, \dots \\ f[a+(2n-1)h] = f(b-h) = y_{2n-1}$$

gesetzt ist.

Zu bemerken ist dabei, daß die Tangenten in den Punkten C und E (Fig. 122) die Ordinate D_1D im allgemeinen nicht genau in demselben Punkte D' treffen werden, so daß die Figur, deren Flächeninhalt durch Gleichung (11.) berechnet worden ist, von dem umschriebenen Polygon sich um eine kleine Größe unterscheidet.

Beispiel.

Es möge auch diese letzte Formel auf die Berechnung der Zahl π angewendet werden, wenn man wieder von Gleichung (7.) ausgeht. In diesem Falle sei die Anzahl der Streifen

$$2n = 16, \quad \text{also} \quad h = \frac{1}{16},$$

dann wird

$$\frac{\pi}{4} = \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} = \frac{1}{8} \left[f\left(\frac{1}{16}\right) + f\left(\frac{3}{16}\right) + \dots + f\left(\frac{15}{16}\right) \right], \\ \pi = \frac{128}{257} + \frac{128}{265} + \frac{128}{281} + \frac{128}{305} + \frac{128}{337} + \frac{128}{377} + \frac{128}{425} + \frac{128}{481}.$$

Nun ist

$$\begin{aligned} 128 : 257 &= 0,498\,054\,47 \\ 128 : 265 &= 0,483\,018\,87 \\ 128 : 281 &= 0,455\,516\,01 \\ 128 : 305 &= 0,419\,672\,13 \\ 128 : 337 &= 0,379\,821\,96 \\ 128 : 377 &= 0,339\,522\,55 \\ 128 : 425 &= 0,301\,176\,47 \\ 128 : 481 &= 0,266\,112\,27; \end{aligned}$$

folglich erhält man *näherungsweise*

$$\pi = 3,142\,894\,73.$$

Der gefundene Wert ist also um 0,001 302 08 *größer* als der wahre Wert der Zahl

$$\pi = 3,141\,592\,65.$$

Der Fehler ist in diesem Falle etwa *halb so groß* wie bei der vorhergehenden Methode.

Diese zweite Methode wird auch bei anderen Anwendungen in der Regel genauere Resultate liefern als die erste, ohne daß man mehr einzelne Glieder zu berechnen braucht, weil sich einer Kurve die Tangenten im allgemeinen enger anschmiegen als die Sehnen. Von diesem Umstande wird in dem folgenden Paragraphen Vorteil gezogen werden.

§ 70.

Simpsonsche Regel.

(Vergl. die Formel-Tabelle Nr. 206 und 207.)

Es möge wieder eine Figur begrenzt sein oben durch den Kurvenbogen AB mit der Gleichung

$$(1.) \quad y = f(x),$$

unten durch die X -Achse, links und rechts durch die Ordinaten $x = a$ und $x = b$ (vergl. Figur 122); die Strecke A_1B_1 sei in $2n$ gleiche Teile von der Länge h , und die Figur selbst sei durch die Ordinaten $y_1, y_2, y_3, \dots, y_{2n-1}$ in $2n$ Streifen zerlegt. Vereinigt man zunächst je 2 benachbarte Streifen, so daß man tatsächlich nur noch n Doppelstreifen hat, und ersetzt die begrenzenden Kurvenbogen durch die zugehörigen Sehnen, so findet man aus Formel Nr. 204 der Tabelle für den gesuchten Flächeninhalt, indem man h mit $2h$ vertauscht, den angenäherten Wert

$$(2.) \quad F_1 = h[f(a) + 2f(a+2h) + 2f(a+4h) + \dots + 2f(b-2h) + f(b)].$$

Ersetzt man dagegen bei den Doppelstreifen die Kurvenbogen bzw. durch die Tangenten, welche in den Endpunkten der Ordinaten $y_1, y_3, y_5, \dots, y_{2n-1}$ an die Kurve

gelegt sind, so erhält man nach Formel Nr. 205 der Tabelle den angenäherten Wert

$$(3.) F_2 = 2h[f(a+h) + f(a+3h) + f(a+5h) + \dots + f(b-h)].$$

Ist der begrenzende Kurvenbogen AB zwischen A und B *nach oben konvex*, so ist F_1 *kleiner* als der gesuchte Flächeninhalt

$$(4.) F = \int_a^b f(x) dx,$$

und F_2 ist *größer* als F ; es ist also

$$(5.) F_1 < F < F_2.$$

Ist dagegen der begrenzende Kurvenbogen AB zwischen A und B *nach oben konkav*, so wird

$$(6.) F_1 > F > F_2.$$

In beiden Fällen ist F ein Mittelwert zwischen F_1 und F_2 , so daß die Größe v , welche durch die Gleichung

$$(7.) \frac{F - F_1}{F_2 - F} = v$$

erklärt wird, immer *positiv* ist, und zwar wird v für hinreichend große Werte von n in der Regel größer als 1 sein, weil sich die Tangenten enger an die Kurve anschmiegen als die Sehnen. Aus Gleichung (7.) ergibt sich sodann

$$(8.) F = \frac{F_1 + vF_2}{1 + v}.$$

Bei der angenäherten Berechnung der Zahl π im vorhergehenden Paragraphen war z. B. $F - F_1$ etwa doppelt so groß wie $F_2 - F$. Setzt man daher in den Gleichungen (7.) und (8.) $v = 2$, so erhält man durch die Formel

$$(9.) F = \frac{F_1 + vF_2}{1 + v} = \frac{F_1 + 2F_2}{3}$$

eine noch stärkere Annäherung an den wirklichen Wert des bestimmten Integrals. Dies gibt, wenn man die Werte von F_1 und F_2 in Gleichung (9.) einsetzt,

$$(10.) F = \frac{h}{3} [f(a) + 4f(a+h) + 2f(a+2h) + 4f(a+3h) + 2f(a+4h) + \dots + 2f(b-2h) + 4f(b-h) + f(b)],$$

oder

$$(11.) F = \frac{h}{3} (y_0 + 4y_1 + 2y_2 + 4y_3 + 2y_4 + \dots + 2y_{2n-2} + 4y_{2n-1} + y_{2n}).$$

Für die Zahl π erhält man daher unter Benutzung der im vorigen Paragraphen gefundenen Resultate

$$\pi = \frac{1}{3} (3,138\,988\,49 + 6,285\,789\,46) = 3,141\,592\,65.$$

Der gefundene Wert stimmt also bis auf 8 Dezimalstellen genau mit dem wahren Werte von π überein.

Die in den Gleichungen (10.) und (11.) enthaltene Formel, welche unter dem Namen „*Simpsonsche Regel*“ bekannt ist, gibt nicht nur für die Berechnung der Zahl π sehr genaue Werte, sondern auch für die Berechnung von anderen bestimmten Integralen, wenn man nur die Zahl n groß genug macht. Bei dem ersten, in § 69 angewendeten Näherungsverfahren wurde die begrenzende Kurve durch *gerade Linien* mit der Gleichung


$$y = ax + b$$

ersetzt, wobei die Konstanten a und b so bestimmt werden können, daß jede dieser Geraden durch zwei benachbarte Punkte der Kurve hindurchgeht. Auf die *Simpsonsche Regel* dagegen wird man geführt, indem man bei der Berechnung der Doppelstreifen die einzelnen Kurvenbogen durch passend gewählte *Parabelbogen* ersetzt, welche sich der Kurve sehr eng anschließen. Dies geschieht in folgender Weise.

Die Gleichung

$$(12.) \quad y = ax^2 + bx + c$$

Fig. 124.



stellt, was auch die konstanten Koeffizienten a , b , c sein mögen, eine Parabel dar, deren Achse zur Y -Achse parallel ist. Über die Koeffizienten a , b , c kann man nun so verfügen, daß die Parabel durch die drei Punkte A , C , D (Fig. 124) mit den Koordinaten

$(-h, y_0)$, $(0, y_1)$, $(+h, y_2)$ hindurchgeht, indem man die Gleichungen

$$(13.) \quad \begin{cases} y_0 = ah^2 - bh + c, \\ y_1 = c, \\ y_2 = ah^2 + bh + c \end{cases}$$

befriedigt. Daraus ergibt sich

$$(14.) \quad a = \frac{1}{2h^2}(y_0 - 2y_1 + y_2), \quad b = \frac{1}{2h}(-y_0 + y_2), \quad c = y_1,$$

so daß Gleichung (12.) übergeht in

$$(15.) \quad y = \frac{1}{2h^2}[(y_0 - 2y_1 + y_2)x^2 + h(-y_0 + y_2)x + 2h^2y_1].$$

Der Flächeninhalt der Figur A_1D_1DA wird daher

$$(16.) \quad \begin{aligned} A_1D_1DA &= \int_{-h}^{+h} y dx = \int_{-h}^{+h} (ax^2 + bx + c) dx = \left[\frac{ax^3}{3} + \frac{bx^2}{2} + cx \right]_{-h}^{+h} \\ &= \frac{ah^3}{3} + \frac{bh^2}{2} + ch - \left(-\frac{ah^3}{3} + \frac{bh^2}{2} - ch \right) = \frac{2ah^3}{3} + 2ch \\ &= \frac{h}{3}(y_0 - 2y_1 + y_2 + 3y_1) = \frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + y_2). \end{aligned}$$

Da bei einer beliebigen Parallelverschiebung der Y-Achse sich weder die Länge der Ordinaten $y_0, y_1, y_2, \dots, y_{2n}$ noch die Größe h ändert, so kann man in ähnlicher Weise den Flächeninhalt der sämtlichen Doppelstreifen (in Figur 122) berechnen und findet dafür bezw.

$$\frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + y_2), \quad \frac{h}{3}(y_2 + 4y_3 + y_4), \quad \dots, \quad \frac{h}{3}(y_{2n-2} + 4y_{2n-1} + y_{2n});$$

dabei hat man die einzelnen Kurvenbogen durch Parabelbogen ersetzt, welche durch je 3 aufeinander folgende Punkte der begrenzenden Kurve AB hindurchgehen. Für den Flächeninhalt der ganzen Figur erhält man dann den angenäherten Wert

$$(17.) \quad F = \frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + 2y_2 + 4y_3 + 2y_4 + \dots + 2y_{2n-2} + 4y_{2n-1} + y_{2n}),$$

ein Ausdruck, welcher mit Gleichung (11.), d. h. mit der *Simpsonschen Regel* genau übereinstimmt.

Um sich darüber Rechenschaft zu geben, wie genau die durch Anwendung der *Simpsonschen Regel* gefundenen Resultate sind, diene die folgende Betrachtung. Entwickelt man

$$(18.) \quad \frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + y_2) = \frac{h}{3}[f(a) + 4f(a+h) + f(a+2h)]$$

nach steigenden Potenzen von h , so erhält man durch Anwendung der *Taylorischen Reihe*

$$(19.) \quad \frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + y_2) = 2h \cdot f(a) + 2h^2 \cdot f'(a) + \frac{4h^3}{3} f''(a) + \frac{2h^4}{3} f'''(a) + \frac{5h^5}{18} f^{(4)}(a) + \dots$$

Andererseits ist nach der *Taylorischen Reihe*, wenn man die Funktion $F(x)$ durch die Gleichung

$$F'(x) = f(x)$$

erklärt,

$$(20.) \quad \int_a^{a+2h} f(x) dx = F(a+2h) - F(a) \\ = \frac{2h}{1!} f(a) + \frac{4h^2}{2!} f'(a) + \frac{8h^3}{3!} f''(a) + \frac{16h^4}{4!} f'''(a) \\ + \frac{32h^5}{5!} f^{(4)}(a) + \dots,$$

folglich wird

$$(21.) \quad \frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + y_2) - \int_a^{a+2h} f(x) dx = \frac{h^5}{90} f^{(4)}(a) + \dots$$

Man erkennt daraus, daß der Unterschied zwischen dem Näherungswert, den die *Simpsonsche Regel* liefert, und dem wahren Werte des Integrals mit h zugleich unendlich klein wird von der *fünften* Ordnung.

Für n Doppelstreifen ist daher der Unterschied unter Vernachlässigung der Glieder von der sechsten und von höherer Ordnung

$$\frac{h^5}{90} [f^{(4)}(a) + f^{(4)}(a+2h) + f^{(4)}(a+4h) + \dots + f^{(4)}(b-2h)],$$

oder, wenn man den Mittelwert M durch die Gleichung

$$(22.) \quad M = \frac{1}{n} [f^{(4)}(a) + f^{(4)}(a+2h) + f^{(4)}(a+4h) + \dots + f^{(4)}(b-2h)]$$

erklärt und beachtet, daß $2nh = b - a$ ist, so wird der gesamte Fehler gleich

$$\frac{nh^5}{90} M = \frac{(b-a)h^4}{180} M.$$

Es war bei Herleitung der Näherungsformel in diesem und dem vorhergehenden Paragraphen bisher die Voraussetzung gemacht worden, daß der begrenzende Kurvenbogen AB über der X -Achse liegt; es gelten aber noch dieselben Schlüsse auch dann, wenn der Bogen AB unter der X -Achse liegt, es wird dann aber der Wert des bestimmten Integrals *negativ*. Die Formeln bleiben sogar noch richtig, wenn die Kurve teilweise *über*, teilweise *unter* der X -Achse liegt, wie schon aus der Zerlegung des bestimmten Integrals hervorgeht. Man kann aber den Beweis auch dadurch führen, daß man die X -Achse um die Strecke c nach unten verschiebt, indem man

$$y = y' - c$$

setzt und c so groß macht, daß die Kurve ganz oberhalb der neuen X -Achse liegt. Man findet dann für die Fläche F' , die unten durch die neue X -Achse begrenzt wird, den Näherungswert

$$\begin{aligned} F' &= \frac{h}{3} (y'_0 + 4y'_1 + 2y'_2 + 4y'_3 + 2y'_4 + \dots \\ &\quad + 2y'_{2n-2} + 4y'_{2n-1} + y'_{2n}) \\ &= \frac{h}{3} (y_0 + 4y_1 + 2y_2 + 4y_3 + 2y_4 + \dots \\ &\quad + 2y_{2n-2} + 4y_{2n-1} + y_{2n}) + \frac{h}{3} 6nc. \end{aligned}$$

Da aber

$$F' - F = 2nhc$$

ist, so folgt hieraus wieder

$$\begin{aligned} F &= \frac{h}{3} (y_0 + 4y_1 + 2y_2 + 4y_3 + 2y_4 + \dots \\ &\quad + 2y_{2n-2} + 4y_{2n-1} + y_{2n}). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (25.) \quad F_1 &= \frac{2h}{45} (7y_0 + 32y_1 + 12y_2 + 32y_3 + 7y_4) \\
 &= \frac{2h}{45} \left[7f(a) + 32f(a+h) + 12f(a+2h) \right. \\
 &\quad \left. + 32f(a+3h) + 7f(a+4h) \right] \\
 &= 4hf(a) + 8h^2f'(a) + \frac{32h^3}{3} f''(a) + \frac{32h^4}{3} f'''(a) \\
 &\quad + \frac{128h^5}{15} f^{(4)}(a) + \frac{256h^6}{45} f^{(5)}(a) + \frac{88h^7}{27} f^{(6)}(a) + \dots
 \end{aligned}$$

Anderseits ist

$$\begin{aligned}
 (26.) \quad \int_a^{a+4h} f(x) dx &= \int_a^{a+4h} F'(x) dx = F(a+4h) - F(a) \\
 &= 4hf(a) + 8h^2f'(a) + \frac{32h^3}{3} f''(a) + \frac{32h^4}{3} f'''(a) \\
 &\quad + \frac{128h^5}{15} f^{(4)}(a) + \frac{256h^6}{45} f^{(5)}(a) + \frac{1024h^7}{315} f^{(6)}(a) + \dots,
 \end{aligned}$$

folglich wird

$$(27.) \quad F_1 - \int_a^{a+4h} f(x) dx = \frac{8h^7}{945} f^{(6)}(a) + \dots$$

Der Unterschied zwischen dem Näherungswerte und dem wahren Werte des Integrals wird also für je 4 Streifen von der Breite h mit h zugleich unendlich klein von der *siebenten* Ordnung.

Für alle $4n$ Streifen wird demnach der Unterschied etwa n -mal so groß. Der gesamte Fehler wird also, da

$$4nh = b - a$$

ist, gleich einem Mittelwerte $f^{(6)}[a + \theta(b-a)]$, multipliziert mit

$$\frac{2(b-a)h^6}{945}.$$

In dieser Weise kann man fortfahren und die einzelnen Teile des Kurvenbogens AB durch Kurvenbogen mit der Gleichung

$$(28.) \quad y = ax^{2m} + a_1x^{2m-1} + a_2x^{2m-2} + \dots + a_{2m-1}x + a_{2m}$$

ersetzen, welche durch je $2m + 1$ aufeinander folgende Punkte der gegebenen Kurve hindurchgehen.

Es ist dabei noch zu bemerken, daß die Genauigkeit im allgemeinen keine wesentlich größere wird, wenn man die Gleichung (28.) mit der Gleichung

$$(29.) \quad y = ax^{2m+1} + a_1x^{2m} + a_2x^{2m-1} + \dots + a_{2m}x + a_{2m+1}$$

vertauscht und die $2m + 2$ Koeffizienten $a, a_1, a_2, \dots, a_{2m+1}$ so bestimmt, daß die entsprechende Kurve durch $2m + 2$ aufeinander folgende Punkte der gegebenen Kurve hindurchgeht. Der Grund dafür liegt darin, daß bei dem Integral

$$(30.) \quad \int_{-k}^{+k} y dx = \left[a \frac{x^{2m+2}}{2m+2} + a_1 \frac{x^{2m+1}}{2m+1} + \dots + a_{2m} \frac{x^2}{2} + a_{2m+1} x \right]_{-k}^{+k} \\ = 2 \left(a_1 \frac{k^{2m+1}}{2m+1} + a_3 \frac{k^{2m-1}}{2m-1} + \dots + a_{2m+1} k \right)$$

der Koeffizient a von x^{2m+1} in dem Endresultat überhaupt nicht mehr vorkommt.

Wenn man z. B. die Figur in $3n$ Streifen von gleicher Breite h zerlegt und in

$$(31.) \quad y = ax^3 + a_1x^2 + a_2x + a_3$$

die vier konstanten Koeffizienten a, a_1, a_2, a_3 so bestimmt, daß die neue Kurve mit dem Kurvenbogen AB in Figur 122 die vier aufeinander folgenden Punkte A, C, D, E gemeinschaftlich hat, so wird

$$a = \frac{1}{6h^3} (-y_0 + 3y_1 - 3y_2 + y_3),$$

$$a_1 = \frac{1}{4h^2} (y_0 - y_1 - y_2 + y_3),$$

$$a_2 = \frac{1}{24h} (y_0 - 27y_1 + 27y_2 - y_3),$$

$$a_3 = \frac{1}{16} (-y_0 + 9y_1 + 9y_2 - y_3),$$

wobei angenommen ist, daß die Y -Achse in der Mitte

zwischen den Ordinaten C_1C und D_1D liegt. Dadurch erhält man für F den Näherungswert

$$\begin{aligned}
 (32.) \quad F_1 &= \int_{-\frac{3h}{2}}^{+\frac{3h}{2}} (ax^3 + a_1x^2 + a_2x + a_3) dx = \left[\frac{ax^4}{4} + \frac{a_1x^3}{3} + \frac{a_2x^2}{2} + a_3x \right]_{-\frac{3h}{2}}^{+\frac{3h}{2}} \\
 &= \left(\frac{81ah^4}{64} + \frac{27a_1h^3}{24} + \frac{9a_2h^2}{8} + \frac{3a_3h}{2} \right) \\
 &\quad - \left(\frac{81ah^4}{64} - \frac{27a_1h^3}{24} + \frac{9a_2h^2}{8} - \frac{3a_3h}{2} \right) \\
 &= \frac{9a_1h^3}{4} + 3a_3h = \frac{3h}{8} (y_0 + 3y_1 + 3y_2 + y_2).
 \end{aligned}$$

Man erkennt, daß dieser Ausdruck unabhängig ist von a und a_2 . Dabei ist auch die Genauigkeit nur von derselben Stufe wie bei der *Simpsonschen Regel*. Setzt man nämlich wieder $f(x)$ gleich $F'(x)$, so ergibt sich aus der Entwicklung nach der *Taylor'schen Reihe*

$$\begin{aligned}
 (33.) \quad \int_a^{a+3h} f(x) dx &= F(a+3h) - F(a) \\
 &= \frac{f(a)}{1!} 3h + \frac{f'(a)}{2!} 9h^2 + \frac{f''(a)}{3!} 27h^3 + \frac{f'''(a)}{4!} 81h^4 + \frac{f^{(4)}(a)}{5!} 243h^5 + \dots
 \end{aligned}$$

und

$$\begin{aligned}
 F_1 &= \frac{3h}{8} (y_0 + 3y_1 + 3y_2 + y_3) \\
 &= \frac{3h}{8} [f(a) + 3f(a+h) + 3f(a+2h) + f(a+3h)] \\
 &= \frac{3h}{8} \left[(1+3+3+1)f(a) + (3+6+3) \frac{f'(a)}{1!} h + (3+12+9) \frac{f''(a)}{2!} h^2 \right. \\
 &\quad \left. + (3+24+27) \frac{f'''(a)}{3!} h^3 + (3+48+81) \frac{f^{(4)}(a)}{4!} h^4 + \dots \right] \\
 &= \frac{f(a)}{1!} 3h + \frac{f'(a)}{2!} 9h^2 + \frac{f''(a)}{3!} 27h^3 + \frac{f'''(a)}{4!} 81h^4 \\
 &\quad + \frac{f^{(4)}(a)}{5!} \frac{495h^5}{2} + \dots,
 \end{aligned}$$

folglich wird

$$(34.) \quad \frac{3h}{8} (y_0 + 3y_1 + 3y_2 + y_3) - \int_a^{a+3h} f(x) dx = \frac{3h^5}{80} f^{(4)}(a) + \dots$$

Der Unterschied wird also auch hier, genau wie bei der *Simpsonschen Regel*, mit h verschwindend klein von der fünften Ordnung.

§ 71.

Übungs-Beispiele.

Aufgabe 1. Man soll mit Anwendung der *Simpsonschen Regel*

$$(1.) \quad \ln 2 = \int_1^2 \frac{dx}{x}$$

berechnen.

Auflösung. Es sei $2n = 12$, also $h = \frac{1}{12}$, dann wird

$$(2.) \quad \ln 2 = \frac{1}{36} \left[f(1) + 4f\left(\frac{13}{12}\right) + 2f\left(\frac{14}{12}\right) + \dots + 4f\left(\frac{23}{12}\right) + f(2) \right]$$

$$= \frac{1}{36} \left(1 + \frac{48}{13} + \frac{24}{14} + \frac{48}{15} + \frac{24}{16} + \frac{48}{17} + \frac{24}{18} + \frac{48}{19} + \frac{24}{20} \right.$$

$$\left. + \frac{48}{21} + \frac{24}{22} + \frac{48}{23} + \frac{12}{24} \right).$$

Nun ist

$$\begin{aligned} 1 : 36 &= 0,027\,777\,78 \\ 4 : 39 &= 0,102\,564\,10 \\ 2 : 42 &= 0,047\,619\,05 \\ 4 : 45 &= 0,088\,888\,89 \\ 2 : 48 &= 0,041\,666\,67 \\ 4 : 51 &= 0,078\,431\,37 \\ 2 : 54 &= 0,037\,037\,04 \\ 4 : 57 &= 0,070\,175\,44 \\ 2 : 60 &= 0,033\,333\,33 \\ 4 : 63 &= 0,063\,492\,06 \\ 2 : 66 &= 0,030\,303\,03 \\ 4 : 69 &= 0,057\,971\,01 \\ 1 : 72 &= 0,013\,888\,89; \end{aligned}$$

folglich findet man für $\ln 2$ den Näherungswert 0,693 148 66, der sich von dem wahren Werte, nämlich von

$$\ln 2 = 0,693\,147\,18$$

nur um 0,000 001 48 unterscheidet.

Berechnet man $\ln 2 = \int_1^2 \frac{dx}{x}$ nach der zweiten Methode,

also nach Formel Nr. 207 der Tabelle, indem man wieder 12 Intervalle annimmt, so wird

$$(3.) \quad 4n = 12, \quad h = \frac{1}{12},$$

also

$$(4.) \quad F = \frac{2h}{45} (7y_0 + 32y_1 + 12y_2 + 32y_3 + 14y_4 + 32y_5 \\ + 12y_6 + 32y_7 + 14y_8 + 32y_9 + 12y_{10} + 32y_{11} + 7y_{12}) \\ = \frac{1}{270} \left(7 + \frac{384}{13} + \frac{144}{14} + \frac{384}{15} + \frac{168}{16} + \frac{384}{17} + \frac{144}{18} \right. \\ \left. + \frac{384}{19} + \frac{168}{20} + \frac{384}{21} + \frac{144}{22} + \frac{384}{23} + \frac{7}{2} \right).$$

Nun ist

$$\begin{aligned} 7 &= 7 \\ 384 : 13 &= 29,538\,461\,538\,5 \\ 144 : 14 &= 10,285\,714\,285\,7 \\ 384 : 15 &= 25,6 \\ 168 : 16 &= 10,5 \\ 384 : 17 &= 22,588\,235\,294\,1 \\ 144 : 18 &= 8 \\ 384 : 19 &= 20,210\,526\,315\,8 \\ 168 : 20 &= 8,4 \\ 384 : 21 &= 18,285\,714\,285\,7 \\ 144 : 22 &= 6,545\,454\,545\,5 \\ 384 : 23 &= 16,695\,652\,173\,9 \\ 7 : 2 &= 3,5; \end{aligned}$$

folglich erhält man für $\ln 2$ den Näherungswert

$$(5.) \quad F = 187,149\,758\,439\,2 : 270 \\ = 0,693\,147\,253\,5,$$

der sich von

$$\ln 2 = 0,693\,147\,180\,6$$

nur um

$$(6.) \quad F - \ln 2 = 0,000\,000\,072\,9$$

unterscheidet.

Aufgabe 2. Man soll die Zahl π durch Anwendung der *Simpsonschen Regel* aus der Gleichung

$$(7.) \quad \int_0^{0.5} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = [\arcsin x]_0^{0.5} = \frac{\pi}{6}$$

berechnen.

Auflösung. Für $2n = 8$, also $h = \frac{1}{16}$ erhält man

$$(8.) \quad \pi = \frac{6h}{3} \left[f(0) + 4f\left(\frac{1}{16}\right) + \dots + 4f\left(\frac{7}{16}\right) + f\left(\frac{8}{16}\right) \right] \\ = \frac{1}{8} \left(1 + \frac{64}{\sqrt{255}} + \frac{32}{\sqrt{252}} + \frac{64}{\sqrt{247}} + \frac{32}{\sqrt{240}} + \frac{64}{\sqrt{231}} \right. \\ \left. + \frac{32}{\sqrt{220}} + \frac{64}{\sqrt{207}} + \frac{16}{\sqrt{192}} \right),$$

oder

$$(9.) \quad \pi = \frac{1}{8} + \frac{\sqrt{16320}}{255} + \frac{\sqrt{28}}{21} + \frac{\sqrt{15808}}{247} + \frac{\sqrt{15}}{15} \\ + \frac{\sqrt{14784}}{231} + \frac{\sqrt{220}}{55} + \frac{\sqrt{1472}}{69} + \frac{\sqrt{3}}{12}.$$

Nun ist

$$1 : 8 = 0,125$$

$$\sqrt{16320} : 255 = 0,500\,979\,43$$

$$\sqrt{28} : 21 = 0,251\,976\,31$$

$$\sqrt{15808} : 247 = 0,509\,027\,81$$

$$\sqrt{15} : 15 = 0,258\,198\,89$$

$$\sqrt{14784} : 231 = 0,526\,361\,35$$

$$\sqrt{220} : 55 = 0,269\,679\,95$$

$$\sqrt{1472} : 69 = 0,556\,038\,44$$

$$\sqrt{3} : 12 = 0,144\,337\,57;$$

folglich erhält man für die Zahl π den Näherungswert 3,141 599 75, der sich von dem wahren Werte, nämlich von

$$\pi = 3,141\,592\,65,$$

nur um die Größe 0,000 007 10 unterscheidet.

Aufgabe 3. Von einer Ellipse $b^2x^2 + a^2y^2 = a^2b^2$ mit den Halbachsen $a = 6$, $b = 4$ soll man das Flächenstück $Q_1Q_2P_2P_1$ berechnen (Fig. 125), wenn $OQ_1 = -1$ und $OQ_2 = +5$ ist.

Auflösung. Aus der Gleichung der Ellipse folgt

$$(10.) \quad y = \frac{b}{a} \sqrt{a^2 - x^2} = \frac{2}{3} \sqrt{36 - x^2},$$

so daß man für den gesuchten Flächeninhalt

$$(11.) \quad F = \frac{2}{3} \int_{-1}^{+5} dx \sqrt{36 - x^2}$$


erhält. Nach der *Simpson-*Regel wird daher für $2n = 12$, $h = \frac{1}{2}$

$$(12.) \quad F = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{6} (\sqrt{35} + 4\sqrt{35,75} + 2\sqrt{36} + 4\sqrt{35,75} \\ + 2\sqrt{35} + 4\sqrt{33,75} + 2\sqrt{32} + 4\sqrt{29,75} \\ + 2\sqrt{27} + 4\sqrt{23,75} + 2\sqrt{20} + 4\sqrt{15,75} + \sqrt{11}).$$

Nun ist

$$\begin{aligned} 2\sqrt{36} &= 2 \cdot 6 = 12,000\,000\,0 \\ 8\sqrt{35,75} &= \sqrt{2288} = 47,833\,043\,0 \\ 3\sqrt{35} &= \sqrt{315} = 17,748\,239\,3 \\ 4\sqrt{33,75} &= \sqrt{540} = 23,237\,900\,1 \\ -2\sqrt{32} &= \sqrt{128} = 11,313\,708\,5 \\ 4\sqrt{29,75} &= \sqrt{476} = 21,817\,424\,2 \\ 2\sqrt{27} &= \sqrt{108} = 10,392\,304\,8 \\ 4\sqrt{23,75} &= \sqrt{380} = 19,493\,588\,7 \\ 2\sqrt{20} &= \sqrt{80} = 8,944\,271\,9 \\ 4\sqrt{15,75} &= \sqrt{252} = 14,874\,507\,9 \\ \sqrt{11} &= 3,316\,624\,8; \end{aligned}$$

Fig. 125.



man erhält daher für F den *Näherungswert*

$$(13.) \quad 191,971\,613\,2 : 9 = 21,330\,179\,24.$$

Den *wahren* Wert von F findet man aus

$$(14.) \quad F = \frac{2}{3} \int_{-1}^5 dx \sqrt{36-x^2} = \frac{2}{3} \left[\frac{x}{2} \sqrt{36-x^2} + 18 \arcsin \left(\frac{x}{6} \right) \right]_{-1}^{+5} \\ = \frac{1}{3} (5\sqrt{11} + \sqrt{35}) + 12 \arcsin \left(\frac{5}{6} \right) - 12 \arcsin \left(-\frac{1}{6} \right).$$

Dabei ist (vergl. Aufgabe 4 in § 19)

$$\frac{5}{3} \sqrt{11} = 5,527\,708$$

$$\frac{1}{3} \sqrt{35} = 1,972\,027$$

$$12 \arcsin \left(\frac{5}{6} \right) = 11,821\,327$$

$$12 \arcsin \left(\frac{1}{6} \right) = 2,009\,377,$$


also

$$(15.) \quad F = 21,330\,439.$$

Der durch die Anwendung der *Simpsonschen Regel* gefundene Näherungswert ist also um 0,000 260 zu klein.

Aufgabe 4. In einer Ellipse (Fig. 126) mit der Gleichung

Fig. 126.



$$(16.) \quad b^2 x^2 + a^2 y^2 = a^2 b^2$$

seien die beiden Halbachsen

(17.) $a = 10$ und $b = 6$;
man soll die Länge des Bogens BP bestimmen, wenn OQ gleich 8 ist.

Auflösung. Aus Gleichung (16.) folgt

$$(18.) \quad \frac{dy}{dx} = -\frac{b^2 x}{a^2 y}, \quad \left(\frac{ds}{dx} \right)^2 = \frac{a^4 y^2 + b^4 x^2}{a^4 y^2} = \frac{a^4 - e^2 x^2}{a^2 (a^2 - x^2)}.$$

In dem vorliegenden Falle ist e gleich 8, also

$$(19.) \quad s = BP = \int_0^8 dx \sqrt{\frac{10\,000 - 64x^2}{100(100 - x^2)}}.$$

Deshalb erhält man durch Anwendung der *Simpson-*schen Regel für $2n = 8$, $h = 1$

$$(20.) \quad s = \frac{1}{3} \left(1 + 4\sqrt{\frac{9936}{9900}} + 2\sqrt{\frac{9744}{9600}} + 4\sqrt{\frac{9424}{9100}} \right. \\ \left. + 2\sqrt{\frac{8976}{8400}} + 4\sqrt{\frac{8400}{7500}} + 2\sqrt{\frac{7696}{6400}} + 4\sqrt{\frac{6864}{5100}} + \sqrt{\frac{5904}{3600}} \right).$$

Nun ist

$$1 = 1,000\,000\,00$$

$$4\sqrt{9936} : \sqrt{9900} = \sqrt{48576} : 55 = 4,007\,266\,12$$

$$2\sqrt{9744} : \sqrt{9600} = \sqrt{406} : 10 = 2,014\,944\,17$$

$$4\sqrt{9424} : \sqrt{9100} = \sqrt{3430336} : 455 = 4,070\,586\,00$$

$$2\sqrt{8976} : \sqrt{8400} = \sqrt{20944} : 70 = 2,067\,434\,57$$

$$4\sqrt{8400} : \sqrt{7500} = \sqrt{448} : 5 = 4,233\,202\,10$$

$$2\sqrt{7696} : \sqrt{6400} = \sqrt{481} : 10 = 2,193\,171\,22$$

$$4\sqrt{6864} : \sqrt{5100} = \sqrt{155584} : 85 = 4,640\,486\,78$$

$$\sqrt{5904} : \sqrt{3600} = \sqrt{41} : 5 = 1,280\,624\,85;$$

folglich findet man für die Bogenlänge BP den Näherungswert

$$(21.) \quad s = 25,507\,715\,81 : 3 = 8,502\,571\,94.$$

Soll der Quadrant der Ellipse, nämlich

$$(22.) \quad q = \int_0^{10} dx \sqrt{\frac{10\,000 - 64x^2}{100(100 - x^2)}}$$

berechnet werden, so würde die Rechnung auf Schwierigkeiten stoßen, weil

$$f(x) = \sqrt{\frac{10\,000 - 64x^2}{100(100 - x^2)}}$$

für $x = 10$ unendlich groß wird. Um auch in diesem Falle

die angenäherte Berechnung von $\int_8^{10} f(x) dx$ auszuführen, mache man y zur Integrations-Veränderlichen, indem man

$$(23.) \quad y = \frac{6}{10} \sqrt{100 - x^2}, \quad \text{oder} \quad x = \frac{10}{6} \sqrt{36 - y^2}$$

setzt. Dies gibt (Fig. 126)

$$(24.) \quad dx = -\frac{5y dy}{3\sqrt{36 - y^2}}, \quad ds = -dy \sqrt{\frac{1296 + 64y^2}{36(36 - y^2)}},$$

$$(25.) \quad PA = \int_8^{10} f(x) dx = -\int_{3,6}^0 dy \sqrt{\frac{324 + 16y^2}{9(36 - y^2)}} \\ = +\int_0^{3,6} dy \sqrt{\frac{324 + 16y^2}{9(36 - y^2)}}.$$

Wendet man auf die Berechnung dieses Integrals die *Simpson'sche Regel* an, indem man $2n = 4$, also $h = 0,9$ setzt, so ergibt sich

$$(26.) \quad PA = 0,3 \left(1 + 4\sqrt{\frac{416}{391}} + 2\sqrt{\frac{116}{91}} + 4\sqrt{\frac{544}{319}} + \sqrt{\frac{41}{16}} \right).$$

Nun ist

$$0,3 = 0,300\,000\,00$$

$$1,2 \cdot \sqrt{416} : \sqrt{391} = \sqrt{234\,224,64} : 391 = 1,237\,768\,80$$

$$0,6 \cdot \sqrt{116} : \sqrt{91} = \sqrt{3800,16} : 91 = 0,677\,422\,39$$

$$1,2 \cdot \sqrt{544} : \sqrt{319} = \sqrt{249\,891,84} : 319 = 1,567\,059\,02$$

$$0,3 \cdot \sqrt{41} : \sqrt{16} = \sqrt{3,69} : 4 = 0,480\,234\,32;$$

folglich erhält man für PA den Näherungswert

$$(27.) \quad PA = 4,262\,484\,53,$$

so daß man mit Rücksicht auf Gleichung (21.) für den ganzen Ellipsenquadranten

$$(28.) \quad BPA = q = 12,765\,056\,47$$

erhält. Durch wirkliche Berechnung des elliptischen Integrals hatte man auf Seite 350 in § 60 für denselben Ellipsenquadranten

$$(29.) \quad q = 12,763\,499\,4$$

so mögen in dem Ausdruck

$$(5.) \quad F_1 = h[c_1 f(c - ah) + c_2 f(c + \beta h)]$$

die 4 Größen c_1, c_2, α, β so bestimmt werden, daß in der Entwicklung von F_1 nach steigenden Potenzen von h , also in

$$(6.) \quad F_1 = (c + c_2)h f(c) + (-c_1\alpha + c_2\beta) \frac{h^2}{1!} f'(c) \\ + (c_1\alpha^2 + c_2\beta^2) \frac{h^3}{2!} f''(c) + (-c_1\alpha^3 + c_2\beta^3) \frac{h^4}{3!} f'''(c) \\ + (c_1\alpha^4 + c_2\beta^4) \frac{h^5}{4!} f^{(4)}(c) + \dots$$

möglichst viele Glieder mit der in Gleichung (4.) gegebenen Entwicklung übereinstimmen. Zunächst folgt aus den Gleichungen

$$(7.) \quad -c_1\alpha + c_2\beta = 0, \quad \text{oder} \quad c_1\alpha = c_2\beta$$

und

$$(8.) \quad -c_1\alpha^3 + c_2\beta^3 = 0, \quad \text{oder} \quad c_1\alpha^3 = c_2\beta^3,$$

daß

$$(9.) \quad \beta^2 = \alpha^2, \quad \text{oder} \quad \beta = \pm \alpha.$$

Wäre $\beta = -\alpha$, so würden die beiden Ordinaten $f(c - ah)$ und $f(c + \beta h)$ zusammenfallen; damit man zwei verschiedene Ordinaten erhält, muß man also in Gleichung (9.) das obere Vorzeichen wählen. Daraus folgt dann auch

$$(10.) \quad c_1 = c_2,$$

so daß die Gleichungen (5.) und (6.) übergehen in

$$(11.) \quad F_1 = c_1 h [f(c - ah) + f(c + ah)] \\ = 2 \left[c_1 h f(c) + c_1 \alpha^2 \frac{h^3}{2!} f''(c) + c_1 \alpha^4 \frac{h^5}{4!} f^{(4)}(c) + \dots \right].$$

Jetzt sind nur noch die beiden Größen c_1 und α so zu bestimmen, daß

$$(12.) \quad c_1 = 1, \quad 3c_1\alpha^2 = 1, \quad \text{also} \quad \alpha = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

wird. Dies gibt

$$(13.) \quad F_1 = h \left[f\left(c - \frac{h}{\sqrt{3}}\right) + f\left(c + \frac{h}{\sqrt{3}}\right) \right] \\ = 2 \left[hf(c) + \frac{h^3}{3 \cdot 2!} f''(c) + \frac{h^5}{9 \cdot 4!} f^{(4)}(c) + \dots \right].$$

Es ist daher

$$(14.) \quad \int_{c-h}^{c+h} f(x) dx - F_1 = \frac{h^5}{135} f^{(4)}(c) + \dots$$

Indem man in Gleichung (13.) für c die Werte $c = a + h, a + 3h, \dots, b - h$ einsetzt und die daraus sich ergebenden Ausdrücke addiert, findet man für $\int_a^b f(x) dx$ den Näherungswert

$$(15.) \quad F = h \left[f\left(a + \frac{3 - \sqrt{3}}{3} h\right) + f\left(a + \frac{3 + \sqrt{3}}{3} h\right) \right. \\ + f\left(a + \frac{9 - \sqrt{3}}{3} h\right) + f\left(a + \frac{9 + \sqrt{3}}{3} h\right) \\ + f\left(a + \frac{15 - \sqrt{3}}{3} h\right) + f\left(a + \frac{15 + \sqrt{3}}{3} h\right) \\ + \dots \\ \left. + f\left(b - \frac{3 + \sqrt{3}}{3} h\right) + f\left(b - \frac{3 - \sqrt{3}}{3} h\right) \right].$$

In dieser Formel braucht man $2n$ Ordinaten und erhält eine etwas stärkere Annäherung als bei der *Simpson*-schen Regel unter Benutzung von $2n + 1$ Ordinaten. Da nämlich $2nh$ gleich $b - a$ ist, so wird der Fehler bei dieser Formel nach Gleichung (14.) gleich einem Mittelwert von $f^{(4)}(x)$ multipliziert mit $\frac{(b-a)h^4}{270}$; er verhält sich also zum Fehler bei der *Simpson*-schen Regel etwa wie 2 zu 3.

Durch die Einführung der Irrationalität $\sqrt{3}$ wird die Rechnung im allgemeinen nicht erschwert. Wenn z. B. $f(x)$ eine *rationale* Funktion von x ist, so wird die Summe

$$f\left(c - \frac{h}{\sqrt{3}}\right) + f\left(c + \frac{h}{\sqrt{3}}\right)$$

rational. Die Rechnung wird dann sogar noch einfacher als bei Anwendung der *Simpsonschen* Regel, wie das folgende Beispiel zeigen möge.

Aufgabe. Es soll wieder

$$\ln 2 = \int_1^2 \frac{dx}{x}$$

berechnet werden unter Anwendung von 12 Ordinaten.

Auflösung. In diesem Falle ist $h = 1 : 12$ und

$$\begin{aligned} F = \frac{1}{12} & \left[f\left(\frac{39 - \sqrt{3}}{36}\right) + f\left(\frac{39 + \sqrt{3}}{36}\right) + f\left(\frac{45 - \sqrt{3}}{36}\right) \right. \\ & + f\left(\frac{45 + \sqrt{3}}{36}\right) + f\left(\frac{51 - \sqrt{3}}{36}\right) + f\left(\frac{51 + \sqrt{3}}{36}\right) \\ & + f\left(\frac{57 - \sqrt{3}}{36}\right) + f\left(\frac{57 + \sqrt{3}}{36}\right) + f\left(\frac{63 - \sqrt{3}}{36}\right) \\ & \left. + f\left(\frac{63 + \sqrt{3}}{36}\right) + f\left(\frac{69 - \sqrt{3}}{36}\right) + f\left(\frac{69 + \sqrt{3}}{36}\right) \right], \end{aligned}$$

oder da $f(x) = \frac{1}{x}$ ist,

$$\begin{aligned} (16.) \quad F &= 3 \left[\left(\frac{1}{39 - \sqrt{3}} + \frac{1}{39 + \sqrt{3}} \right) + \left(\frac{1}{45 - \sqrt{3}} + \frac{1}{45 + \sqrt{3}} \right) \right. \\ & + \left(\frac{1}{51 - \sqrt{3}} + \frac{1}{51 + \sqrt{3}} \right) + \left(\frac{1}{57 - \sqrt{3}} + \frac{1}{57 + \sqrt{3}} \right) \\ & \left. + \left(\frac{1}{63 - \sqrt{3}} + \frac{1}{63 + \sqrt{3}} \right) + \left(\frac{1}{69 - \sqrt{3}} + \frac{1}{69 + \sqrt{3}} \right) \right] \\ &= \frac{39}{253} + \frac{45}{337} + \frac{51}{433} + \frac{57}{541} + \frac{63}{661} + \frac{69}{793}. \end{aligned}$$

Nun ist

$$39 : 253 = 0,154\,150\,197\,6$$

$$45 : 337 = 0,133\,531\,157\,3$$

$$51 : 433 = 0,117\,782\,909\,9$$

$$57 : 541 = 0,105\,360\,443\,6$$

$$63 : 661 = 0,095\,310\,136\,2$$

$$69 : 793 = 0,087\,011\,349\,3,$$

also

$$(17.) \quad F = 0,693\,146\,193\,9 = \ln 2 - 0,000\,000\,986\,7.$$

Der Fehler ist also kleiner als bei Anwendung der *Simpsonschen* Regel mit 13 Ordinaten. (Vergl. Aufgabe 1 auf Seite 422 und 424.)

Auch dieses Verfahren läßt sich verallgemeinern, indem man

$$\begin{aligned} (18.) \quad F_2 &= hc_1[f(c - \alpha h) + f(c + \alpha h)] + hc_2[f(c - \beta h) \\ &\quad + f(c + \beta h)] \\ &= 2 \left[(c_1 + c_2)hf(c) + (c_1\alpha^2 + c_2\beta^2)\frac{h^3}{2!}f''(c) \right. \\ &\quad + (c_1\alpha^4 + c_2\beta^4)\frac{h^5}{4!}f^{(4)}(c) + (c_1\alpha^6 + c_2\beta^6)\frac{h^7}{6!}f^{(6)}(c) \\ &\quad \left. + (c_1\alpha^8 + c_2\beta^8)\frac{h^9}{8!}f^{(8)}(c) + \dots \right] \end{aligned}$$

setzt und die 4 Größen c_1, c_2, α, β so bestimmt, daß möglichst viele Glieder dieser Entwicklung mit den entsprechenden Gliedern in der Entwicklung von

$$\begin{aligned} (19.) \quad \int_{c-2h}^{c+2h} f(x)dx &= \int_{c-2h}^{c+2h} F'(x)dx = F(c + 2h) - F(c - 2h) \\ &= 2 \left[\frac{2h}{1!}f(c) + \frac{8h^3}{3!}f''(c) + \frac{32h^5}{5!}f^{(4)}(c) + \frac{128h^7}{7!}f^{(6)}(c) \right. \\ &\quad \left. + \frac{512h^9}{9!}f^{(8)}(c) + \dots \right] \end{aligned}$$

übereinstimmen. Dies gibt die Gleichungen

$$(20.) \quad c_1 + c_2 = 2,$$

$$(21.) \quad c_1\alpha^2 + c_2\beta^2 = \frac{8}{3},$$

$$(22.) \quad c_1\alpha^4 + c_2\beta^4 = \frac{32}{5},$$

$$(23.) \quad c_1\alpha^6 + c_2\beta^6 = \frac{128}{7}.$$

Eliminiert man aus den Gleichungen (20.) und (21.), (21.) und (22.), (22.) und (23.) die Größe c_1 , so erhält man

$$(24.) \quad c_2(\alpha^2 - \beta^2) = 2\left(\alpha^2 - \frac{4}{3}\right),$$

$$(25.) \quad c_2\beta^2(\alpha^2 - \beta^2) = 8\left(\frac{\alpha^2}{3} - \frac{4}{5}\right) = 2\beta^2\left(\alpha^2 - \frac{4}{3}\right),$$

$$(26.) \quad c_2\beta^4(\alpha^2 - \beta^2) = 32\left(\frac{\alpha^2}{5} - \frac{4}{7}\right) = 8\beta^2\left(\frac{\alpha^2}{3} - \frac{4}{5}\right),$$

also

$$(27.) \quad \beta^2 = 4\left(\frac{\alpha^2}{3} - \frac{4}{5}\right) : \left(\alpha^2 - \frac{4}{3}\right) = 4\left(\frac{\alpha^2}{5} - \frac{4}{7}\right) : \left(\frac{\alpha^2}{3} - \frac{4}{5}\right)$$

Dies gibt

$$\left(\alpha^2 - \frac{4}{3}\right)\left(\frac{\alpha^2}{5} - \frac{4}{7}\right) = \left(\frac{\alpha^2}{3} - \frac{4}{5}\right)^2,$$

oder

$$(28.) \quad 35\alpha^4 - 120\alpha^2 + 48 = 0,$$

$$(29.) \quad \alpha^2 = \frac{60 \pm \sqrt{1920}}{35} = \frac{12 \pm 1,6\sqrt{30}}{7}.$$

Da die Gleichungen (20.) bis (23.) sich nicht ändern, wenn man c_1 mit c_2 und α mit β vertauscht, so genügt β derselben Gleichung (28.) wie α ; es sei deshalb

$$(30.) \quad \alpha^2 = \frac{4}{7}(3 - 0,4\sqrt{30}), \quad \beta^2 = \frac{4}{7}(3 + 0,4\sqrt{30}).$$

Dann folgt aus Gleichung (24.)

$$(31.) \quad c_2 = \frac{2(3\alpha^2 - 4)}{3(\alpha^2 - \beta^2)} = \frac{8(9 - 1,2\sqrt{30} - 7)}{-3 \cdot 3,2\sqrt{30}} = 1 - \frac{1}{18}\sqrt{30},$$

$$(32.) \quad c_1 = \frac{2(3\beta^2 - 4)}{3(\beta^2 - \alpha^2)} = 1 + \frac{1}{18}\sqrt{30}.$$

Es ist daher

$$(33.) \quad F_2 = \left(1 + \frac{1}{18}\sqrt{30}\right)h \left[f\left(c - \frac{2\sqrt{3 - 0,4\sqrt{30}}}{\sqrt{7}}h\right) \right. \\ \left. + f\left(c + \frac{2\sqrt{3 - 0,4\sqrt{30}}}{\sqrt{7}}h\right) \right] \\ + \left(1 - \frac{1}{18}\sqrt{30}\right)h \left[f\left(c - \frac{2\sqrt{3 + 0,4\sqrt{30}}}{\sqrt{7}}h\right) \right. \\ \left. + f\left(c + \frac{2\sqrt{3 + 0,4\sqrt{30}}}{\sqrt{7}}h\right) \right].$$

Der Koeffizient von $\frac{h^9}{8!}$ in der Entwicklung von F_2 wird dabei

$$\begin{aligned} 2(c_1\alpha^8 + c_2\beta^8) &= 2 \cdot \left(\frac{4}{7}\right)^4 \left[\left(1 + \frac{1}{18}\sqrt{30}\right) \left(3 - 0,4\sqrt{30}\right)^4 \right. \\ &\quad \left. + \left(1 - \frac{1}{18}\sqrt{30}\right) \left(3 + 0,4\sqrt{30}\right)^4 \right] \\ &= \frac{1024 \cdot 5,16}{49}. \end{aligned}$$

Deshalb wird

$$\begin{aligned} (34.) \quad \int_{c-2h}^{c+2h} f(x) dx - F_2 &= \left(\frac{1024h^9}{9!} - \frac{1024 \cdot 5,16h^9}{8! \cdot 49} \right) f^{(8)}(c) + \dots \\ &= \frac{20,48h^9}{138915} f^{(8)}(c) + \dots \end{aligned}$$

Bezeichnet man

$$f[a + (4m - 2 - \alpha)h] \text{ mit } y_{m,1},$$

$$f[a + (4m - 2 + \alpha)h] \text{ mit } y_{m,2},$$

$$f[a + (4m - 2 - \beta)h] \text{ mit } y_{m,3},$$

$$f[a + (4m - 2 + \beta)h] \text{ mit } y_{m,4},$$

so erhält man für das gesuchte Integral $\int_a^b f(x) dx$ den Näherungswert

$$\begin{aligned} (35.) \quad F &= hc_1[(y_{1,1} + y_{1,2}) + (y_{2,1} + y_{2,2}) + \dots + (y_{n,1} + y_{n,2})] \\ &\quad + hc_2[(y_{1,3} + y_{1,4}) + (y_{2,3} + y_{2,4}) + \dots + (y_{n,3} + y_{n,4})]. \end{aligned}$$

Da hierbei $4nh = b - a$ ist, so wird, wenn man mit Θ eine Größe zwischen 0 und 1 bezeichnet, der Fehler

$$(36.) \quad \int_a^b f(x) dx - F = \frac{5,12(b-a)h^8}{138915} f^{(8)}[a + \Theta(b-a)];$$

er wird also mit h zugleich unendlich klein von der achten Ordnung.

Die folgende Aufgabe möge zeigen, wie bei den Anwendungen häufig die in α , β , c_1 , c_2 enthaltenen Irratio-

nalitäten vermieden werden können, weil in dem Endresultat nur die symmetrischen Funktionen von α^2 und β^2 auftreten. Nach Gleichung (28.) wird aber

$$(37.) \quad \alpha^2 + \beta^2 = \frac{120}{35}, \quad \alpha^2 \beta^2 = \frac{48}{35}.$$

Aufgabe. Man soll wieder $\ln 2 = \int_1^2 \frac{dx}{x}$ unter Benutzung von 12 Ordinaten berechnen.

Auflösung. Hier ist

$$h = \frac{1}{12}, \quad f(x) = \frac{1}{x},$$

also, wenn man der Kürze wegen $12c$ mit k bezeichnet,

$$f(c - ah) + f(c + ah) = \frac{12}{12c - \alpha} + \frac{12}{12c + \alpha} = \frac{24k}{k^2 - \alpha^2},$$

$$f(c - \beta h) + f(c + \beta h) = \frac{12}{12c - \beta} + \frac{12}{12c + \beta} = \frac{24k}{k^2 - \beta^2}.$$

Deshalb wird mit Rücksicht auf die Gleichungen (31.) und (32.)

$$\begin{aligned} (38.) \quad & c_1[f(c - ah) + f(c + ah)] + c_2[f(c - \beta h) + f(c + \beta h)] \\ &= \frac{48k}{3(\alpha^2 - \beta^2)} \left(-\frac{3\beta^2 - 4}{k^2 - \alpha^2} + \frac{3\alpha^2 - 4}{k^2 - \beta^2} \right) \\ &= \frac{16k[-3(\alpha^4 - \beta^4) + (3k^2 + 4)(\alpha^2 - \beta^2)]}{(\alpha^2 - \beta^2)[k^4 - (\alpha^2 + \beta^2)k^2 + \alpha^2\beta^2]} \\ &= \frac{16k[-3(\alpha^2 + \beta^2) + 3k^2 + 4]}{k^4 - (\alpha^2 + \beta^2)k^2 + \alpha^2\beta^2} = \frac{16k(105k^2 - 220)}{35k^4 - 120k^2 + 48}. \end{aligned}$$

Wenn man in diesem Ausdruck für $k = 12c$ die drei Werte

$12(1 + 2h) = 14$, $12(1 + 6h) = 18$, $12(1 + 10h) = 22$ einsetzt, so erhält man bezw.

$$(39.) \quad \begin{cases} c_1(y_{1,1} + y_{1,2}) + c_2(y_{1,3} + y_{1,4}) = \frac{35\,630}{10\,321}, \\ c_1(y_{2,1} + y_{2,2}) + c_2(y_{2,3} + y_{2,4}) = \frac{25\,350}{9\,467}, \\ c_1(y_{3,1} + y_{3,2}) + c_2(y_{3,3} + y_{3,4}) = \frac{139\,150}{63\,601}. \end{cases}$$

Indem man diese Werte in Gleichung (35.) einsetzt, findet man

$$(40.) \quad F = \frac{1}{12} \left(\frac{35\,630}{10\,321} + \frac{25\,350}{9\,467} + \frac{139\,150}{63\,601} \right).$$

Nun ist

$$35\,630 : 10\,321 = 3,452\,184\,865\,808$$

$$25\,350 : 9\,467 = 2,677\,722\,615\,401$$

$$139\,150 : 63\,601 = 2,187\,858\,681\,467,$$

folglich wird

$$(41.) \quad \begin{aligned} F &= 8,317\,766\,162\,676 : 12 \\ &= 0,693\,147\,180\,223 \\ &= \ln 2 - 0,000\,000\,000\,337. \end{aligned}$$

Man erhält also durch dieses Verfahren eine außerordentlich starke Annäherung.

Noch stärker wird die Annäherung, wenn man in den Gleichungen

$$(42.) \quad \int_{c-3h}^{c+3h} f(x) dx = \int_{c-3h}^{c+3h} F'(x) dx = F(c+3h) - F(c-3h)$$

und

$$(43.) \quad F_3 = hc_1[f(c-ah) + f(c+ah)] + hc_2[f(c-\beta h) + f(c+\beta h)] + hc_3[f(c-\gamma h) + f(c+\gamma h)]$$

die rechten Seiten nach steigenden Potenzen von h entwickelt und die 6 Größen $c_1, c_2, c_3, a, \beta, \gamma$ so bestimmt, daß in beiden Entwicklungen die Koeffizienten von $h, h^3, h^5, h^7, h^9, h^{11}$ miteinander übereinstimmen. Der Fehler wird dann mit h zugleich unendlich klein von der 13^{ten} Ordnung.

In dieser Weise kann man das Verfahren noch beliebig weiter fortsetzen.

§ 73.


Amslers Polarplanimeter.

Man kann den Flächeninhalt einer allseitig umschlossenen ebenen Figur auch durch rein mechanische Hilfsmittel bestimmen und auf diese Weise die rechnerische Ausführung der Integration vermeiden. Die meiste Anwendung auf diesem Gebiete hat wohl das *Amslersche* Polarplanimeter gefunden, das es möglich macht, die Größe des Flächeninhaltes der Figur auf einer in gleiche Teile eingeteilten Rolle, „der *Integrierrolle*“, abzulesen, nachdem man die Umgrenzung der Figur mit dem sogenannten *Fahrstifte* umfahren hat.

Diese sinnreiche Vorrichtung beruht auf der folgenden Überlegung.

Die Gerade AB von der Länge l bewege sich in einer Ebene so, daß der eine Endpunkt A auf dem Kreise mit dem Mittelpunkte M und dem Halbmesser r bleibt (Fig. 127),

Fig. 127.




während der andere Endpunkt B die geschlossene Kurve K , deren Flächeninhalt F bestimmt werden soll, durchläuft. Man könnte statt des Kreises auch eine andere geschlossene Kurve nehmen; der Kreis hat jedoch schon deshalb den Vorzug, weil man die zwangsläufige Bewegung des Punktes A auf dem Kreise dadurch erreichen kann, daß man zum Halbmesser MA des Kreises eine Schiene macht, die in M eine feine

Spitze und in A eine zur Ebene der Figur senkrecht stehende Achse hat, um die sich eine zweite, der Geraden AB entsprechende Schiene drehen kann. Sticht man die Spitze M in einem passend gewählten Punkte der Ebene, welcher der

Pol genannt wird, ein und bewegt den in B befestigten *Fahrstift* auf der Kurve K , so tritt die oben beschriebene Bewegung ein. Man betrachte dann ein unendlich kleines Flächenelement dF gleich $AA'B'B$, das die Gerade AB bei eintretender Bewegung überstreicht, und bezeichne den Winkel, unter dem sich die Geraden AB und $A'B'$ im Punkte C schneiden, mit $d\varphi$. (Vergl. Fig. 128.) Bezeichnet man die Mitte von AB mit G und beschreibt um C die Kreisbogen AD , GH und BE , so unterscheiden sich die Kreissektoren ACD und BCE von den Kurvensektoren ACA' und BCB' bezw. nur um die Dreiecke ADA' und BEB' , die, wie bei der Berechnung des Flächeninhalts unter Anwendung von Polarkoordinaten gezeigt wurde, unendlich klein werden von der zweiten Ordnung und deshalb neben den unendlich kleinen Größen erster Ordnung vernachlässigt werden dürfen. Dadurch findet man für den Flächeninhalt der Figur $AA'B'B$

Fig. 128.



$$\begin{aligned}
 (1.) \quad dF &= BCB' - ACA' = BCE - ACD \\
 &= \frac{1}{2} (\overline{CB}^2 - \overline{CA}^2) d\varphi \\
 &= \frac{1}{2} (CB + CA)(CB - CA) d\varphi.
 \end{aligned}$$

Nun ist aber

$$CB + CA = 2CG \quad \text{und} \quad CB - CA = AB = l,$$

folglich wird

$$(2.) \quad dF = CG \cdot l \cdot d\varphi.$$

Dabei ist $CG \cdot d\varphi$ gleich dem Kreisbogen GH , so daß man erhält


$$(3.) \quad dF = l \cdot GH = l \cdot d\sigma,$$

wenn man den Kreisbogen GH mit $d\sigma$ bezeichnet.

Bisher wurde stillschweigend angenommen, daß der Punkt C , in dem sich die Geraden AB und $A'B'$ schneiden,

auf der Verlängerung von AB über A hinaus liegt. Die vorstehenden Schlüsse bleiben aber auch dann noch richtig, wenn das nicht der Fall ist, wenn z. B. C zwischen A und

Fig. 129.



B liegt, wie in Fig. 129.

Nur muß man auf das Vorzeichen von dF und $d\sigma$ achten. Man kann z. B. festsetzen, daß alle Flächenstücke, die ein von A nach B sehender Beobachter zur Rechten hat, *positiv* zu nehmen sind, und daß die zu seiner Linken mit *negativem* Vorzeichen zu berücksichtigen sind. Entsprechendes gilt auch für $d\sigma$. Dann wird das in Figur 129 von AB überstrichene Flächenstück

$$\begin{aligned} dF &= BCB' - ACA' = BCE - ACD \\ &= \frac{1}{2}(\overline{CB}^2 - \overline{CA}^2)d\varphi = \frac{1}{2}(CB + CA)(CB - CA)d\varphi \\ &= l \cdot CG \cdot d\varphi = l \cdot d\sigma, \end{aligned}$$

wobei der Kreisbogen GH wieder mit $d\sigma$ bezeichnet worden ist.

Ist nun im Punkte G eine kleine Rolle befestigt, deren Achse in der Geraden AB liegt, so wird der Umfang der Rolle, wenn die Gerade AB das Flächenstück $AA'B'B$ überstreicht, um den Kreisbogen $d\sigma$ fortrollen, denn man kann die eintretende Bewegung zerlegen in eine Drehung um den Punkt C , so daß die Gerade AB in die Lage DE kommt, und in eine Verschiebung der Geraden in ihrer eigenen Richtung von DE nach $A'B'$. Bei dem ersten Teile dieser Bewegung dreht sich die Rolle um den Bogen GH gleich $d\sigma$, bei der zweiten aber kann sich die Rolle nicht drehen, weil die Verschiebungsrichtung mit ihrer Achse zusammenfällt. Dabei wird das Vorzeichen von $d\sigma$ mit dem von dF übereinstimmen.

Wenn jetzt der Fahrstift B die ganze geschlossene Kurve K durchläuft, möge zunächst der in Figur 127 dargestellte Fall eintreten, daß der Pol M , d. h. der Mittelpunkt des Kreises, außerhalb der geschlossenen Kurve K liegt und infolgedessen der Punkt A nur einen Teil PQ des Kreisumfanges durchläuft. Er wird dann im allgemeinen jeden Punkt des Kreisbogens PQ *zweimal* passieren, und zwar das eine Mal in der einen, das andere Mal in der entgegengesetzten Richtung. Dann wird die Gerade AB die von der Kurve K eingeschlossene Fläche F nur *einmal* überstreichen, während die zwischen K und dem Kreisbogen liegende Fläche *zweimal* überstrichen wird, und zwar das eine Mal im *positiven* und das andere Mal im *negativen* Sinne. Summiert man also alle die kleinen Flächenteile $dF = l \cdot d\sigma$, welche von AB überstrichen werden, so erhält man, da der zweimal überstrichene Flächenraum herausfällt, für die gesuchte, von der Kurve K umschlossene Fläche

$$(4.) \quad F = \int l \cdot d\sigma = l \int d\sigma,$$

wobei $\int d\sigma$ dem Bogen gleich ist, der auf der Rolle in G abgerollt ist. Man braucht also nur an der Rolle mit Hilfe eines Nonius den Stand am Anfange und am Schlusse der Bewegung abzulesen. Dabei kann durch eine Schraube ohne Ende an der Achse der Rolle noch eine Vorrichtung angebracht werden, welche die ganzen Umdrehungen der Rolle zählt.

Das in Gleichung (4.) ausgesprochene Gesetz bleibt auch noch richtig, wenn die Gerade AB Teile der Fläche F mehr als einmal und Teile der Fläche $PQRS$ mehr als zweimal überstreicht; denn die Flächenteile von F werden stets nur einmal oder 3, 5, 7, ... mal überstrichen, und zwar einmal mehr im positiven Sinne als im negativen Sinne, und die Teile außerhalb der Fläche F werden entweder gar nicht oder 2, 4, 6, ... mal überstrichen, und zwar ebenso oft im positiven wie im negativen Sinne, so daß Gleichung (4.) auch dann noch richtig bleibt. Dies gibt:

Satz 1. *Liegt der Pol M außerhalb der geschlossenen Kurve K , so ist der Flächeninhalt der Figur F proportional*

zu dem auf dem Umfange der Rolle abgerollten Bogen, dessen Länge man durch die oben angedeuteten Vorrichtungen sehr genau ablesen kann.

Etwas anders verhält sich die Sache, wenn der Punkt A bei eintretender Bewegung der Geraden AB den ganzen Kreis einmal durchläuft, ehe die Gerade AB in ihre Anfangslage zurückkehrt. Das wird geschehen, wenn der Pol M im Innern der geschlossenen Kurve liegt (vergl. Fig. 130 und 131).

Fig. 130.





Fig. 131.



Bei Fig. 130 überstreicht die Gerade AB bis zur Rückkehr in ihre Anfangslage nur die Fläche, welche zwischen der Kurve K und dem Kreise mit dem Halbmesser MA gleich a liegt, so daß der Flächeninhalt der ganzen Figur

$$(5.) \quad F = l \int d\sigma + a^2 \pi$$

wird. Diese Formel bleibt aber auch noch für Figur 131 richtig, bei welcher ein Teil der Kurve K innerhalb des Kreises liegt, denn die im Innern des Kreises liegenden

Flächenteile, welche von der Geraden AB (einmal, oder 3, 5, 7 ... mal) durchstrichen werden, ohne daß sie dem Flächeninhalt F angehören, kommen mit negativem Vorzeichen in Rechnung. Dies gibt

Satz 2. *Liegt der Pol M im Innern der geschlossenen Kurve K , so ist der Flächeninhalt der Figur F gleich der Summe von einer konstanten Größe ($a^2\pi$) und von einer Größe $\int d\sigma$, welche zu dem auf dem Umfange der Rolle abgerollten Bogen proportional ist.*

Schließlich ist noch hervorzuheben, daß die beiden gefundenen Sätze noch richtig bleiben, auch wenn die Rolle nicht genau in der Mitte G der Geraden AB , sondern in irgendeinem anderen Punkte L der Geraden AB angebracht ist. Der Punkt L darf, wie es bei der üblichen Ausführung des Instrumentes der Fall ist, sogar auf der Verlängerung von AB , z. B. über A hinaus liegen. (Vergl. Fig. 128 und 129.) Die Rolle wird dann allerdings bei eintretender Bewegung nicht mehr den Bogen

$$GH = d\sigma,$$

sondern den Bogen

$$LN = d\tau$$

abwickeln. Dabei ist aber

$$(6.) \quad LN = d\tau = CL \cdot d\varphi,$$

$$(7.) \quad GH = d\sigma = CG \cdot d\varphi = CL \cdot d\varphi + LG \cdot d\varphi \\ = d\tau + LG \cdot d\varphi,$$

und zwar gilt das für Figur 128 und 129, wenn man auf die Richtung der Strecken Rücksicht nimmt, d. h. wenn man beachtet, daß

$$CL = -LC$$

ist. Kehrt die Gerade AB in ihre ursprüngliche Lage zurück, so findet man durch Integration aus Gleichung (7.)

$$(8.) \quad \int d\sigma = \int d\tau + LG \cdot \int d\varphi.$$

In dem durch Figur 127 dargestellten Falle, wo der Pol M außerhalb der Kurve K liegt, ist $\int d\varphi$ gleich Null, so daß

$$\int d\sigma = \int d\tau$$

wird, und Satz 1 ohne weiteres in Kraft bleibt. In dem zweiten Falle aber, wo der Pol M innerhalb der Kurve K liegt, macht die Gerade AB eine ganze Umdrehung, ehe sie in ihre ursprüngliche Lage zurückkehrt. Es wird also

$$\int d\varphi = 2\pi$$

und Gleichung (8.) geht über in

$$(9.) \quad \int d\sigma = \int d\tau + LG \cdot 2\pi.$$

Also auch Satz 2 bleibt in Kraft; nur die konstante Größe $a^2\pi$ ist durch die konstante Größe $a^2\pi + l \cdot LG \cdot 2\pi$ zu ersetzen. Den Proportionalitätsfaktor l und die konstanten Größen $a^2\pi$ bzw. $a^2\pi + l \cdot LG \cdot 2\pi$ ermittelt man für jedes einzelne Instrument dadurch, daß man mit dem Polarplanimeter zunächst Figuren ausmißt, deren Flächeninhalt bereits bekannt ist, am besten Kreise mit gegebenem Halbmesser.

XIII. Abschnitt.

Kubatur der Körper und Komplanatation der krummen Oberflächen. Mehrfache Integrale.

§ 74.

Kubatur der Körper durch Anwendung einfacher Integrale.

(Vergl. die Formel-Tabelle Nr. 210.)

Es war bereits in Abschnitt VI gezeigt worden, wie man das Volumen eines Rotationskörpers berechnen kann. Es wurde damals der Körper durch Schnitte, senkrecht zur Rotations-Achse in unendlich viele, unendlich dünne Schichten zerlegt, die man unter Vernachlässigung unendlich kleiner Größen höherer Ordnung als Kreiszylinder betrachten darf. Ist z. B. die den Körper begrenzende Fläche durch Rotation der Kurve

$$(1.) \quad y = f(x)$$

um die X -Achse entstanden, so ist die Grundfläche eines solchen Zylinders ein Kreis mit dem Halbmesser y und dem Flächeninhalte $y^2\pi$. Da der Zylinder die Höhe dx hat, so wird das Volumen einer solchen unendlich dünnen Schicht

$$(2.) \quad dV = y^2\pi dx,$$

also das Volumen des ganzen Rotationskörpers

$$(3.) \quad V = \pi \int_{x_1}^{x_2} y^2 dx,$$

wie bereits in Formel Nr. 136 der Tabelle angegeben ist.

Ein ähnliches Verfahren kann man auch für die Berechnung des Volumens bei anderen Körpern anwenden.

Man teilt dieselben durch Schnitte, welche zur X -Achse senkrecht stehen, in unendlich viele, unendlich dünne Schichten und summiert die Volumina dieser einzelnen Schichten.

Zur Berechnung des Volumens der einzelnen Schichten muß zunächst der Flächeninhalt der einzelnen Schnitte als stetige Funktion von x bekannt sein, wobei $x = OQ$ der Abstand des betreffenden Schnittes von der YZ -Ebene ist




Fig. 132.

(Fig. 132). Es sei also $F(x)$ der Flächeninhalt eines solchen Schnittes, welcher in $F(x + \Delta x)$ übergeht, wenn x um $\Delta x = QQ_1$ wächst, d.h. wenn der Schnitt durch den Punkt Q_1 der X -Achse gelegt wird.




Fig. 133.

Legt man durch die Umgrenzungen der beiden Schnitte $F(x)$ und $F(x + \Delta x)$ Parallele zur X -Achse, so werden die beiden Umgrenzungskurven der Schnitte in die YZ -Ebene projiziert. In Figur 133 sei z. B. die Kurve $ABCJEF GK$ die Projektion von $F(x)$, und die Kurve $ALCDEMGH$ die Projektion von $F(x + \Delta x)$.

Die beiden Figuren haben das Stück $ALCJEMGK$ gemeinschaftlich; dieses Stück muß man um

$$(4.) \quad \alpha_1 = ALCB \quad \text{und} \quad \alpha_2 = GFEM$$

vermehrten, damit man $F(x)$ erhält, während man

$$(4a.) \quad \beta_1 = AHGK \quad \text{und} \quad \beta_2 = CJED$$

hinzufügen muß, damit man $F(x + \Delta x)$ erhält.

So wird man im allgemeinen bei jedem Körper schließen können. Die Projektionen der beiden Schnitte werden ein Flächenstück

$$(5.) \quad F(x) - \alpha = F(x + \Delta x) - \beta$$

gemeinschaftlich haben, wenn man mit α und β die Summe der kleinen Flächenstücke bezeichnet, welche das gemeinsame Stück bzw. zu $F(x)$ und $F(x + \Delta x)$ ergänzen. In Figur 133 ist z. B.

$$\alpha = \alpha_1 + \alpha_2 \quad \text{und} \quad \beta = \beta_1 + \beta_2.$$

Dabei sind α und β kleine Größen, welche mit Δx zugleich verschwindend klein werden, wenn $F(x)$ als eine stetige Funktion von x vorausgesetzt worden ist.

Bezeichnet man das Volumen der dünnen Schicht mit ΔV , so wird ΔV im allgemeinen größer sein als ein Zylinder, welcher $F(x) - \alpha = F(x + \Delta x) - \beta$ zur Grundfläche und Δx zur Höhe hat. Dagegen wird ΔV im allgemeinen kleiner sein als ein Zylinder, welcher $F(x) + \beta = F(x + \Delta x) + \alpha$ zur Grundfläche und Δx zur Höhe hat, d. h. es wird im allgemeinen

$$(6.) \quad [F(x) - \alpha] \Delta x \leq \Delta V \leq [F(x) + \beta] \Delta x$$

sein. Dies gibt

$$(7.) \quad F(x) - \alpha \leq \frac{\Delta V}{\Delta x} \leq F(x) + \beta,$$

oder, wenn man Δx verschwindend klein werden läßt,

$$(8.) \quad F(x) \leq \frac{dV}{dx} \leq F(x),$$


also

$$(9.) \quad \frac{dV}{dx} = F(x), \quad V = \int_{x_1}^{x_2} F(x) dx.$$

Wie bereits hervorgehoben wurde, gelten die Schlüsse nur im allgemeinen. Die krumme Fläche, welche die betrachtete Schicht begrenzt, kann möglicherweise zwischen den beiden Schnitten $F(x)$ und $F(x + \Delta x)$ solche Einbiegungen oder Ausbiegungen haben, daß der Zylinder mit der Grundfläche $F(x) - \alpha$ und der Höhe Δx nicht ganz innerhalb der Schicht ΔV liegt, oder daß der Zylinder mit

der Grundfläche $F(x) + \beta$ und der Höhe Δx die Schicht ΔV nicht vollständig *einschließt*. In diesem Falle lege man durch eine Gerade g , welche zur X -Achse parallel ist und die Schicht durchbohrt, eine beliebige Ebene QQ_1P_1P (Fig. 134). Diese Ebene sei auf der einen Seite durch die Gerade g begrenzt und schneide die Figuren $F(x)$ und $F(x + \Delta x)$ bezw. in den Geraden QP und Q_1P_1 . Die be-

Fig. 134.



begrenzende Fläche schneide sie in dem Kurvenbogen PP_1 , welcher in den Punkten P_k und P_g bezw. den kleinsten und den größten Abstand von der Geraden g haben möge. Dreht sich nun die Ebene QQ_1P_1P um die Gerade g , so möge vorausgesetzt werden, daß die ausgeschnittene Kurve $PP_kP_gP_1$ sich zwar ändert, aber niemals die Gerade g schneidet. Dann beschreiben die Punkte P_k und P_g auf der begrenzenden krummen Fläche zwei Kurven, deren Projektionen in die YZ -Ebene jetzt mit $F(x) - \alpha$ und $F(x) + \beta$ bezeichnet werden mögen. Dabei wird wieder

$$[F(x) - \alpha]\Delta x \leq \Delta V \leq [F(x) + \beta]\Delta x,$$

$$F(x) - \alpha \leq \frac{\Delta V}{\Delta x} \leq F(x) + \beta,$$

also, weil für verschwindend kleine Werte von Δx die Punkte P_k und P_g mit P zusammenfallen, so daß α und β verschwindend klein werden,

$$F(x) \leq \frac{dV}{dx} \leq F(x);$$

dies gibt wieder

$$\frac{dV}{dx} = F(x), \quad V = \int_{x_1}^{x_2} F(x) dx.$$

In dieser strengeren Herleitung ist der zuerst behandelte, am häufigsten vorkommende Fall eingeschlossen.

Die Berechnung des Volumens der Körper nennt man „Kubatur der Körper“.

§ 75.

Übungs-Aufgaben.

Aufgabe 1. Man soll das Volumen des Körpers berechnen, welcher von dem *elliptischen Paraboloid* mit der Gleichung

$$(1.) \quad y^2 + a^2 z^2 = 2px$$

und von der Ebene mit der Gleichung $x = c$ eingeschlossen ist (Fig. 135).

Auflösung. Jeder Schnitt senkrecht zur X -Achse schneidet aus der Fläche eine Ellipse mit der Gleichung

$$(2.) \quad \frac{y^2}{2px} + \frac{a^2 z^2}{2px} = 1$$

und mit den Halbachsen

$$a_1 = \sqrt{2px}, \quad b_1 = \frac{1}{a} \sqrt{2px}$$

aus. Der Flächeninhalt dieser Ellipse ist bekanntlich

$$(3.) \quad F(x) = a_1 b_1 \pi = \frac{2p\pi}{a} x,$$

folglich findet man für das Volumen des Körpers

$$(4.) \quad V = \int_0^c F(x) dx = \frac{2p\pi}{a} \int_0^c x dx = \frac{p\pi}{a} [x^2]_0^c = \frac{c^2 p \pi}{a}.$$

Aufgabe 2. Man soll das Volumen des dreiachsigen Ellipsoids

$$(5.) \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$


berechnen.

Auflösung. Auch hier ist jeder Schnitt, senkrecht zur X -Achse, eine Ellipse mit der Gleichung

$$(6.) \quad \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = \frac{a^2 - x^2}{a^2} \quad \text{oder} \quad \frac{a^2 y^2}{b^2(a^2 - x^2)} + \frac{a^2 z^2}{c^2(a^2 - x^2)} = 1$$

und mit den Halbachsen

Fig. 135.



$$(7.) \quad a_1 = \frac{b}{a} \sqrt{a^2 - x^2}, \quad b_1 = \frac{c}{a} \sqrt{a^2 - x^2},$$

folglich ist der Flächeninhalt dieser Ellipse

$$(8.) \quad F(x) = a_1 b_1 \pi = \frac{bc}{a^2} (a^2 - x^2) \pi.$$

Das Volumen des Ellipsoids wird daher

$$(9.) \quad V = \int_{-a}^{+a} F(x) dx = \frac{bc\pi}{a^2} \int_{-a}^{+a} (a^2 - x^2) dx$$

$$= \frac{bc\pi}{a^2} \left[a^2 x - \frac{x^3}{3} \right]_{-a}^{+a} = \frac{bc\pi}{a^2} \left(\frac{2a^3}{3} + \frac{2a^3}{3} \right) = \frac{4abc\pi}{3}.$$

Aufgabe 3. Man soll das Volumen des Körpers berechnen, welcher von der Fläche 4^{ten} Grades

$$(10.) \quad a^2 y^2 + x^2 z^2 = b^2 x^2$$

und den beiden Ebenen

$$(11.) \quad x = 0 \quad \text{und} \quad x = a$$

eingeschlossen wird. Die durch Gleichung (10.) dargestellte Fläche heißt: „*Conocuneus* von Wallis“.

Auflösung. Die Schnitte, senkrecht zur *X*-Achse, sind wieder Ellipsen mit der Gleichung

$$(12.) \quad \frac{a^2 y^2}{b^2 x^3} + \frac{z^2}{b^2} = 1$$

und mit den Halbachsen

$$(13.) \quad a_1 = \frac{bx}{a}, \quad b_1 = b,$$

folglich wird der Flächeninhalt eines solchen Schnittes

$$(14.) \quad F(x) = a_1 b_1 \pi = \frac{b^2 x \pi}{a}.$$

Das Volumen des oben beschriebenen Körpers wird daher

$$(15.) \quad V = \int_0^a F(x) dx = \frac{b^2 \pi}{a} \int_0^a x dx = \frac{b^2 \pi}{a} \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^a = \frac{ab^2 \pi}{2}.$$

Gleichzeitig gewinnt man aus dieser Untersuchung Auskunft über die Gestalt der Fläche.

Aus Gleichung (10.) ergibt sich zunächst, daß die Koordinaten-Ebenen Symmetrie-Ebenen der Fläche sind. und aus Gleichung (12.) erkennt man, daß die Schnitte senkrecht zur X -Achse, Ellipsen sind, welche alle dieselbe Halbachse $b_1 = b$ haben, während die andere Halbachse $a_1 = \frac{bx}{a}$ mit x proportional zunimmt. Die XY -Ebene (mit der Gleichung $z = 0$) schneidet die Fläche in zwei geraden Linien mit den Gleichungen

$$(16.) \quad ay = \pm bx,$$

und die ZX -Ebene (mit der Gleichung $y = 0$) schneidet die Fläche in der Doppel-Geraden

$$(17.) \quad x = 0,$$

welche mit der Z -Achse zusammenfällt, und in den beiden Geraden

$$(18.) \quad z = +b, \quad z = -b.$$

§ 76.

Einführung mehrfacher Integrale.

(Vergl. die Formel-Tabelle Nr. 211.)

In den soeben behandelten Aufgaben war

$$(1.) \quad V = \int F(x) dx,$$

wobei der Flächeninhalt der ebenen Figur $F(x)$ nach den Ausführungen in Abschnitt V selbst wieder durch Integration zu ermitteln ist. In allen drei Aufgaben war $F(x)$ der Flächeninhalt einer Ellipse mit den Halbachsen a_1 und b_1 , also mit der Gleichung

$$(2.) \quad b_1^2 y^2 + a_1^2 z^2 = a_1^2 b_1^2, \quad \text{oder} \quad z = \pm \frac{b_1}{a_1} \sqrt{a_1^2 - y^2}.$$

Nach Formel Nr. 133 der Tabelle findet man $F(x)$ aus der Gleichung

$$\begin{aligned}
 (3.) \quad F(x) &= \int_{-a_1}^{+a_1} (z' - z'') dy = \frac{2b_1}{a_1} \int_{-a_1}^{+a_1} dy \sqrt{a_1^2 - y^2} \\
 &= \frac{2b_1}{a_1} \left[\frac{y}{2} \sqrt{a_1^2 - y^2} + \frac{a_1^2}{2} \arcsin \left(\frac{y}{a_1} \right) \right]_{-a_1}^{+a_1} = a_1 b_1 \pi.
 \end{aligned}$$

Dabei war in den Aufgaben 1, 2 und 3 bezw.

$$(4.) \quad \begin{cases} a_1 = \sqrt{2px}, & b_1 = \frac{1}{a} \sqrt{2px}; \\ a_1 = \frac{b}{a} \sqrt{a^2 - x^2}, & b_1 = \frac{c}{a} \sqrt{a^2 - x^2}; \\ a_1 = \frac{bx}{a}, & b_1 = b. \end{cases}$$

Daraus erkennt man auch, daß in der Gleichung (3.) die Integrationsgrenzen $-a_1$ und $+a_1$ Funktionen von x sind.

In ähnlicher Weise wird auch die Aufgabe, das Volumen eines Körpers zu berechnen, *ganz allgemein* zu behandeln sein. Den Schnitt, welcher senkrecht auf der X -Achse steht, und dessen Flächeninhalt mit $F(x)$ bezeichnet worden ist, erhält man, indem man in den Gleichungen der den Körper oben und unten begrenzenden Flächen

$$(5.) \quad z' = g(x, y) \quad \text{und} \quad z'' = h(x, y)$$

die Größe x als *Konstante* betrachtet. Setzt man

$$(6.) \quad z' - z'' = g(x, y) - h(x, y) = f(x, y),$$

so ist der Flächeninhalt dieses Schnittes

$$(7.) \quad F(x) = \int_{y_1}^{y_2} (z' - z'') dy = \int_{y_1}^{y_2} f(x, y) dy,$$

wobei im allgemeinen, je nach den Bedingungen der Aufgabe,

$$(8.) \quad y_1 = \varphi(x), \quad y_2 = \psi(x)$$

bekannte Funktionen von x sein werden. Da nun nach Formel Nr. 210 der Tabelle das Volumen des Körpers

$$(9.) \quad V = \int_{x_1}^{x_2} F(x) dx$$

ist, so erhält man mit Rücksicht auf Gleichung (7.)

$$(10.) \quad V = \int_{x_1}^{x_2} \int_{y_1}^{y_2} f(z' - z'') dy = \int_{x_1}^{x_2} \int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} f(x, y) dy.$$

Den Ausdruck auf der rechten Seite von Gleichung (10.) nennt man „ein *Doppelintegral*“. Besondere Aufmerksamkeit ist bei Doppelintegralen auf die richtige Bestimmung der Grenzen $y_1 = \varphi(x)$ und $y_2 = \psi(x)$ zu verwenden.

Am besten wird man das angedeutete Verfahren durch die Behandlung einiger Aufgaben verstehen.

Aufgabe 1. Die Gleichung

$$(11.) \quad p(z - z_0) = xy$$

stellt ein *gleichseitiges hyperbolisches Paraboloid* dar: man soll das Volumen des Körpers berechnen, welcher oben von dieser Fläche, unten von der XY -Ebene, vorn und rückwärts von den Ebenen $y = c$ und $y = d$, links und rechts von den Ebenen $x = a$ und $x = b$ begrenzt wird. Dabei möge z_0 so groß gewählt sein, daß das durch die angegebenen Grenzen eingeschlossene Stück der Fläche oberhalb der XY -Ebene liegt.

Auflösung. In diesem Falle ist

$$(12.) \quad z' = z_0 + \frac{xy}{p}, \quad z'' = 0;$$

die Grenzen der Integrations-Veränderlichen y sind konstant, denn es ist

$$(13.) \quad y_1 = c, \quad y_2 = d.$$

Man erhält daher

$$\begin{aligned}
 (14.) \quad V &= \int_a^b dx \int_c^d (z' - z'') dy = \frac{1}{p} \int_a^b dx \int_c^d (pz_0 + xy) dy \\
 &= \frac{1}{p} \int_a^b dx \left[pz_0 y + \frac{xy^2}{2} \right]_c^d \\
 &= \frac{1}{2p} \int_a^b dx [2pz_0(d - c) + (d^2 - c^2)x] \\
 &= \frac{d - c}{2p} \left[2pz_0 x + (d + c) \frac{x^2}{2} \right]_a^b
 \end{aligned}$$

also

$$(15.) \quad V = \frac{(b - a)(d - c)}{4p} [4pz_0 + (a + b)(c + d)].$$

Aufgabe 2. Die Gleichung

$$(16.) \quad 2p(z - z_0) = y^2 - m^2 x^2$$


stellt ein *hyperbolisches Paraboloid* dar; man soll das Volumen des Körpers berechnen, welcher oben durch diese Fläche, unten durch die XY -Ebene und seitlich durch den *Zylinder*

$$(17.) \quad x^2 + y^2 = a^2$$

begrenzt wird. Dabei sei z_0 wieder so groß gewählt, daß das von dem Zylinder eingeschlossene Stück des Paraboloids oberhalb der XY -Ebene liegt.

Auflösung. Eine Ebene, welche man durch den Punkt Q der X -Achse parallel zur YZ -Ebene legt, schneidet aus dem Körper eine Figur $F(x)$ aus, welche oben durch die Parabel

$$(18.) \quad z' = \frac{1}{2p} (2pz_0 + y^2 - m^2 x^2),$$



unten durch die Gerade

$$(19.) \quad z'' = 0$$

und seitlich durch zwei Gerade $W_1 P_1$ und $W_2 P_2$ begrenzt

wird, in denen der Zylinder von dieser Ebene geschnitten wird (Fig. 136). Dies gibt

$$(20.) \quad V = \int_{x_1}^{x_2} \int_{y_1}^{y_2} z dy = \frac{1}{2p} \int_{x_1}^{x_2} dx \int_{y_1}^{y_2} (2pz_0 + y^2 - m^2 x^2) dy \\ = \frac{1}{2p} \int_{x_1}^{x_2} dx \left[2pz_0 y + \frac{y^3}{3} - m^2 x^2 y \right]_{y_1}^{y_2}.$$

In diesem Falle sind aber y_1 und y_2 Funktionen von x , denn der Schnitt, welchen man durch den Punkt Q der X -Achse parallel zur YZ -Ebene legt, schneidet den begrenzenden Zylinder in zwei Geraden, welche auf der XY -Ebene in den Punkten W_1 und W_2 senkrecht stehen (Fig. 137). Deshalb wird

$$(21.) \quad \begin{cases} y_2 = +\sqrt{a^2 - x^2}, \\ y_1 = -\sqrt{a^2 - x^2} \end{cases}$$

und

$$(22.) \quad V = \frac{1}{2p} \int_{x_1}^{x_2} 2dx \sqrt{a^2 - x^2} [2pz_0 - m^2 x^2 + \frac{1}{3}(a^2 - x^2)] \\ = \frac{6pz_0 + a^2}{3p} \int_{x_1}^{x_2} dx \sqrt{a^2 - x^2} - \frac{3m^2 + 1}{3p} \int_{x_1}^{x_2} x^2 dx \sqrt{a^2 - x^2}.$$

Nun ist nach den Formeln Nr. 122, 120 und 123 der Tabelle

$$(23.) \quad \int x^2 dx \sqrt{a^2 - x^2} = \frac{x^3}{4} \sqrt{a^2 - x^2} + \frac{a^2}{4} \int \frac{x^2 dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} \\ = \frac{1}{8} \left[x(2x^2 - a^2) \sqrt{a^2 - x^2} + a^4 \arcsin\left(\frac{x}{a}\right) \right],$$

$$(24.) \quad \int dx \sqrt{a^2 - x^2} = \frac{x}{2} \sqrt{a^2 - x^2} + \frac{a^2}{2} \arcsin\left(\frac{x}{a}\right).$$

Fig. 137.



Dabei muß der Punkt Q den ganzen Kreisdurchmesser BA durchlaufen, d. h. x_1 ist gleich $-a$ und x_2 gleich $+a$. Dies gibt

$$(23\text{ a.}) \quad \int_{-a}^{+a} x^2 dx \sqrt{a^2 - x^2} = \frac{a^4}{4} \arcsin 1 = \frac{a^4 \pi}{8},$$

$$(24\text{ a.}) \quad \int_{-a}^{+a} dx \sqrt{a^2 - x^2} = a^2 \arcsin 1 = \frac{a^2 \pi}{2},$$

also

$$(25.) \quad V = \frac{(6pz_0 + a^2)a^2\pi}{6p} - \frac{(3m^2 + 1)a^4\pi}{24p} \\ = \frac{a^2\pi}{8p} [8pz_0 + (1 - m^2)a^2].$$

Aufgabe 3. Die Gleichung

$$(26.) \quad 2pz = y^2 - m^2x^2$$


stellt wieder ein *hyperbolisches Paraboloid* dar, welches die XY -Ebene in den beiden Geraden AC und BD mit den Gleichungen

$$(27.) \quad y = +mx \quad \text{und} \quad y = -mx$$

schneidet (Fig. 138); man soll das Volumen des Körpers berechnen, der oben von der Fläche, unten von der XY -Ebene und seitlich von dem Zylinder

$$(28.) \quad x^2 + y^2 = a^2$$

begrenzt wird.



Auflösung. Wenn die Konstante p positiv ist, so liegt nur derjenige Teil der Fläche über der XY -Ebene, für welchen $y^2 > m^2x^2$ ist; das Körperstück, welches berechnet werden soll, liegt also ausschließlich über dem schraffierten Teile der Figur. Da die XZ -Ebene und die YZ -Ebene Symmetrie-Ebenen sind, so genügt es, das Volumen des

den soll, liegt also ausschließlich über dem schraffierten Teile der Figur. Da die XZ -Ebene und die YZ -Ebene Symmetrie-Ebenen sind, so genügt es, das Volumen des

Körpers zu berechnen, welcher über dem Kreissektor COE liegt, wenn man das gefundene Resultat noch mit 4 multipliziert. Es wird also

$$(29.) \quad V = 4 \int_{x_1}^{x_2} dx \int_{y_1}^{y_2} y dy = \frac{2}{p} \int_{x_1}^{x_2} dx \int_{y_1}^{y_2} (y^2 - m^2 x^2) dy,$$

wobei

$$(30.) \quad y_1 = QP_1 = mx, \quad y_2 = QP_2 = \sqrt{a^2 - x^2},$$

$$(31.) \quad x_1 = 0, \quad x_2 = OF = a \cos \alpha = \frac{a}{\sqrt{1+m^2}}$$

ist, wenn man den Winkel XOC mit α bezeichnet. Es ist nämlich x_2 die Abszisse des Punktes C , für den die beiden Gleichungen

$$y = \sqrt{a^2 - x^2} \quad \text{und} \quad y = mx$$

gemeinschaftlich gelten, für den also

$$a^2 - x^2 = m^2 x^2, \quad \text{oder} \quad x^2(1 + m^2) = a^2$$

wird. Deshalb findet man aus Gleichung (29.)

$$\begin{aligned} (32.) \quad V &= \frac{2}{p} \int_{x_1}^{x_2} dx \left[\frac{y^3}{3} - m^2 x^2 y \right]_{mx}^{\sqrt{a^2 - x^2}} \\ &= \frac{2}{3p} \int_{x_1}^{x_2} dx [V a^2 - x^2 (a^2 - x^2 - 3m^2 x^2) + 2m^3 x^3] \\ &= \frac{2}{3p} \left[a^2 \int_{x_1}^{x_2} dx \sqrt{a^2 - x^2} - (1 + 3m^2) \int_{x_1}^{x_2} x^2 dx \sqrt{a^2 - x^2} \right. \\ &\quad \left. + 2m^3 \int_{x_1}^{x_2} x^3 dx \right]. \end{aligned}$$

Nun ist nach Gleichung (24.) und (31.)

$$\begin{aligned} (33.) \quad \int_{x_1}^{x_2} dx \sqrt{a^2 - x^2} &= \left[\frac{x}{2} \sqrt{a^2 - x^2} + \frac{a^2}{2} \arcsin \left(\frac{x}{a} \right) \right]_0^{a \cos \alpha} \\ &= \frac{a^2}{2} [\sin \alpha \cos \alpha + \arcsin(\cos \alpha)] \\ &= \frac{a^2}{2} \left[\frac{m}{1+m^2} + \frac{\pi}{2} - \alpha \right]; \end{aligned}$$

nach Gleichung (23.) ist ferner

$$\begin{aligned}
 (34.) \int_{x_1}^{x_2} x^2 dx \sqrt{a^2 - x^2} &= \frac{1}{8} \left[x(2x^2 - a^2) \sqrt{a^2 - x^2} + a^4 \arcsin\left(\frac{x}{a}\right) \right]_0^{a \cos \alpha} \\
 &= \frac{a^4}{8} [\sin \alpha \cos \alpha (2 \cos^2 \alpha - 1) + \arcsin(\cos \alpha)] \\
 &= \frac{a^4}{8} \left[\frac{m(1 - m^2)}{(1 + m^2)^2} + \frac{\pi}{2} - \alpha \right];
 \end{aligned}$$

und endlich ist

$$(35.) \int_{x_1}^{x_2} x^3 dx = \left[\frac{x^4}{4} \right]_0^{a \cos \alpha} = \frac{a^4}{4} \cos^4 \alpha = \frac{a^4}{4(1 + m^2)^2},$$


folglich wird nach Gleichung (32.)

$$\begin{aligned}
 V &= \frac{2a^4}{3p} \left[\frac{1}{2} \left(\frac{m}{1 + m^2} + \frac{\pi}{2} - \alpha \right) - \frac{1 + 3m^2}{8} \left(\frac{m(1 - m^2)}{(1 + m^2)^2} + \frac{\pi}{2} - \alpha \right) \right. \\
 &\quad \left. + \frac{m^3}{2(1 + m^2)^2} \right],
 \end{aligned}$$

oder

$$(36.) \quad V = \frac{a^4}{8p} [2m + (1 - m^2)(\pi - 2\alpha)].$$

Fig. 139.



Aufgabe 4. Aus einer

Kugel mit der Gleichung

$$(37.) \quad x^2 + y^2 + z^2 - a^2 = 0$$

bohren die beiden Kreiszylinder mit den Gleichungen

$$(38.) \quad x^2 + y^2 - ax = 0$$

und

$$x^2 + y^2 + ax = 0$$

Öffnungen heraus; wie groß ist das Volumen des übrig gebliebenen Teiles der Kugel (Fig. 139 und 140)?

Auflösung. Die XY -Ebene schneidet die Kugel in einem Kreise mit dem Halbmesser a und die beiden Kreiszylinder in Kreisen mit den Halbmessern $\frac{a}{2}$ (Fig. 139 und

140). Legt man durch den Punkt Q der X -Achse einen Schnitt senkrecht zur X -Achse, so schneidet derselbe aus der Kugel einen Kreis mit dem Halbmesser

$$(39.) \quad QR_1 = \sqrt{a^2 - x^2}$$

und aus dem einen Zylinder die beiden Geraden $P_1'P_1$ und $P_2'P_2$ (Fig. 141), deren Abstand

$$QW_1 = \sqrt{ax - x^2}$$

vom Mittelpunkt Q des Kreises sich aus der Gleichung

$$(40.) \quad x^2 + y^2 - ax = 0,$$

oder

$$(40a.) \quad y = \sqrt{ax - x^2}$$

ergibt. Der Durchschnitt des Zylinders über OW_1A mit der Kugelfläche ist in Figur 139 durch die Kurve CP_1A dargestellt.

Da der Kreis um Q auf der Kugelfläche liegt, so

genügen die Koordinaten der Punkte P_1 und P_1' der Gleichung (37.), die man auf die Form


$$(41.) \quad \begin{cases} z' = +\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}, \\ z'' = -\sqrt{a^2 - x^2 - y^2} \end{cases}$$

bringen kann. Man erhält daher für den Flächeninhalt des Schnittes $F(x)$, welcher aus den beiden Kreissegmenten $P_2R_2P_2'$ und $P_1R_1P_1'$ besteht,

$$(42.) \quad F(x) = 2 \int_{y_1}^{y_2} (z' - z'') dy \\ = 4 \int_{y_1}^{y_2} \sqrt{a^2 - x^2 - y^2} dy,$$

wobei


Fig. 140.



$$OQ = x, \quad QR_1 = \sqrt{a^2 - x^2},$$

$$QW_1 = \sqrt{ax - x^2}.$$

Fig. 141.



(43.) $y_1 = Q W_1 = \sqrt{ax - x^2}$, $y_2 = Q R_1 = \sqrt{a^2 - x^2} = c$
ist. Nun wird nach Formel Nr. 123 der Tabelle

$$(44.) \quad \int dy \sqrt{c^2 - y^2} = \frac{y}{2} \sqrt{c^2 - y^2} + \frac{c^2}{2} \arcsin\left(\frac{y}{c}\right),$$

folglich ist, wenn man $c^2 = a^2 - x^2$ setzt,

$$(45.) \quad F(x) = 4 \left[\frac{y}{2} \sqrt{a^2 - x^2 - y^2} + \frac{a^2 - x^2}{2} \arcsin\left(\frac{y}{\sqrt{a^2 - x^2}}\right) \right]_{y_1}^{y_2}$$

oder mit Rücksicht auf die Gleichungen (43.)

$$F(x) = 2(a^2 - x^2) \left(\arcsin 1 - \arcsin \sqrt{\frac{ax - x^2}{a^2 - x^2}} \right) \\ - 2 \sqrt{ax - x^2} \sqrt{a^2 - ax},$$

also

$$(46.) \quad F(x) = 2(a^2 - x^2) \left(\frac{\pi}{2} - \arcsin \sqrt{\frac{x}{a+x}} \right) - 2(a-x) \sqrt{ax}.$$

Setzt man, um jetzt $F(x)dx$ zu integrieren, in Formel Nr. 98 der Tabelle, nämlich in

$$f u dv = uv - \int v du,$$

$$(47.) \quad u = \frac{\pi}{2} - \arcsin \sqrt{\frac{x}{a+x}}, \quad dv = (a^2 - x^2) dx,$$

also

$$(48.) \quad du = -\frac{adx}{2(a+x)\sqrt{ax}}, \quad v = a^2x - \frac{x^3}{3},$$

so wird

$$(49.) \quad \int_0^a (a^2 - x^2) \left(\frac{\pi}{2} - \arcsin \sqrt{\frac{x}{a+x}} \right) dx \\ = \left[\left(\frac{\pi}{2} - \arcsin \sqrt{\frac{x}{a+x}} \right) \left(a^2x - \frac{x^3}{3} \right) \right]_0^a + \frac{1}{6} \int_0^a \frac{a(3a^2x - x^3)}{(a+x)\sqrt{ax}} dx \\ = \left(\frac{\pi}{2} - \arcsin \sqrt{\frac{1}{2}} \right) \frac{2a^3}{3} + \frac{1}{6} \int_0^a \frac{(3a^2 - x^2)\sqrt{ax}}{a+x} dx.$$

Setzt man noch

$$(50.) \quad x = at^2, \quad \text{also} \quad dx = 2at dt, \quad \sqrt{ax} = at,$$

so wird

$$\begin{aligned}
 (51.) \quad \int_0^a \frac{(3a^2 - x^2)\sqrt{ax}}{a+x} dx &= \int_0^1 \frac{a^2(3-t^4)at}{a(1+t^2)} \cdot 2at dt = 2a^3 \int_0^1 \frac{-t^6 + 3t^2}{t^2 + 1} dt \\
 &= 2a^3 \int_0^1 \left(-t^4 + t^2 + 2 - \frac{2}{1+t^2} \right) dt \\
 &= 2a^3 \left[-\frac{t^5}{5} + \frac{t^3}{3} + 2t - 2 \operatorname{arctg} t \right]_0^1 = 2a^3 \left(\frac{32}{15} - \frac{\pi}{2} \right),
 \end{aligned}$$

also, da $\arcsin \sqrt{\frac{1}{2}}$ gleich $\frac{\pi}{4}$ ist,

$$\begin{aligned}
 (52.) \quad \int_0^a (a^2 - x^2) \left(\frac{\pi}{2} - \arcsin \sqrt{\frac{x}{a+x}} \right) dx \\
 = \frac{2a^3}{3} \cdot \frac{\pi}{4} + \frac{a^3}{3} \left(\frac{32}{15} - \frac{\pi}{2} \right) = \frac{32a^3}{45}.
 \end{aligned}$$

Außerdem ist mit Rücksicht auf die Gleichungen (50.)

$$\begin{aligned}
 (53.) \quad \int_0^a (a-x)\sqrt{ax} \cdot dx &= a^3 \int_0^1 (1-t^2)t \cdot 2t dt = 2a^3 \int_0^1 (t^2 - t^4) dt \\
 &= 2a^3 \left[\frac{t^3}{3} - \frac{t^5}{5} \right]_0^1 = 2a^3 \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5} \right) = \frac{4a^3}{15}.
 \end{aligned}$$

Deshalb wird

$$\begin{aligned}
 (54.) \quad V &= 2 \int_0^a F(x) dx \\
 &= 4 \int_0^a (a^2 - x^2) \left(\frac{\pi}{2} - \arcsin \sqrt{\frac{x}{a+x}} \right) dx - 4 \int_0^a (a-x)\sqrt{ax} dx \\
 &= \frac{128a^3}{45} - \frac{16a^3}{15} = \frac{16a^3}{9}.
 \end{aligned}$$

Man hätte auch das Volumen V_1 der beiden Zylinder berechnen können, soweit sie in der Kugel liegen. Zieht man dann das gefundene Resultat von dem Volumen der

ganzen Kugel, nämlich von $\frac{4a^3\pi}{3}$, ab, so ist die Aufgabe gelöst. Nach Figur 139, 140 und 141 wird bei dieser Behandlung

$$(55.) \quad F_1(x) = 4 \int_0^{y_1} dy \sqrt{a^2 - x^2 - y^2},$$

wobei wieder

$$(56.) \quad y_1 = Q W_1 = \sqrt{ax - x^2}$$

ist. Dies gibt nach Formel Nr. 123 der Tabelle

$$(57.) \quad F_1(x) = 2 \left[y \sqrt{a^2 - x^2 - y^2} + (a^2 - x^2) \arcsin \left(\frac{y}{\sqrt{a^2 - x^2}} \right) \right]_0^{y_1}$$

$$= 2(a - x) \sqrt{ax} + 2(a^2 - x^2) \arcsin \sqrt{\frac{x}{a + x}},$$

folglich findet man

$$(58.) \quad V_1 = 2 \int_0^a F_1(x) dx = 4 \int_0^a (a - x) \sqrt{ax} \, dx$$

$$+ 4 \int_0^a (a^2 - x^2) \arcsin \sqrt{\frac{x}{a + x}} \, dx.$$

Nach Gleichung (53.) ist

$$(59.) \quad \int_0^a (a - x) \sqrt{ax} \, dx = \frac{4a^3}{15}.$$

Setzt man zur Berechnung des anderen Integrals

$$u = \arcsin \sqrt{\frac{x}{a + x}}, \quad dv = (a^2 - x^2) dx,$$

also

$$du = \frac{adx}{2(a + x)\sqrt{ax}}, \quad v = a^2x - \frac{x^3}{3},$$

so ergibt sich durch partielle Integration

$$(60.) \quad \int_0^a (a^2 - x^2) \arcsin \sqrt{\frac{x}{a + x}} \, dx = \left[\left(a^2x - \frac{x^3}{3} \right) \arcsin \sqrt{\frac{x}{a + x}} \right]_0^a$$

$$- \frac{1}{6} \int_0^a \frac{(3a^2 - x^2) \sqrt{ax}}{a + x} \, dx.$$

Nun ist nach Gleichung (51.)

$$\int_0^a \frac{(3a^2 - x^2)\sqrt{ax}}{a + x} dx = 2a^3 \left(\frac{32}{15} - \frac{\pi}{2} \right),$$

folglich wird

$$(61.) \int_0^a (a^2 - x^2) \arcsin \sqrt{\frac{x}{a+x}} dx = \frac{2a^3}{3} \cdot \frac{\pi}{4} - \frac{a^3}{3} \left(\frac{32}{15} - \frac{\pi}{2} \right) \\ = \frac{a^3 \pi}{3} - \frac{32a^3}{45},$$

also

$$(62.) V_1 = \frac{16a^3}{15} + \frac{4a^3 \pi}{3} - \frac{128a^3}{45} = \frac{4a^3 \pi}{3} - \frac{16a^3}{9}.$$


Deshalb findet man wieder

$$(63.) V = \frac{4a^3 \pi}{3} - V_1 = \frac{16a^3}{9}.$$

Mit demselben Rechte, mit welchem man bisher die Schnitte senkrecht zur X -Achse legte, darf man natürlich auch zunächst Schnitte senkrecht zur Y -Achse oder senkrecht zur Z -Achse legen. Wenn man z. B. in der letzten Aufgabe den Körper, dessen Volumen berechnet werden soll, durch Schnitte, senkrecht zur Z -Achse, in Schichten zerlegt, so stellt Figur 142 einen solchen Schnitt dar, wobei $OS = z$ der Abstand dieses Schnittes von der XY -Ebene ist. Die Kugel wird in einem Kreise mit dem Halbmesser

$$(64.) SL = \sqrt{a^2 - z^2},$$

und die beiden Zylinder werden in Kreisen mit dem Halbmesser $\frac{a}{2}$ ge-



schnitten. Da die Achsen SL und SM die Figur in vier symmetrische Teile zerlegen, so ist der Flächeninhalt dieses Schnittes

$$(65.) \quad F(z) = 4SP_1M = 4 \int_0^{x_1} (y' - y'') dx,$$

wobei P' ein Punkt der Kugel und P'' ein Punkt des Zylinders ist, so daß

$$(66.) \quad y' = \sqrt{a^2 - z^2 - x^2}, \quad y'' = \sqrt{ax - x^2}$$

wird, folglich erhält man

$$(67.) \quad F(z) = 4 \int_0^{x_1} (\sqrt{a^2 - z^2 - x^2} - \sqrt{ax - x^2}) dx.$$

Im Punkte P_1 werden y' und y'' einander gleich; man findet daher den Wert von x_1 , indem man

$$(68.) \quad y' = y'', \quad \text{oder } a^2 - z^2 - x^2 = ax - x^2$$

setzt; dies gibt

$$(69.) \quad x_1 = \frac{a^2 - z^2}{a}.$$

Nun wird nach Formel Nr. 123 der Tabelle

$$(70.) \quad \int_0^{x_1} \sqrt{a^2 - z^2 - x^2} \cdot dx \\ = \left[\frac{x}{2} \sqrt{a^2 - z^2 - x^2} + \frac{a^2 - z^2}{2} \arcsin \left(\frac{x}{\sqrt{a^2 - z^2}} \right) \right]_0^{x_1},$$

oder, wenn man

$$(71.) \quad z = a \cos \varphi,$$

also

$$(72.) \quad a^2 - z^2 = a^2 \sin^2 \varphi, \quad x_1 = \frac{a^2 - z^2}{a} = a \sin^2 \varphi$$

setzt,

$$(73.) \quad \int_0^{x_1} \sqrt{a^2 - z^2 - x^2} dx = \left[\frac{x}{2} \sqrt{a^2 \sin^2 \varphi - x^2} \right. \\ \left. + \frac{a^2 \sin^2 \varphi}{2} \arcsin \left(\frac{x}{a \sin \varphi} \right) \right]_0^{a \sin^2 \varphi} \\ = \frac{a^2}{2} \sin^2 \varphi (\sin \varphi \cos \varphi + \varphi).$$

Ferner ist, wenn man

$$(74.) \quad x = a \sin^2 t,$$

also

(75) $a - x = a \cos^2 t$, $\sqrt{ax - x^2} = a \sin t \cos t$, $dx = 2a \sin t \cos t dt$ setzt,

$$\begin{aligned}
 (76.) \quad \int_0^{x_1} dx \sqrt{ax - x^2} &= 2a^2 \int_0^{\varphi} \sin^2 t \cos^2 t dt = 2a^2 \int_0^{\varphi} (\cos^2 t - \cos^4 t) dt \\
 &= 2a^2 \left[-\frac{1}{4} \cos^3 t \sin t + \frac{1}{8} \cos t \sin t + \frac{1}{8} t \right]_0^{\varphi} \\
 &= \frac{a^2}{4} [\sin \varphi \cos \varphi (1 - 2 \cos^2 \varphi) + \varphi].
 \end{aligned}$$

Aus den Gleichungen (67.), (73.) und (76.) folgt daher

$$\begin{aligned}
 (77.) \quad F(z) &= 4 \int_0^{x_1} dx \sqrt{a^2 - z^2 - x^2} - 4 \int_0^{x_1} dx \sqrt{ax - x^2} \\
 &= 2a^2 \sin^2 \varphi (\sin \varphi \cos \varphi + \varphi) - a^2 [\sin \varphi \cos \varphi (1 - 2 \cos^2 \varphi) + \varphi] \\
 &= a^2 [\sin \varphi \cos \varphi + \varphi (2 \sin^2 \varphi - 1)].
 \end{aligned}$$

Dies gibt nach Gleichung (71.)

$$\begin{aligned}
 (78.) \quad V &= 2 \int_0^a F(z) dz = 2a^3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} (-\sin^2 \varphi \cos \varphi - 2\varphi \sin^3 \varphi + \varphi \sin \varphi) d\varphi \\
 &= 2a^3 \left[\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 \varphi \cos \varphi d\varphi - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \varphi (\sin \varphi - 2 \sin^3 \varphi) d\varphi \right].
 \end{aligned}$$

Dabei ist

$$(79.) \quad \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 \varphi \cos \varphi d\varphi = \frac{1}{3} [\sin^3 \varphi]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{1}{3};$$

sodann findet man durch partielle Integration

$$\begin{aligned}
 \int \varphi (\sin \varphi - 2 \sin^3 \varphi) d\varphi &= \int \varphi (2 \cos^2 \varphi - 1) \sin \varphi d\varphi \\
 &= \varphi \left(\cos \varphi - \frac{2}{3} \cos^3 \varphi \right) - \int \left(\cos \varphi - \frac{2}{3} \cos^3 \varphi \right) d\varphi \\
 &= \varphi \left(\cos \varphi - \frac{2}{3} \cos^3 \varphi \right) - \int \left(\frac{1}{3} + \frac{2}{3} \sin^2 \varphi \right) \cos \varphi d\varphi \\
 &= \varphi \left(\cos \varphi - \frac{2}{3} \cos^3 \varphi \right) - \frac{1}{3} \sin \varphi - \frac{2}{9} \sin^3 \varphi,
 \end{aligned}$$

also

$$(80.) \quad \int_0^{\frac{\pi}{2}} \varphi(\sin \varphi - 2\sin^3 \varphi) d\varphi = -\frac{5}{9}.$$

Deshalb wird nach den Gleichungen (78.) und (79.) wieder

$$(81.) \quad V = 2a^3 \left(\frac{1}{3} + \frac{5}{9} \right) = \frac{16a^3}{9}.$$

§ 77.

Theorie der mehrfachen Integrale.

(Vergl. die Formel-Tabelle Nr. 212.)

Wie aus dem vorhergehenden Paragraphen zu ersehen ist, wird man durch die Kubatur der Körper auf *Doppelintegrale* geführt, und zwar in folgender Weise. Es war

$$(1.) \quad F'(x) = \int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} f(x, y) dy,$$

wobei

$$(2.) \quad f(x, y) = z' - z'' = g(x, y) - h(x, y)$$

und

$$(3.) \quad z' = g(x, y), \quad z'' = h(x, y)$$

die Gleichungen der beiden, den Körper oben und unten begrenzenden Flächen sind. Bei dem in Gleichung (1.) aufgestellten Integrale ist y die *Integrations-Veränderliche*, während x bei Ausführung der Integration als *Konstante* betrachtet werden muß. Deshalb dürfen auch die Grenzen

$$(4.) \quad y_1 = \varphi(x), \quad y_2 = \psi(x)$$

dieses Integrals noch Funktionen von x sein, wobei die Gleichungen (4.) auf der XY -Ebene senkrecht stehende Zylinder darstellen, welche den Körper vorn und rückwärts begrenzen. Das Volumen des Körpers wird dann

$$(5.) \quad V = \int_a^b F(x) dx = \int_a^b \int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} f(x, y) dy dx.$$

Dabei kann der Fall eintreten, daß der Körper, dessen Volumen berechnet werden soll, allseitig von krummen

Flächen begrenzt wird, die weder Zylinderflächen noch Ebenen sind. Man denke z. B. an das Volumen des dreiachsigen Ellipsoids. Die vorstehende Untersuchung bleibt aber auch dann noch richtig; es schrumpfen aber die Flächenstücke der Zylinder-Mäntel

$$y_1 = \varphi(x) \quad \text{und} \quad y_2 = \psi(x)$$

zu Kurven, in denen diese Zylinder den Körper berühren, und die begrenzenden ebenen Figuren in den Ebenen

$$x = a \quad \text{und} \quad x = b$$

zu Punkten, in denen diese Ebenen den Körper berühren, zusammen.

Aus dem Vorstehenden folgt gleichzeitig, daß auch umgekehrt ein solches Doppelintegral stets als das Volumen eines Körpers betrachtet werden kann, der oben von der Fläche (6.)

$$z = f(x, y),$$

unten von der XY -Ebene, vorn und rückwärts durch die Zylinder

$$(7.) \quad y_1 = \varphi(x), \quad y_2 = \psi(x),$$


links und rechts von den Ebenen

$$(8.) \quad x_1 = a, \quad x_2 = b$$

begrenzt wird. Die Richtigkeit dieser Behauptung folgt aus Figur 143; dabei entspricht der Gleichung (6.) die Fläche $CDFE$, den Gleichungen (7.) entsprechen die Zylinder CC_1E_1E und DD_1F_1F , und den Gleichungen (8.) entsprechen die Ebenen CC_1D_1D und EE_1F_1F . Dabei wird häufig der Fall eintreten, daß die Figur $D_1F_1E_1C_1$ in eine geschlossene Kurve übergeht, die „der Integrationsbereich A “ des Doppelintegrals genannt wird.

Für einen konstanten Wert von x , z. B. für $x = OR$, erhält man eine Ebene, senkrecht zur X -Achse, welche aus dem Körper die ebene Figur

Fig. 143.




$$(9.) \quad GG_1H_1H = F(x) = \int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} f(x, y) dy$$

ausschneidet.

Aus dieser geometrischen Deutung des Doppelintegrals folgt auch, daß es als eine Summe von *zweifach* unendlich vielen, unendlich kleinen Größen aufgefaßt werden kann.

Fig. 144.



Der betrachtete Körper wird nämlich durch die Schnitte, senkrecht zur *X*-Achse, in unendlich viele, unendlich dünne Schichten zerlegt, und jede solche Schicht wird wieder durch Schnitte, senkrecht zur *Y*-Achse, in unendlich viele, unendlich dünne Säulchen (Fig. 144) zerlegt, deren Höhe

$$(10.) \quad QP = z = f(x, y),$$

und deren Grundfläche ein unendlich kleines Rechteck $QQ_1Q_3Q_2$ mit den Seiten dx , dy und dem Flächeninhalte $dx dy$ ist.

Da bei der Integration in bezug auf y die Größen x und dx konstant bleiben, so kann man natürlich die Gleichung (5.) auch in der Form

$$(11.) \quad V = \int_a^b \int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} f(x, y) dx dy$$

schreiben, wobei

$$(12.) \quad f(x, y) dx dy = z dx dy$$

das Volumen eines solchen unendlich dünnen Säulchens $QQ_1Q_3Q_2PP_1P_3P_2$ ist. Das Doppelintegral ist die Summe der Säulchen, welche über dem Integrationsbereich A stehen.

Daraus ergibt sich, daß man auch die Reihenfolge der Integrationen ändern darf, denn man kann auch zuerst die unendlich dünnen Säulchen, welche zu demselben Werte von y gehören, durch Summation zu einer unendlich dünnen

Schicht vereinigen, welche zur XZ -Ebene parallel ist, und dann durch Summation aller dieser Schichten den ganzen Körper erhalten. Zu beachten ist aber, daß hierbei im allgemeinen auch eine *Änderung der Integrationsgrenzen* stattfindet.

Nur in dem Falle, wo die Integrationsgrenzen $\varphi(x)$ und $\psi(x)$ von x unabhängig sind, werden die Zylinder

$$(13.) \quad y = \varphi(x) \quad \text{und} \quad y = \psi(x)$$

in Ebenen

$$(14.) \quad y = c \quad \text{und} \quad y = d$$

übergehen (Fig. 145). Der Integrationsbereich A wird somit ein Rechteck $D_1F_1E_1C_1$. Dann folgt aus der geometrischen Deutung des Doppelintegrals ohne weiteres

$$(15.) \quad \int_a^b \int_c^d f(x, y) dy dx = \int_c^d \int_a^b f(x, y) dx dy,$$

denn in diesem Falle ist der Körper begrenzt von der krummen Fläche $z = f(x, y)$, von der XY -Ebene und den 4 Ebenen

$$C_1CDD_1, \quad E_1EFF_1, \quad C_1CEE_1, \quad D_1DFF_1$$

mit den Gleichungen


$$(16.) \quad x = a, \quad x = b, \quad y = c, \quad y = d.$$

Dies gibt den Satz:

Sind die Grenzen eines Doppelintegrals in bezug auf x und y konstante Größen, so wird der Wert des Doppelintegrals nicht geändert, wenn man die Reihenfolge der Integrationen in bezug auf die beiden Veränderlichen x und y umkehrt und die Integrationsgrenzen unverändert läßt.

Jetzt ergibt sich von selbst, was man unter einem *dreifachen Integrale*

Fig. 145.



$$\int_a^b \int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} \int_{h(x,y)}^{g(x,y)} f(x, y, z) dz$$

zu verstehen hat. In ähnlicher Weise kann man auch ein *n*-faches Integral erklären und als den Grenzwert einer Summe von *n*-fach unendlich vielen, unendlich kleinen Größen deuten.

Es ist möglich, das Volumen eines Körpers auch als ein dreifaches Integral darzustellen, denn man kann schreiben

$$z' - z'' = \int_{s''}^{s'} g(x, y) h(x, y) dz,$$

also

$$(17.) \quad V = \int_a^b \int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} \int_{h(x,y)}^{g(x,y)} f(x, y, z) dz = \int_a^b \int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} \int_{h(x,y)}^{g(x,y)} f(x, y, z) dz.$$

Hierbei ist $dx dy dz$ ein unendlich kleines rechtwinkliges Parallelepipedon (Fig. 146), welches das *Volumenelement* genannt wird. Die angegebenen Integrationsgrenzen deuten darauf hin, daß man zuerst in bezug auf *z*, dann in bezug auf *y* und zuletzt in bezug auf *x* integrieren soll. Man darf aber auch die Reihenfolge der Integrationen ändern, nur muß man dabei beachten, daß dann auch die Integrationsgrenzen durch Betrachtung des räumlichen Integrationsgebietes anders zu bestimmen sind. Wenn man z. B. zuerst in bezug auf *x* integriert, so sind die Grenzen x_1 und x_2 im allgemeinen noch Funktionen von *y* und *z*, welche durch die Gleichungen der begrenzenden Flächen erklärt sind.

Fig. 146.



§ 78.

Einführung von neuen Integrations-Veränderlichen.

(Vergl. die Formel-Tabelle Nr. 213 und 214.)

Wie man bei den einfachen Integralen durch Substitution eine neue Integrations-Veränderliche zur leichtern Ermittlung des gesuchten Integrals einführt, so kann man auch bei den *n*-fachen Integralen durch Substitution *n* neue Veränderliche einführen und dadurch möglicherweise

die Berechnung des mehrfachen Integrals wesentlich erleichtern. Bei einem Doppelintegrale

$$(1.) \quad V = \int_a^b \int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} f(x, y) dx dy$$

setze man z. B.

$$(2.) \quad x = f_1(u, v), \quad y = f_2(u, v)$$

und mache u und v zu *Integrations-Veränderlichen*. Während aber bei der Darstellung von V durch Gleichung (1.) konstante Werte von x Schnitte, senkrecht zur X -Achse, lieferten, erhält man für $u = c$ aus den Gleichungen (2.) die Gleichungen

$$(3.) \quad x = f_1(c, v), \quad y = f_2(c, v),$$


welche für jeden konstanten Wert von c einer Kurve in der XY -Ebene, also einer Zylinderfläche im Raume entsprechen. Ebenso erhält man für konstante Werte von v aus den Gleichungen (2.) wieder Zylinderflächen, welche auf der XY -Ebene senkrecht stehen. Setzt man z. B.

$$(4.) \quad x = r \cos \varphi, \quad y = r \sin \varphi,$$

indem man die beiden neuen Integrations-Veränderlichen mit r und φ bezeichnet, so erhält man für konstante Werte von r konzentrische Kreise (Fig. 147), bzw. koaxiale Kreiszyylinder, und für konstante Werte von φ gerade Linien durch den Nullpunkt, bzw. Ebenen durch die Z -Achse.

So lange x und y die Integrations - Veränderlichen waren, mußte man sich den Körper in zweifach unendlich viele, unendlich dünne Säulchen zerlegt denken, deren Höhe $z = f(x, y)$, und deren Grundfläche ein Rechteck mit den Seiten dx, dy und dem Flächeninhalte $dx dy$ ist. Jetzt wird der Körper auch in

Fig. 147




zweifach unendlich viele, unendlich dünne Säulchen mit der Höhe

$$(5.) \quad z = f(x, y) = f[f_1(u, v), f_2(u, v)] = F(u, v)$$

zerlegt, aber die Grundflächen $PP_1P_3P_2$ (Fig. 148) sind nicht mehr Rechtecke mit dem Flächeninhalte $dx dy$, sondern

Fig. 148.



kleine Vierecke mit den Ecken P, P_1, P_3, P_2 . Die Koordinaten dieser Punkte entsprechen nach den vorhergehenden Ausführungen bzw. den Werten $(u, v), (u + du, v), (u + du, v + dv), (u, v + dv)$, d. h. es wird

$$(6.) \quad x_1 = x + \frac{\partial x}{\partial u} du, \quad y_1 = y + \frac{\partial y}{\partial u} du,$$

$$(7.) \quad x_2 = x + \frac{\partial x}{\partial v} dv, \quad y_2 = y + \frac{\partial y}{\partial v} dv,$$

$$(8.) \quad x_3 = x + \frac{\partial x}{\partial u} du + \frac{\partial x}{\partial v} dv, \quad y_3 = y + \frac{\partial y}{\partial u} du + \frac{\partial y}{\partial v} dv.$$

Nun ist der Flächeninhalt des Vierecks $PP_1P_3P_2$, da man die Seiten als gerade Linien betrachten darf,

$$(9.) \quad G = \frac{1}{2} [x(y_1 - y_2) + x_1(y_3 - y) + x_3(y_2 - y_1) + x_2(y - y_3)] \\ = \frac{1}{2} [(x_3 - x)(y_2 - y_1) - (x_2 - x_1)(y_3 - y)],$$

oder

$$(9a.) \quad 2G = \begin{vmatrix} x_3 - x, & x_2 - x_1 \\ y_3 - y, & y_2 - y_1 \end{vmatrix}.$$

Dies gibt mit Rücksicht auf die Gleichungen (6.) bis (8.)

$$2G = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} du + \frac{\partial x}{\partial v} dv, & \frac{\partial x}{\partial v} dv - \frac{\partial x}{\partial u} du \\ \frac{\partial y}{\partial u} du + \frac{\partial y}{\partial v} dv, & \frac{\partial y}{\partial v} dv - \frac{\partial y}{\partial u} du \end{vmatrix},$$

oder, wenn man die Elemente der zweiten Kolonne von denen der ersten Kolonne subtrahiert,

$$(10.) \quad 2G = 2du \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u}, & \frac{\partial x}{\partial v} dv - \frac{\partial x}{\partial u} du \\ \frac{\partial y}{\partial u}, & \frac{\partial y}{\partial v} dv - \frac{\partial y}{\partial u} du \end{vmatrix} = 2du dv \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u}, & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u}, & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix},$$

also

$$(10a.) \quad G = \left(\frac{\partial x}{\partial u} \frac{\partial y}{\partial v} - \frac{\partial x}{\partial v} \frac{\partial y}{\partial u} \right) du dv^*).$$

Vertauscht man in dieser Gleichung u mit v , so ändert sich das Vorzeichen von G . Da nun bei dieser Darstellung die Veränderlichen u und v gleichberechtigt sind, so ist

$$(10b.) \quad G = \pm \left(\frac{\partial x}{\partial u} \frac{\partial y}{\partial v} - \frac{\partial x}{\partial v} \frac{\partial y}{\partial u} \right) du dv,$$

und zwar ist das Vorzeichen immer so zu wählen, daß G positiv wird. Bei Einführung der neuen Veränderlichen u und v müssen die Funktionen

$$f_1(u, v) \quad \text{und} \quad f_2(u, v)$$

so gewählt werden, daß der Ausdruck $\frac{\partial x}{\partial u} \frac{\partial y}{\partial v} - \frac{\partial x}{\partial v} \frac{\partial y}{\partial u}$ innerhalb des Integrationsbereichs das Vorzeichen nicht wechselt.

Deshalb ist das Volumen eines solchen Säulchens

$$(11.) \quad \pm F(u, v) \cdot \left(\frac{\partial x}{\partial u} \frac{\partial y}{\partial v} - \frac{\partial x}{\partial v} \frac{\partial y}{\partial u} \right) du dv,$$

und das Volumen des ganzen Körpers

$$(12.) \quad V = \pm \int_{\alpha}^{\beta} \int_{g(u)}^{h(u)} F(u, v) \cdot \left(\frac{\partial x}{\partial u} \frac{\partial y}{\partial v} - \frac{\partial x}{\partial v} \frac{\partial y}{\partial u} \right) du dv,$$

wobei man noch die Integrationsgrenzen aus der Gestalt des Integrationsbereichs richtig bestimmen muß.

Den Ausdruck

$$(13.) \quad \frac{\partial x}{\partial u} \frac{\partial y}{\partial v} - \frac{\partial x}{\partial v} \frac{\partial y}{\partial u} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix}$$

nennt man „die Funktionaldeterminante“.

Aus den Gleichungen (1.) und (12.) folgt ganz allgemein für die Doppelintegrale die Formel

$$(14.) \quad \int_{\alpha}^{\beta} \int_{g(x)}^{h(x)} f(x, y) dx dy = \pm \int_{\alpha}^{\beta} \int_{g(u)}^{h(u)} F(u, v) \cdot \left(\frac{\partial x}{\partial u} \frac{\partial y}{\partial v} - \frac{\partial x}{\partial v} \frac{\partial y}{\partial u} \right) du dv.$$

*) Die Rechnung ist auch sehr leicht ohne Anwendung der Determinanten auszuführen, indem man in Gleichung (9.) die Werte von $x_2 - x$, $y_2 - y$, $x_2 - x_1$, $y_2 - y$ einsetzt.

Für den Fall, daß man durch die Gleichungen

$$(15.) \quad x = r \cos \varphi, \quad y = r \sin \varphi$$

ebene Polarkoordinaten einführt, wird z. B.

$$(16.) \quad \frac{\partial x}{\partial r} = \cos \varphi, \quad \frac{\partial x}{\partial \varphi} = -r \sin \varphi,$$

$$(17.) \quad \frac{\partial y}{\partial r} = \sin \varphi, \quad \frac{\partial y}{\partial \varphi} = +r \cos \varphi;$$

die Funktionaldeterminante ist daher

$$(18.) \quad \frac{\partial x}{\partial r} \frac{\partial y}{\partial \varphi} - \frac{\partial x}{\partial \varphi} \frac{\partial y}{\partial r} = r \cos^2 \varphi + r \sin^2 \varphi = r,$$

folglich geht, da r immer positiv ist, Gleichung (14.) über in

$$(19.) \quad \int_{\alpha}^{\beta} \int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} f(x, y) dx dy = \int_{\alpha}^{\beta} \int_{\varphi(\varphi)}^{\psi(\varphi)} f(r \cos \varphi, r \sin \varphi) \cdot r d\varphi dr.$$

Hier ist vorausgesetzt, daß man zuerst in bezug auf r und dann in bezug auf φ integriert; man kann aber auch zuerst in bezug auf φ und dann in bezug auf r integrieren, nur muß man dann die Grenzen anders bestimmen.

Das in Gleichung (19.) enthaltene Resultat findet man noch leichter, wenn man nicht die Funktionaldeterminante berechnet, sondern beachtet, daß die Grundflächen $PP_1P_3P_2$ in diesem Falle kleine Rechtecke mit den Seiten $rd\varphi$ und dr sind (Fig. 147).

Wie nützlich die Einführung von neuen Integrations-Veränderlichen mitunter bei der Ermittlung von Doppelintegralen ist, kann man z. B. aus den in § 76 behandelten Aufgaben ersehen. So war in Aufgabe 2

$$(20.) \quad V = \frac{1}{2p} \int_{x_1}^{x_2} \int_{y_1}^{y_2} (2pz_0 + y^2 - m^2x^2) dx dy.$$

Führt man in diesem Falle für die rechtwinkligen Koordinaten x und y ebene Polarkoordinaten durch die Gleichungen (15.) ein, so erhält man nach Gleichung (19.)

$$\begin{aligned}
 (21.) \quad V &= \frac{1}{2p} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^a [2pz_0 + r^2(\sin^2\varphi - m^2\cos^2\varphi)] r dr \\
 &= \frac{1}{2p} \int_0^{2\pi} d\varphi \left[pz_0 r^2 + \frac{r^4}{4} (\sin^2\varphi - m^2\cos^2\varphi) \right]_0^a \\
 &= \frac{a^2}{8p} \int_0^{2\pi} d\varphi [4pz_0 + a^2(\sin^2\varphi - m^2\cos^2\varphi)],
 \end{aligned}$$

und dies gibt nach Formel Nr. 99 und 100 der Tabelle in Übereinstimmung mit dem früher gefundenen Resultate

$$\begin{aligned}
 (22.) \quad V &= \frac{a^2}{8p} \left[4pz_0\varphi - \frac{1+m^2}{2} a^2 \sin\varphi \cos\varphi + \frac{1-m^2}{2} a^2\varphi \right]_0^{2\pi} \\
 &= \frac{a^2\pi}{8p} [8pz_0 + (1-m^2)a^2].
 \end{aligned}$$

In Aufgabe 3 (vergl. Fig. 138) sollte

$$(23.) \quad V = \frac{2}{p} \int_{x_1}^{x_2} \int_{y_1}^{y_2} (y^2 - m^2x^2) dx dy$$

berechnet werden, wobei

$m = \operatorname{tg} \alpha$, $y_1 = mx$, $y_2 = \sqrt{a^2 - x^2}$, $x_1 = 0$, $x_2 = a \cos \alpha$ war. Durch Einführung von Polarkoordinaten wird nach Gleichung (19.)

$$\begin{aligned}
 (24.) \quad V &= \frac{2}{p} \int_a^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^a r^2 (\sin^2\varphi - m^2\cos^2\varphi) r dr \\
 &= \frac{a^4}{2p} \int_a^{\frac{\pi}{2}} (\sin^2\varphi - m^2\cos^2\varphi) d\varphi,
 \end{aligned}$$

also nach Formel Nr. 99 und 100 der Tabelle

$$\begin{aligned}
 (25.) \quad V &= \frac{a^4}{4p} \left[-(1+m^2) \sin\varphi \cos\varphi + (1-m^2)\varphi \right]_a^{\frac{\pi}{2}} \\
 &= \frac{a^4}{4p} \left[(1-m^2) \frac{\pi}{2} + (1+m^2) \sin \alpha \cos \alpha - (1-m^2)\alpha \right],
 \end{aligned}$$

oder, da $1 + m^2 = 1 + \operatorname{tg}^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha}$ ist,

$$(26.) \quad V = \frac{a^4}{8p} [2m + (1 - m^2)(\pi - 2\alpha)].$$

Bei Aufgabe 4 war nach den Gleichungen (42.), (43.) und (54.) in § 76

$$(27.) \quad V = 8 \int_0^a \int_{\sqrt{a^2 - x^2}}^{\sqrt{a^2 - x^2}} \sqrt{a^2 - x^2 - y^2} \cdot dx dy.$$

Durch Einführung von Polarkoordinaten wird nach Gleichung (19.)

$$(28.) \quad V = 8 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_{a \cos \varphi}^a r dr \sqrt{a^2 - r^2},$$

also nach Formel Nr. 124 der Tabelle

$$(29.) \quad \begin{aligned} V &= 8 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \left[-\frac{1}{3} (a^2 - r^2) \sqrt{a^2 - r^2} \right]_{a \cos \varphi}^a \\ &= \frac{8a^3}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 \varphi d\varphi = -\frac{8a^3}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \cos^2 \varphi) d(\cos \varphi). \end{aligned}$$

Dies gibt wieder

$$(30.) \quad V = -\frac{8a^3}{3} \left[\cos \varphi - \frac{1}{3} \cos^3 \varphi \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{16a^3}{9}.$$

§ 79.

Das Gaußsche Fehlerintegral.

(Vergl. die Formel-Tabelle Nr. 215.)

Mitunter wird man sogar *einfache* Integrale dadurch ermitteln, daß man sie auf *Doppelintegrale* zurückführt, die man durch Einführung von neuen Integrations-Veränderlichen leicht berechnen kann. Es sei z. B.

$$(1.) \quad J = \int_0^{\infty} e^{-x^2} dx$$

zu berechnen; dann ist auch, wenn man x mit y vertauscht,

$$(2.) \quad J = \int_0^{\infty} e^{-y^2} dy.$$

Indem man die Gleichungen (1.) und (2.) miteinander multipliziert, erhält man

$$(3.) \quad J^2 = \int_0^{\infty} e^{-x^2} dx \int_0^{\infty} e^{-y^2} dy = \int_0^{\infty} \int_0^{\infty} e^{-(x^2+y^2)} dx dy.$$

Dieses Integral stellt das Volumen eines Körpers dar, welcher oben durch die Rotationsfläche


$$(4.) \quad z = e^{-(x^2+y^2)},$$

unten durch die XY -Ebene und seitlich durch die XZ -Ebene und durch die YZ -Ebene begrenzt wird (Fig. 149).

Fig. 149.

Durch Einführung von Polarkoordinaten findet man daher nach Gleichung (19.) in § 78

$$(5.) \quad J^2 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{\infty} e^{-r^2} r dr d\varphi.$$



Dies gibt, indem man

$$(6.) \quad r^2 = -t, \text{ also } 2r dr = -dt$$

setzt und die in § 52 gegebene Grenzbetrachtung beachtet,

$$(7.) \quad J^2 = -\frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{-\infty} e^t dt = -\frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi [e^t]_0^{-\infty} = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi = \frac{\pi}{4},$$

folglich wird

$$(8.) \quad J = \int_0^{\infty} e^{-x^2} dx = \frac{1}{2} \sqrt{\pi}.$$

Dieses Integral spielt eine wichtige Rolle in der höheren Vermessungskunde, und zwar auch dann, wenn die obere Grenze nicht den Wert ∞ , sondern einen endlichen positiven Wert x hat. Gewöhnlich setzt man dann

$$(9.) \quad J = \int_0^x e^{-x^2} dx = \frac{1}{2} \sqrt{\pi} \Phi(x)$$

und nennt die Funktion $\Phi(x)$ das „Gaußsche Fehlerintegral“. Da

$$(10.) \quad \frac{d\Phi(x)}{dx} = \frac{2}{e^{x^2} \sqrt{\pi}}$$

für alle Werte von x positiv ist, so ergibt sich aus Gleichung (8.); daß $\Phi(x)$ von 0 bis 1 beständig wächst, wenn x alle Werte von 0 bis ∞ durchläuft. Zur Berechnung der Funktion $\Phi(x)$ beachte man, daß nach D.-R. (12. Auflage), Formel Nr. 93 der Tabelle

$$(11.) \quad e^{-x^2} = 1 - \frac{x^2}{1!} + \frac{x^4}{2!} - \frac{x^6}{3!} + \dots$$

eine Reihe ist, die für alle Werte von x gleichmäßig konvergiert. Man erhält daher durch gliedweise Integration

$$(12.) \quad J = \int_0^x e^{-x^2} dx = \frac{x}{1} - \frac{x^3}{1! 3} + \frac{x^5}{2! 5} - \frac{x^7}{3! 7} + \dots$$

Wegen der vielfachen Anwendungen des Fehlerintegrals in der Wahrscheinlichkeitsrechnung und in der Vermessungskunde hat man ausführliche Tabellen dafür aufgestellt*). Hier möge es genügen, die folgenden Werte anzuführen:

x	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9
$\Phi(x)$	0,0000	0,1125	0,2227	0,3286	0,4284	0,5205	0,6039	0,6778	0,7421	0,7969

*) Vergl. die Funktionentafel von Jahnke und Emde, Seite 31 bis 42.

x	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9
$\Phi(x)$	0,8427	0,8802	0,9103	0,9340	0,9523	0,9661	0,9763	0,9838	0,9891	0,9928

x	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	
$\Phi(x)$	0,9953	0,9970	0,9981	0,9989	0,9993	0,9996	0,9998	0,9999	0,9999	

Man erkennt hieraus schon, daß die Annäherung der Funktion $\Phi(x)$ an den Grenzwert 1 für $\lim x = \infty$ außerordentlich schnell erfolgt. Da dieser Umstand für die Anwendung von Bedeutung ist, möge hier noch das Verhalten von $\Phi(x)$ für größere Werte von x besonders untersucht werden.

Durch Zerlegung des Integrals J erhält man

$$(13.) \quad J = \int_0^x e^{-x^2} dx = \int_0^{\infty} e^{-x^2} dx - \int_x^{\infty} e^{-x^2} dx = \frac{1}{2} \sqrt{\pi} - \int_x^{\infty} e^{-x^2} dx.$$

Setzt man jetzt in die Formel für die partielle Integration

$$u = \frac{1}{2x^{2n+1}}, \quad dv = e^{-x^2} \cdot 2x dx,$$

also

$$du = -\frac{(2n+1)dx}{2x^{2n+2}}, \quad v = -e^{-x^2}.$$

so wird

$$(14.) \quad \int_x^{\infty} \frac{e^{-x^2} dx}{x^{2n}} = + \frac{e^{-x^2}}{2x^{2n+1}} - \frac{2n+1}{2} \int_x^{\infty} \frac{e^{-x^2} dx}{x^{2n+2}}.$$

Dies gibt für $n = 0, 1, 2, \dots n$

$$\int_x^{\infty} e^{-x^2} dx = \frac{e^{-x^2}}{2x} - \frac{1}{2} \int_x^{\infty} \frac{e^{-x^2} dx}{x^2},$$

$$\int_x^{\infty} \frac{e^{-x^2} dx}{x^2} = \frac{e^{-x^2}}{2x^3} - \frac{3}{2} \int_x^{\infty} \frac{e^{-x^2} dx}{x^4},$$

$$\int_x^{\infty} \frac{e^{-x^2} dx}{x^4} = \frac{e^{-x^2}}{2x^5} - \frac{5}{2} \int_x^{\infty} \frac{e^{-x^2} dx}{x^6},$$

$$\dots \dots \dots$$

$$\int_x^{\infty} \frac{e^{-x^2} dx}{x^{2n}} = \frac{e^{-x^2}}{2x^{2n+1}} - \frac{2n+1}{2} \int_x^{\infty} \frac{e^{-x^2} dx}{x^{2n+2}},$$

also

$$(15.) \int_x^\infty e^{-x^2} dx = \frac{e^{-x^2}}{2x} \left[1 - \frac{1}{2x^2} + \frac{1 \cdot 3}{(2x^2)^2} - \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{(2x^2)^3} + \dots \right. \\ \left. \pm \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \dots (2n-1)}{(2x^2)^n} \right] \mp R,$$

wobei

$$(16.) R = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \dots (2n+1)}{2^{n+1}} \int_x^\infty \frac{e^{-x^2} dx}{x^{2n+2}}.$$

Da die Funktion $e^{-x^2} = \frac{1}{e^{x^2}}$ mit wachsendem x abnimmt, so ist der größte Wert, den sie zwischen den Integrationsgrenzen annimmt, $\frac{1}{e^{x^2}}$. Deshalb wird nach Formel Nr. 171 der Tabelle

$$(17.) \int_x^\infty \frac{e^{-x^2} dx}{x^{2n+2}} < e^{-x^2} \int_x^\infty \frac{dx}{x^{2n+2}} = e^{-x^2} \left[-\frac{1}{(2n+1)x^{2n+1}} \right]_x^\infty \\ = \frac{e^{-x^2}}{(2n+1)x^{2n+1}},$$

folglich ist

$$(18.) R < \frac{e^{-x^2}}{2x} \cdot \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \dots (2n-1)}{(2x^2)^n},$$

d. h. das Restglied R ist, vom Vorzeichen abgesehen, kleiner als das letzte Glied, das man bei der Entwicklung in Gleichung (15.) benutzt hat. Dabei wird man für n keine besonders großen Werte nehmen, denn durch Vertauschung von n mit $n+1$ würde man in der eckigen Klammer noch ein weiteres Glied erhalten, das sich von dem vorhergehenden nur durch den Faktor $-\frac{2n+1}{2x^2}$ unterscheidet und, vom Vorzeichen abgesehen, nur dann kleiner wäre als das vorhergehende Glied, wenn $\frac{2n+1}{2x^2}$ ein echter Bruch ist. Setzt man daher $n=1$, so wird

$$(19.) \int_x^\infty e^{-x^2} dx = \frac{e^{-x^2}}{2x} \left(1 - \frac{1}{2x^2} \right) + R,$$

wobei

$$R < \frac{1}{4x^3 e^{x^2}}$$

ist. Aus den Gleichungen (9.), (13.) und (19.) erhält man

$$\begin{aligned} (20.) \quad 1 - \Phi(x) &= 1 - \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-x^2} dx = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_x^\infty e^{-x^2} dx \\ &= \frac{2}{\sqrt{\pi}} \cdot \frac{e^{-x^2}}{2x} \left(1 - \frac{1}{2x^2}\right) + \frac{2}{\sqrt{\pi}} R. \end{aligned}$$

Dies gibt für $1 - \Phi(x)$ den Näherungswert $\frac{2x^2 - 1}{e^{x^2} \cdot 2x^3 \sqrt{\pi}}$, durch dessen Berechnung man die folgende Tabelle findet:

x	Berechneter Wert von $1 - \Phi(x)$	Dabei ist der Fehler $\frac{2}{\sqrt{\pi}} R$ kleiner als	Wirklicher Wert von $1 - \Phi(x)$	Unterschied zwischen dem wirklichen und dem berechne- ten Wert
1	0,103 8	0,103 8	0,157 3	0,053 5
2	0,004 52	0,000 65	0,004 68	0,000 16
3	0,000 021 9	0,000 001 3	0,000 022 1	0,000 000 2
4	0,000 000 015 4	0,000 000 000 5	0,000 000 015 4	0,000 000 000 0

Diese Tabelle zeigt erstens, daß die Annäherung von $\Phi(x)$ an den Grenzwert 1 schon für $x \geq 3$, und noch mehr für $x \geq 4$ eine außerordentlich starke ist, und zweitens, daß man bei einer Genauigkeit von 5 Dezimalstellen die Gleichung (20.) sehr wohl für die Berechnung von $\Phi(x)$ benutzen kann. Für $x \geq 4$ gibt die Gleichung (20.) die Werte von $\Phi(x)$ sogar bis auf 9 Dezimalstellen genau.

Dabei möge aber hervorgehoben werden, daß bei der Berechnung von $\Phi(x)$ im allgemeinen 4 Dezimalstellen genügen werden.

§ 80.

Komplanatıon der Flächen.

(Vergl. die Formel-Tabelle Nr. 216.)

Wie man sich den Bogen einer Kurve zusammengesetzt denken kann aus unendlich vielen, unendlich kleinen Sehnen ds , d. h. wie man die unendlich kleinen Teile des

Bogens einer Kurve als gerade Linien betrachten kann, so kann man die unendlich kleinen Teile einer gekrümmten Fläche

$$(1.) \quad F(x, y, z) = 0, \quad \text{oder} \quad z = f(x, y)$$

als eben betrachten; man kann sich also die gekrümmte Fläche als die Summe von zweifach unendlich vielen, unendlich kleinen ebenen Stücken vorstellen.

Verbindet man nämlich einen beliebigen Punkt P der Fläche mit allen unendlich nahen Punkten durch gerade Linien, so sind diese geraden Linien Tangenten der Fläche im Punkte P und liegen im allgemeinen sämtlich in einer Ebene, welche die Tangentialebene der Fläche im Punkte P genannt wird und die Gleichung

$$(2.) \quad F_1(x' - x) + F_2(y' - y) + F_3(z' - z) = 0,$$


oder

$$(2a.) \quad z' - z = \frac{\partial z}{\partial x} (x' - x) + \frac{\partial z}{\partial y} (y' - y)$$

hat. (Vergl. D.-R., 12. Auflage, Formel Nr. 254 der Tabelle.)

Legt man also wieder unendlich viele Schnitte, senkrecht zur X -Achse und senkrecht zur Y -Achse, so zerteilen

Fig. 150.



diese die Fläche in unendlich viele, unendlich kleine Vierecke $PP_1P_3P_2$, deren Eckpunkte sämtlich in der Tangentialebene des Punktes P liegen (Fig. 150). Man kann also das Viereck $PP_1P_3P_2$ als *eben* betrachten und findet den Flächeninhalt dO desselben aus der Gleichung

$$(3.) \quad PP_1P_3P_2 \cdot \cos \gamma = dO \cdot \cos \gamma \\ = QQ_1Q_3Q_2 = dxdy,$$

wobei $QQ_1Q_3Q_2$ die Projektion von $PP_1P_3P_2$ auf die XY -Ebene und γ der Winkel ist, welchen die Tangentialebene des Punktes P mit der XY -Ebene bildet*).

*) Der hierbei angewendete Satz ergibt sich unmittelbar aus Figur 151.

Wird nämlich das beliebige Viereck $PP_1P_3P_2$ in der Ebene ε auf die Ebene ε_1 projiziert, so liegen die Lote QP , Q_1P_1 , Q_3P_3 , Q_2P_2 .

Dabei ist nach Gleichung (2.) und (2a.) in diesem Falle

$$(11.) \quad \cos \gamma = \frac{F_3}{\sqrt{F_1^2 + F_2^2 + F_3^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}},$$

folglich wird

welche man bezw. von den Punkten P, P_1, P_3, P_2 auf die Ebene ε_1 fällt, in den Ebenen $PSQ, P_1S_1Q_1, P_3S_3Q_3, P_2S_2Q_2$, welche durch die Eckpunkte des Vierecks $PP_1P_3P_2$ hindurchgehen und auf der Schnittlinie AB der Ebenen ε und ε_1 senkrecht stehen. Die Winkel $PSQ, P_1S_1Q_1, P_3S_3Q_3, P_2S_2Q_2$ sind alle dem Neigungswinkel γ gleich, so daß

$$(4.) \quad \begin{cases} SQ = SP \cdot \cos \gamma \\ S_1Q_1 = S_1P_1 \cdot \cos \gamma, \\ S_3Q_3 = S_3P_3 \cdot \cos \gamma, \\ S_2Q_2 = S_2P_2 \cdot \cos \gamma \end{cases}$$

ist. Da nun das Parallelogramm

$$SQQ_1S_1 = \frac{1}{2}(SQ + S_1Q_1) \cdot SS_1$$

und das Parallelogramm

$$SPP_1S_1 = \frac{1}{2}(SP + S_1P_1) \cdot SS_1,$$

so folgt mit Rücksicht auf die Gleichungen (4.), daß

$$(5.) \quad SQQ_1S_1 = SPP_1S_1 \cdot \cos \gamma.$$

Ebenso findet man

$$(6.) \quad S_1Q_1Q_3S_3 = S_1P_1P_3S_3 \cdot \cos \gamma,$$

$$(7.) \quad S_3Q_3Q_2S_2 = S_3P_3P_2S_2 \cdot \cos \gamma,$$

$$(8.) \quad S_2Q_2QS = S_2P_2PS \cdot \cos \gamma.$$

Dies gibt


$$(9.) \quad \begin{aligned} QQ_1Q_3Q_2 &= S_1Q_1Q_3S_3 + S_3Q_3Q_2S_2 - S_2Q_2QS - SQQ_1S_1 \\ &= (S_1P_1P_3S_3 + S_3P_3P_2S_2 - S_2P_2PS - SPP_1S_1) \cos \gamma \\ &= PP_1P_3P_2 \cdot \cos \gamma. \end{aligned}$$

In ähnlicher Weise kann man zeigen, daß die Projektion F_1 eines beliebigen Polygons F in der Ebene ε auf eine andere Ebene ε_1 gleich $F \cdot \cos \gamma$ wird, wenn γ der Neigungswinkel zwischen den beiden Ebenen ist. Da man eine krummlinig begrenzte Figur als ein Polygon mit unendlich vielen Seiten betrachten kann, so gilt die Formel

$$(10.) \quad F_1 = F \cdot \cos \gamma$$

auch für jede beliebige ebene Figur F und deren Projektion F_1 .

Fig. 151.



$$(12.) \quad dO = \frac{dx dy}{\cos \gamma} = \frac{dx dy}{F_3} \sqrt{F_1^2 + F_2^2 + F_3^2},$$

oder

$$(12a.) \quad dO = dx dy \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}.$$

Die Integration dieses Ausdruckes in bezug auf y bedeutet, daß man alle diese unendlich kleinen Vierecke summiert, welche zu demselben Werte von x gehören. Die erste Integration gibt also einen unendlich dünnen Flächenstreifen.

Integriert man dann noch in bezug auf x , so erhält man die ganze Oberfläche

$$(13.) \quad O = \int_{\alpha}^{\beta} dx \int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} \frac{dy}{F_3} \sqrt{F_1^2 + F_2^2 + F_3^2} = \int_{\alpha}^{\beta} dx \int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} dy \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}.$$

Die Berechnung des Inhalts krummer Oberflächen nennt man: „Komplanation der Flächen“.

§ 81.

Übungs-Beispiele.

Aufgabe 1. Die Gleichung

$$(1.) \quad pz = xy$$

stellt ein *gleichseitiges hyperbolisches Paraboloid* dar; man soll den Inhalt der Oberfläche zwischen den Ebenen

$$(2.) \quad x = 0 \quad \text{und} \quad x = a, \quad y = 0 \quad \text{und} \quad y = b$$

berechnen.

Auflösung. Das hyperbolische Paraboloid wird von den begrenzenden Ebenen in geraden Linien geschnitten, so daß die gesuchte Fläche die Seiten eines räumlichen Vierecks miteinander verbindet. Aus Gleichung (1.) folgt dabei

$$(3.) \quad \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{y}{p}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{x}{p},$$

$$(4.) \quad \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} = \frac{1}{p} \sqrt{p^2 + x^2 + y^2};$$

deshalb wird

$$(5.) \quad O = \frac{1}{p} \int_0^a dx \int_0^b dy \sqrt{p^2 + x^2 + y^2}.$$

Dies gibt nach Formel Nr. 129 der Tabelle

$$(6.) \quad O = \frac{1}{2p} \int_0^a dx \left[y \sqrt{p^2 + x^2 + y^2} + (p^2 + x^2) \ln \left(\frac{y + \sqrt{p^2 + x^2 + y^2}}{\sqrt{p^2 + x^2}} \right) \right]_0^b \\ = \frac{1}{2p} \int_0^a dx \left[b \sqrt{p^2 + b^2 + x^2} + (p^2 + x^2) \ln \left(\frac{b + \sqrt{p^2 + b^2 + x^2}}{\sqrt{p^2 + x^2}} \right) \right].$$

Setzt man

$$(7.) \quad u = \ln \left(\frac{b + \sqrt{p^2 + b^2 + x^2}}{\sqrt{p^2 + x^2}} \right), \quad dv = (p^2 + x^2) dx,$$

so wird

$$(8.) \quad v = p^2 x + \frac{x^3}{3} = \frac{x}{3} (3p^2 + x^2),$$

$$(9.) \quad du = \frac{xdx}{(b + \sqrt{p^2 + b^2 + x^2}) \sqrt{p^2 + b^2 + x^2}} - \frac{xdx}{p^2 + x^2} \\ = \frac{(\sqrt{p^2 + b^2 + x^2} - b)xdx}{(p^2 + x^2) \sqrt{p^2 + b^2 + x^2}} - \frac{xdx}{p^2 + x^2} \\ = - \frac{bxdx}{(p^2 + x^2) \sqrt{p^2 + b^2 + x^2}},$$

folglich erhält man nach der Formel

$$\int u dv = uv - \int v du$$

durch partielle Integration

$$(10.) \quad \int (p^2 + x^2) \ln \left(\frac{b + \sqrt{p^2 + b^2 + x^2}}{\sqrt{p^2 + x^2}} \right) dx \\ = \frac{x}{3} (3p^2 + x^2) \ln \left(\frac{b + \sqrt{p^2 + b^2 + x^2}}{\sqrt{p^2 + x^2}} \right) + \frac{b}{3} \int \frac{(3p^2 x^2 + x^4) dx}{(p^2 + x^2) \sqrt{p^2 + b^2 + x^2}}$$

Nun ist nach Formel Nr. 127 und 35 der Tabelle

$$\begin{aligned}
 (11.) \quad & \int \frac{(x^4 + 3p^2x^2)dx}{(x^3 + p^2)\sqrt{p^2 + b^2 + x^2}} \\
 &= \int \frac{(x^2 + 2p^2)dx}{\sqrt{p^2 + b^2 + x^2}} - 2p^4 \int \frac{dx}{(p^2 + x^2)\sqrt{p^2 + b^2 + x^2}} \\
 &= \frac{x}{2}\sqrt{p^2 + b^2 + x^2} + \frac{3p^2 - b^2}{2} \ln \left(\frac{x + \sqrt{p^2 + b^2 + x^2}}{\sqrt{p^2 + b^2}} \right) \\
 &\quad - 2p^4 \int \frac{dx}{(p^2 + x^2)\sqrt{p^2 + b^2 + x^2}}
 \end{aligned}$$

Setzt man noch

$$(12.) \quad \sqrt{p^2 + b^2} = c \quad \text{und} \quad x = c \cdot \operatorname{tg} t,$$

so wird

$$(13.) \quad dx = \frac{c \cdot dt}{\cos^2 t}, \quad \sqrt{p^2 + b^2 + x^2} = \frac{c}{\cos t}, \quad \frac{x}{\sqrt{p^2 + b^2 + x^2}} = \sin t,$$

also

$$(14.) \quad \int \frac{dx}{(p^2 + x^2)\sqrt{p^2 + b^2 + x^2}} = \int \frac{c \cdot dt \cdot \cos t}{(p^2 \cos^2 t + c^2 \sin^2 t) \cdot c} = \int \frac{\cos t \cdot dt}{p^2 + b^2 \sin^2 t}.$$

Wenn man ferner

$$(15.) \quad b \sin t = pw, \quad \text{also} \quad b \cos t \cdot dt = pdw$$

einführt, so findet man aus Gleichung (14.)

$$\begin{aligned}
 (16.) \quad & \int \frac{dx}{(p^2 + x^2)\sqrt{p^2 + b^2 + x^2}} = \frac{1}{pb} \int \frac{dw}{1 + w^2} = \frac{1}{pb} \operatorname{arctg} \left(\frac{b \sin t}{p} \right) \\
 &= \frac{1}{pb} \operatorname{arctg} \left(\frac{bx}{p\sqrt{p^2 + b^2 + x^2}} \right),
 \end{aligned}$$

folglich geht Gleichung (11.) über in

$$\begin{aligned}
 (17.) \quad & \int \frac{(x^4 + 3p^2x^2)dx}{(p^3 + x^3)\sqrt{p^2 + b^2 + x^2}} \\
 &= \frac{x}{2}\sqrt{p^2 + b^2 + x^2} + \frac{3p^2 - b^2}{2} \ln \left(\frac{x + \sqrt{p^2 + b^2 + x^2}}{\sqrt{p^2 + b^2}} \right) \\
 &\quad - \frac{2p^3}{b} \operatorname{arctg} \left(\frac{bx}{p\sqrt{p^2 + b^2 + x^2}} \right),
 \end{aligned}$$

und Gleichung (10.) ergibt

$$\begin{aligned}
 (18.) \quad & \int (p^2 + x^2) \ln \left(\frac{b + \sqrt{p^2 + b^2 + x^2}}{\sqrt{p^2 + x^2}} \right) dx \\
 &= \frac{x}{3} (3p^2 + x^2) \ln \left(\frac{b + \sqrt{p^2 + b^2 + x^2}}{\sqrt{p^2 + x^2}} \right) + \frac{bx}{6} \sqrt{p^2 + b^2 + x^2} \\
 &+ \frac{(3p^2 - b^2)b}{6} \ln \left(\frac{x + \sqrt{p^2 + b^2 + x^2}}{\sqrt{p^2 + b^2}} \right) - \frac{2}{3} p^3 \operatorname{arctg} \left(\frac{bx}{p\sqrt{p^2 + b^2 + x^2}} \right).
 \end{aligned}$$

Da nun noch nach Formel Nr. 129 der Tabelle

$$\begin{aligned}
 (19.) \quad & \int b dx \sqrt{p^2 + b^2 + x^2} = \frac{bx}{2} \sqrt{p^2 + b^2 + x^2} \\
 &+ \frac{(p^2 + b^2)b}{2} \ln \left(\frac{x + \sqrt{p^2 + b^2 + x^2}}{\sqrt{p^2 + b^2}} \right)
 \end{aligned}$$

ist, so folgt aus Gleichung (6.)

$$\begin{aligned}
 (20.) \quad O &= \frac{1}{2p} \left[\frac{2bx}{3} \sqrt{p^2 + b^2 + x^2} + \frac{(3p^2 + b^2)b}{3} \ln \left(\frac{x + \sqrt{p^2 + b^2 + x^2}}{\sqrt{p^2 + b^2}} \right) \right. \\
 &+ \left. \frac{(3p^2 + x^2)x}{3} \ln \left(\frac{b + \sqrt{p^2 + b^2 + x^2}}{\sqrt{p^2 + x^2}} \right) - \frac{2p^3}{3} \operatorname{arctg} \left(\frac{bx}{p\sqrt{p^2 + b^2 + x^2}} \right) \right]_0^a,
 \end{aligned}$$

also

$$\begin{aligned}
 (21.) \quad O &= \frac{ab}{3p} \sqrt{p^2 + a^2 + b^2} + \frac{(3p^2 + a^2)a}{6p} \ln \left(\frac{b + \sqrt{p^2 + a^2 + b^2}}{\sqrt{p^2 + a^2}} \right) \\
 &+ \frac{(3p^2 + b^2)b}{6p} \ln \left(\frac{a + \sqrt{p^2 + a^2 + b^2}}{\sqrt{p^2 + b^2}} \right) - \frac{p^2}{3} \operatorname{arctg} \left(\frac{ab}{p\sqrt{p^2 + a^2 + b^2}} \right).
 \end{aligned}$$

Da bei dieser Aufgabe die Integrationsgrenzen konstant sind, so hätte man auch die Reihenfolge der Integrationen umkehren können, ohne die Grenzen zu ändern.

Aufgabe 2. Die Gleichung

$$(22.) \quad 2pz = x^2 - y^2$$

stellt wieder ein *gleichseitiges hyperbolisches Paraboloid* dar; man soll den Inhalt der Oberfläche innerhalb des Zylinders

$$(23.) \quad x^2 + y^2 = a^2$$

berechnen.

Auflösung. Aus Gleichung (22.) folgt

$$(24.) \quad \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{x}{p}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{y}{p},$$

$$(25.) \quad \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} = \frac{1}{p} \sqrt{p^2 + x^2 + y^2};$$

deshalb wird

$$(26.) \quad O = \frac{4}{p} \int_0^a dx \int_0^{\sqrt{a^2 - x^2}} dy \sqrt{p^2 + x^2 + y^2}.$$

Durch Einführung von ebenen Polarkoordinaten erhält man nach Formel Nr. 214 der Tabelle

$$(27.) \quad O = \frac{4}{p} \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^a r dr \sqrt{p^2 + r^2}$$

und daraus nach Formel Nr. 130 der Tabelle

$$(28.) \quad \begin{aligned} O &= \frac{4}{3p} \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \left[(p^2 + r^2) \sqrt{p^2 + r^2} \right]_0^a \\ &= \frac{4}{3p} \left[(p^2 + a^2) \sqrt{p^2 + a^2} - p^3 \right] \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \\ &= \frac{2\pi}{3p} [(p^2 + a^2) \sqrt{p^2 + a^2} - p^3]. \end{aligned}$$

Auch hier hätte man die Reihenfolge bei den Integrationen ändern und die Gleichung (27.) auf die Form

$$(29.) \quad \begin{aligned} O &= \frac{4}{p} \int_0^a r dr \sqrt{p^2 + r^2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi = \frac{2\pi}{p} \int_0^a r dr \sqrt{p^2 + r^2} \\ &= \frac{2\pi}{3p} \left[(p^2 + r^2) \sqrt{p^2 + r^2} \right]_0^a = \frac{2\pi}{3p} \left[(p^2 + a^2) \sqrt{p^2 + a^2} - p^3 \right] \end{aligned}$$

bringen können.

Aufgabe 3. Man soll denjenigen Teil der Kugeloberfläche mit der Gleichung

$$(30.) \quad x^2 + y^2 + z^2 - a^2 = 0, \quad \text{oder} \quad z = \pm \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$$

berechnen, der von den beiden Zylindern

(31.) $x^2 + y^2 = ax$ und $x^2 + y^2 = -ax$
herausgebohrt wird*). (Vergl. die Figuren 139 bis 142.)

Auflösung. Aus den Gleichungen (30.) folgt

$$(32.) \quad F_1 = 2x, \quad F_2 = 2y, \quad F_3 = 2z,$$

$$(33.) \quad \frac{1}{F_3} \sqrt{F_1^2 + F_2^2 + F_3^2} = \frac{1}{z} \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \frac{a}{z} = \frac{a}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}}.$$

Da die gesuchte Oberfläche durch die Koordinaten-Ebenen in 8 symmetrische Teile zerlegt wird, so braucht man nur einen solchen Teil zu berechnen und mit 8 zu multiplizieren. Dadurch erhält man nach den Formeln Nr. 216 und 34 der Tabelle

$$(34.) \quad \begin{aligned} O &= 8a \int_0^a dx \int_0^{\sqrt{ax-x^2}} \frac{dy}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} \\ &= 8a \int_0^a dx \left[\arcsin \left(\frac{y}{\sqrt{a^2 - x^2}} \right) \right]_0^{\sqrt{ax-x^2}}, \end{aligned}$$

also

$$(35.) \quad O = 8a \int_0^a dx \cdot \arcsin \sqrt{\frac{x}{a+x}}.$$

Setzt man

$$(36.) \quad u = \arcsin \sqrt{\frac{x}{a+x}}, \quad dv = dx,$$

also

$$(37.) \quad du = \frac{adx}{2(a+x)\sqrt{ax}}, \quad v = x,$$

so findet man durch partielle Integration

$$(38.) \quad \int_0^a dx \cdot \arcsin \sqrt{\frac{x}{a+x}} = \left[x \cdot \arcsin \sqrt{\frac{x}{a+x}} \right]_0^a - \frac{1}{2} \int_0^a \frac{\sqrt{ax} \cdot dx}{a+x},$$

oder, wenn man wieder

*) Diese Aufgabe ist schon von *Viviani* (*Acta Eruditorum* 1692) etwa in folgender Einkleidung gestellt worden: „Ein halbkugelförmiges Tempelgewölbe hat zwei gleiche Fenster von der Beschaffenheit, daß der Rest des Gewölbes eine quadrierbare Oberfläche hat. Welches ist die Gestalt der Fenster?“ (Vergl. *Joh. Bernoulli*, *Opera*, t. III, p. 212.)

(39.) $x = at^2$, also $\sqrt{ax} = at$, $dx = 2at dt$
setzt,

$$\begin{aligned}
 (40.) \quad \int_0^a dx \cdot \arcsin \sqrt{\frac{x}{a+x}} &= \frac{a\pi}{4} - a \int_0^1 \frac{t^2 dt}{1+t^2} \\
 &= \frac{a\pi}{4} - a \int_0^1 \left(1 - \frac{1}{1+t^2}\right) dt \\
 &= \frac{a\pi}{4} - a[t - \arctg t]_0^1 = \frac{a\pi}{4} - a\left(1 - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{a\pi}{2} - a,
 \end{aligned}$$

folglich wird nach Gleichung (35.)

$$(41.) \quad O = 8a \int_0^a dx \cdot \arcsin \sqrt{\frac{x}{a+x}} = 4a^2\pi - 8a^2.$$

Da die ganze Kugel die Oberfläche

$$(42.) \quad K = 4a^2\pi$$

hat, so bleibt für den außerhalb der beiden Zylinder liegenden Teil der Kugeloberfläche

$$(43.) \quad O_1 = 8a^2.$$

übrig.

Die Lösung der Aufgabe wird bedeutend einfacher, wenn man ebene Polarkoordinaten einführt; dadurch geht nach Formel Nr. 214 der Tabelle Gleichung (34.) über in

$$\begin{aligned}
 (44.) \quad O &= 8a \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{a \cos \varphi} \frac{r dr}{\sqrt{a^2 - r^2}} = 8a \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \left[-\sqrt{a^2 - r^2} \right]_0^{a \cos \varphi} \\
 &= 8a \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi [a - a \sin \varphi] = 8a^2 [\varphi + \cos \varphi]_0^{\frac{\pi}{2}},
 \end{aligned}$$

folglich erhält man wieder

$$(45.) \quad O = 4a^2\pi - 8a^2.$$

Aufgabe 4. Man soll die Oberfläche der beiden Kreiszylinder

$$(46.) \quad x^2 + y^2 - ax = 0 \quad \text{und} \quad x^2 + y^2 + ax = 0$$

berechnen, soweit dieselbe innerhalb der Kugel

$$(47.) \quad x^2 + y^2 + z^2 - a^2 = 0$$

liegt. (Vergl. die Figuren 139 bis 142.)

Auflösung. Die gesuchte Oberfläche wird durch die Koordinaten-Ebenen in 8 symmetrische Teile zerlegt; man braucht daher wieder nur einen dieser Teile zu berechnen und das gefundene Resultat mit 8 zu multiplizieren. Die Gleichung der Fläche ist

$$(46a.) \quad F(x, y, z) = x^2 + y^2 - ax = 0$$

und enthält die Veränderliche z gar nicht. Damit die gegebene Methode anwendbar wird, muß man die Koordinaten in Formel Nr. 216 der Tabelle miteinander vertauschen. Indem man z. B. y als Funktion von x und z ansieht, geht diese Formel für die Berechnung der krummen Oberfläche über in

$$(48.) \quad O = 8 \int_a^b dx \int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} \frac{dz}{F_2} \sqrt{F_1^2 + F_2^2 + F_3^2}.$$

Aus Gleichung (46a.) findet man

$$(49.) \quad F_1 = 2x - a, \quad F_2 = 2y, \quad F_3 = 0,$$

$$(50.) \quad F_1^2 + F_2^2 + F_3^2 = 4x^2 - 4ax + a^2 + 4y^2,$$

oder mit Rücksicht auf Gleichung (46a.)

$$(51.) \quad F_1^2 + F_2^2 + F_3^2 = a^2, \quad \sqrt{F_1^2 + F_2^2 + F_3^2} = a,$$

folglich wird

$$(52.) \quad O = 8a \int_0^a dx \int_0^{z_1} \frac{dz}{2y} = 4a \int_0^a \frac{dx}{\sqrt{ax - x^2}} \int_0^{z_1} dz.$$

Da z_1 , der Grenzwert von z , zu einem Punkte gehört, welcher auf der Kugel und auf dem Kreiszylinder liegt, so wird

$$z_1 = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2},$$

wobei aber noch nach Gleichung (46a.)

$$x^2 + y^2 = ax$$

ist, folglich erhält man

$$(53.) \quad z_1 = \sqrt{a^2 - ax}.$$

Dies gibt

$$(54.) \quad O = 4a \int_0^a dx \sqrt{\frac{a^2 - ax}{ax - x^2}} = 4a \sqrt{a} \int_0^a \frac{dx}{\sqrt{x}} = 8a \sqrt{a} [\sqrt{x}]_0^a,$$

also

$$(55.) \quad O = 8a^{\frac{3}{2}}.$$

Die Fläche der beiden Kreiszylinder, soweit sie von der Kugel eingeschlossen wird, ist also gerade so groß wie derjenige Teil der Kugeloberfläche, welcher außerhalb der beiden Zylinder liegt.

Aufgabe 5. Aus der Schraubenfläche

$$(56.) \quad F(x, y, z) = y - x \operatorname{tg}\left(\frac{z}{c}\right) = 0, \quad \text{oder} \quad \operatorname{tg}\left(\frac{z}{c}\right) = \frac{y}{x}$$

schneiden die beiden koaxialen Kreiszylinder

$$(57.) \quad x^2 + y^2 = a^2, \quad x^2 + y^2 = b^2$$

und die beiden Ebenen

$$(58.) \quad z = -\frac{c\pi}{2}, \quad z = +\frac{c\pi}{2}$$

einen Teil der Oberfläche heraus; man soll den Flächeninhalt dieses Teiles berechnen.

Auflösung. Aus Gleichung (56.) folgt

$$(59.) \quad F_1 = -\operatorname{tg}\left(\frac{z}{c}\right) = -\frac{y}{x}, \quad F_2 = 1, \quad F_3 = -\frac{x}{c} \left[1 + \operatorname{tg}^2\left(\frac{z}{c}\right)\right] \\ = -\frac{x^2 + y^2}{cx},$$

$$(60.) \quad F_1^2 + F_2^2 + F_3^2 = \frac{c^2(x^2 + y^2) + (x^2 + y^2)^2}{c^2 x^2} = \frac{x^2 + y^2}{c^2 x^2} (c^2 + x^2 + y^2),$$

$$(61.) \quad \frac{1}{F_3} \sqrt{F_1^2 + F_2^2 + F_3^2} = \pm \sqrt{\frac{c^2 + x^2 + y^2}{x^2 + y^2}},$$

also, da hier nur das obere Zeichen in Betracht kommt,

$$(62.) \quad O = \int dx \int dy \sqrt{\frac{c^2 + x^2 + y^2}{x^2 + y^2}}.$$

Die Bestimmung der Integrationsgrenzen ist unterblieben, weil durch die Gleichungen

$$(63.) \quad x = r \cos \varphi, \quad y = r \sin \varphi$$

neue Integrations-Veränderliche eingeführt werden sollen. Dadurch erhält man nach Formel Nr. 214 der Tabelle

$$(64.) \quad O = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{+\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_a^b r dr \sqrt{\frac{c^2 + r^2}{r^2}} = \int_a^b dr \sqrt{c^2 + r^2} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{+\frac{\pi}{2}} d\varphi = \pi \int_a^b dr \sqrt{c^2 + r^2}.$$

Die Grenzen $\varphi = -\frac{\pi}{2}$ und $\varphi = +\frac{\pi}{2}$ bestimmen sich daraus, daß nach Gleichung (56.)

$$(65.) \quad z = c\varphi$$

wird. Nach Formel Nr. 129 der Tabelle erhält man daher

$$(66.) \quad O = \pi \int_a^b dr \sqrt{c^2 + r^2} = \frac{\pi}{2} \left[r \sqrt{c^2 + r^2} + c^2 \ln \left(\frac{r + \sqrt{c^2 + r^2}}{c} \right) \right]_a^b \\ = \frac{\pi}{2} \left[b \sqrt{b^2 + c^2} - a \sqrt{a^2 + c^2} + c^2 \ln \left(\frac{b + \sqrt{b^2 + c^2}}{a + \sqrt{a^2 + c^2}} \right) \right].$$

§ 82.

Einführung zweier variablen Parameter.

(Vergl. die Formel-Tabelle Nr. 217.)

Ist die Gleichung einer Fläche in der Form

$$(1.) \quad z = f(x, y)$$

gegeben, so kann man, wie es auch bereits in § 78 bei der Einführung von neuen Integrations-Veränderlichen geschehen war, x und y als Funktionen von zwei neuen, voneinander unabhängigen Veränderlichen u und v darstellen, indem man

$$(2.) \quad x = f_1(u, v), \quad y = f_2(u, v)$$

setzt, wo $f_1(u, v)$ und $f_2(u, v)$ für den jedesmaligen Zweck passend gewählte Funktionen sind. Trägt man diese Werte von x und y in die Gleichung (1.) ein, so erhält man

$$(3.) \quad z = f[f_1(u, v), f_2(u, v)] = f_3(u, v).$$

Man kann also eine Fläche durch die drei Gleichungen

$$(4.) \quad x = f_1(u, v), \quad y = f_2(u, v), \quad z = f_3(u, v)$$

darstellen; und umgekehrt: Sind die drei Gleichungen (4.) beliebig gegeben, so stellen sie im allgemeinen*) eine Fläche dar, deren Gleichung man durch Elimination von u und v aus den Gleichungen (4.) erhält.

Aus den Gleichungen (1.) und (2.) folgt sodann

$$(5.) \quad \begin{cases} \frac{\partial z}{\partial u} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u}, \\ \frac{\partial z}{\partial v} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial v}, \end{cases}$$

also

$$(6.) \quad \left(\frac{\partial x}{\partial u} \frac{\partial y}{\partial v} - \frac{\partial x}{\partial v} \frac{\partial y}{\partial u} \right) \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\partial y}{\partial v} - \frac{\partial z}{\partial v} \frac{\partial y}{\partial u},$$

$$(7.) \quad \left(\frac{\partial x}{\partial u} \frac{\partial y}{\partial v} - \frac{\partial x}{\partial v} \frac{\partial y}{\partial u} \right) \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial x}{\partial u} \frac{\partial z}{\partial v} - \frac{\partial x}{\partial v} \frac{\partial z}{\partial u}.$$

Setzt man also

$$(8.) \quad \begin{cases} \frac{\partial y}{\partial u} \frac{\partial z}{\partial v} - \frac{\partial y}{\partial v} \frac{\partial z}{\partial u} = A, & \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\partial x}{\partial v} - \frac{\partial z}{\partial v} \frac{\partial x}{\partial u} = B, \\ \frac{\partial x}{\partial u} \frac{\partial y}{\partial v} - \frac{\partial x}{\partial v} \frac{\partial y}{\partial u} = C, \end{cases}$$

so wird

$$(9.) \quad \frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{A}{C}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{B}{C},$$

$$(10.) \quad \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} = \pm \frac{1}{C} \sqrt{A^2 + B^2 + C^2}.$$

Deshalb erhält man nach Formel Nr. 213 der Tabelle, da die Funktional-Determinante gleich $\pm C$ ist,

$$(11.) \quad 0 = \iint dx dy \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} = \pm \iint du dv \sqrt{A^2 + B^2 + C^2},$$

wobei nur das obere Vorzeichen einen Sinn hat.

*) Eine Ausnahme findet nur statt, wenn die drei Funktional-determinanten A , B , C , welche durch die Gleichungen (8.) erklärt werden, gleichzeitig verschwinden, wie in der Flächentheorie gezeigt wird. Hier werde daher die Voraussetzung gemacht, daß wenigstens eine von diesen drei Größen nicht verschwindet.

Wie diese Formel verwendet werden kann, möge das folgende Beispiel zeigen.

Aufgabe. Durch die Gleichungen

(12.) $x = u^3 - 3uv^2 - 3u$, $y = 3u^2 - 3v^2$, $z = v^3 - 3u^2v - 3v$ wird eine Fläche dargestellt, welche die „*Ennepersche Minimalfläche*“ genannt wird, und auf welcher man für konstante Werte von u und v zwei Scharen von ebenen Kurven dritten Grades erhält, die einander rechtwinklig schneiden*). Man soll auf der Fläche den Inhalt eines Vierecks berechnen, welches durch die Kurven

(13.) $u = a$, $u = b$, $v = c$, $v = d$

begrenzt wird.

Auflösung. Aus den Gleichungen (12.) folgt

$$(14.) \quad \begin{cases} \frac{\partial x}{\partial u} = 3(u^2 - v^2 - 1), & \frac{\partial y}{\partial u} = 6u, & \frac{\partial z}{\partial u} = -6uv, \\ \frac{\partial x}{\partial v} = -6uv, & \frac{\partial y}{\partial v} = -6v, & \frac{\partial z}{\partial v} = 3(v^2 - u^2 - 1), \end{cases}$$

deshalb wird

$$(15.) \quad \begin{cases} A = -18u(u^2 + v^2 + 1), \\ B = 9(u^2 + v^2 + 1)(u^2 + v^2 - 1), \\ C = 18v(u^2 + v^2 + 1), \end{cases}$$

$$(16.) \quad A^2 + B^2 + C^2 = 81(u^2 + v^2 + 1)^4.$$

Dies gibt nach Gleichung (11.)

$$(17.) \quad \begin{aligned} O &= 9 \int_a^b \int_c^d (u^2 + v^2 + 1)^2 dv \\ &= 9 \int_a^b \int_c^d (u^4 + 2u^2v^2 + v^4 + 2u^2 + 2v^2 + 1) dv \\ &= 9 \int_a^b [(u^4 + 2u^2 + 1)(d - c) + \frac{2}{3}(u^2 + 1)(d^3 - c^3) + \frac{1}{5}(d^5 - c^5)], \end{aligned}$$

also

$$(18.) \quad \begin{aligned} O &= 9 \left[\frac{1}{5}(b^5 - a^5)(d - c) + \frac{1}{3}(d^5 - c^5)(b - a) + \frac{2}{3}(b^3 - a^3)(d^3 - c^3) \right. \\ &\quad \left. + \frac{2}{3}(b^3 - a^3)(d - c) + \frac{2}{3}(d^3 - c^3)(b - a) + (b - a)(d - c) \right]. \end{aligned}$$

*) Diese Linien sind die *Krümmungslinien* der *Enneperschen Minimalfläche*. Davon soll aber bei dieser Aufgabe kein Gebrauch gemacht werden, weil in diesem Lehrbuche wegen der Beschränkung des Stoffes eine Erklärung der Krümmungslinien nicht gegeben werden konnte.

§ 83.


Einführung räumlicher Polarkoordinaten.

(Vergl. die Formel-Tabelle Nr. 218.)

Führt man räumliche Polarkoordinaten ein, indem man

$$(1.) \quad x = r \cos \lambda \cos \varphi, \quad y = r \cos \lambda \sin \varphi, \quad z = r \sin \lambda$$

Fig. 152.



setzt, so ist (Fig. 152) OP gleich r der *Radius vektor*, λ der Neigungswinkel QOP von OP gegen die XY -Ebene, und φ der Winkel XOQ , welchen die Projektion OQ des Radius vectors OP auf die XY -Ebene mit der positiven Richtung der X -Achse bildet. Wenn man bei der Darstellung

einer Fläche λ und φ als die beiden unabhängigen Veränderlichen betrachtet, so wird r eine Funktion von λ und φ , also

$$r = F(\lambda, \varphi).$$

Setzt man diesen Wert in die Gleichungen (1.) ein, so erhält man durch Differentiation

$$(2.) \quad \left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial x}{\partial \lambda} = \frac{\partial r}{\partial \lambda} \cos \lambda \cos \varphi - r \sin \lambda \cos \varphi, \\ \frac{\partial y}{\partial \lambda} = \frac{\partial r}{\partial \lambda} \cos \lambda \sin \varphi - r \sin \lambda \sin \varphi, \\ \frac{\partial z}{\partial \lambda} = \frac{\partial r}{\partial \lambda} \sin \lambda + r \cos \lambda, \\ \frac{\partial x}{\partial \varphi} = \frac{\partial r}{\partial \varphi} \cos \lambda \cos \varphi - r \cos \lambda \sin \varphi, \\ \frac{\partial y}{\partial \varphi} = \frac{\partial r}{\partial \varphi} \cos \lambda \sin \varphi + r \cos \lambda \cos \varphi, \\ \frac{\partial z}{\partial \varphi} = \frac{\partial r}{\partial \varphi} \sin \lambda; \end{array} \right.$$

folglich wird, wenn man u mit λ und v mit φ vertauscht,

$$(3.) \quad \begin{cases} A = -r \frac{\partial r}{\partial \lambda} \sin \lambda \cos \lambda \cos \varphi - r \frac{\partial r}{\partial \varphi} \sin \varphi - r^2 \cos^2 \lambda \cos \varphi, \\ B = -r \frac{\partial r}{\partial \lambda} \sin \lambda \cos \lambda \sin \varphi + r \frac{\partial r}{\partial \varphi} \cos \varphi - r^2 \cos^2 \lambda \sin \varphi, \\ C = +r \frac{\partial r}{\partial \lambda} \cos^2 \lambda - r^2 \sin \lambda \cos \lambda. \end{cases}$$

$$(4.) \quad \begin{aligned} A^2 + B^2 + C^2 &= r^2 \left(\frac{\partial r}{\partial \lambda} \right)^2 \cos^2 \lambda + r^2 \left(\frac{\partial r}{\partial \varphi} \right)^2 + r^2 \cos^2 \lambda \\ &= r^2 \left[r^2 + \left(\frac{\partial r}{\partial \lambda} \right)^2 \right] \cos^2 \lambda + r^2 \left(\frac{\partial r}{\partial \varphi} \right)^2, \end{aligned}$$

also, da auch hier nur das positive Zeichen bei der Wurzel-
ausziehung in Betracht kommt,

$$(5.) \quad \begin{aligned} O &= \iint \sqrt{A^2 + B^2 + C^2} du dv \\ &= \iint r \sqrt{\left[r^2 + \left(\frac{\partial r}{\partial \lambda} \right)^2 \right] \cos^2 \lambda + \left(\frac{\partial r}{\partial \varphi} \right)^2} d\lambda d\varphi. \end{aligned}$$

Konstanten Werten von φ entsprechen Ebenen durch die Z -Achse, und konstanten Werten von λ Kegelflächen, welche die Z -Achse zur Rotations-Achse haben. Durch diese Ebenen und Kegel wird die Fläche in zweifach unendlich viele, unendlich kleine Vierecke zerlegt. Indem man in bezug auf φ integriert, erhält man die Summe von diesen Vierecken auf einem ringförmigen, unendlich schmalen Streifen zwischen zwei benachbarten Kegelflächen. Alle diese unendlich schmalen Streifen werden sodann durch Integration in bezug auf λ summiert. Daraus ergibt sich für jeden einzelnen Fall die Bestimmung der Grenzen.

Wie dies geschieht, möge die folgende Aufgabe zeigen.

Aufgabe. Die gegebene Fläche habe die Gleichung

$$(6.) \quad (x^2 + y^2 + z^2)^2 = a^2(x^2 - y^2),$$

oder bei Einführung räumlicher Polarkoordinaten durch die Gleichungen (1.)

$$(7.) \quad r^2 = a^2 \cos^2 \lambda \cos(2\varphi);$$

man soll die gesamte Oberfläche berechnen.

Auflösung. Um sich eine Vorstellung von der Fläche zu machen, beachte man, daß $r \leq a$ sein muß, daß die Fläche also ganz innerhalb einer Kugel mit dem Halbmesser a liegt. Die XY -Ebene, in der λ gleich 0 ist, schneidet die Fläche in einer *Lemniskate* mit der Gleichung

$$(8.) \quad (x^2 + y^2)^2 = a^2(x^2 - y^2), \quad \text{oder} \quad r^2 = a^2 \cos(2\varphi).$$

Gibt man φ einen konstanten Wert und setzt

$$(9.) \quad a\sqrt{\cos(2\varphi)} = a_1,$$

so erhält man den Durchschnitt der Fläche mit einer Ebene, welche durch die Z -Achse hindurchgeht. Die Schnittkurve zerfällt in zwei Kreise mit den Gleichungen

$$(10.) \quad r = +a_1 \cos \lambda \quad \text{und} \quad r = -a_1 \cos \lambda,$$

oder

$$(10a.) \quad x^2 + y^2 = +a_1 x \quad \text{und} \quad x^2 + y^2 = -a_1 x.$$

Fig. 153.



Die Fläche entsteht also aus der Lemniskate in der XY -Ebene (Fig. 153), indem man sämtliche Radii vektorens OP zu Durchmessern von Kreisen macht, deren Ebenen auf der XY -Ebene senkrecht stehen.

Da die Koordinaten-Ebenen die Fläche in 8 symmetrische Teile zerlegen, so braucht man nur die Oberfläche eines solchen Teiles zu berechnen und das gefundene Resultat mit 8 zu multiplizieren. Die Grenzen von φ sind dabei 0 und $\frac{\pi}{4}$, die von λ sind 0 und $\frac{\pi}{2}$.

Aus Gleichung (7.) folgt dann

$$(11.) \quad r \frac{\partial r}{\partial \lambda} = -a^2 \cos \lambda \sin \lambda \cos(2\varphi),$$

$$(12.) \quad r \frac{\partial r}{\partial \varphi} = -a^2 \cos^2 \lambda \sin(2\varphi);$$

deshalb wird

$$(13.) \quad r^2 \left(\frac{\partial r}{\partial \lambda} \right)^2 = a^4 \cos^2 \lambda \sin^2 \lambda \cos^2(2\varphi) = a^2 r^2 \sin^2 \lambda \cos(2\varphi),$$

$$(14.) \quad r^2 \left(\frac{\partial r}{\partial \varphi} \right)^2 = a^4 \cos^4 \lambda \sin^2(2\varphi) = a^2 r^2 \cos^2 \lambda \cdot \frac{\sin^2(2\varphi)}{\cos(2\varphi)},$$

$$(15.) \quad \left[r^2 + \left(\frac{\partial r}{\partial \lambda} \right)^2 \right] \cos^2 \lambda + \left(\frac{\partial r}{\partial \varphi} \right)^2 = a^2 \cos(2\varphi) \cos^2 \lambda \\ + a^2 \cos^2 \lambda \frac{\sin^2(2\varphi)}{\cos(2\varphi)} \\ = \frac{a^2 \cos^2 \lambda}{\cos(2\varphi)} = \frac{r^2}{\cos^2(2\varphi)}.$$

Dies gibt nach Gleichung (5.)

$$(16.) \quad 0 = 8 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\lambda \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{r^2 d\varphi}{\cos(2\varphi)} = 8a^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \lambda d\lambda \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \\ = 2a^2 \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \lambda d\lambda = a^2 \pi \left[\sin \lambda \cos \lambda + \lambda \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{a^2 \pi^2}{2}.$$

XIV. Abschnitt.

Berechnung der Masse, der statischen Momente, der Trägheits-Momente und der Schwerpunkts-Koordinaten.

§ 84.

Erklärung und Berechnung der Masse.

(Vergl. die Formel-Tabelle Nr. 219 bis 225.)

Die drei fundamentalen Größen für das sogenannte „wissenschaftliche“ Maßsystem, das in der Physik allgemein benutzt wird, sind

- 1.) die *Länge*,
- 2.) die *Zeit* und
- 3.) die *Masse*.

Als *Massen-Einheit* möge hier die Masse eines Kubikdezimeters Wasser (bei 4° Celsius) betrachtet werden*). Der

*) In der technischen Mechanik wird als dritte Fundamentalgröße nicht die *Masse*, sondern die *Kraft* zugrunde gelegt. Die Einheit der Kraft ist auch hier das Kilogramm, d. h. die Kraft, die von einem Kubikdezimeter Wasser infolge der Erdbeschleunigung g (Schwere) ausgeübt wird. Dabei hat die Konstante g unter 45° geographischer Breite den Wert 9,806 Meter. Die Masse ist dann eine *abgeleitete* Größe; ihre Einheit ist die Masse, die von der Einheit der Kraft, d. h. von einem Kilogramm, die Beschleunigung von einem Meter in der Sekunde erhält. Danach hat bei dieser Festsetzung das Kubikdezimeter Wasser die Masse $\frac{1}{g}$.

Die hier folgenden Ausführungen behalten auch für diese Erklärung ihre Geltung, wenn man bei den Angaben über die Masse den Faktor $\frac{1}{g}$ hinzufügt.

Vergleich der Massen geschieht mit Hilfe der Wage, d. h. man vergleicht die *Gewichte*, also die *Kräfte* miteinander, die von den Massen infolge der Erdbeschleunigung g (Schwere) ausgeübt werden können. Diese Kräfte sind den Massen proportional, da an einem festen Orte der Erdoberfläche die Beschleunigung durch die Schwere für alle Körper den gleichen Wert hat. Man braucht daher praktisch zwischen *Masse* und *Gewicht* nicht so streng zu unterscheiden; d. h. die Doppeldeutigkeit der Bezeichnung „*Kilogramm*“ als *Massen*-Einheit und als *Gewichts*-Einheit ist ohne Nachteil.

Hat ein Körper, in Kubikmetern ausgedrückt, das Volumen V , und in Kilogrammen ausgedrückt, die Masse M , so nennt man

$$(1.) \quad \gamma = \frac{M}{V}$$

die „*mittlere Dichte*“ (oder „*Dichtigkeit*“) des Körpers. Behält dieses Verhältnis auch für jeden beliebigen Teil des Körpers denselben Wert γ , so nennt man den Körper „*homogen*“ und sagt, der Körper hat die *Dichte*

$$\gamma = \frac{M}{V}.$$

Ist der Körper *nicht* homogen, so grenzt man um jeden seiner Punkte P ein kleines Volumenstück ΔV ab und bestimmt seine Masse ΔM . Das Verhältnis $\frac{\Delta M}{\Delta V}$ wird sich einem bestimmten Grenzwerte γ nähern, wenn alle Dimensionen von ΔV verschwindend klein werden. Diesen Grenzwert nennt man die „*Dichte des Körpers im Punkte P*“. Da man in dieser Weise jedem Punkte P des Körpers eine Dichte zuordnen kann, so wird unter Zugrundelegung eines rechtwinkligen Koordinatensystems die Dichte γ eine Funktion $\varphi(x, y, z)$ der Koordinaten des Punktes P sein. Das Volumen-Element

$$(2.) \quad dV = dx dy dz,$$

das als ein unendlich kleines rechtwinkliges Parallelepipedon betrachtet werden kann, hat dann die Masse

$$(3.) \quad dM = \varphi(x, y, z) dx dy dz.$$

Daraus erhält man die Masse des ganzen Körpers ausgedrückt durch das dreifache Integral

$$(4.) \quad M = \int_{x_1}^{x_2} \int_{y_1}^{y_2} \int_{z_1}^{z_2} \varphi(x, y, z) dz,$$

wobei die Integrationsgrenzen

$$(5.) \quad z_1 = g_1(x, y), \quad z_2 = g_2(x, y), \quad y_1 = f_1(x), \quad y_2 = f_2(x)$$

durch die Gleichungen der den Körper begrenzenden Flächen gegeben sind.

Ist die den Körper einschließende Fläche durch Rotation einer Kurve mit der Gleichung

$$y = f(x)$$

um die X -Achse entstanden, und ist die Dichtigkeit γ eine Funktion $\varphi(x)$ der einzigen Veränderlichen x , so daß die einzelnen Schichten des Rotationskörpers homogen sind, so hat das Volumen-Element

$$dV = y^2 \pi dx$$

die Masse

$$(6.) \quad dM = \varphi(x) \cdot y^2 \pi dx,$$

und der ganze Körper hat die Masse

$$(7.) \quad M = \pi \int_{x_1}^{x_2} \varphi(x) y^2 dx.$$

Schrumpft der Körper so zusammen, daß eine seiner Dimensionen im Verhältnis zu den beiden anderen sehr klein wird, so kann man annehmen, daß alle seine Punkte in der nächsten Umgebung einer (ebenen oder) gekrümmten Fläche mit der Gleichung

$$(8.) \quad F(x, y, z) = 0, \quad \text{oder} \quad z = f(x, y)$$

liegen, so daß die Abstände aller Punkte von der Fläche kleiner sind als die beliebig kleine Größe ε . Wenn sich jetzt ε dem Grenzwerte Null nähert, so verliert der Körper, streng genommen, seine Masse, bzw. sein Gewicht. Für die Anwendungen in der Physik und Technik ist dabei aber die folgende Auffassung häufig von großem Nutzen.

Die Dichte sei bei diesem dünnen Körper in allen Punkten, die auf einer und derselben Parallelen zur Z -Achse

liegen, die gleiche, so daß γ eine Funktion von x und y allein wird. Läßt man jetzt wieder ε sich der Grenze Null nähern, aber γ gleichzeitig in dem Maße wachsen, daß sich

$$2\gamma\varepsilon$$

einem endlichen Grenzwerte nähert, so sagt man, *die Fläche sei mit Masse belegt*, d. h. man stellt sich die Fläche als schwer vor. Der Grenzwert, dem sich das Produkt $2\gamma\varepsilon$ nähert, heißt dann die „*Flächendichte*“ $\varphi(x, y)$ im Flächenpunkte P .

Das Oberflächen-Element

$$(9.) \quad dO = dxdy \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} = \frac{dxdy}{F_3} \sqrt{F_1^2 + F_2^2 + F_3^2}$$

hat dann die Masse $\varphi(x, y)dO$, so daß man für die Masse des in Frage kommenden Flächenstücks

$$(10.) \quad M = \int_{x_1}^{x_2} \int_{y_1}^{y_2} \varphi(x, y) dy \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} \\ = \int_{x_1}^{x_2} \int_{y_1}^{y_2} \frac{\varphi(x, y) dy}{F_3} \sqrt{F_1^2 + F_2^2 + F_3^2}$$

erhält, wo wieder die Integrationsgrenzen $y_1 = f_1(x)$, $y_2 = f_2(x)$ die Gleichungen der Zylinder sind, welche den Rand des Flächenstückes auf die XY -Ebene projizieren.

Ist die Fläche durch Rotation einer Kurve mit der Gleichung

$$y = f(x)$$

um die X -Achse entstanden, und ist die Dichtigkeit γ eine Funktion $\varphi(x)$ der einzigen Veränderlichen x , so hat das Oberflächen-Element

$$(11.) \quad dO = 2y\pi ds$$

die Masse $\varphi(x)dO$, so daß man für die Masse der ganzen Oberfläche

$$(12.) \quad M = 2\pi \int_{x_1}^{x_2} \varphi(x) y ds$$

erhält

Insbesondere kann die mit Masse belegte Oberfläche in eine *ebene* Figur übergehen, welche oben und unten von Kurven mit den Gleichungen

$$(13.) \quad y_2 = f_2(x), \quad y_1 = f_1(x)$$

begrenzt ist. Dann wird die Masse der ebenen Figur

$$(14.) \quad M = \int_{x_1}^{x_2} \int_{y_1}^{y_2} \varphi(x, y) dy,$$

wo wieder $\varphi(x, y)$ die Dichtigkeit im Punkte P ist.

Schrumpft die ebene Figur zu einer mit Masse belegten Kurve mit der Gleichung

$$y = f(x)$$

zusammen, wobei man die „*Kurvendichte*“ in ähnlicher Weise wie vorher die *Flächendichte* erklären kann, so findet man in entsprechender Weise für die Masse des Kurvenbogens

$$(15.) \quad M = \int_{x_1}^{x_2} \varphi(x) ds = \int_{x_1}^{x_2} \varphi(x) \sqrt{dx^2 + dy^2}.$$

Ebenso erhält man für die Masse des Bogens bei einer Raumkurve

$$(16.) \quad M = \int_{x_1}^{x_2} \varphi(x) ds = \int_{x_1}^{x_2} \varphi(x) \sqrt{dx^2 + dy^2 + dz^2}.$$

§ 85.

Erklärung und Berechnung der statischen Momente.

(Vergl. die Formel-Tabelle Nr. 226 bis 230.)

Unter dem „*statischen Moment*“ dM eines *Massenelementes*, oder wie man gewöhnlich sagt, eines *Massenpunktes* P in bezug auf eine Ebene ϵ versteht man das Produkt $p dM$ aus seiner Masse dM und dem Abstände p von der Ebene ϵ . Die Gleichung der Ebene kann man auf die Form

$$(1.) \quad x \cos \alpha + y \cos \beta + z \cos \gamma - p_0 = 0$$

bringen, welche unter dem Namen „*Hessesche Normalform*“ bekannt ist. Dabei sind

$$(2.) \quad \alpha = (YZ, \epsilon), \quad \beta = (ZX, \epsilon), \quad \gamma = (XY, \epsilon)$$

die Winkel, welche die Ebene ε mit den drei Koordinaten-Ebenen bildet, und p_0 ist der Abstand des Nullpunktes von der Ebene. Dann hat der Punkt P mit den Koordinaten x, y, z von der Ebene ε den Abstand

$$(3.) \quad p = \pm (x \cos \alpha + y \cos \beta + z \cos \gamma - p_0),$$

wobei das Vorzeichen so zu wählen ist, daß p positiv wird. Hier möge aber immer

$$(3a.) \quad p = x \cos \alpha + y \cos \beta + z \cos \gamma - p_0$$

gesetzt werden, so daß p positive und negative Werte haben kann. Daraus ergibt sich für das statische Moment des Massenpunktes P mit der Masse dM der Wert

$$(4.) \quad d\mathfrak{M} = (x \cos \alpha + y \cos \beta + z \cos \gamma - p_0) dM,$$

wobei wieder

$$dM = \varphi(x, y, z) dx dy dz$$

zu setzen ist. Man sagt dann, das statische Moment habe einen *positiven* oder *negativen* Drehungssinn, je nachdem p einen positiven oder negativen Wert hat. Das statische Moment des ganzen Körpers ist daher unter Beibehaltung der früheren Bezeichnungen

$$(5.) \quad \mathfrak{M} = \int_{x_1}^{x_2} \int_{y_1}^{y_2} \int_{z_1}^{z_2} (x \cos \alpha + y \cos \beta + z \cos \gamma - p_0) \varphi(x, y, z) dz.$$

Bei einer Oberfläche mit der Gleichung

$$(6.) \quad z = f(x, y), \quad \text{oder} \quad F(x, y, z) = 0$$

wird dementsprechend das statische Moment

$$(7.) \quad \mathfrak{M} =$$

$$\int_{x_1}^{x_2} \int_{y_1}^{y_2} (x \cos \alpha + y \cos \beta + z \cos \gamma - p_0) \varphi(x, y) dy \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2};$$

und bei einer Raumkurve mit den Gleichungen

$$(8.) \quad y = f(x), \quad z = g(x)$$

wird das statische Moment

$$(9.) \quad \mathfrak{M} = \int_{x_1}^{x_2} (x \cos \alpha + y \cos \beta + z \cos \gamma - p_0) \varphi(x) \sqrt{dx^2 + dy^2 + dz^2}.$$

Ist die Dichte konstant, so kann man in den vorstehenden Formeln die Faktoren $\varphi(x, y, z)$, $\varphi(x, y)$, $\varphi(x)$,

weil sie einen konstanten Wert haben, vor das Integralzeichen setzen. Man nennt dann die Ausdrücke

$$(5a.) \quad \mathfrak{M} = \int_{x_1}^{x_2} \int_{y_1}^{y_2} \int_{z_1}^{z_2} (x \cos \alpha + y \cos \beta + z \cos \gamma - p_0) dz,$$

$$(7a.) \quad \mathfrak{M} =$$

$$\int_{x_1}^{x_2} \int_{y_1}^{y_2} (x \cos \alpha + y \cos \beta + z \cos \gamma - p_0) dy \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}$$

und

$$(9a.) \quad \mathfrak{M} = \int_{x_1}^{x_2} (x \cos \alpha + y \cos \beta + z \cos \gamma - p_0) \sqrt{dx^2 + dy^2 + dz^2},$$

bei denen die konstante Dichte gleich 1 gesetzt ist, die „statischen Momente der *rein geometrischen* Gebilde“.

An die Stelle der Ebene ε kann auch eine Gerade (Achse) g oder ein Punkt A treten. Dann muß man in den Formeln den Abstand p von dieser Geraden, bezw. von diesem Punkte A an Stelle des Abstandes von der Ebene ε

$$x \cos \alpha + y \cos \beta + z \cos \gamma - p_0$$

setzen. Solche statische Momente wird man namentlich dann zu betrachten haben, wenn es sich um eine beliebig begrenzte Figur oder um eine Kurve in einer *Ebene* handelt.

Man versteht dann unter dem statischen Moment eines Massenpunktes P mit der Masse

$$(10.) \quad dM = \varphi dx dy$$

in bezug auf eine Gerade g mit der Gleichung

$$(11.) \quad x \cos \alpha + y \sin \alpha - p_0 = 0$$

das Produkt

$$(12.) \quad d\mathfrak{M} = p \cdot dM = (x \cos \alpha + y \sin \alpha - p_0) \varphi dx dy$$

aus der Masse dM und dem Abstände

$$(13.) \quad p = x \cos \alpha + y \sin \alpha - p_0$$

des Punktes P von der Geraden g . Dabei kann auch hier p positive und negative Werte haben. Das statische Moment der ganzen Figur, deren Begrenzung in § 84 beschrieben ist, wird daher

$$(14.) \quad \mathfrak{M} = \int_{x_1}^{x_2} \int_{y_1}^{y_2} (x \cos \alpha + y \sin \alpha - p_0) \varphi dy.$$

In ähnlicher Weise findet man für das statische Moment eines Kurvenbogens in bezug auf die Gerade g

$$(15.) \quad \mathfrak{M} = \int_{x_1}^{x_2} (x \cos \alpha + y \sin \alpha - p_0) \varphi \sqrt{dx^2 + dy^2}.$$

Hat die Dichtigkeit den konstanten Wert 1, so gehen die Gleichungen (14.) und (15.) über in

$$(14a.) \quad \mathfrak{M} = \int_{x_1}^{x_2} dx \int_{y_1}^{y_2} (x \cos \alpha + y \sin \alpha - p_0) dy,$$

$$(15a.) \quad \mathfrak{M} = \int_{x_1}^{x_2} (x \cos \alpha + y \sin \alpha - p_0) \sqrt{dx^2 + dy^2}.$$

§ 86.

Erklärung und Berechnung der Trägheits-Momente.

(Vergl. die Formel-Tabelle Nr. 231 bis 233.)

Unter dem „*Trägheits-Moment*“ dJ eines Massenelementes, oder wie man gewöhnlich sagt, eines Massenkpunktes P in bezug auf eine Ebene ε versteht man das Produkt $p^2 dM$ aus seiner Masse dM und dem *Quadrate* des Abstandes p von der Ebene ε . Dadurch erhält man für das Trägheitsmoment eines rein geometrischen Körpers

$$(1.) \quad J = \int_{x_1}^{x_2} \int_{y_1}^{y_2} \int_{z_1}^{z_2} p^2 dz,$$

einer krummen Oberfläche

$$(2.) \quad J = \int_{x_1}^{x_2} dx \int_{y_1}^{y_2} p^2 dy \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}$$

und eines Kurvenbogens

$$(3.) \quad J = \int_{x_1}^{x_2} p^2 \sqrt{dx^2 + dy^2 + dz^2},$$

wobei

$$(4.) \quad p = x \cos \alpha + y \cos \beta + z \cos \gamma - p_0$$

ist. Handelt es sich um das Trägheits-Moment in bezug auf eine Achse oder einen Punkt, so bezeichnet p den Abstand von dieser Achse, bzw. von diesem Punkte.

§ 87.

Erklärung des Schwerpunktes und Berechnung seiner Koordinaten.

(Vergl. die Formel-Tabelle Nr. 234 bis 240.)

Bezeichnet man der Kürze wegen die Dichtigkeit eines Körpers im Punkte P mit φ statt mit $\varphi(x, y, z)$, so wird seine Masse (vergl. Formel Nr. 219 der Tabelle)

$$(1.) \quad M = \int_{x_1}^{x_2} \int_{y_1}^{y_2} \int_{z_1}^{z_2} \varphi dz.$$

Setzt man sodann

$$(2.) \quad \xi = \frac{1}{M} \int_{x_1}^{x_2} \int_{y_1}^{y_2} \int_{z_1}^{z_2} x \varphi dz,$$

$$(3.) \quad \eta = \frac{1}{M} \int_{x_1}^{x_2} \int_{y_1}^{y_2} \int_{z_1}^{z_2} y \varphi dz,$$

$$(4.) \quad \zeta = \frac{1}{M} \int_{x_1}^{x_2} \int_{y_1}^{y_2} \int_{z_1}^{z_2} z \varphi dz,$$

so ist das statische Moment des ganzen Körpers in bezug auf die Ebene ε mit der Gleichung

$$(5.) \quad x \cos \alpha + y \cos \beta + z \cos \gamma - p_0 = 0$$

nach Gleichung (5.) in § 85

$$(6.) \quad \mathfrak{M} = \int_{x_1}^{x_2} \int_{y_1}^{y_2} \int_{z_1}^{z_2} (x \cos \alpha + y \cos \beta + z \cos \gamma - p_0) \varphi dz \\ = M(\xi \cos \alpha + \eta \cos \beta + \zeta \cos \gamma - p_0).$$

Aus dieser Gleichung erkennt man erstens, daß die Größen ξ , η , ζ von der Lage der Ebene ε unabhängig sind, und zweitens, daß der Punkt S mit den Koordinaten ξ , η , ζ , wenn man ihm die Masse M des ganzen Körpers beilegt, in bezug auf jede beliebige Ebene ε dasselbe statische Moment hat wie der Körper selbst.

Man nennt deshalb diesen Punkt S den „Schwerpunkt“ oder den „Massenmittelpunkt“ des Körpers.

Die Größen $M\xi$, $M\eta$, $M\zeta$ sind dabei die statischen Momente des Körpers in bezug auf die drei Koordinaten-Ebenen.

Ist die Dichtigkeit φ eine Konstante, so hebt sich dieser Faktor φ im Zähler und Nenner der Ausdrücke für ξ , η , ζ fort.

Ähnliche Untersuchungen gelten auch bei einer Fläche und bei einer Kurve im Raume.

Bei einer krummen Oberfläche war

$$(7.) \quad M = \int_{x_1}^{x_2} dx \int_{y_1}^{y_2} \varphi dy \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}.$$

Setzt man dann

$$(8.) \quad \xi = \frac{1}{M} \int_{x_1}^{x_2} dx \int_{y_1}^{y_2} x \varphi dy \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2},$$

$$(9.) \quad \eta = \frac{1}{M} \int_{x_1}^{x_2} dx \int_{y_1}^{y_2} y \varphi dy \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2},$$

$$(10.) \quad \zeta = \frac{1}{M} \int_{x_1}^{x_2} dx \int_{y_1}^{y_2} z \varphi dy \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2},$$

so wird das statische Moment der Fläche

$$(11.) \quad \mathfrak{M} = \int_{x_1}^{x_2} dx \int_{y_1}^{y_2} (x \cos \alpha + y \cos \beta + z \cos \gamma - p_0) \varphi dy \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} \\ = M(\xi \cos \alpha + \eta \cos \beta + \zeta \cos \gamma - p_0).$$

Auch hier sind also die Größen ξ , η , ζ unabhängig von der Lage der Ebene ε ; sie sind die Koordinaten des Schwerpunktes S , der die Eigenschaft hat, daß er in bezug auf jede beliebige Ebene ε dasselbe statische Moment hat wie die Fläche selbst, wenn man dem Punkte S die Masse M der Fläche beilegt.

Ebenso findet man für eine Kurve im Raume

$$(12.) \quad M = \int_{x_1}^{x_2} \varphi ds,$$

$$(13.) \quad \xi = \frac{1}{M} \int_{x_1}^{x_2} x \varphi ds, \quad \eta = \frac{1}{M} \int_{x_1}^{x_2} y \varphi ds, \quad \zeta = \frac{1}{M} \int_{x_1}^{x_2} z \varphi ds,$$

wobei der Punkt S mit den Koordinaten ξ, η, ζ für die Kurve dieselben Eigenschaften hat wie vorher bei dem Körper, bzw. bei der krummen Oberfläche.

Es sei insbesondere die den Körper umgrenzende Fläche durch Rotation einer Kurve mit der Gleichung

$$y = f(x)$$

um die X -Achse entstanden, dann ist die Masse des Körpers

$$(14.) \quad M = \pi \int_{x_1}^{x_2} \varphi(x) y^2 dx,$$

wobei die Dichtigkeit $\varphi(x)$ nur eine Funktion der einzigen Veränderlichen x sein möge. Der Schwerpunkt liegt dann auf der Rotations-Achse. Denn führt man durch die Gleichungen

$$y = r \cos \psi, \quad z = r \sin \psi^*)$$

Polarkoordinaten ein, so findet man nach Formel Nr. 214 der Tabelle in diesem Falle

$$\begin{aligned} \int_{y_1}^{y_2} \int_{z_1}^{z_2} \varphi(x) dz &= \varphi(x) \int_{y_1}^{y_2} \int_{z_1}^{z_2} y dz \\ &= \varphi(x) \int_{-\pi}^{+\pi} \int_0^r r \cos \psi r dr \\ &= \varphi(x) \frac{r^3}{3} [\sin \psi]_{-\pi}^{+\pi} = 0, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int_{y_1}^{y_2} \int_{z_1}^{z_2} z \varphi(x) dz &= \varphi(x) \int_{y_1}^{y_2} \int_{z_1}^{z_2} y z dz \\ &= \varphi(x) \int_{-\pi}^{+\pi} \int_0^r r \sin \psi r dr \\ &= \varphi(x) \frac{r^3}{3} [-\cos \psi]_{-\pi}^{+\pi} = 0, \end{aligned}$$

*) Hier ist der Winkel mit ψ statt mit φ bezeichnet worden, damit eine Verwechslung mit der Dichtigkeit φ vermieden wird.

folglich wird

$$(15.) \quad \eta = 0 \quad \text{und} \quad \zeta = 0.$$

Dagegen ist

$$\begin{aligned} \int_{y_1}^{y_2} dy \int_{z_1}^{z_2} x \varphi(x) dz &= x \varphi(x) \int_{y_1}^{y_2} dy \int_{z_1}^{z_2} dz \\ &= x \varphi(x) \int_{-\pi}^{+\pi} d\psi \int_0^r r dr = \frac{x \varphi(x) r^2}{2} \int_{-\pi}^{+\pi} d\psi \\ &= \frac{x \varphi(x) r^2}{2} [\psi]_{-\pi}^{+\pi} = r^2 \pi x \varphi(x), \end{aligned}$$

also, da hier

$$r = y = f(x)$$

zu setzen ist,

$$(16.) \quad \xi = \frac{\pi}{M} \int_{x_1}^{x_2} x y^2 \varphi(x) dx.$$

Ebenso findet man bei einer Fläche, die durch Rotation der Kurve

$$y = f(x)$$

um die X -Achse entstanden ist,

$$\eta = 0, \quad \zeta = 0,$$

wenn die Dichtigkeit φ eine Funktion $\varphi(x)$ der einzigen Veränderlichen x ist. Dagegen findet man ξ , indem man die Fläche durch Schnitte, senkrecht zur Rotationsachse in unendlich viele, unendlich schmale ringförmige Zonen zerlegt, die man als Mäntel von Kegelstumpfen betrachten kann. Die Masse einer solchen Zone ist

$$dM = 2\pi \varphi(x) y ds$$

und ihr statisches Moment in bezug auf die YZ -Ebene ist

$$dM \xi = 2\pi x \varphi(x) y ds,$$

folglich wird

$$(17.) \quad M = 2\pi \int_{x_1}^{x_2} \varphi(x) y ds,$$

$$(18.) \quad \xi = \frac{2\pi}{M} \int_{x_1}^{x_2} x \varphi(x) y ds.$$

Zur Bestimmung des Schwerpunktes einer ebenen Figur, welche oben, bezw. unten von den Kurven

$$(19.) \quad y_2 = f_2(x) \quad \text{und} \quad y_1 = f_1(x)$$

begrenzt wird, beachte man, daß nach Formel Nr. 223 der Tabelle die Masse

$$(20.) \quad M = \int_{x_1}^{x_2} \int_{y_1}^{y_2} \varphi(x, y) dy$$

war. Setzt man jetzt

$$(21.) \quad \xi = \frac{1}{M} \int_{x_1}^{x_2} \int_{y_1}^{y_2} x \varphi(x, y) dy, \quad \eta = \frac{1}{M} \int_{x_1}^{x_2} \int_{y_1}^{y_2} y \varphi(x, y) dy,$$

so wird nach Gleichung (14.) in § 85 das statische Moment in bezug auf die Gerade g

$$(22.) \quad \mathfrak{M} = \int_{x_1}^{x_2} \int_{y_1}^{y_2} (x \cos \alpha + y \sin \alpha - p_0) \varphi(x, y) dy \\ = M(\xi \cos \alpha + \eta \sin \alpha - p_0).$$

Die Größen ξ und η sind also die Koordinaten eines Punktes S , dessen Lage unabhängig ist von der Lage der Geraden g , und der, wenn man ihm die Masse M beilegt, in bezug auf jede beliebige Gerade dasselbe statische Moment hat wie die ebene Figur selbst. Deshalb heißt S der „Schwerpunkt“ der ebenen Figur.

Bei dem Bogen der ebenen Kurve

$$y = f(x)$$

war die Masse nach Formel Nr. 224 der Tabelle

$$(23.) \quad M = \int_{x_1}^{x_2} \varphi(x) ds = \int_{x_1}^{x_2} \varphi(x) \sqrt{dx^2 + dy^2};$$

setzt man jetzt

$$(24.) \quad \xi = \frac{1}{M} \int_{x_1}^{x_2} x \varphi(x) ds, \quad \eta = \frac{1}{M} \int_{x_1}^{x_2} y \varphi(x) ds,$$

so wird das statische Moment in bezug auf die Gerade g nach Gleichung (15.) in § 85

$$(25.) \quad \mathfrak{M} = \int_{x_1}^{x_2} (x \cos \alpha + y \sin \alpha - p_0) \varphi(x) ds \\ = M(\xi \cos \alpha + \eta \sin \alpha - p_0).$$

Also hat auch hier der Punkt S mit den Koordinaten ξ und η die oben aufgeführten Eigenschaften des Schwerpunktes.

§ 88.

Guldinsche Regeln.

(Vergl. die Formel-Tabelle Nr. 241 und 242.)

Der Einfachheit wegen möge vorausgesetzt werden, daß die Dichtigkeit φ eine Konstante sei, deren Wert man gleich 1 setzen darf, weil sich bei der Berechnung der Schwerpunkts-Koordinaten ξ , η , ζ der Faktor φ im Zähler und Nenner forthebt; d. h. es soll hier nur der Schwerpunkt der *rein geometrischen Gebilde* aufgesucht werden. Man erhält dann aus den Gleichungen (20.) und (21.) in § 87 für die Masse und für die Koordinaten des Schwerpunktes einer ebenen Figur, welche durch die Kurven

$$y_2 = f_2(x) \quad \text{und} \quad y_1 = f_1(x)$$

oben und unten begrenzt ist, die Werte

$$(1.) \quad M = \int_{x_1}^{x_2} dx (y_2 - y_1) = \int_{x_1}^{x_2} [f_2(x) - f_1(x)] dx = F,$$

$$(2.) \quad \xi = \frac{1}{F} \int_{x_1}^{x_2} x (y_2 - y_1) dx = \frac{1}{F} \int_{x_1}^{x_2} [f_2(x) - f_1(x)] x dx,$$

$$(3.) \quad \eta = \frac{1}{F} \int_{x_1}^{x_2} dx \int_{y_1}^{y_2} y dy = \frac{1}{2F} \int_{x_1}^{x_2} [y_2^2 - y_1^2] dx \\ = \frac{1}{2F} \int_{x_1}^{x_2} [f_2(x)^2 - f_1(x)^2] dx.$$

Das Volumen des Körpers, der durch Rotation der ebenen Figur um die X -Achse entsteht, ist nach Formel Nr. 136 der Tabelle

$$(4.) \quad V = V_2 - V_1 = \pi \int_{x_1}^{x_2} y_2^2 dx - \pi \int_{x_1}^{x_2} y_1^2 dx = \pi \int_{x_1}^{x_2} (y_2^2 - y_1^2) dx,$$

folglich wird

$$(5.) \quad V = 2\eta\pi \cdot F.$$

Diese Formel gibt den

Satz 1. *Rotiert eine ebene Figur F um eine beliebige Achse, so ist das Volumen des von ihr beschriebenen Rotationskörpers gleich dem Flächeninhalt F der ebenen Figur, multipliziert mit dem Umfange $2\eta\pi$ des von ihrem Schwerpunkt beschriebenen Kreises. (Erste Guldinsche Regel.)*

Ferner erhält man aus den Gleichungen (23.) und (24.) in § 87 für die Masse und die Koordinaten des Schwerpunktes eines Kurvenbogens in der Ebene

$$(6.) \quad M = \int_{x_1}^{x_2} ds = s, \quad \xi = \frac{1}{s} \int_{x_1}^{x_2} x ds, \quad \eta = \frac{1}{s} \int_{x_1}^{x_2} y ds.$$

Der Flächeninhalt der Oberfläche, die durch Rotation des Kurvenbogens um die X -Achse entsteht, war nach Formel Nr. 141 der Tabelle

$$(7.) \quad O = 2\pi \int_{x_1}^{x_2} y ds,$$

folglich wird

$$(8.) \quad O = 2\eta\pi \cdot s.$$

Diese Formel gibt

Satz 2. *Rotiert ein Kurvenbogen s um eine beliebige Achse, so ist der Flächeninhalt der von ihm beschriebenen Rotationsfläche gleich der Bogenlänge s , multipliziert mit dem Umfange $2\eta\pi$ des von seinem Schwerpunkte beschriebenen Kreises. (Zweite Guldinsche Regel.)*

Mit Hilfe dieser beiden Sätze kann man auch umgekehrt zur Berechnung der Koordinaten des Schwerpunktes bei Figuren und Kurvenbögen in der Ebene dieselben Rechnungen verwenden, welche schon bei der Kubatur der Rotationskörper und bei der Komplanatation der Rotationsflächen ausgeführt worden sind.

§ 89.

Übungs-Beispiele.

(Vergl. die Formel-Tabelle Nr. 243.)


Aufgabe 1. Die Gleichung einer Parabel (Fig. 154) ist

$$(1.) \quad y^2 = 2px, \quad \text{oder} \quad y = \sqrt{2px};$$

man soll die Koordinaten des Schwerpunktes berechnen:

- für das Flächenstück OQP ,
- für den bei der Rotation um die X -Achse von OQP beschriebenen Rotationskörper,
- für den Bogen OP ,
- für die von dem Bogen OP beschriebene Rotationsfläche.

Fig. 154.



Auflösung. Hier ist (vergl. Aufgabe 2 in § 19)

$$(2.) \quad F = \int_0^x y dx = \sqrt{2p} \int_0^x x^{\frac{1}{2}} dx = \frac{2}{3} \sqrt{2p} \cdot x^{\frac{3}{2}} = \frac{2xy}{3},$$

und nach Formel Nr. 239 der Tabelle

$$(3.) \quad \xi = \frac{1}{F} \int_0^x xy dx = \frac{\sqrt{2p}}{F} \int_0^x x^{\frac{3}{2}} dx = \frac{2\sqrt{2p}}{5F} x^{\frac{5}{2}} = \frac{2x^2y}{5F},$$

$$(4.) \quad \eta = \frac{1}{2F} \int_0^x y^2 dx = \frac{2p}{2F} \int_0^x x dx = \frac{2p}{4F} x^2 = \frac{xy^2}{4F},$$

folglich ist

$$(5.) \quad \xi = \frac{3x}{5}, \quad \eta = \frac{3y}{8}.$$

Daraus ergibt sich für das Volumen des Rotationskörpers (vergl. Aufgabe 4 in § 25)

$$(6.) \quad V = 2\eta\pi \cdot F = \frac{3y\pi}{4} \cdot \frac{2xy}{3} = \frac{xy^2\pi}{2}.$$

Für den Schwerpunkt dieses Rotationskörpers erhält man nach Formel Nr. 237 der Tabelle

$$\xi = \frac{\pi}{V} \int_0^x xy^2 dx = \frac{2p\pi}{V} \int_0^x x^2 dx = \frac{2p\pi}{V} \cdot \frac{x^3}{3} = \frac{x^2y^2\pi}{3V},$$

also

$$(7.) \quad \xi = \frac{2x^2y^2\pi}{3xy^2\pi} = \frac{2x}{3}.$$

Die Länge des Bogens OP war (vergl. Aufgabe 1 in § 27)

$$(8.) \quad s = \int_0^x ds = \frac{1}{p} \int_0^y dy \sqrt{p^2 + y^2} = \frac{y}{2p} \sqrt{p^2 + y^2} + \frac{p}{2} \operatorname{Ar} \sin\left(\frac{y}{p}\right);$$

ferner ist nach Formel Nr. 240 der Tabelle

$$\xi = \frac{1}{s} \int_0^x x ds = \frac{1}{2p^2 s} \int_0^y y^2 dy \sqrt{p^2 + y^2},$$

also nach Formel Nr. 128 und 127 der Tabelle

$$(9.) \quad \begin{aligned} \xi &= \frac{1}{2p^2 s} \left[\frac{y^3}{4} \sqrt{p^2 + y^2} + \frac{p^2 y}{8} \sqrt{p^2 + y^2} - \frac{p^4}{8} \operatorname{Ar} \sin\left(\frac{y}{p}\right) \right] \\ &= \frac{1}{16p^2 s} \left[(2y^2 + p^2)y \sqrt{p^2 + y^2} - p^4 \operatorname{Ar} \sin\left(\frac{y}{p}\right) \right], \end{aligned}$$

$$\eta = \frac{1}{s} \int_0^x y ds = \frac{1}{ps} \int_0^y y dy \sqrt{p^2 + y^2},$$

also nach Formel Nr. 130 der Tabelle

$$(10.) \quad \eta = \frac{1}{3ps} [(p^2 + y^2) \sqrt{p^2 + y^2} - p^3].$$

Der Flächeninhalt der von dem Bogen OP beschriebenen Rotationsfläche ist daher (vergl. Aufgabe 2 in § 31)

$$(11.) \quad O = 2\eta\pi \cdot s = \frac{2\pi}{3p} [(p^2 + y^2) \sqrt{p^2 + y^2} - p^3].$$

Für diese Rotationsfläche wird nach Formel Nr. 238 der Tabelle

$$\xi = \frac{2\pi}{O} \int_0^x xy ds = \frac{\pi}{Op^2} \int_0^y y^3 dy \sqrt{p^2 + y^2},$$

oder, wenn man

$$\sqrt{p^2 + y^2} = t, \quad y^2 = t^2 - p^2, \quad y dy = t dt$$

setzt,

$$\begin{aligned} \xi &= \frac{\pi}{Op^2} \int_{(0)}^{(y)} (t^2 - p^2) t^2 dt = \frac{\pi}{Op^2} \left[\frac{t^5}{5} - \frac{p^2 t^3}{3} \right]_{(0)}^{(y)} \\ &= \frac{\pi}{15Op^2} [t^3(3t^2 - 5p^2)]_{(0)}^{(y)} = \frac{\pi}{15Op^2} [(y^2 + p^2) \sqrt{y^2 + p^2} (3y^2 - 2p^2)]^{(y)} \\ &= \frac{\pi}{15Op^2} [(3y^4 + p^2 y^2 - 2p^4) \sqrt{p^2 + y^2} + 2p^5], \end{aligned}$$

also

$$(12.) \quad \xi = \frac{(3y^4 + p^2y^2 - 2p^4)\sqrt{p^2 + y^2} + 2p^5}{10p[(p^2 + y^2)\sqrt{p^2 + y^2} - p^3]}.$$

Aufgabe 2. Ein Kreis (Fig. 155) sei gegeben durch die Gleichungen

$$(13.) \quad x = acost, \quad y = asint;$$

man soll die Koordinaten des Schwerpunktes berechnen:

- für die Flächenstücke $OQPB$ und QAP ,
- für die bei der Rotation um die X -Achse von $OQPB$ beschriebene Kugelschicht und für den von QAP beschriebenen Kugelabschnitt,
- für die Bögen BP und PA ,
- für die bei der Rotation um die X -Achse von BP beschriebene Kugelzone und für die von PA beschriebene Kugelhaube.

Fig. 155.



Auflösung. Hier ist für die Fläche $OQPB$

$$\begin{aligned} OQPB &= \int_0^x y dx = -a^2 \int_{\frac{\pi}{2}}^t \sin^2 t dt = -a^2 \left[-\frac{1}{2} \sin t \cos t + \frac{1}{2} t \right]_{\frac{\pi}{2}}^t \\ &= \frac{a^2}{2} \left(\sin t \cos t + \frac{\pi}{2} - t \right), \end{aligned}$$

also, wenn man die Fläche $OQPB$ mit F_1 bezeichnet,

$$(14.) \quad F_1 = \frac{1}{2} xy + \frac{a^2}{2} \arcsin\left(\frac{x}{a}\right),$$

und nach Formel Nr. 239 der Tabelle

$$\begin{aligned} (15.) \quad \xi_1 &= \frac{1}{F_1} \int_0^x xy dx = -\frac{a^3}{F_1} \int_{\frac{\pi}{2}}^t \sin^2 t \cos t dt \\ &= -\frac{a^3}{3F_1} [\sin^3 t]_{\frac{\pi}{2}}^t = \frac{a^3}{3F_1} (1 - \sin^3 t) = \frac{a^3 - y^3}{3F_1}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\eta_1 &= \frac{1}{2F_1} \int_0^x y^2 dx = -\frac{a^3}{2F_1} \int_{\frac{\pi}{2}}^t \sin^3 t dt \\ &= \frac{a^3}{2F_1} \int_{\frac{\pi}{2}}^t (1 - \cos^2 t) d(\cos t) = \frac{a^3}{2F_1} \left[\cos t - \frac{1}{3} \cos^3 t \right]_{\frac{\pi}{2}}^t,\end{aligned}$$

also

$$(16.) \quad \eta_1 = \frac{1}{6F_1} (3a^2x - x^3).$$

Setzt man $t = 0$, also $x = a$, $y = 0$, so fällt der Punkt P mit dem Punkte A zusammen; man erhält daher für den Quadranten des Kreises

$$(17.) \quad F' = \frac{a^2}{2} \arcsin 1 = \frac{a^2\pi}{4},$$

$$(18.) \quad \xi = \frac{4a^3}{3a^2\pi} = \frac{4a}{3\pi}, \quad \eta = \frac{4(3a^3 - a^3)}{6a^2\pi} = \frac{4a}{3\pi}.$$

Für die Fläche F_2 gleich QAP erhält man

$$F_2 = -a^2 \left[-\frac{1}{2} \sin t \cos t + \frac{1}{2} t \right]_t^0 = \frac{a^2}{2} (t - \sin t \cos t),$$

also

$$(19.) \quad F_2 = \frac{a^2}{2} \arccos \left(\frac{x}{a} \right) - \frac{xy}{2},$$

$$(20.) \quad \xi_2 = -\frac{a^3}{3F_2} [\sin^3 t]_t^0 = \frac{a^3 \sin^3 t}{3F_2} = \frac{y^3}{3F_2},$$

$$\begin{aligned}(21.) \quad \eta_2 &= \frac{a^3}{2F_2} \left[\cos t - \frac{1}{3} \cos^3 t \right]_t^0 = \frac{a^3}{6F_2} (2 - 3 \cos t + \cos^3 t) \\ &= \frac{1}{6F_2} (2a^3 - 3a^2x + x^3).\end{aligned}$$

Setzt man hier $t = \frac{\pi}{2}$, also $x = 0$, $y = a$, so erhält man auch hier für den Quadranten des Kreises wieder

$$(22.) \quad F = \frac{a^2\pi}{4}, \quad \xi = \frac{4a}{3\pi}, \quad \eta = \frac{4a}{3\pi}.$$

Daraus ergibt sich für das Volumen der bei der Rotation von $OQPB$ beschriebenen Kugelschicht (vergl. Aufgabe 3 in § 25)

$$(23.) \quad V_1 = 2\eta_1\pi \cdot F_1 = \frac{(3a^2x - x^3)\pi}{3},$$

und für das Volumen des von QAP beschriebenen Kugelabschnittes

$$(24.) \quad V_2 = 2\eta_2\pi \cdot F_2 = \frac{(2a^3 - 3a^2x + x^3)\pi}{3}.$$

Für den Schwerpunkt von V_1 erhält man nach Formel Nr. 237 der Tabelle

$$\begin{aligned} \xi_1 &= \frac{\pi}{V_1} \int_0^x xy^2 dx = -\frac{a^4\pi}{V_1} \int_{\frac{\pi}{2}}^t \cos t \sin^3 t dt \\ &= -\frac{a^4\pi}{4V_1} [\sin^4 t]_{\frac{\pi}{2}}^t = \frac{a^4\pi}{4V_1} (1 - \sin^4 t) = \frac{3\pi(a^4 - y^4)}{4\pi(3a^2x - x^3)}, \end{aligned}$$

also

$$(25.) \quad \xi_1 = \frac{3(2a^2x^2 - x^4)}{4(3a^2x - x^3)} = \frac{3(2a^2 - x^2)x}{4(3a^2 - x^2)}.$$

Für den Schwerpunkt von V_2 erhält man

$$\xi_2 = -\frac{a^4\pi}{4V_2} [\sin^4 t]_t^0 = \frac{a^4\pi \sin^4 t}{4V_2} = \frac{3y^4}{4(2a^3 - 3a^2x + x^3)},$$

oder

$$(26.) \quad \xi_2 = \frac{3(a^2 - x^2)^2}{4(2a^3 - 3a^2x + x^3)} = \frac{3(a + x)^2}{4(2a + x)}.$$

Für $t = 0$, $x = a$, $y = 0$ gehen V_1 und ξ_1 über in

$$(27.) \quad V = \frac{2a^3\pi}{3}, \quad \xi = \frac{3a}{8};$$

und für $t = \frac{\pi}{2}$, $x = 0$, $y = a$ gehen V_2 und ξ_2 ebenfalls in dieselben Werte V und ξ über. Dieser Wert von ξ gibt also die Lage des Schwerpunktes der Halbkugel an.

Für den Bogen BP erhält man

$$(28.) \quad s_1 = \int_0^x \sqrt{dx^2 + dy^2} = -a \int_{\frac{\pi}{2}}^t dt = a \left(\frac{\pi}{2} - t \right),$$

und nach Formel Nr. 240 der Tabelle

$$\xi_1 = \frac{1}{s_1} \int_0^x x \sqrt{dx^2 + dy^2} = -\frac{a^2}{s_1} \int_{\frac{\pi}{2}}^t \cos t \, dt = -\frac{a^2}{s_1} [\sin t]_{\frac{\pi}{2}}^t,$$

$$\eta_1 = \frac{1}{s_1} \int_0^x y \sqrt{dx^2 + dy^2} = -\frac{a^2}{s_1} \int_{\frac{\pi}{2}}^t \sin t \, dt = \frac{a^2}{s_1} [\cos t]_{\frac{\pi}{2}}^t,$$

also

$$(29.) \quad \xi_1 = \frac{a^2}{s_1} (1 - \sin t) = \frac{2(a-y)}{\pi - 2t}, \quad \eta_1 = \frac{a^2 \cos t}{s_1} = \frac{2ax}{\pi - 2t}.$$

Für $t = 0$ wird $x = a$, $y = 0$ und P fällt mit A zusammen, dann gehen s_1 , ξ_1 und η_1 über in

$$(30.) \quad s = \frac{a\pi}{2}, \quad \xi = \frac{2a}{\pi}, \quad \eta = \frac{2a}{\pi}.$$

Für den Bogen PA erhält man

$$(31.) \quad s_2 = \int_x^a \sqrt{dx^2 + dy^2} = -\int_t^0 a \, dt = at,$$

$$\xi_2 = \frac{1}{s_2} \int_x^a x \sqrt{dx^2 + dy^2} = -\frac{a^2}{s_2} \int_t^0 \cos t \, dt = -\frac{a^2}{s_2} [\sin t]_t^0,$$

$$\eta_2 = \frac{1}{s_2} \int_x^a y \sqrt{dx^2 + dy^2} = -\frac{a^2}{s_2} \int_t^0 \sin t \, dt = \frac{a^2}{s_2} [\cos t]_t^0,$$

also

$$(32.) \quad \xi_2 = \frac{a^2 \sin t}{s_2} = \frac{ay}{s_2} = \frac{y}{t}, \quad \eta_2 = \frac{a^2(1 - \cos t)}{s_2} = \frac{a(a-x)}{s_2} = \frac{a-x}{t}.$$

Für $t = \frac{\pi}{2}$ wird $x = 0$, $y = a$ und P fällt mit B zusammen, dann erhält man wieder wie in Gleichung (30.) für den Quadranten des Kreises

$$s = \frac{a\pi}{2}, \quad \xi = \frac{2a}{\pi}, \quad \eta = \frac{2a}{\pi}.$$

Aus Gleichung (29.) folgt für die Oberfläche der vom Bogen BP beschriebenen Kugelzone (vergl. Aufgabe 1 in § 31)

$$(33.) \quad O_1 = 2\eta_1 \pi \cdot s_1 = 2a^2 \pi \cos t = 2a\pi x.$$

Die Abszisse des Schwerpunktes der Zone wird nach Formel Nr. 238 der Tabelle

$$\begin{aligned}\xi_1 &= \frac{2\pi}{O_1} \int_0^x xy ds = -\frac{2a^3\pi}{O_1} \int_{\frac{\pi}{2}}^t \cos t \sin t dt \\ &= -\frac{2a^3\pi}{2O_1} [\sin^2 t]_{\frac{\pi}{2}}^t = \frac{a^3\pi}{O_1} (1 - \sin^2 t) = \frac{a^3\pi}{O_1} \cos^2 t,\end{aligned}$$

also

$$(34.) \quad \xi_1 = \frac{a\pi x^2}{O_1} = \frac{a\pi x^2}{2a\pi x} = \frac{x}{2}.$$

Für $t = 0$ wird $x = a$, $y = 0$ und die Kugelzone geht über in die Halbkugel. Für diese findet man daher

$$(35.) \quad O = 2a^2\pi, \quad \xi = \frac{a}{2}.$$

Aus Gleichung (32.) folgt für die Oberfläche der vom Bogen PA beschriebenen Kugelhaube

$$\begin{aligned}(36.) \quad O_2 &= 2\eta_2\pi \cdot s_2 = 2a\pi(a - x), \\ \xi_2 &= \frac{2\pi}{O_2} \int_x^a xy ds = -\frac{2a^3\pi}{O_2} \int_t^0 \cos t \sin t dt \\ &= -\frac{a^3\pi}{O_2} [\sin^2 t]_t^0 = \frac{a^3\pi}{O_2} \sin^2 t,\end{aligned}$$

also

$$(37.) \quad \xi_2 = \frac{a\pi y^2}{O_2} = \frac{a\pi(a^2 - x^2)}{2a\pi(a - x)} = \frac{a + x}{2}.$$

Für $t = \frac{\pi}{2}$ wird $x = 0$, $y = a$. Die Kugelhaube geht dadurch über in die Halbkugel, für die man wieder erhält


$$O = 2a^2\pi, \quad \xi = \frac{a}{2}.$$

Aufgabe 3. Durch die Gleichung

$$(38.) \quad y = a \cos\left(\frac{x}{a}\right), \quad \text{oder} \quad \sqrt{y^2 - a^2} = a \sin\left(\frac{x}{a}\right)$$

ist die Kettenlinie (vergl. Fig. 156) gegeben; man soll die Koordinaten des Schwerpunktes berechnen:

Fig. 156.



- a) für das Flächenstück $OQPA$,
- b) für das Volumen des von $OQPA$ bei der Rotation um die X -Achse beschriebenen Rotationskörpers,
- c) für den Bogen AP ,
- d) für die vom Bogen AP bei der Rotation um die X -Achse beschriebene Rotationsfläche.

Auflösung. Hier ist (vergl. Aufgabe 9 in § 19)

$$OQPA = F = \int_0^x y dx = a \int_0^x \cos\left(\frac{x}{a}\right) dx = a^2 \sin\left(\frac{x}{a}\right),$$

also

(39.)

$$F = a\sqrt{y^2 - a^2}$$

und nach Formel Nr. 239 der Tabelle

$$\xi = \frac{1}{F} \int_0^x xy dx = \frac{a}{F} \int_0^x x \cos\left(\frac{x}{a}\right) dx.$$

Dabei findet man, wenn man $x = at$ setzt und partielle Integration anwendet,

$$\begin{aligned} (40.) \quad \int_0^x x \cos\left(\frac{x}{a}\right) dx &= a^2 \int_0^t t \cos t dt = a^2 t \sin t - a^2 \int_0^t \sin t dt \\ &= x \sqrt{y^2 - a^2} - a^2 [\cos t]_0^t \\ &= x \sqrt{y^2 - a^2} - a(y - a), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (41.) \quad \eta &= \frac{1}{2F} \int_0^x y^3 dx = \frac{a^2}{2F} \int_0^x \cos^2\left(\frac{x}{a}\right) dx = \frac{a^3}{4F} \left[\cos\left(\frac{x}{a}\right) \sin\left(\frac{x}{a}\right) + \frac{x}{a} \right] \\ &= \frac{a}{4F} (y \sqrt{y^2 - a^2} + ax), \end{aligned}$$

folglich ist

$$(40a.) \quad \xi = \frac{1}{\sqrt{y^2 - a^2}} [x\sqrt{y^2 - a^2} - a(y - a)] = x - a\sqrt{\frac{y - a}{y + a}},$$

$$(41a.) \quad \eta = \frac{1}{4\sqrt{y^2 - a^2}} (y\sqrt{y^2 - a^2} + ax) = \frac{1}{4} \left(y + \frac{ax}{\sqrt{y^2 - a^2}} \right).$$

Aus Gleichung (41.) folgt für das Volumen des Körpers, der von $OQPA$ bei der Rotation um die X -Achse beschrieben wird (vergl. Aufgabe 9 in § 25),

$$(42.) \quad V = 2\eta\pi \cdot F = \frac{a\pi}{2} (y\sqrt{y^2 - a^2} + ax).$$

Für den Schwerpunkt dieses Körpers erhält man nach Formel Nr. 237 der Tabelle

$$\xi = \frac{\pi}{V} \int_0^x xy^2 dx = \frac{a^2\pi}{V} \int_0^x x \operatorname{Co}^2\left(\frac{x}{a}\right) dx = \frac{a^2\pi}{4V} \int_0^x x \left(e^{\frac{2x}{a}} + 2 + e^{-\frac{2x}{a}} \right) dx.$$

Setzt man

$$\frac{2x}{a} = t, \quad \text{also} \quad x = \frac{at}{2}, \quad dx = \frac{a}{2} dt,$$

so wird, wenn man partielle Integration anwendet,

$$\int x e^{\frac{2x}{a}} dx = \frac{a^2}{4} \int t e^t dt = \frac{a^2}{4} (t e^t - e^t) = \frac{a^2}{4} \left(\frac{2x}{a} - 1 \right) e^{\frac{2x}{a}}.$$

Ebenso ist

$$\int x e^{-\frac{2x}{a}} dx = \frac{a^2}{4} \left(-\frac{2x}{a} - 1 \right) e^{-\frac{2x}{a}},$$

folglich wird

$$\begin{aligned} (43.) \quad \int_0^x x \operatorname{Co}^2\left(\frac{x}{a}\right) dx &= \frac{1}{4} \left[\frac{a^2}{4} \left(\frac{2x}{a} - 1 \right) e^{\frac{2x}{a}} + x^2 - \frac{a^2}{4} \left(\frac{2x}{a} + 1 \right) e^{-\frac{2x}{a}} \right]_0^x \\ &= \frac{1}{16} \left[2ax \left(e^{\frac{2x}{a}} - e^{-\frac{2x}{a}} \right) - a^2 \left(e^{\frac{2x}{a}} + e^{-\frac{2x}{a}} \right) + 4x^2 + 2a^2 \right] \\ &= \frac{1}{16} \left[8ax \operatorname{Co}\left(\frac{x}{a}\right) \operatorname{Sin}\left(\frac{x}{a}\right) - 4a^2 \operatorname{Sin}^2\left(\frac{x}{a}\right) + 4x^2 \right] \\ &= \frac{1}{4} \left(\frac{2xy}{a} \sqrt{y^2 - a^2} + x^2 - y^2 + a^2 \right), \end{aligned}$$

also

$$\begin{aligned}
 (43a.) \quad \xi &= \frac{a\pi}{4V} [2xy\sqrt{y^2 - a^2} + a(x^2 - y^2 + a^2)] \\
 &= \frac{2xy\sqrt{y^2 - a^2} + a(x^2 - y^2 + a^2)}{2(y\sqrt{y^2 - a^2} + ax)}.
 \end{aligned}$$

Für den Bogen AP erhält man (vergl. Aufgabe 4 in § 27)

$$s = \int_0^x \sqrt{dx^2 + dy^2} = \int_0^x \cos\left(\frac{x}{a}\right) dx = a \sin\left(\frac{x}{a}\right),$$

also

$$(44.) \quad s = \sqrt{y^2 - a^2}.$$

Ferner wird nach Formel Nr. 240 der Tabelle und mit Rücksicht auf Gleichung (40.)

$$\begin{aligned}
 (45.) \quad \xi &= \frac{1}{s} \int_0^x x ds = \frac{1}{s} \int_0^x x \cos\left(\frac{x}{a}\right) dx \\
 &= \frac{1}{s} [x\sqrt{y^2 - a^2} - a(y - a)] = x - a\sqrt{\frac{y - a}{y + a}},
 \end{aligned}$$

und mit Rücksicht auf Gleichung (41.)

$$\begin{aligned}
 (46.) \quad \eta &= \frac{1}{s} \int_0^x y ds = \frac{a}{s} \int_0^x \cos^2\left(\frac{x}{a}\right) dx \\
 &= \frac{a^2}{2s} \left[\cos\left(\frac{x}{a}\right) \sin\left(\frac{x}{a}\right) + \frac{x}{a} \right] = \frac{1}{2s} (y\sqrt{y^2 - a^2} + ax) \\
 &= \frac{1}{2} \left(y + \frac{ax}{\sqrt{y^2 - a^2}} \right).
 \end{aligned}$$

Aus Gleichung (46.) erhält man für die Oberfläche der vom Bogen AP bei der Rotation um die X -Achse beschriebenen Rotationsfläche (vergl. Aufgabe 7 in § 31)

$$(47.) \quad O = 2\eta\pi s = \pi(y\sqrt{y^2 - a^2} + ax).$$

Dabei ist nach Formel Nr. 238 der Tabelle

$$\xi = \frac{2\pi}{O} \int_0^x xy ds = \frac{2\pi a}{O} \int_0^x x \cos^2\left(\frac{x}{a}\right) dx.$$

Dies gibt nach Gleichung (43.)


$$(48.) \quad \begin{aligned} \xi &= \frac{2\pi}{4O} [2xy\sqrt{y^2 - a^2} + a(x^2 - y^2 + a^2)] \\ &= \frac{2xy\sqrt{y^2 - a^2} + a(x^2 - y^2 + a^2)}{2(y\sqrt{y^2 - a^2} + ax)}. \end{aligned}$$

Aufgabe 4. Durch die Gleichungen

$$(49.) \quad x = a(t - \sin t), \quad y = a(1 - \cos t)$$

ist die gewöhnliche Zyклоide gegeben (vergl. Fig. 157); man soll die Koordinaten des Schwerpunktes berechnen:

Fig. 157.



- für das Flächenstück OQP ,
- für das Volumen des von OQP bei der Rotation um die X -Achse beschriebenen Rotationskörpers,
- für den Bogen OP ,
- für die Oberfläche der vom Bogen OP bei der Rotation um die X -Achse beschriebenen Rotationsfläche.

Auflösung. Hier ist (vergl. Aufgabe 10 in § 19)

$$OQP = F = \int_0^x y dx = a^2 \int_0^t (1 - \cos t)^2 dt,$$

also

$$(50.) \quad F = \frac{a^2}{2} (3t - 4\sin t + \cos t \sin t).$$

Ferner ist nach Formel Nr. 239 der Tabelle

$$\begin{aligned} \xi &= \frac{1}{F} \int_0^x xy dx = \frac{a^3}{F} \int_0^t (t - \sin t)(1 - \cos t)^2 dt \\ &= \frac{a^3}{F} \int_0^t (1 - 2\cos t + \cos^2 t) dt - \frac{a^3}{F} \int_0^t (1 - \cos t)^2 \sin t dt. \end{aligned}$$

Dabei findet man durch partielle Integration

$$\begin{aligned}
 \int_0^t (1 - 2\cos t + \cos^2 t) dt &= \frac{t}{2} (3t - 4\sin t + \cos t \sin t) \\
 &\quad - \frac{1}{2} \int_0^t (3t - 4\sin t + \cos t \sin t) dt \\
 &= \frac{t}{2} (3t - 4\sin t + \cos t \sin t) - \frac{1}{2} \left(\frac{3t^2}{2} + 4\cos t + \frac{1}{2} \sin^2 t - 4 \right) \\
 &= \frac{3t^2}{4} - 2t\sin t + \frac{t}{2} \cos t \sin t + 2 - 2\cos t - \frac{1}{4} \sin^2 t.
 \end{aligned}$$

Setzt man sodann

$$1 - \cos t = z, \quad \text{also} \quad \sin t dt = dz,$$

so wird

$$\int_0^t (1 - \cos t)^2 \sin t dt = \int_0^z z^2 dz = \frac{z^3}{3} = \frac{1}{3} (1 - \cos t)^3.$$

Dies gibt

$$\xi = \frac{a^3}{F} \left[\frac{3t^2}{4} + \frac{t}{2} \sin t (-4 + \cos t) + 2(1 - \cos t) - \frac{1}{4} \sin^2 t - \frac{1}{3} (1 - \cos t)^3 \right],$$

also

$$(51.) \quad \xi = \frac{a[9t^2 + 6t\sin t(-4 + \cos t) + (1 - \cos t)(17 + 5\cos t - 4\cos^2 t)]}{6(3t - 4\sin t + \cos t \sin t)}.$$

Schließlich ist

$$\begin{aligned}
 \eta &= \frac{1}{2F} \int_0^x y^2 dx = \frac{a^3}{2F} \int_0^t (1 - \cos t)^3 dt \\
 &= \frac{a^3}{2F} \left[t - 3\sin t + \frac{3}{2} \sin t \cos t + \frac{3}{2} t - \sin t + \frac{1}{3} \sin^3 t \right],
 \end{aligned}$$

also

$$\begin{aligned}
 (52.) \quad \eta &= \frac{a^3}{12F} (15t - 24\sin t + 9\sin t \cos t + 2\sin^3 t) \\
 &= \frac{a(15t - 24\sin t + 9\sin t \cos t + 2\sin^3 t)}{6(3t - 4\sin t + \cos t \sin t)}.
 \end{aligned}$$

Für $t = 2\pi$, d. h. für die von dem ganzen Zyklidenbogen begrenzte Fläche gehen die Gleichungen (50.), (51.) und (52.) über in

$$(53.) \quad F = 3a^2\pi, \quad \xi = \frac{36a\pi^2}{36\pi} = a\pi, \quad \eta = \frac{30a\pi}{36\pi} = \frac{5a}{6}.$$

Für $t = \pi$, d. h. für die Hälfte $OBHPO$ dieser Fläche erhält man

$$(54.) \quad F = \frac{3a^2\pi}{2}, \quad \xi = \frac{(9\pi^2 + 16)a}{18\pi} = a\left(\frac{\pi}{2} + \frac{8}{9\pi}\right), \quad \eta = \frac{5a}{6}.$$

Aus Gleichung (52.) folgt für das Volumen des von OQP beschriebenen Rotationskörpers (vergl. Aufgabe 10 in § 25)

$$(55.) \quad V = 2\eta\pi \cdot F = \frac{a^3\pi}{6}(15t - 24\sin t + 9\sin t \cos t + 2\sin^3 t),$$

und nach Formel Nr. 237 der Tabelle

$$\begin{aligned} \xi &= \frac{\pi}{V} \int_0^x xy^2 dx = \frac{a^4\pi}{V} \int_0^t (t - \sin t)(1 - \cos t)^3 dt \\ &= \frac{a^4\pi}{V} \int_0^t (1 - 3\cos t + 3\cos^2 t - \cos^3 t) dt - \frac{a^4\pi}{V} \int_0^t (1 - \cos t)^3 \sin t dt. \end{aligned}$$

Durch partielle Integration findet man

$$\begin{aligned} \int_0^t (1 - 3\cos t + 3\cos^2 t - \cos^3 t) dt &= \frac{t}{6}(15t - 24\sin t + 9\sin t \cos t \\ &\quad + 2\sin^3 t) \\ &\quad - \frac{1}{6} \int_0^t (15t - 24\sin t + 9\sin t \cos t + 2\sin^3 t) dt \\ &= \frac{t}{6}(15t - 24\sin t + 9\sin t \cos t + 2\sin^3 t) - \frac{1}{6} \left[\frac{15t^2}{2} + 24(\cos t - 1) \right. \\ &\quad \left. + \frac{9}{2}\sin^2 t + \frac{4}{3} - 2\cos t + \frac{2}{3}\cos^3 t \right] \\ &= \frac{1}{12} \left[15t^2 + t\sin t(-48 + 18\cos t + 4\sin^2 t) \right. \\ &\quad \left. + (1 - \cos t) \left(\frac{109}{3} - \frac{23}{3}\cos t + \frac{4}{3}\cos^2 t \right) \right]; \end{aligned}$$

und durch die Substitution $z = 1 - \cos t$ erhält man

$$\int_0^t (1 - \cos t)^3 \sin t \, dt = \int_0^z z^3 \, dz = \frac{z^4}{4} = \frac{1}{4} (1 - \cos t)^4,$$

folglich wird

$$(56.) \quad \xi = \frac{a^4 \pi}{36 V} [45 t^3 + 3 t \sin t (-44 + 18 \cos t - 4 \cos^2 t) \\ + (1 - \cos t)(100 + 4 \cos t - 23 \cos^2 t + 9 \cos^3 t)].$$

Für $t = \pi$, d. h. für den Rotationskörper, der durch Rotation der ebenen Figur $OBHPO$ um die X -Achse entsteht, wird

$$(57.) \quad V = \frac{5a^3 \pi^2}{2}, \quad \xi = \frac{a^4 \pi}{36 V} (45 \pi^2 + 128) = a \left(\frac{\pi}{2} + \frac{64}{45 \pi} \right).$$

Für den Bogen OP erhält man (vergl. Aufgabe 5 in § 27)

$$s = \int_0^x \sqrt{dx^2 + dy^2} = 2a \int_0^t \sin\left(\frac{t}{2}\right) dt = -4a \left[\cos\left(\frac{t}{2}\right) \right]_0^t,$$

also

$$(58.) \quad s = 4a \left[1 - \cos\left(\frac{t}{2}\right) \right] = 8a \sin^2\left(\frac{t}{4}\right).$$

Ferner ist nach Formel Nr. 240 der Tabelle

$$\xi = \frac{1}{s} \int_s^x x \, ds = \frac{2a^2}{s} \int_0^t (t - \sin t) \sin\left(\frac{t}{2}\right) dt.$$

Durch partielle Integration findet man, wenn man $t = 2z$, also $dt = 2dz$ setzt,

$$\int_0^t t \sin\left(\frac{t}{2}\right) dt = 4 \int_0^z z \sin z \, dz = 4(-z \cos z + \sin z),$$

$$\int_0^t \sin t \sin\left(\frac{t}{2}\right) dt = 4 \int_0^z \sin^2 z \cos z \, dz = \frac{4}{3} \sin^3 z,$$

folglich wird

$$(59.) \quad \xi = \frac{2a^2}{s} \left[-2t \cos\left(\frac{t}{2}\right) + 4 \sin\left(\frac{t}{2}\right) - \frac{4}{3} \sin^3\left(\frac{t}{2}\right) \right] \\
= \frac{a \left[-3t \cos\left(\frac{t}{2}\right) + 6 \sin\left(\frac{t}{2}\right) - 2 \sin^3\left(\frac{t}{2}\right) \right]}{3 \left[1 - \cos\left(\frac{t}{2}\right) \right]}.$$

Schließlich ist

$$\eta = \frac{1}{s} \int_0^x y ds = \frac{2a^2}{s} \int_0^t (1 - \cos t) \sin\left(\frac{t}{2}\right) dt = \frac{8a^2}{s} \int_0^z \sin^3 z dz \\
= -\frac{8a^3}{s} \int_0^z (1 - \cos^2 z) d(\cos z) = -\frac{8a^2}{s} \left[\cos z - \frac{1}{3} \cos^3 z \right]_0^z;$$

dies gibt

$$(60.) \quad \eta = \frac{8a^2}{3s} (2 - 3 \cos z + \cos^3 z) = \frac{8a^2}{3s} (1 - \cos z)^2 (2 + \cos z) \\
= \frac{2a}{3} \left[1 - \cos\left(\frac{t}{2}\right) \right] \cdot \left[2 + \cos\left(\frac{t}{2}\right) \right].$$

Aus Gleichung (60.) folgt für die Oberfläche der vom Bogen OP bei der Rotation um die X -Achse beschriebenen Rotationsfläche (vergl. Aufgabe 8 in § 31)

$$(61.) \quad O = 2\eta\pi \cdot s = \frac{16a^2\pi}{3} \left[1 - \cos\left(\frac{t}{2}\right) \right]^2 \left[2 + \cos\left(\frac{t}{2}\right) \right].$$

Für diese Fläche wird nach Formel Nr. 238 der Tabelle

$$\xi = \frac{2\pi}{O} \int_0^x xy ds = \frac{4a^3\pi}{O} \int_0^t (t - \sin t)(1 - \cos t) \sin\left(\frac{t}{2}\right) dt \\
= \frac{4a^3\pi}{O} \int_0^t t(1 - \cos t) \sin\left(\frac{t}{2}\right) dt - \frac{4a^3\pi}{O} \int_0^t \sin t(1 - \cos t) \sin\left(\frac{t}{2}\right) dt.$$

Wenn man wieder $t = 2z$ setzt, so findet man durch partielle Integration

$$\begin{aligned}
 \int_0^t (1 - \cos t) \sin\left(\frac{t}{2}\right) dt &= 8 \int_0^z z \sin^3 z dz = -8z \left(\cos z - \frac{1}{3} \cos^3 z \right) \\
 &\quad + \frac{8}{3} \int_0^z (3 \cos z - \cos^3 z) dz, \\
 &= -\frac{8z}{3} \cos z (3 - \cos^2 z) + 8 \sin z - \frac{8}{3} \left(\sin z - \frac{1}{3} \sin^3 z \right) \\
 &= -\frac{8z}{3} \cos z (3 - \cos^2 z) + \frac{16}{3} \sin z + \frac{8}{9} \sin^3 z,
 \end{aligned}$$

$$\int_0^t \sin t (1 - \cos t) \sin\left(\frac{t}{2}\right) dt = 8 \int_0^z \sin^4 z \cos z dz = \frac{8}{5} \sin^5 z,$$

folglich wird

$$\xi = \frac{4a^3\pi}{O} \left[-\frac{8z}{3} \cos z (3 - \cos^2 z) + \frac{16}{3} \sin z + \frac{8}{9} \sin^3 z - \frac{8}{5} \sin^5 z \right],$$


also

$$\begin{aligned}
 a \left[-t \cos\left(\frac{t}{2}\right) \left\{ 3 - \cos^2\left(\frac{t}{2}\right) \right\} + 2 \sin\left(\frac{t}{2}\right) \left\{ 2 + \frac{1}{3} \sin^2\left(\frac{t}{2}\right) - \frac{3}{5} \sin^4\left(\frac{t}{2}\right) \right\} \right] \\
 (62.) \xi = \frac{\quad}{\left[1 - \cos\left(\frac{t}{2}\right) \right]^2 \left[2 + \cos\left(\frac{t}{2}\right) \right]}
 \end{aligned}$$

Für $t = \pi$, d. h. für den Schwerpunkt der durch Rotation des halben Zykloidenbogens OH beschriebenen Oberfläche ergibt sich

$$(63.) \quad O = \frac{32a^2\pi}{3}, \quad \xi = \frac{26a}{15}.$$

Fig. 158.



Aufgabe 5. Durch die Gleichungen

$$(64.) \quad x = a \cos^3 t, \quad y = a \sin^3 t$$

ist die Astroide gegeben (vergl. Fig. 158); man soll die Koordinaten des Schwerpunktes berechnen:

- für die Fläche QAP ,
- für das Volumen des von

QAP bei der Rotation um die X -Achse beschriebenen Rotationskörpers,

c) für den Bogen PA ,

d) für die Oberfläche der vom Bogen PA bei der Rotation um die X -Achse beschriebenen Rotationsfläche.

Auflösung. Hier ist (vergl. Aufgabe 11 in § 19)

$$QAP = F = \int_x^a y dx = -3a^2 \int_t^0 \sin^4 t \cos^2 t dt,$$

also

$$(65.) \quad F = \frac{a^2}{16} [\sin t \cos t (8 \sin^4 t - 2 \sin^2 t - 3) + 3t],$$

und nach Formel Nr. 239 der Tabelle

$$\begin{aligned} \xi &= \frac{1}{F} \int_x^a xy dx = \frac{3a^3}{F} \int_0^t \sin^4 t \cos^2 t dt \\ &= \frac{3a^3}{F} \int_0^t \sin^4 t (1 - 2 \sin^2 t + \sin^4 t) d(\sin t) \\ &= \frac{3a^3}{F} \left(\frac{1}{5} \sin^5 t - \frac{2}{7} \sin^7 t + \frac{1}{9} \sin^9 t \right) \end{aligned}$$

also

$$(66.) \quad \xi = \frac{a^3}{105F} (63 \sin^5 t - 90 \sin^7 t + 35 \sin^9 t),$$

$$\begin{aligned} \eta &= \frac{1}{2F} \int_x^a y^2 dx = \frac{3a^3}{2F} \int_0^t \sin^7 t \cos^2 t dt \\ &= -\frac{3a^3}{2F} \int_0^t \cos^2 t (1 - 3 \cos^2 t + 3 \cos^4 t - \cos^6 t) d(\cos t) \\ &= -\frac{3a^3}{2F} \left[\frac{1}{3} \cos^3 t - \frac{3}{5} \cos^5 t + \frac{3}{7} \cos^7 t - \frac{1}{9} \cos^9 t \right]_0^t, \end{aligned}$$

also

$$(67.) \quad \eta = \frac{a^3}{210F} (16 - 105 \cos^3 t + 189 \cos^5 t - 135 \cos^7 t + 35 \cos^9 t).$$

Für $t = \frac{\pi}{2}$, d. h. für den Quadranten der Astroide,

wird

$$(68.) \quad F = \frac{3a^2\pi}{32}, \quad \xi = \frac{8a^3}{105F} = \frac{256a}{315\pi}, \quad \eta = \frac{16a^3}{210F} = \frac{256a}{315\pi}.$$

Aus Gleichung (67.) folgt für das Volumen des bei der Rotation um die X -Achse von der Fläche QAP beschriebenen Rotationskörpers (vergl. Aufgabe 11 in § 25)

$$(69.) \quad V = 2\eta\pi \cdot F \\ = \frac{a^3\pi}{105} (16 - 105\cos^3 t + 189\cos^5 t - 135\cos^7 t + 35\cos^9 t).$$

Für den Schwerpunkt dieses Körpers wird nach Formel Nr. 237 der Tabelle

$$\begin{aligned} \xi &= \frac{\pi}{V} \int_x^a xy^2 dx = -\frac{3a^4\pi}{V} \int_t^0 \sin^7 t \cos^5 t dt \\ &= -\frac{3a^4\pi}{V} \int_0^t \sin^7 t (1 - 2\sin^2 t + \sin^4 t) d(\sin t), \end{aligned}$$

also

$$(70.) \quad \begin{aligned} \xi &= \frac{3a^4\pi}{V} \left(\frac{1}{8} \sin^8 t - \frac{2}{10} \sin^{10} t + \frac{1}{12} \sin^{12} t \right) \\ &= \frac{a^4\pi}{40V} (15 \sin^8 t - 24 \sin^{10} t + 10 \sin^{12} t). \end{aligned}$$

Für $t = \frac{\pi}{2}$ wird

$$(71.) \quad V = \frac{16a}{105}, \quad \xi = \frac{a^4\pi}{40V} = \frac{21a}{128}.$$

Für den Bogen PA erhält man (vergl. Aufgabe 6 in § 27)

$$(72.) \quad s = \int_x^a \sqrt{dx^2 + dy^2} = 3a \int_0^t \sin t \cos t dt = \frac{3a}{2} \sin^2 t.$$

Der Schwerpunkt des Bogens hat nach Formel Nr. 240 der Tabelle die Koordinaten

$$(73.) \quad \xi = \frac{1}{s} \int_x^a x ds = \frac{3a^2}{s} \int_0^t \cos^4 t \sin t dt = -\frac{3a^2}{5s} [\cos^5 t]_0^t,$$

$$(74.) \quad \eta = \frac{1}{s} \int_x^a y ds = \frac{3a^2}{s} \int_0^t \sin^4 t \cos t dt = \frac{3a^2}{5s} \sin^5 t,$$

folglich wird

$$(73a.) \quad \xi = \frac{3a^2}{5s}(1 - \cos^5 t) = \frac{2a(1 - \cos^5 t)}{5(1 - \cos^2 t)} \\ = \frac{2a(1 + \cos t + \cos^2 t + \cos^3 t + \cos^4 t)}{5(1 + \cos t)},$$

$$(74a.) \quad \eta = \frac{3a^2}{5s} \sin^5 t = \frac{2a}{5} \sin^3 t.$$

Für $t = \frac{\pi}{2}$, d. h. für den Quadranten der Astroide, wird

$$(75.) \quad s = \frac{3a}{2}, \quad \xi = \frac{2a}{5}, \quad \eta = \frac{2a}{5}.$$

Aus Gleichung (74.) folgt für die Oberfläche der bei der Rotation um die X -Achse vom Bogen PA beschriebenen Rotationsfläche (vergl. Aufgabe 9 in § 31)

$$(76.) \quad O = 2\eta\pi \cdot s = \frac{6a^2\pi}{5} \sin^3 t.$$

Für den Schwerpunkt dieser Fläche erhält man nach Formel Nr. 238 der Tabelle

$$\bar{\xi} = \frac{2\pi}{O} \int_x^a xy ds = \frac{6a^3\pi}{O} \int_0^t \sin^4 t \cos^4 t dt \\ = \frac{6a^3\pi}{O} \int_0^t (\cos^4 t - 2\cos^6 t + \cos^8 t) dt,$$

also nach Formel Nr. 102 der Tabelle

$$(77.) \quad \bar{\xi} = \frac{6a^3\pi}{O} \left[\sin t \left(\frac{1}{8} \cos^7 t - \frac{3}{16} \cos^5 t + \frac{1}{64} \cos^3 t + \frac{3}{128} \cos t \right) + \frac{3t}{128} \right] \\ = \frac{5a}{\sin^3 t} \left[\sin t \left(\frac{1}{8} \cos^7 t - \frac{3}{16} \cos^5 t + \frac{1}{64} \cos^3 t + \frac{3}{128} \cos t \right) + \frac{3t}{128} \right].$$

Für $t = \frac{\pi}{2}$, d. h. für die von dem Quadranten der Astroide beschriebene Rotationsfläche erhält man daher

$$(78.) \quad O = \frac{6a^2\pi}{5}, \quad \bar{\xi} = \frac{15a\pi}{256}.$$

Handelt es sich um den Sektor AOB gleich S einer Kurve, deren Gleichung in Polarkoordinaten gegeben ist (vergl. Fig. 159), so wird nach Formel Nr. 134 der Tabelle

$$(79.) \quad S = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} r^2 d\varphi.$$

Der Flächeninhalt des unendlich kleinen Vierecks $PP_2P_3P_1$ (vergl. Fig. 160) ist gleich $r d\varphi \cdot dr$, wobei der Punkt P die Koordinaten

$$x = r \cos \varphi, \quad y = r \sin \varphi$$

Fig. 159.




Fig. 160.



hat. Da die Koordinaten des Schwerpunktes dieses unendlich kleinen Vierecks von x und y nur unendlich wenig verschieden sind, so sind seine statischen Momente in bezug auf die beiden Koordinaten-Achsen

$$(80.) \quad x r d\varphi dr = r^2 \cos \varphi d\varphi dr$$

und

$$(81.) \quad y r d\varphi dr = r^2 \sin \varphi d\varphi dr,$$

folglich hat der Schwerpunkt des ganzen Sektors die Koordinaten

$$(82.) \quad \begin{cases} \xi = \frac{1}{S} \int_{\alpha}^{\beta} \cos \varphi d\varphi \int_0^r r^2 dr = \frac{1}{3S} \int_{\alpha}^{\beta} r^3 \cos \varphi d\varphi, \\ \eta = \frac{1}{S} \int_{\alpha}^{\beta} \sin \varphi d\varphi \int_0^r r^2 dr = \frac{1}{3S} \int_{\alpha}^{\beta} r^3 \sin \varphi d\varphi. \end{cases}$$

Aufgabe 6. Durch die Gleichung

$$(83.) \quad r^2 = a^2 \cos(2\varphi)$$

ist die Lemniskate gegeben (vergleiche Fig. 161); man soll die Koordinaten des Schwerpunktes für den Quadranten $OAPQ$ berechnen.

Fig. 161.



Auflösung. Hier ist (vergl. Aufgabe 6 in § 22)

$$(84.) \quad S = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} r^2 d\varphi = \frac{a^2}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos(2\varphi) d\varphi = \frac{a^2}{4} [\sin(2\varphi)]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{a^2}{4},$$

$$\bar{\xi} = \frac{1}{3S} \int_0^{\frac{\pi}{4}} r^3 \cos \varphi d\varphi = \frac{a^3}{3S} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos(2\varphi) \sqrt{\cos(2\varphi)} \cos \varphi d\varphi.$$

Setzt man jetzt

$$(85.) \quad \sin \varphi = \frac{1}{\sqrt{2}} \sin t, \quad \text{also} \quad \cos \varphi d\varphi = \frac{1}{\sqrt{2}} \cos t dt,$$

so nimmt t alle Werte von 0 bis $\frac{\pi}{2}$ an, wenn φ die Werte von 0 bis $\frac{\pi}{4}$ durchläuft, denn $\sin \varphi$ durchläuft dann die Werte von 0 bis $\frac{1}{\sqrt{2}}$ und $\sin t$ die Werte von 0 bis 1.

Aus Gleichung (85.) folgt dann

$$\cos(2\varphi) = 1 - 2\sin^2 \varphi = 1 - \sin^2 t = \cos^2 t.$$

Dies gibt

$$\bar{\xi} = \frac{a^3}{3S\sqrt{2}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 t dt = \frac{a^3}{3S\sqrt{2}} \left[\frac{1}{4} \cos^3 t \sin t + \frac{3}{8} \cos t \sin t + \frac{3t}{8} \right]_0^{\frac{\pi}{2}},$$

also

$$(86.) \quad \bar{\xi} = \frac{a^3}{3S\sqrt{2}} \cdot \frac{3\pi}{16} = \frac{a\pi}{4\sqrt{2}};$$

$$\eta = \frac{1}{3S} \int_0^{\frac{\pi}{4}} r^3 \sin \varphi d\varphi = \frac{a^3}{3S} \int_0^{\frac{\pi}{4}} (2\cos^2 \varphi - 1)^{\frac{3}{2}} \sin \varphi d\varphi.$$

Hier setze man

$$(87.) \quad \sqrt{2} \cdot \cos \varphi = \frac{1}{\sin t}, \text{ also } \sin t = \frac{1}{\sqrt{2} \cdot \cos \varphi},$$

$$(88.) \quad 2\cos^2 \varphi - 1 = \frac{1}{\sin^2 t} - 1 = \frac{\cos^2 t}{\sin^2 t}, \quad \sin \varphi d\varphi = \frac{\cos t dt}{\sqrt{2} \cdot \sin^2 t},$$

dann nimmt t alle Werte von $\frac{\pi}{4}$ bis $\frac{\pi}{2}$ an, wenn φ die Werte von 0 bis $\frac{\pi}{4}$ durchläuft, denn $\cos \varphi$ durchläuft dann alle Werte von 1 bis $\frac{1}{\sqrt{2}}$, also $\sin t$ alle Werte von $\frac{1}{\sqrt{2}}$ bis 1. Dies gibt

$$\eta = \frac{a^3}{3S\sqrt{2}} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos^4 t dt}{\sin^5 t} = \frac{a^3}{3S\sqrt{2}} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{1}{\sin^5 t} - \frac{2}{\sin^3 t} + \frac{1}{\sin t} \right) dt.$$

Deshalb wird nach den Formeln Nr. 106 und 47 der Tabelle

$$\begin{aligned} \eta &= \frac{a^3}{3S\sqrt{2}} \left[-\frac{\cos t}{4\sin^4 t} + \frac{5\cos t}{8\sin^2 t} + \frac{3}{8} \ln \operatorname{tg}\left(\frac{t}{2}\right) \right]_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \\ &= \frac{a^3}{3S\sqrt{2}} \left[\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{5}{4\sqrt{2}} - \frac{3}{8} \ln \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{8}\right) \right] \\ &= \frac{a^3}{3S\sqrt{2}} \left[-\frac{1}{4\sqrt{2}} - \frac{3}{8} \ln(-1 + \sqrt{2}) \right], \end{aligned}$$

also

$$\begin{aligned} (89.) \quad \eta &= \frac{a}{3} \left[-\frac{1}{2} - \frac{3}{2\sqrt{2}} \ln(-1 + \sqrt{2}) \right] \\ &= a \left[\frac{1}{2\sqrt{2}} \ln(1 + \sqrt{2}) - \frac{1}{6} \right]. \end{aligned}$$

Aufgabe 7. Durch die Gleichung

$$(90.) \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

ist ein *dreiaxsiges Ellipsoid* gegeben; man soll die Koordinaten des Schwerpunktes von einem Oktanten des Ellipsoids berechnen.

Auflösung. Zerlegt man den Körper durch Schnitte, senkrecht zur X -Achse, in unendlich viele, unendlich dünne Schichten, so ist ein solcher Schnitt eine Ellipse mit der Gleichung

$$(91.) \quad \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = \frac{a^2 - x^2}{a^2}, \text{ oder } \frac{a^2 y^2}{b^2(a^2 - x^2)} + \frac{a^2 z^2}{c^2(a^2 - x^2)} = 1.$$

und die Fläche des Ellipsen-Quadranten mit den Halbachsen

$$(92.) \quad a_1 = \frac{b}{a} \sqrt{a^2 - x^2}, \quad b_1 = \frac{c}{a} \sqrt{a^2 - x^2}$$

ist

$$(93.) \quad F = \frac{a_1 b_1 \pi}{4} = \frac{bc(a^2 - x^2)\pi}{4a^2},$$

folglich ist (vergl. Aufgabe 2 in § 75)

$$(94.) \quad V = \frac{bc\pi}{4a^2} \int_0^a (a^2 - x^2) dx = \frac{bc\pi}{4a^2} \left[a^2 x - \frac{x^3}{3} \right]_0^a = \frac{abc\pi}{6}.$$

Das statische Moment einer solchen Schicht in bezug auf die YZ -Ebene ist

$$\frac{bcx(a^2 - x^2)\pi dx}{4a^2};$$

folglich wird

$$\xi = \frac{bc\pi}{4a^2 V} \int_0^a (a^2 x - x^3) dx = \frac{bc\pi}{4a^2 V} \left[\frac{a^2 x^2}{2} - \frac{x^4}{4} \right]_0^a,$$

also

$$(95.) \quad \xi = \frac{a^2 bc\pi}{16 V} = \frac{3a}{8}.$$

Ebenso findet man

$$(96.) \quad \eta = \frac{3b}{8}, \quad \zeta = \frac{3c}{8}.$$

Aufgabe 8. Durch die Gleichung.

$$(97.) \quad 2p(z - z_0) = y^2 - m^2 x^2$$

ist ein *hyperbolisches Paraboloid* gegeben; man soll die Koordinaten des Schwerpunktes für den Körper berechnen, der oben durch diese Fläche, unten durch die XY -Ebene, seitlich durch den Zylinder mit der Gleichung

$$(98.) \quad x^2 + y^2 = a^2$$

und durch die XZ -Ebene, bzw. YZ -Ebene begrenzt ist. Dabei sei z_0 so groß gewählt, daß die von dem Kreiszylinder eingeschlossene Fläche oberhalb der XY -Ebene liegt.

Auflösung. Hier ist

$$V = \int_{x_1}^{x_2} \int_{y_1}^{y_2} z dy = \frac{1}{2p} \int_{x_1}^{x_2} \int_{y_1}^{y_2} (2pz_0 + y^2 - m^2 x^2) dy,$$

oder, wenn man ebene Polarkoordinaten einführt, nach Formel Nr. 214 der Tabelle

$$\begin{aligned} V &= \frac{1}{2p} \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^a (2pz_0 + r^2 \sin^2 \varphi - m^2 r^2 \cos^2 \varphi) r dr \\ &= \frac{1}{2p} \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \left[2pz_0 \frac{r^2}{2} + \frac{r^4}{4} (\sin^2 \varphi - m^2 \cos^2 \varphi) \right]_0^a \\ &= \frac{a^2}{8p} \int_0^{\frac{\pi}{2}} [4pz_0 + a^2 (\sin^2 \varphi - m^2 \cos^2 \varphi)] d\varphi \\ &= \frac{a^2}{8p} \left[4pz_0 \varphi + \frac{a^2}{2} (-1 - m^2) \sin \varphi \cos \varphi + \frac{a^2}{2} (1 - m^2) \varphi \right]_0^{\frac{\pi}{2}}, \end{aligned}$$

also

$$(99.) \quad V = \frac{a^2 \pi}{32p} [8pz_0 + (1 - m^2)a^2].$$

Ferner ist nach Formel Nr. 234 der Tabelle

$$\bar{\xi} = \frac{1}{2pV} \int_{x_1}^{x_2} x dx \int_{y_1}^{y_2} (2pz_0 + y^2 - m^2 x^2) dy,$$

oder nach Formel Nr. 214 der Tabelle

$$\begin{aligned}
\xi &= \frac{1}{2pV} \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^a (2pz_0 r^2 \cos \varphi + r^4 \sin^2 \varphi \cos \varphi - m^2 r^4 \cos^3 \varphi) dr \\
&= \frac{1}{2pV} \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \left[\frac{2pz_0 r^3 \cos \varphi}{3} + \frac{r^5}{5} (\sin^2 \varphi - m^2 \cos^2 \varphi) \cos \varphi \right]_0^a \\
&= \frac{a^3}{2pV} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left[\frac{2pz_0}{3} + \frac{a^2}{5} (\sin^2 \varphi - m^2 + m^2 \sin^2 \varphi) \right] \cos \varphi d\varphi \\
&= \frac{a^3}{2pV} \left[\left(\frac{2pz_0}{3} - \frac{a^2 m^2}{5} \right) \sin \varphi + \frac{a^2}{15} (1 + m^2) \sin^3 \varphi \right]_0^{\frac{\pi}{2}} \\
&= \frac{a^3}{30pV} [10pz_0 + a^2(1 - 2m^2)],
\end{aligned}$$

also

$$(100.) \quad \xi = \frac{16a[10pz_0 + (1 - 2m^2)a^2]}{15\pi[8pz_0 + (1 - m^2)a^2]};$$

$$\eta = \frac{1}{2pV} \int_{x_1}^{x_2} dx \int_{y_1}^{y_2} (2pz_0 y + y^3 - m^2 x^2 y) dy,$$

oder nach Formel Nr. 214 der Tabelle

$$\begin{aligned}
\eta &= \frac{1}{2pV} \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^a (2pz_0 r^2 \sin \varphi + r^4 \sin^3 \varphi - m^2 r^4 \cos^2 \varphi \sin \varphi) dr \\
&= \frac{1}{2pV} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \varphi d\varphi \left[\frac{2pz_0 r^3}{3} + \frac{r^5}{5} (\sin^2 \varphi - m^2 \cos^2 \varphi) \right]_0^a \\
&= \frac{a^3}{30pV} \int_0^{\frac{\pi}{2}} [10pz_0 + 3a^2(1 - \cos^2 \varphi - m^2 \cos^2 \varphi)] \sin \varphi d\varphi \\
&= \frac{a^3}{30pV} [-10pz_0 \cos \varphi - 3a^2 \cos \varphi + a^2(1 + m^2) \cos^3 \varphi]_0^{\frac{\pi}{2}} \\
&= \frac{a^3}{30pV} [10pz_0 + (2 - m^2)a^2],
\end{aligned}$$

also

$$(101.) \quad \eta = \frac{16a[10pz_0 + (2 - m^2)a^2]}{15\pi[8pz_0 + (1 - m^2)a^2]}.$$

Schließlich ist

$$\zeta = \frac{1}{V} \int_{x_1}^{x_2} dx \int_{y_1}^{y_2} \frac{z^2}{2} dy = \frac{1}{8p^2 V} \int_{x_1}^{x_2} dx \int_{y_1}^{y_2} (2pz_0 + y^2 - m^2 x^2)^2 dy,$$

also bei Einführung von ebenen Polarkoordinaten

$$\begin{aligned} \zeta &= \frac{1}{8p^2 V} \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^a [2pz_0 + r^2(\sin^2\varphi - m^2 \cos^2\varphi)]^2 r dr \\ &= \frac{1}{8p^2 V} \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^a [4p^2 z_0^2 r + 4pz_0 r^3(\sin^2\varphi - m^2 \cos^2\varphi) \\ &\quad + r^5(\sin^2\varphi - m^2 \cos^2\varphi)^2] dr \\ &= \frac{1}{8p^2 V} \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \left[2p^2 z_0^2 a^2 + pz_0 a^4(\sin^2\varphi - m^2 \cos^2\varphi) \right. \\ &\quad \left. + \frac{a^6}{6}(\sin^2\varphi - m^2 \cos^2\varphi)^2 \right]. \end{aligned}$$

Dabei ist

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin^2\varphi - m^2 \cos^2\varphi) d\varphi &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} [1 - (1 + m^2)\cos^2\varphi] d\varphi \\ &= \left[\varphi - \frac{1+m^2}{2} (\cos\varphi \sin\varphi + \varphi) \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{(1-m^2)\pi}{4}, \\ \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin^2\varphi - m^2 \cos^2\varphi)^2 d\varphi &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} [1 - (1 + m^2)\cos^2\varphi]^2 d\varphi \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} [1 - 2(1 + m^2)\cos^2\varphi + (1 + m^2)^2 \cos^4\varphi] d\varphi \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \left[\varphi - (1 + m^2)(\cos \varphi \sin \varphi + \varphi) + (1 + m^2)^2 \left(\frac{1}{4} \cos^3 \varphi \sin \varphi \right. \right. \\
&\quad \left. \left. + \frac{3}{8} \cos \varphi \sin \varphi + \frac{3}{8} \varphi \right) \right]_0^{\frac{\pi}{2}} \\
&= \frac{\pi}{2} \left[-m^2 + \frac{3}{8} (1 + m^2)^2 \right] = \frac{\pi}{16} (3 - 2m^2 + 3m^4),
\end{aligned}$$

folglich wird

$$\zeta = \frac{\pi}{8p^2 V} \left[p^2 z_0^2 a^2 + \frac{1-m^2}{4} p z_0 a^4 + \frac{1}{96} (3 - 2m^2 + 3m^4) a^6 \right],$$

also

$$(102.) \quad \zeta = \frac{96p^2 z_0^2 + 24(1-m^2)p z_0 a^2 + (3-2m^2+3m^4)a^4}{24p[8p z_0 + (1-m^2)a^2]}.$$

Aufgabe 9. Die Gleichung

$$(103.) \quad 2pz = x^2 - y^2$$

stellt ein *gleichseitiges hyperbolisches Paraboloid* dar; man soll die Koordinaten des Schwerpunktes für denjenigen Teil der Oberfläche berechnen, der von der *XZ*-Ebene, der *YZ*-Ebene und dem Zylinder

$$(104.) \quad x^2 + y^2 = a^2$$

begrenzt wird. (Vergl. Aufgabe 2 in § 81.)

Auflösung. Hier ist, wie schon in § 81 gezeigt wurde,

$$O = \frac{1}{p} \int_{x_1}^{x_2} dx \int_{y_1}^{y_2} dy \sqrt{p^2 + x^2 + y^2},$$

oder, wenn man ebene Polarkoordinaten einführt,

$$\begin{aligned}
(105.) \quad O &= \frac{1}{p} \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^a r dr \sqrt{p^2 + r^2} = \frac{1}{3p} [(p^2 + a^2)\sqrt{p^2 + a^2} - p^3] \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \\
&= \frac{\pi}{6p} [(p^2 + a^2)\sqrt{p^2 + a^2} - p^3].
\end{aligned}$$

Ferner ist nach Formel Nr. 235 der Tabelle

$$\zeta = \frac{1}{Op} \int_{x_1}^{x_2} dx \int_{y_1}^{y_2} dy \sqrt{p^2 + x^2 + y^2} = \frac{1}{Op} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \varphi d\varphi \int_0^a r^2 \sqrt{p^2 + r^2} dr.$$

Nun ist nach Formel Nr. 128 und 127 der Tabelle

$$\begin{aligned}\int_0^a r^2 \sqrt{p^2 + r^2} dr &= \left[\frac{r^3}{4} \sqrt{p^2 + r^2} \right]_0^a + \frac{p^2}{4} \int_0^a \frac{r^2 dr}{\sqrt{p^2 + r^2}} \\ &= \frac{a^3}{4} \sqrt{p^2 + a^2} + \frac{p^2}{4} \left[\frac{r}{2} \sqrt{p^2 + r^2} - \frac{p^2}{2} \operatorname{Ar} \sin \left(\frac{r}{p} \right) \right]_0^a \\ &= \frac{a}{8} (2a^2 + p^2) \sqrt{p^2 + a^2} - \frac{p^4}{8} \operatorname{Ar} \sin \left(\frac{a}{p} \right).\end{aligned}$$

Da

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \varphi d\varphi = [\sin \varphi]_0^{\frac{\pi}{2}} = 1$$

ist, so erhält man

$$\begin{aligned}(106.) \quad \xi &= \frac{1}{8Op} \left[a(2a^2 + p^2) \sqrt{p^2 + a^2} - p^4 \operatorname{Ar} \sin \left(\frac{a}{p} \right) \right] \\ &= \frac{3 \left[a(2a^2 + p^2) \sqrt{p^2 + a^2} - p^4 \operatorname{Ar} \sin \left(\frac{a}{p} \right) \right]}{4\pi [(p^2 + a^2) \sqrt{p^2 + a^2} - p^3]}\end{aligned}$$

Ferner ist

$$\eta = \frac{1}{Op} \int_{x_1}^{x_2} \int_{y_1}^{y_2} dy \sqrt{p^2 + x^2 + y^2} = \frac{1}{Op} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \varphi d\varphi \int_0^a r^2 \sqrt{p^2 + r^2} dr.$$

Da auch

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \varphi d\varphi = [-\cos \varphi]_0^{\frac{\pi}{2}} = 1$$

ist, so wird

$$(107.) \quad \eta = \xi.$$

Schließlich ist

$$\begin{aligned}\zeta &= \frac{1}{2Op^2} \int_{x_1}^{x_2} \int_{y_1}^{y_2} (x^2 - y^2) \sqrt{p^2 + x^2 + y^2} dy \\ &= \frac{1}{2Op^2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos^2 \varphi - \sin^2 \varphi) d\varphi \int_0^a r^3 \sqrt{p^2 + r^2} dr.\end{aligned}$$

Da

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos^2 \varphi - \sin^2 \varphi) d\varphi = \frac{1}{2} \int_{(0)}^{\left(\frac{\pi}{2}\right)} \cos(2\varphi) d(2\varphi) = \frac{1}{2} [\sin(2\varphi)]_0^{\frac{\pi}{2}} = 0$$

ist, so wird

$$(108.) \quad \zeta = 0.$$

Aufgabe 10. Man soll die Koordinaten des Schwerpunktes für denjenigen Teil der Kugeloberfläche

$$(109.) \quad x^2 + y^2 + z^2 - a^2 = 0$$

berechnen, der durch die ZX -Ebene und den Zylinder

$$(110.) \quad x^2 - ax + y^2 = 0$$

begrenzt wird und auf der positiven Seite der XY -Ebene liegt. (Vergl. Aufgabe 3 in § 81.)

Auflösung. Hier ist

$$O = a \int_0^a dx \int_0^{\sqrt{ax-x^2}} \frac{dy}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}},$$

oder bei Einführung ebener Polarkoordinaten

$$\begin{aligned} O &= a \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{a \cos \varphi} \frac{r dr}{\sqrt{a^2 - r^2}} = a \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \left[-\sqrt{a^2 - r^2} \right]_0^{a \cos \varphi} \\ &= a^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi (1 - \sin \varphi) = a^2 [\varphi + \cos \varphi]_0^{\frac{\pi}{2}}, \end{aligned}$$

also

$$(111.) \quad O = \frac{a^2}{2} (\pi - 2).$$

Ferner wird nach Formel Nr. 235 der Tabelle

$$\xi = \frac{a}{O} \int_0^a dx \int_0^{\sqrt{ax-x^2}} \frac{x dy}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} = \frac{a}{O} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \varphi d\varphi \int_0^{a \cos \varphi} \frac{r^2 dr}{\sqrt{a^2 - r^2}}.$$

Nun ist nach Formel Nr. 120 der Tabelle

$$\begin{aligned}
 (112.) \quad \int_0^{a \cos \varphi} \frac{r^2 dr}{\sqrt{a^2 - r^2}} &= \left[-\frac{r}{2} \sqrt{a^2 - r^2} + \frac{a^2}{2} \arcsin\left(\frac{r}{a}\right) \right]_0^{a \cos \varphi} \\
 &= \frac{a^2}{2} [-\cos \varphi \sin \varphi + \arcsin(\cos \varphi)] \\
 &= \frac{a^2}{2} \left(\frac{\pi}{2} - \varphi - \cos \varphi \sin \varphi \right),
 \end{aligned}$$

folglich ist

$$\begin{aligned}
 \xi &= \frac{a^3}{20} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{\pi}{2} \cos \varphi - \varphi \cos \varphi - \cos^2 \varphi \sin \varphi \right) d\varphi \\
 &= \frac{a^3}{20} \left[\frac{\pi}{2} \sin \varphi - \varphi \sin \varphi - \cos \varphi + \frac{1}{3} \cos^3 \varphi \right]_0^{\frac{\pi}{2}} \\
 &= \frac{a^3}{20} \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2} + \frac{2}{3} \right) = \frac{a^3}{30},
 \end{aligned}$$

also

$$(113.) \quad \xi = \frac{2a^3}{3a^2(\pi - 2)} = \frac{2a}{3(\pi - 2)};$$

$$\eta = \frac{a}{0} \int_0^a dx \int_0^{\sqrt{a^2 - x^2}} \frac{y dy}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} = \frac{a}{0} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \varphi d\varphi \int_0^{a \cos \varphi} \frac{r^2 dr}{\sqrt{a^2 - r^2}},$$

also nach Gleichung (112.)

$$\begin{aligned}
 \eta &= \frac{a^3}{20} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{\pi}{2} \sin \varphi - \varphi \sin \varphi - \sin^2 \varphi \cos \varphi \right) d\varphi \\
 &= \frac{a^3}{20} \left[-\frac{\pi}{2} \cos \varphi + \varphi \cos \varphi - \sin \varphi - \frac{1}{3} \sin^3 \varphi \right]_0^{\frac{\pi}{2}};
 \end{aligned}$$

dies gibt

$$(114.) \quad \eta = \frac{a^3}{20} \left(\frac{\pi}{2} - \frac{4}{3} \right) = \frac{a^3}{120} (3\pi - 8) = \frac{a(3\pi - 8)}{6(\pi - 2)}.$$

Schließlich ist

$$\begin{aligned}\xi &= \frac{a}{O} \int_0^a dx \int_0^{\sqrt{a^2-x^2}} \frac{z dy}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}} = \frac{a}{O} \int_0^a dx \int_0^{\sqrt{a^2-x^2}} dy \\ &= \frac{a}{O} \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{a \cos \varphi} r dr = \frac{a^3}{2O} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \varphi d\varphi,\end{aligned}$$

also

$$(115.) \quad \xi = \frac{a^3}{2O} \left[\frac{1}{2} \sin \varphi \cos \varphi + \frac{\varphi}{2} \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{a^3 \cdot \pi}{8O} = \frac{a \cdot \tau}{4(\pi - 2)}.$$

XV. Abschnitt.

Theorie der *Eulerschen* Integrale*).

§ 90.

Erklärung der *Eulerschen* Integrale erster und zweiter Gattung.

(Vergl. die Formel-Tabelle Nr. 244 bis 247.)

Die „*Betafunktion*“, auch „*Eulersches* Integral *erster* Gattung“ genannt, wird erklärt durch die Gleichung

$$(1.) \quad B(p, q) = \int_0^1 x^{p-1} (1-x)^{q-1} dx;$$

die „*Gammafunktion*“, auch „*Eulersches* Integral *zweiter* Gattung“ genannt, wird erklärt durch die Gleichung

$$(2.) \quad \Gamma(p) = \int_0^{\infty} e^{-x} x^{p-1} dx^{**}.$$

Da die Funktionen $x^{p-1}(1-x)^{q-1}$ und $e^{-x}x^{p-1}$, die in den Gleichungen (1.) und (2.) unter dem Integralzeichen stehen, für alle Werte von x zwischen den Integrationsgrenzen positiv sind, so müssen auch $B(p, q)$ und $\Gamma(p)$ stets positiv sein. Als Veränderliche der Funktion $B(p, q)$ treten die Parameter p und q auf, bei der Funktion $\Gamma(p)$ ist der Parameter p die Veränderliche. Dabei möge vorausgesetzt werden, daß p und q größer als Null sind; dann soll bewiesen werden, daß die beiden Integrale stets einen endlichen Wert besitzen, daß also beide Funktionen für positive Werte ihrer Veränderlichen endlich und stetig sind.

*) Der Anfänger darf diesen Abschnitt übergehen.

**) *Gauß* bezeichnet die Funktion $\Gamma(1+x)$ mit $\Pi(x)$.

Das ist ohne weiteres einzusehen, sobald p und q gleich 1 oder größer als 1 sind, da in diesem Falle die Funktionen unter dem Integralzeichen endlich und stetig bleiben. Liegt aber p zwischen 0 und 1, so wird der Faktor

$$x^{p-1} = \frac{1}{x^{1-p}}$$

an der unteren Grenze der Integrale, d. h. für $x = 0$ unendlich. Liegt auch q zwischen 0 und 1, so wird der Faktor

$$(1-x)^{q-1} = \frac{1}{(1-x)^{1-q}}$$

an der oberen Grenze des Integrals, d. h. für $x = 1$, unendlich. Trotzdem behält $B(p, q)$ einen endlichen Wert, wie sogleich bewiesen werden soll. Zerlegt man nämlich das durch Gleichung (1.) erklärte Integral in die Summe

$$(3.) \quad B(p, q) = \int_0^a x^{p-1}(1-x)^{q-1} dx + \int_a^1 x^{p-1}(1-x)^{q-1} dx,$$

wo a irgendeine Zahl zwischen 0 und 1 sein möge, so kann man zunächst zeigen, daß das erste Integral auf der rechten Seite dieser Gleichung endlich bleibt. Zu diesem Zwecke entwickle man $(1-x)^{q-1}$ nach dem binomischen Lehrsatz. Dadurch erhält man, solange $x < 1$ ist, d. h. für das ganze Integrationsgebiet des ersten Integrals

$$x^{p-1}(1-x)^{q-1} = x^{p-1} - \binom{q-1}{1} x^p + \binom{q-1}{2} x^{p+1} - + \dots,$$

also

$$\int x^{p-1}(1-x)^{q-1} dx = \frac{x^p}{p} - \binom{q-1}{1} \frac{x^{p+1}}{p+1} + \binom{q-1}{2} \frac{x^{p+2}}{p+2} - + \dots$$

Da nach Voraussetzung p positiv ist, so verschwindet dieser Ausdruck für $x = 0$.

Zum Beweise der Endlichkeit des zweiten Integrals braucht man unter dem Integralzeichen nur die Substitution

$$x = 1 - z, \quad \text{also} \quad 1 - x = z, \quad dx = -dz,$$

auszuführen, dann wird

$$\int_a^1 x^{p-1}(1-x)^{q-1} dx = - \int_{1-a}^0 (1-z)^{p-1} z^{q-1} dz = \int_0^{1-a} z^{q-1}(1-z)^{p-1} dz.$$

Die Endlichkeit dieses Integrals folgt aber sogleich durch Wiederholung der vorhin ausgeführten Schlüsse nach Vertauschung von x mit z und von p mit q .

Die Funktion $B(p, q)$ erhält also für alle positiven Werte von p und q einen *endlichen* positiven Wert.

Dasselbe gilt für die Funktion $\Gamma(p)$. Liegt p zwischen 0 und 1, so wird die Funktion $e^{-x}x^{p-1}$ unter dem Integralzeichen zwar an der unteren Grenze, d. h. für $x=0$, *unendlich*, aber das Integral behält trotzdem einen endlichen Wert. Entwickelt man nämlich e^{-x} nach steigenden Potenzen von x , so erhält man

$$e^{-x}x^{p-1} = x^{p-1} - \frac{x^p}{1!} + \frac{x^{p+1}}{2!} - \frac{x^{p+2}}{3!} + \dots,$$

eine Entwicklung, die für alle endlichen Werte von x giltig ist. Daraus folgt

$$\int e^{-x}x^{p-1}dx = \frac{x^p}{p} - \frac{x^{p+1}}{1!(p+1)} + \frac{x^{p+2}}{2!(p+2)} - + \dots$$

Da p nach Voraussetzung positiv ist, so verschwindet dieser Ausdruck für $x=0$.

Hier könnte sich eine Schwierigkeit daraus ergeben, daß das Integrationsintervall sich ins Unendliche erstreckt. Aber man sieht leicht, daß das Integral auch dabei seinen Sinn behält, denn es ist bekanntlich (vergl. D.-R., 12. Auflage, § 69)

$$\lim_{x=\infty} \frac{x^{p+1}}{e^x} = 0,$$

folglich kann man eine Zahl a so bestimmen, daß $e^x > x^{p+1}$ wird für $x \geq a$. Dies gibt

$$e^{-x} = \frac{1}{e^x} < \frac{1}{x^{p+1}} = x^{-p-1},$$

also

$$e^{-x} \cdot x^{p-1} < x^{-2}.$$

Zerlegt man jetzt das Integral in eine Summe von zwei Integralen, von denen das eine über das Intervall von 0 bis a und das andere über das Intervall von a bis ∞ erstreckt wird, setzt man also

$$\int_0^{\infty} e^{-x} x^{p-1} dx = \int_0^a e^{-x} x^{p-1} dx + \int_a^{\infty} e^{-x} x^{p-1} dx,$$

so bleibt das erste Integral auf der rechten Seite dieser Gleichung sicher endlich, und für das zweite erhält man

$$\int_a^{\infty} e^{-x} x^{p-1} dx < \int_a^{\infty} x^{-2} dx = \left[-\frac{1}{x} \right]_a^{\infty} = +\frac{1}{a},$$

folglich hat $\Gamma(p)$ einen endlichen, positiven Wert, solange $p > 0$ ist.

Durch geeignete Substitution kann man dem Integral, das die Funktion $B(p, q)$ erklärt, eine Gestalt geben, die zeigt, daß die Betafunktion in bezug auf die beiden Veränderlichen p und q symmetrisch ist. Zu diesem Zwecke setzt man

$$(4.) \quad x = \frac{t}{1+t}, \text{ also } 1-x = \frac{1}{1+t}, \quad t = \frac{x}{1-x}, \quad dx = \frac{dt}{(1+t)^2},$$

dann wird

$$(5.) \quad B(p, q) = \int_0^{\infty} \frac{t^{p-1} dt}{(1+t)^{p+q}} = \int_0^1 \frac{t^{p-1} dt}{(1+t)^{p+q}} + \int_1^{\infty} \frac{t^{p-1} dt}{(1+t)^{p+q}}.$$

Setzt man noch

$$t = \frac{1}{u}, \quad \text{also} \quad dt = -\frac{du}{u^2},$$

so wird

$$\int_1^{\infty} \frac{t^{p-1} dt}{(1+t)^{p+q}} = - \int_1^0 \frac{u^{q-1} du}{(1+u)^{p+q}} = \int_0^1 \frac{t^{q-1} dt}{(1+t)^{p+q}},$$

folglich wird

$$(6.) \quad B(p, q) = \int_0^1 \frac{(t^{p-1} + t^{q-1}) dt}{(1+t)^{p+q}}.$$

Da sich das Integral auf der rechten Seite dieser Gleichung nicht ändert, wenn man p mit q vertauscht, so erhält man

$$(7.) \quad B(p, q) = B(q, p).$$

Die durch Gleichung (7.) gegebene Beziehung könnte man dazu benutzen, die Untersuchung der Eigenschaften der Betafunktion zu vereinfachen. Es gelingt aber, diese Untersuchung ganz zu vermeiden, denn die folgende Überlegung zeigt, daß sich die Betafunktion in sehr einfacher Weise durch Gammafunktionen ausdrücken läßt. Setzt man nämlich

$$(8.) \quad x = az, \quad \text{also} \quad dx = a dz,$$

wobei $a > 1$ sein möge, so erhält man aus Gleichung (2.)

$$(9.) \quad \Gamma(p) = a^p \int_0^{\infty} e^{-az} z^{p-1} dz,$$

oder

$$\frac{1}{a^p} = \frac{1}{\Gamma(p)} \int_0^{\infty} e^{-az} z^{p-1} dz.$$

Vertauscht man in dieser Gleichung a mit $1+x$ und p mit $p+q$, so erhält man

$$\frac{1}{(1+x)^{p+q}} = \frac{1}{\Gamma(p+q)} \int_0^{\infty} e^{-(1+x)z} z^{p+q-1} dz,$$

und wenn man beide Seiten dieser Gleichung mit $x^{p-1} dx$ multipliziert und dann beide Seiten der Gleichung in bezug auf x zwischen den Grenzen 0 und x_1 integriert,

$$(10.) \quad \int_0^{x_1} \frac{x^{p-1} dx}{(1+x)^{p+q}} = \frac{1}{\Gamma(p+q)} \int_0^{x_1} dx \int_0^{\infty} x^{p-1} e^{-(1+x)z} z^{p+q-1} dz.$$

Da die Grenzen des Doppelintegrals auf der rechten Seite dieser Gleichung konstant sind, so darf man die Reihenfolge der Integration umkehren, ohne daß man die Integrationsgrenzen zu ändern hat. Dadurch erhält man

$$(11.) \quad \int_0^{x_1} \frac{x^{p-1} dx}{(1+x)^{p+q}} = \frac{1}{\Gamma(p+q)} \int_0^{\infty} e^{-z} z^{p+q-1} dz \int_0^{x_1} x^{p-1} e^{-xz} dx.$$

Nun ist aber nach Gleichung (5.)

$$\lim_{x_1=\infty} \int_0^{x_1} \frac{x^{p-1} dx}{(1+x)^{p+q}} = \int_0^{\infty} \frac{x^{p-1} dx}{(1+x)^{p+q}} = B(p, q)$$

und nach Gleichung (9.)

$$\begin{aligned} \lim_{x_1=\infty} \int_0^{x_1} x^{p-1} e^{-xz} dx &= \int_0^{\infty} e^{-xz} x^{p-1} dx \\ &= \frac{1}{z^p} \int_0^{\infty} e^{-(xz)} (xz)^{p-1} d(xz) = \frac{\Gamma(p)}{z^p}, \end{aligned}$$

folglich geht Gleichung (11.) über in

$$(12.) \quad B(p, q) = \frac{\Gamma(p)}{\Gamma(p+q)} \int_0^{\infty} e^{-z} z^{q-1} dz = \frac{\Gamma(p) \Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}.$$

Die *Betafunktion* läßt sich also durch *Gammafunktion* darstellen, so daß man sich auf die Untersuchung der Gammafunktion beschränken darf.

§ 91.

Darstellung der Gammafunktion durch unendliche Produkte.

(Vergl. die Formel-Tabelle Nr. 248.)

Man kann die Gammafunktion, wie *Gauß* gezeigt hat, auch als unendliches Produkt darstellen. Setzt man nämlich

$$u = \left(1 - \frac{x}{m}\right)^m,$$

oder, wenn man m mit $\frac{1}{n}$ vertauscht,

$$u = \sqrt[n]{1 - nx}, \quad \ln u = \frac{\ln(1 - nx)}{n}.$$

so wird

$$\lim_{m=\infty} (\ln u) = \lim_{n=0} \frac{\ln(1 - nx)}{n} = \frac{0}{0} = \lim_{n=0} \frac{-x}{1 - nx} = -x,$$

folglich ist, da $\lim_{m=\infty} (\ln u) = \ln(\lim_{m=\infty} u)$ wird,

$$(1.) \quad \lim_{m=\infty} u = \lim_{m=\infty} \left(1 - \frac{x}{m}\right)^m = e^{-x}.$$

Bildet man daher $\int_0^m \left(1 - \frac{x}{m}\right)^m x^{p-1} dx$, so muß der Grenzwert, dem sich dieser Ausdruck für $\lim m = \infty$ nähert, falls er endlich ist, gleich $\int_0^\infty e^{-x} x^{p-1} dx$ sein, d. h. es wird

$$(2.) \quad \lim_{m=\infty} \int_0^m \left(1 - \frac{x}{m}\right)^m x^{p-1} dx = \int_0^\infty e^{-x} x^{p-1} dx,$$

und dies ist nach der Erklärung die Funktion $\Gamma(p)$.

Nun ist nach Formel Nr. 195 der Tabelle (vergl. Aufgabe 4 in § 64) unter der Voraussetzung, daß m eine positive ganze Zahl ist,

$$(3.) \quad \int_0^m \left(1 - \frac{x}{m}\right)^m x^{p-1} dx = \frac{m! m^p}{p(p+1)(p+2)\dots(p+m)},$$

folglich ist

$$(4.) \quad \Gamma(p) = \lim_{m=\infty} \frac{m! m^p}{p(p+1)(p+2)\dots(p+m)},$$

oder, wenn man Zähler und Nenner durch $m!$ dividiert,

$$(5.) \quad \Gamma(p) = \lim_{m=\infty} \frac{m^p}{p\left(1 + \frac{p}{1}\right)\left(1 + \frac{p}{2}\right)\left(1 + \frac{p}{3}\right)\dots\left(1 + \frac{p}{m}\right)}$$

eine Darstellung für $\Gamma(p)$, vorausgesetzt, daß dieser Ausdruck für jedes positive p bei $\lim m = \infty$ sich einem bestimmten endlichen Werte nähert.

Der Beweis, daß dieses Produkt auch für unendlich große Werte von m einen endlichen Wert besitzt, wird erst in § 93 erbracht werden.

Man kann Gleichung (4.) noch auf eine andere Form bringen, wenn man beachtet, daß

$$\begin{aligned} m^p &= \binom{2}{1}^{p-1} \binom{3}{2}^{p-1} \dots \binom{m}{m-1}^{p-1} \cdot m \\ &= \left(1 + \frac{1}{1}\right)^{p-1} \left(1 + \frac{1}{2}\right)^{p-1} \dots \left(1 + \frac{1}{m-1}\right)^{p-1} \cdot m \end{aligned}$$

und

$$\begin{aligned}
 p(p+1)(p+2)\dots(p+m) \\
 &= (1+p-1)(2+p-1)(3+p-1)\dots(m+1+p-1) \\
 &= (m+1)! \left(1+\frac{p-1}{1}\right) \left(1+\frac{p-1}{2}\right) \left(1+\frac{p-1}{3}\right) \dots \left(1+\frac{p-1}{m+1}\right)
 \end{aligned}$$

wird: denn dadurch erhält man

$$\begin{aligned}
 (6.) \quad & \frac{m! m^p}{p(p+1)(p+2)\dots(p+m)} \\
 &= \frac{m \left(1+\frac{1}{1}\right)^{p-1} \left(1+\frac{1}{2}\right)^{p-1} \dots \left(1+\frac{1}{m-1}\right)^{p-1}}{(m+1) \left(1+\frac{p-1}{1}\right) \left(1+\frac{p-1}{2}\right) \dots \left(1+\frac{p-1}{m+1}\right)}
 \end{aligned}$$

Da nun

$$\begin{aligned}
 & \frac{m \left(1+\frac{1}{1}\right)^{p-1} \left(1+\frac{1}{2}\right)^{p-1} \dots \left(1+\frac{1}{m-1}\right)^{p-1}}{(m+1) \left(1+\frac{p-1}{1}\right) \left(1+\frac{p-1}{2}\right) \dots \left(1+\frac{p-1}{m+1}\right)} \\
 &= \frac{m}{(m+1) \left(1+\frac{p-1}{m}\right) \left(1+\frac{p-1}{m+1}\right)} \prod_{n=1}^{n=m-1} \left(\frac{\left(1+\frac{1}{n}\right)^{p-1}}{1+\frac{p-1}{n}} \right)
 \end{aligned}$$

ist, wo das Produktzeichen $\prod_{n=1}^{n=m-1}$ bedeutet, daß die Faktoren

$$\frac{\left(1+\frac{1}{n}\right)^{p-1}}{1+\frac{p-1}{n}} \quad \text{für alle Werte von } n=1 \text{ bis } n=m-1 \text{ zu}$$

bilden und miteinander zu multiplizieren sind, so folgt aus den Gleichungen (4.) und (6.)

$$\begin{aligned}
 \Gamma(p) &= \lim_{m=\infty} \frac{m}{(m+1) \left(1+\frac{p-1}{m}\right) \left(1+\frac{p-1}{m+1}\right)} \\
 &= \lim_{m=\infty} \prod_{n=1}^{n=m-1} \left(\frac{\left(1+\frac{1}{n}\right)^{p-1}}{1+\frac{p-1}{n}} \right),
 \end{aligned}$$

oder, da

$$\lim_{m=\infty} \frac{m}{(m+1) \left(1+\frac{p-1}{m}\right) \left(1+\frac{p-1}{m+1}\right)} = 1$$

ist,

$$(7.) \quad \Gamma(p) = \prod_{n=1}^{n=\infty} \left(\frac{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{p-1}}{1 + \frac{p-1}{n}} \right),$$

immer unter der Voraussetzung, daß dieses unendliche Produkt einen bestimmten, endlichen Wert hat.

§ 92.

Eigenschaften der Gammafunktion.

(Vergl. die Formel-Tabelle Nr. 249 bis 253.)

Aus der Erklärung der Gammafunktion durch das bestimmte Integral gelingt es, eine Reihe wichtiger Eigenschaften herzuleiten, die insbesondere für eine tabellenmäßige Berechnung der zu den einzelnen Werten der Veränderlichen p gehörigen Funktionswerte wesentliche Vereinfachungen herbeiführen.

Setzt man

$u = x^{p-1}$, $dv = e^{-x}dx$, also $du = (p-1)x^{p-2}dx$, $v = -e^{-x}$, so erhält man durch partielle Integration

$$\int_0^{\infty} e^{-x} x^{p-1} dx = [-e^{-x} x^{p-1}]_0^{\infty} + (p-1) \int_0^{\infty} e^{-x} x^{p-2} dx.$$

Dies gibt, wenn $p > 1$, also $p-1 > 0$ ist,

$$(1.) \quad \int_0^{\infty} e^{-x} x^{p-1} dx = (p-1) \int_0^{\infty} e^{-x} x^{p-2} dx,$$

oder

$$(1a.) \quad \Gamma(p) = (p-1)\Gamma(p-1).$$

Durch wiederholte Anwendung dieser Formel erhält man unter der Voraussetzung, daß n eine positive ganze Zahl ist, die kleiner bleibt als p ,

$$(2.) \quad \Gamma(p) = (p-1)(p-2)\dots(p-n)\Gamma(p-n).$$

Da

$$(3.) \quad \Gamma(1) = \int_0^{\infty} e^{-x} dx = [-e^{-x}]_0^{\infty} = 1$$

ist, so folgt für den Fall, wo p eine positive ganze Zahl ist, daß

$$(4.) \quad \Gamma(p) = (p-1)(p-2)\dots 3 \cdot 2 \cdot 1 = (p-1)!$$

ist. Die Gammafunktion darf deshalb als eine Verallgemeinerung der Fakultät in dem Sinne betrachtet werden, daß sie auch noch für positive Werte der Veränderlichen p erklärt ist, die von einer ganzen Zahl verschieden sind.

Für die Berechnung von $\Gamma(p)$ folgt aus Gleichung (2.), daß es genügt, $\Gamma(p)$ nur für diejenigen Werte von p zu ermitteln, welche zwischen 0 und 1 liegen, denn hat man die Werte von $\Gamma(p)$ für diese Werte von p gefunden, so ergeben sich aus Gleichung (2.) ohne weiteres auch alle übrigen Werte.

Aber dieses Intervall $0 < p < 1$ reduziert sich sofort noch weiter; denn liegt p zwischen 0 und 1, so folgt aus der Gleichung

$$B(p, q) = \frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)} = \int_0^{\infty} \frac{x^{p-1}dx}{(1+x)^{p+q}},$$

wenn man $q = 1-p$ setzt und die Formel Nr. 196 der Tabelle beachtet,

$$(5.) \quad B(p, 1-p) = \Gamma(p)\Gamma(1-p) = \int_0^{\infty} \frac{x^{p-1}dx}{1+x} = \frac{\pi}{\sin(p\pi)},$$

also

$$(6.) \quad \Gamma(1-p) = \frac{\pi}{\sin(p\pi)\Gamma(p)}.$$

Kennt man also die Werte von $\Gamma(p)$ für alle Werte von p , die zwischen 0 und $\frac{1}{2}$ liegen, so kennt man sie auch für die Werte von p , die zwischen $\frac{1}{2}$ und 1 liegen.

Nach Gleichung (1a.) ist, wenn man p mit $1+p$ vertauscht, $\Gamma(1+p) = p\Gamma(p)$, folglich geht Gleichung (6.) über in

$$(6a.) \quad \Gamma(1+p)\Gamma(1-p) = \frac{p\pi}{\sin(p\pi)}.$$

Für $p = \frac{1}{2}$ folgt aus Gleichung (5.)

$$(7.) \quad \Gamma\left(\frac{1}{2}\right)\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \pi, \quad \text{also} \quad \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi},$$

und zwar ist die Wurzel mit positivem Zeichen zu nehmen, weil $\Gamma(p)$, wie früher gezeigt wurde, nur positive Werte besitzt, solange $p > 0$ ist.

Setzt man in der Gleichung

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \int_0^{\infty} e^{-x} \frac{dx}{\sqrt{x}} = \sqrt{\pi}$$

die Veränderliche

$$x = t^2, \quad \text{also} \quad \sqrt{x} = t, \quad dx = 2t dt,$$

so erhält man

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = 2 \int_0^{\infty} e^{-t^2} dt = \sqrt{\pi},$$

eine Gleichung, die mit Formel Nr. 215 der Tabelle übereinstimmt.

Aus der Gleichung

$$B(p, q) = \frac{\Gamma(p) \Gamma(q)}{\Gamma(p+q)} = \int_0^1 x^{p-1} (1-x)^{q-1} dx$$

folgt, wenn man $p = q$ setzt,

$$\begin{aligned} (8.) \quad B(p, p) &= \frac{\Gamma(p) \Gamma(p)}{\Gamma(2p)} = \int_0^1 (x - x^2)^{p-1} dx \\ &= \frac{1}{2^{2p-2}} \int_0^1 [1 - (1-2x)^2]^{p-1} dx. \end{aligned}$$

Auf dieses Integral wende man die Substitution

$$1 - 2x = \pm \sqrt{z}, \quad \text{also} \quad -2dx = \pm \frac{dz}{2\sqrt{z}}$$

an, wobei offenbar das obere Zeichen gewählt werden muß, wenn x zwischen 0 und $\frac{1}{2}$ liegt, das untere dagegen, wenn x zwischen $\frac{1}{2}$ und 1 liegt. Daraus folgt

$$\begin{aligned} (9.) \quad B(p, p) &= \frac{1}{2^{2p-2}} \int_0^{\frac{1}{2}} [1 - (1-2x)^2]^{p-1} dx + \frac{1}{2^{2p-2}} \int_{\frac{1}{2}}^1 [1 - (1-2x)^2]^{p-1} dx \\ &= -\frac{1}{2^{2p}} \int_1^0 \frac{(1-z)^{p-1} dz}{\sqrt{z}} + \frac{1}{2^{2p}} \int_0^1 \frac{(1-z)^{p-1} dz}{\sqrt{z}} \\ &= \frac{1}{2^{2p-1}} \int_0^1 z^{-\frac{1}{2}} (1-z)^{p-1} dz = \frac{1}{2^{2p-1}} B\left(\frac{1}{2}, p\right); \end{aligned}$$

oder

$$(10.) \quad \frac{\Gamma(p)\Gamma(p)}{\Gamma(2p)} = \frac{1}{2^{2p-1}} \frac{\Gamma(\frac{1}{2})\Gamma(p)}{\Gamma(p+\frac{1}{2})},$$

also mit Rücksicht auf Gleichung (7.)

$$(11.) \quad \Gamma(p)\Gamma(p+\frac{1}{2}) = \frac{\sqrt{\pi}}{2^{2p-1}} \Gamma(2p).$$

§ 93.

Berechnung von $\ln \Gamma(p)$.

(Vergl. die Formel-Tabelle Nr. 254 bis 256.)

Zur Berechnung von $\Gamma(p)$ für $0 < p < 1$ verwende man den Grenzwert des Ausdrucks der Formel Nr. 248 der Tabelle, nämlich die Formel

$$(1.) \quad \Gamma(p) = \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{m^p}{p \left(1 + \frac{p}{1}\right) \left(1 + \frac{p}{2}\right) \cdots \left(1 + \frac{p}{m}\right)}.$$

Um diesen Ausdruck auf eine Form zu bringen, die für die Berechnung bequem ist, betrachte man das Produkt

$$(2.) \quad F(p) = \frac{m^p}{p \left(1 + \frac{p}{1}\right) \left(1 + \frac{p}{2}\right) \cdots \left(1 + \frac{p}{m}\right)},$$

worin m eine bestimmte, endliche Zahl ist. Bildet man

$$(3.) \quad \ln F(p) = p \ln m - \ln p - \ln \left(1 + \frac{p}{1}\right) - \ln \left(1 + \frac{p}{2}\right) \\ \cdots \cdots - \ln \left(1 + \frac{p}{m}\right),$$

so kann man $\ln \left(1 + \frac{p}{1}\right)$, $\ln \left(1 + \frac{p}{2}\right)$, $\cdots \ln \left(1 + \frac{p}{m}\right)$ mit Hilfe der Formel

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \cdots$$

(vergl. D.-R., 12. Auflage, Formel Nr. 102 der Tabelle) in Reihen entwickeln, die unbedingt konvergent sind, da $0 < p < 1$ ist. Dies gibt

$$\begin{aligned}
 (4.) \quad \ln F(p) = & p \ln m - \ln p - \frac{p}{1} + \frac{p^2}{2} - \frac{p^3}{3} + \frac{p^4}{4} - + \dots \\
 & - \frac{p}{2} + \frac{p^2}{2 \cdot 2^2} - \frac{p^3}{3 \cdot 2^3} + \frac{p^4}{4 \cdot 2^4} - + \dots \\
 & - \frac{p}{3} + \frac{p^2}{2 \cdot 3^2} - \frac{p^3}{3 \cdot 3^3} + \frac{p^4}{4 \cdot 3^4} - + \dots \\
 & \dots \dots \dots \\
 & - \frac{p}{m} + \frac{p^2}{2 \cdot m^2} - \frac{p^3}{3 \cdot m^3} + \frac{p^4}{4 \cdot m^4} - + \dots.
 \end{aligned}$$

Setzt man hierbei

$$(5.) \quad \left\{ \begin{aligned} S_1^{(m)} &= \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{m}, \\ S_2^{(m)} &= \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{m^2}, \\ S_3^{(m)} &= \frac{1}{1^3} + \frac{1}{2^3} + \frac{1}{3^3} + \dots + \frac{1}{m^3}, \\ &\dots \dots \dots \end{aligned} \right.$$

so geht Gleichung (4.) über in

$$(6.) \quad \ln F(p) = p \ln m - \ln p - p S_1^{(m)} + \frac{p^2}{2} S_2^{(m)} - \frac{p^3}{3} S_3^{(m)} + \dots,$$

und zwar ist diese Reihe für endliche Werte von m konvergent als Summe von m unbedingt konvergenten Reihen. Wächst jetzt m ins Unbegrenzte, so werden die Koeffizienten $S_1^{(m)}$ auf der rechten Seite von Gleichung (6.) selbst unendliche Reihen. Von diesen sind nun bekanntlich die Reihen

$$(7.) \quad \left\{ \begin{aligned} S_2 &= \lim_{m=\infty} S_2^{(m)} = \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots, \\ S_3 &= \lim_{m=\infty} S_3^{(m)} = \frac{1}{1^3} + \frac{1}{2^3} + \frac{1}{3^3} + \dots, \\ S_4 &= \lim_{m=\infty} S_4^{(m)} = \frac{1}{1^4} + \frac{1}{2^4} + \frac{1}{3^4} + \dots, \\ &\dots \dots \dots \end{aligned} \right.$$

konvergent, d. h. die Grenzwerte S_2, S_3, S_4, \dots der Koeffizienten $S_2^{(m)}, S_3^{(m)}, S_4^{(m)}, \dots$ auf der rechten Seite von Gleichung (6.) sind bestimmte, endliche Größen. Die Werte

der Summen S_2, S_3, \dots, S_{35} hat *Legendre* auf 16 Dezimalstellen ausgerechnet, und zwar ist

$$(8.) \begin{cases} S_2 = 1,644\,934, & S_3 = 1,202\,057, & S_4 = 1,082\,323, \\ S_5 = 1,036\,928, & S_6 = 1,017\,343, & S_7 = 1,008\,349, \\ S_8 = 1,004\,077, & S_9 = 1,002\,008, & S_{10} = 1,000\,995, \\ S_{11} = 1,000\,494, & S_{12} = 1,000\,246, & S_{13} = 1,000\,123, \\ S_{14} = 1,000\,061\,25, & S_{15} = 1,000\,030\,59, & S_{16} = 1,000\,015\,28. \end{cases}$$

Über die Abnahme der Summen S_2, S_3, S_4, \dots mit wachsendem Index gibt die folgende Überlegung Aufschluß. Es ist

$$S_{n+1} = 1 + \frac{1}{2^{n+1}} + \frac{1}{3^{n+1}} + \frac{1}{4^{n+1}} + \dots,$$

also

$$S_{n+1} - 1 < \frac{1}{2 \cdot 2^n} + \frac{1}{2 \cdot 3^n} + \frac{1}{2 \cdot 4^n} + \dots = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2^n} + \frac{1}{3^n} + \frac{1}{4^n} + \dots \right).$$

Dies gibt

$$(9.) \quad S_{n+1} - 1 < \frac{1}{2} (S_n - 1),$$

und man erkennt, wie sich auch schon aus der in den Gleichungen (8.) aufgeführten Tabelle ergibt, daß die Koeffizienten S_n mit wachsendem n abnehmen und sich schnell dem Grenzwerte 1 nähern.

Eine Schwierigkeit bringt der Koeffizient $S_1^{(m)}$ beim Grenzübergange mit sich, denn die *harmonische* Reihe

$$S_1 = \lim_{m=\infty} S_1^{(m)} = \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots$$

ist bekanntlich divergent; man kann aber nachweisen, daß $S_1^{(m)} - \ln m$ einen endlichen Wert behält, wenn m ins Unbegrenzte wächst, so daß man durch Zusammenfassen des ersten und dritten Gliedes auf der rechten Seite von Gleichung (6.) zu $p(\ln m - S_1^{(m)})$ an der Grenze einen endlichen Wert erhält. Zum Beweise beachte man, daß nach D.-R. (12. Auflage), Formel Nr. 105 der Tabelle

$$\ln(a+1) - \ln a = \frac{1}{a} - \frac{1}{2a^2} + \frac{1}{3a^3} - \frac{1}{4a^4} + \dots$$

ist; dies gibt, wenn man der Reihe nach $a = 1, 2, 3, \dots$ $m - 1, m$ setzt,

$$\ln 2 = \frac{1}{1} - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots,$$

$$\ln 3 - \ln 2 = \frac{1}{2} - \frac{1}{2 \cdot 2^2} + \frac{1}{3 \cdot 2^3} - \frac{1}{4 \cdot 2^4} + \dots,$$

$$\ln 4 - \ln 3 = \frac{1}{3} - \frac{1}{2 \cdot 3^2} + \frac{1}{3 \cdot 3^3} - \frac{1}{4 \cdot 3^4} + \dots,$$

$$\ln m - \ln(m-1) = \frac{1}{m-1} - \frac{1}{2(m-1)^2} + \frac{1}{3(m-1)^3} - \frac{1}{4(m-1)^4} + \dots,$$

$$\ln(m+1) - \ln m = \frac{1}{m} - \frac{1}{2m^2} + \frac{1}{3m^3} - \frac{1}{4m^4} + \dots$$

Durch Addition dieser Gleichungen findet man für endliche Werte von m

$$\ln(m+1) = S_1^{(m)} - \frac{1}{2} S_2^{(m)} + \frac{1}{3} S_3^{(m)} - \frac{1}{4} S_4^{(m)} + \dots$$

folglich wird

$$(10.) \quad S_1^{(m)} - \ln(m+1) = \frac{1}{2} S_2^{(m)} - \frac{1}{3} S_3^{(m)} + \frac{1}{4} S_4^{(m)} - + \dots$$

oder

$$(10a.) \quad S_1^{(m)} - \ln m = \ln\left(\frac{m+1}{m}\right) + \frac{1}{2} S_2^{(m)} - \frac{1}{3} S_3^{(m)} + \frac{1}{4} S_4^{(m)} - + \dots$$

Nun ist aber

$$\lim_{m=\infty} \ln\left(\frac{m+1}{m}\right) = \lim_{m=\infty} \ln\left(1 + \frac{1}{m}\right) = 0,$$

so daß man erhält

$$(11.) \quad \lim_{m=\infty} [S_1^{(m)} - \ln m] = \frac{1}{2} S_2 - \frac{1}{3} S_3 + \frac{1}{4} S_4 - + \dots$$

Diese alternierende Reihe ist konvergent, weil der absolute Betrag der Glieder immer kleiner und schließlich unendlich klein wird, denn in $\frac{S_n}{n}$ nähert sich der Zähler mit wachsendem n sehr schnell dem Werte 1, während der Nenner über alle Grenzen wächst. Deshalb hat die Summe einen bestimmten, endlichen Wert, den man mit γ bezeichnet und die *Eulersche Konstante* nennt.

Die Berechnung von

$$(11a.) \quad \gamma = \frac{1}{2} S_2 - \frac{1}{3} S_3 + \frac{1}{4} S_4 - + \dots$$

kann man noch vereinfachen, wenn man beachtet, daß

$$\ln 2 = \frac{1}{1} - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots$$

ist. Dadurch geht Gleichung (11a.) über in

$$(11b.) \quad \gamma = 1 - \ln 2 + \frac{1}{2}(S_2 - 1) - \frac{1}{3}(S_3 - 1) + \frac{1}{4}(S_4 - 1) - + \dots;$$

diese Reihe ist sogar *unbedingt* konvergent, weil der absolute Betrag eines jeden Gliedes kleiner ist als die Hälfte vom absoluten Betrage des vorhergehenden Gliedes. Daraus ergibt sich dann

$$(12.) \quad \gamma = 0,577\,215\,664\,9.$$

Nach Einführung dieser *Eulerschen* Konstanten γ findet man aus Gleichung (6.)

$$(13.) \quad \lim_{m \rightarrow \infty} \ln F(p) = \ln \Gamma(p) \\ = -p\gamma - \ln p + \frac{p^2}{2}S_2 - \frac{p^3}{3}S_3 + \frac{p^4}{4}S_4 - + \dots$$

Dies ist eine alternierende Reihe, die für $0 < p < 1$ konvergiert, weil der absolute Betrag der einzelnen Glieder immer kleiner und schließlich unendlich klein wird. Der Quotient zweier aufeinander folgenden Glieder ist nämlich, vom Vorzeichen abgesehen,

$$\frac{np}{n+1} \cdot \frac{S_{n+1}}{S_n} < \frac{np}{n+1} \leq p < +1.$$

Kennt man die Werte von $\ln \Gamma(p)$, so findet man daraus auch die Werte von $\Gamma(p)$, und zwar zunächst für $0 < p < 1$, dann aber auch mit Hilfe der Formel

$$\Gamma(1+p) = p\Gamma(p)$$

für alle positiven Werte von p . Dies gibt z. B.

$$\Gamma(1,0) = 1,0000, \quad \Gamma(1,1) = 0,9514, \quad \Gamma(1,2) = 0,9182,$$

$$\Gamma(1,3) = 0,8975, \quad \Gamma(1,4) = 0,8873, \quad \Gamma(1,5) = 0,8862,$$

$$\Gamma(1,6) = 0,8935, \quad \Gamma(1,7) = 0,9086, \quad \Gamma(1,8) = 0,9314,$$

$$\Gamma(1,9) = 0,9618, \quad \Gamma(2,0) = 1,000*).$$

*) Eine ausführlichere Tabelle findet man in den schon mehrfach erwähnten Funktionentafeln von *Jahnke* und *Emde*.

Auch die Reihenentwicklung in Gleichung (13.) kann man durch eine noch stärker konvergierende ersetzen. Bekanntlich ist für $-1 < p < +1$

$$\ln(1+p) = \frac{p}{1} - \frac{p^2}{2} + \frac{p^3}{3} - \frac{p^4}{4} + \dots,$$

folglich wird

$$(14.) \quad \ln \Gamma(p) = -\ln(1+p) + p(1-\gamma) - \ln p + \frac{p^2}{2}(S_2 - 1) \\ - \frac{p^3}{3}(S_3 - 1) + \frac{p^4}{4}(S_4 - 1) - + \dots$$

Aus der Gleichung

$$\Gamma(1+p) = p \Gamma(p), \quad \text{oder} \quad \ln \Gamma(1+p) = \ln p + \ln \Gamma(p)$$

folgt dann

$$(15.) \quad \ln \Gamma(1+p) = p(1-\gamma) - \ln(1+p) + \frac{p^2}{2}(S_2 - 1) \\ - \frac{p^3}{3}(S_3 - 1) + \frac{p^4}{4}(S_4 - 1) - + \dots$$

Da die Reihe auf der rechten Seite dieser Gleichung *unbedingt* konvergent ist, so bleibt sie auch noch konvergent, wenn man p mit $-p$ vertauscht, d. h. wenn man annimmt, daß

$$-1 < p < 0, \quad \text{oder} \quad 0 < 1+p < 1$$

ist. Es läßt sich zeigen, daß Gleichung (15.) auch in diesem Falle noch richtig bleibt. Doch soll der strenge Beweis übergangen werden. Durch diese Vertauschung erhält man

$$(16.) \quad \ln \Gamma(1-p) = -p(1-\gamma) - \ln(1-p) + \frac{p^2}{2}(S_2 - 1) \\ + \frac{p^3}{3}(S_3 - 1) + \frac{p^4}{4}(S_4 - 1) + + \dots,$$

und wenn man die Gleichung (16.) von der Gleichung (15.) abzieht,

$$(17.) \quad \ln \Gamma(1+p) - \ln \Gamma(1-p) = 2p(1-\gamma) - \ln \left(\frac{1+p}{1-p} \right) \\ - \frac{2p^3}{3}(S_3 - 1) - \frac{2p^5}{5}(S_5 - 1) - \dots$$

Außerdem ist nach Formel Nr. 251a der Tabelle

$$(18.) \quad \Gamma(1+p)\Gamma(1-p) = \frac{p\pi}{\sin(p\pi)},$$

also

$$(19.) \quad \ln \Gamma(1+p) + \ln \Gamma(1-p) = \ln \left(\frac{p\pi}{\sin(p\pi)} \right)$$

folglich erhält man, indem man die Gleichungen (17.) und (19.) addiert und die Summe durch 2 dividiert,

$$(20.) \quad \ln \Gamma(1+p) = p(1-p) + \frac{1}{2} \ln \left(\frac{p\pi}{\sin(p\pi)} \right) - \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1+p}{1-p} \right) \\ - \frac{p^3}{3} (S_3 - 1) - \frac{p^5}{5} (S_5 - 1) - \dots,$$

wobei nach Ungleichung (9.) jedes Glied der unendlichen Reihe dem absoluten Betrage nach mindestens 4mal kleiner ist als das vorhergehende Glied.

§ 94.

Einige besondere Werte der Gammafunktion und ihre Anwendung auf die Berechnung von bestimmten Integralen.

(Vergl. die Formel-Tabelle Nr. 257 bis 264.)

Nach den Formeln Nr. 249 und 252 der Tabelle ist

$$\Gamma(1+p) = p\Gamma(p) \quad \text{und} \quad \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi},$$

folglich wird

$$(1.) \quad \Gamma\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{1}{2} \sqrt{\pi}, \quad \Gamma\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{3}{4} \sqrt{\pi}, \quad \Gamma\left(\frac{7}{2}\right) = \frac{3 \cdot 5}{8} \sqrt{\pi}, \dots$$

Ferner folgt aus Formel Nr. 251a der Tabelle, nämlich aus

$$\Gamma(1+p)\Gamma(1-p) = \frac{p\pi}{\sin(p\pi)},$$

$$(2.) \quad \Gamma\left(1 + \frac{1}{4}\right)\Gamma\left(1 - \frac{1}{4}\right) = \frac{\pi}{4\sin\left(\frac{\pi}{4}\right)} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}},$$

oder nach Formel Nr. 249 der Tabelle

$$(2a.) \quad \Gamma\left(\frac{1}{4}\right)\Gamma\left(\frac{3}{4}\right) = \pi\sqrt{2}.$$

Für $p = \frac{1}{3}$ erhält man

$$(3.) \quad \Gamma(1 + \frac{1}{3}) \Gamma(1 - \frac{1}{3}) = \frac{\pi}{3 \sin(\frac{\pi}{3})} = \frac{2\pi}{3\sqrt{3}}$$

oder

$$(3a.) \quad \Gamma(\frac{4}{3}) \Gamma(\frac{2}{3}) = \frac{2\pi}{\sqrt{3}}$$

Setzt man

$$x = \sin^2 t, \quad \text{also} \quad 1 - x = \cos^2 t, \quad dx = 2 \sin t \cos t dt,$$

so wird

$$(4.) \quad B(p, q) = \int_0^1 x^{p-1} (1-x)^{q-1} dx \\ = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2p-1} t \cos^{2q-1} t dt = \frac{\Gamma(p) \Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}.$$

Dies gibt für $p = \frac{5}{4}$, $q = \frac{1}{4}$ nach Formel Nr. 252 der Tabelle

$$B(\frac{5}{4}, \frac{1}{4}) = B(\frac{1}{2}, \frac{5}{4}) = \frac{\Gamma(\frac{5}{4}) \sqrt{\pi}}{\Gamma(\frac{3}{4})},$$

oder

$$(5.) \quad 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin t \sqrt{\sin t} dt = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos t \sqrt{\cos t} dt = \frac{\Gamma(\frac{1}{4}) \sqrt{\pi}}{3 \Gamma(\frac{3}{4})},$$

oder mit Rücksicht auf Gleichung (2a.)

$$(6.) \quad \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin t \sqrt{\sin t} dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos t \sqrt{\cos t} dt = \frac{\Gamma(\frac{1}{4})^2 \sqrt{\pi}}{6 \Gamma(\frac{1}{4}) \Gamma(\frac{3}{4})} = \frac{1}{6 \sqrt{2\pi}} \Gamma(\frac{1}{4})^2.$$

Für $p = q = \frac{1}{3}$, also $2p - 1 = 2q - 1 = -\frac{1}{3}$ wird mit Rücksicht auf Gleichung (3a.)

$$(7.) \quad \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dt}{\sqrt[3]{\sin t \cos t}} = \frac{\Gamma(\frac{1}{3})^2}{2 \Gamma(\frac{2}{3})} = \frac{\Gamma(\frac{1}{3})^3}{2 \Gamma(\frac{1}{3}) \Gamma(\frac{2}{3})} = \frac{\sqrt[3]{3}}{4\pi} \Gamma(\frac{1}{3})^3.$$

Setzt man

$$2t = \varphi, \quad \text{also} \quad 2 \sin t \cos t = \sin(2t) = \sin \varphi,$$

so wird

$$(8.) \quad \int_0^{\pi} \frac{d\varphi}{\sqrt[3]{\sin \varphi}} = \frac{V3}{2\pi\sqrt[3]{2}} \Gamma\left(\frac{1}{3}\right)^3 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\varphi}{\sqrt[3]{\sin \varphi}} + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \frac{d\varphi}{\sqrt[3]{\sin \varphi}}.$$

Setzt man $\varphi = \pi - \psi$, so wird

$$\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \frac{d\varphi}{\sqrt[3]{\sin \varphi}} = - \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \frac{d\psi}{\sqrt[3]{\sin \psi}} = + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\varphi}{\sqrt[3]{\sin \varphi}},$$

folglich ist

$$(9.) \quad \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\varphi}{\sqrt[3]{\sin \varphi}} = \frac{V3}{4\pi\sqrt[3]{2}} \Gamma\left(\frac{1}{3}\right)^3.$$

Jetzt sei

$$\sin^2 \varphi = z^3, \quad \text{also} \quad \cos^2 \varphi = 1 - z^3, \quad \sin \varphi = z^{\frac{3}{2}},$$

$$\sqrt[3]{\sin \varphi} = V z, \quad \cos \varphi d\varphi = \frac{3}{2} V z dz, \quad d\varphi = \frac{3 V z dz}{2 \sqrt{1 - z^3}},$$

dann wird

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\varphi}{\sqrt[3]{\sin \varphi}} = \frac{3}{2} \int_0^1 \frac{dz}{\sqrt{1 - z^3}};$$

deshalb findet man für das elliptische Integral

$$(10.) \quad \int_0^1 \frac{dz}{\sqrt{1 - z^3}} = \frac{3}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\varphi}{\sqrt[3]{\sin \varphi}} = \frac{1}{2\pi\sqrt[3]{2} V3} \Gamma\left(\frac{1}{3}\right)^3.$$

Für $p = \frac{2}{3}$, $q = \frac{2}{3}$ geht Gleichung (4.) über in

$$2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt[3]{\sin t \cos t} dt = \frac{\Gamma(\frac{2}{3})^2}{\Gamma(\frac{1}{3})} = \frac{3 \Gamma(\frac{2}{3})^2}{\Gamma(\frac{1}{3})} = \frac{3 \Gamma(\frac{2}{3})^3}{\Gamma(\frac{1}{3}) \Gamma(\frac{2}{3})},$$

oder mit Rücksicht auf Gleichung (3a.)

$$(11.) \quad \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt[3]{\sin t \cos t} dt = \frac{3 V3}{4\pi} \Gamma\left(\frac{2}{3}\right)^3.$$

Setzt man wieder $2t = \varphi$ und $\sin^2 \varphi = z^3$, so erhält man in ähnlicher Weise wie vorhin

$$\int_0^{\pi} \sqrt[3]{\sin \varphi} d\varphi = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt[3]{\sin \varphi} d\varphi = \frac{3\sqrt[3]{3}}{\pi \sqrt[3]{4}} \Gamma\left(\frac{2}{3}\right)^3 = 3 \int_0^1 \frac{z dz}{\sqrt{1-z^3}},$$

also

$$(12.) \quad \int_0^1 \frac{z dz}{\sqrt{1-z^3}} = \frac{2}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt[3]{\sin \varphi} d\varphi = \frac{\sqrt[3]{3}}{\pi \sqrt[3]{4}} \Gamma\left(\frac{2}{3}\right)^3.$$

Für $p = \frac{1}{4}$, $q = \frac{1}{2}$ wird $2p - 1 = -\frac{1}{2}$, $2q - 1 = 0$ und Gleichung (4.) geht mit Rücksicht auf Gleichung (2a.) über in

$$(13.) \quad \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dt}{V \sin t} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dt}{V \cos t} = \frac{\Gamma(\frac{1}{4}) V \pi}{2 \Gamma(\frac{3}{4})} = \frac{\Gamma(\frac{1}{4})^2 V \pi}{2 \Gamma(\frac{1}{4}) \Gamma(\frac{1}{4})} = \frac{1}{2 \sqrt{2} \pi} \Gamma(\frac{1}{4})^2.$$

Jetzt sei

$$\cos t = z^2, \quad \text{also} \quad \sin^2 t = 1 - z^4, \quad \sin t = \sqrt{1 - z^4},$$

$$-\sin t dt = 2z dz, \quad dt = -\frac{2z dz}{\sqrt{1 - z^4}};$$

dies gibt

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dt}{V \cos t} = -2 \int_1^0 \frac{dz}{\sqrt{1 - z^4}} = +2 \int_0^1 \frac{dz}{\sqrt{1 - z^4}},$$

folglich wird

$$(14.) \quad \int_0^1 \frac{dz}{\sqrt{1 - z^4}} = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dt}{V \cos t} = \frac{1}{4 \sqrt{2} \pi} \Gamma(\frac{1}{4})^2.$$

XVI. Abschnitt.

Integration der Differentiale der Funktionen von mehreren Veränderlichen.

§ 95.

Vollständige Differentiale der Funktionen von zwei Veränderlichen.

(Vergl. die Formel-Tabelle Nr. 265.)

Ist

$$(1.) \quad u = f(x, y)$$

eine Funktion von zwei voneinander unabhängigen Veränderlichen, die nebst ihren ersten partiellen Ableitungen nach x und y für die betrachteten Werte von x und y stetig ist, so wird nach D.-R. (12. Auflage), Formel Nr. 229 der Tabelle das *vollständige* oder *totale* Differential von u

$$(2.) \quad du = \frac{\partial u}{\partial x} dx + \frac{\partial u}{\partial y} dy,$$

wobei nach Voraussetzung

$$(3.) \quad \frac{\partial u}{\partial x} = F(x, y), \quad \frac{\partial u}{\partial y} = G(x, y)$$

noch stetige Funktionen von x und y sind, so daß Gleichung (2.) übergeht in

$$(2a.) \quad du = F(x, y)dx + G(x, y)dy.$$

Während in dem Vorstehenden die Gleichung (2a.) aus Gleichung (1.) abgeleitet ist, so könnte man sich umgekehrt auch die Aufgabe stellen: „Man soll u als Funktion der beiden Veränderlichen x und y bestimmen, wenn du durch die Gleichung (2a.) gegeben ist, oder, was auf dasselbe

hinauskommt, wenn $\frac{\partial u}{\partial x}$ und $\frac{\partial u}{\partial y}$ durch die Gleichungen (3.) gegeben sind.“

Dabei erkennt man aber sogleich, daß die Funktionen $F(x, y)$ und $G(x, y)$ nicht willkürlich gegeben sein dürfen; es müssen vielmehr F und G einer gewissen Bedingung genügen, damit sie die partiellen Ableitungen ein und derselben Funktion $u = f(x, y)$ sind. Wenn für $u = f(x, y)$ die bereits aufgestellten Voraussetzungen gelten, und wenn

außerdem auch $\frac{\partial(\frac{\partial u}{\partial x})}{\partial y}$ und $\frac{\partial(\frac{\partial u}{\partial y})}{\partial x}$ für die betrachteten Werte von x und y stetig sind, so ergibt sich diese Bedingung aus der Überlegung, daß nach D.-R. (12. Auflage), Formel Nr. 235 der Tabelle

$$(4.) \quad \frac{\partial(\frac{\partial u}{\partial x})}{\partial y} = \frac{\partial(\frac{\partial u}{\partial y})}{\partial x}$$

wird, daß also mit Rücksicht auf die Gleichungen (3.)

$$(4a.) \quad \frac{\partial F(x, y)}{\partial y} = \frac{\partial G(x, y)}{\partial x}$$

sein muß. Diese Bedingung ist *notwendig*, wenn

$$(5.) \quad du = F(x, y)dx + G(x, y)dy$$

ein *vollständiges Differential* sein soll; sie ist aber auch, wie sogleich gezeigt werden soll, *hinreichend* dafür, daß es eine Funktion

$$(6.) \quad u = f(x, y)$$

gibt, deren vollständiges Differential mit $Fdx + Gdy$ übereinstimmt.

Beweis. Wie die Gleichung

$$(7.) \quad \frac{\partial u}{\partial x} = F(x, y)$$

aus Gleichung (6.) hervorgeht, indem man y als eine Konstante betrachtet und die Funktion u nach x *differentiiert*, so wird man es versuchen, aus Gleichung (7.) dadurch Gleichung (6.) herzuleiten, daß man y wieder als konstant ansieht und die Funktion $F(x, y)$ in bezug auf x *integriert*. Deshalb bilde man zunächst die Funktion

$$(8.) \quad P(x, y) = \int_a^x F(x, y) dx,$$

wobei die untere Grenze a eine ganz beliebige, von dem Parameter y unabhängige Konstante ist. Aus Gleichung (8.) folgt dann nach Formel Nr. 187 und 188 der Tabelle mit Rücksicht auf Gleichung (4a.)

$$(9.) \quad \frac{\partial P(x, y)}{\partial x} = F(x, y),$$

$$(10.) \quad \frac{\partial P(x, y)}{\partial y} = \int_a^x \frac{\partial F(x, y)}{\partial y} dx = \int_a^x \frac{\partial G(x, y)}{\partial x} dx \\ = [G(x, y)]_a^x = G(x, y) - G(a, y),$$

folglich ist

$$(11.) \quad dP(x, y) = F(x, y)dx + [G(x, y) - G(a, y)]dy.$$

Setzt man jetzt

$$(12.) \quad \int_b^y G(a, y)dy = Q(a, y),$$

wobei die untere Grenze b noch beliebig ist, so wird

$$(13.) \quad dQ(a, y) = \frac{\partial Q(a, y)}{\partial y} dy = G(a, y)dy.$$

Deshalb wird

$$(14.) \quad d[P(x, y) + Q(a, y)] = F(x, y)dx + G(x, y)dy,$$

d. h. die gesuchte Funktion ist

$$(15.) \quad u = P(x, y) + Q(a, y) = \int_a^x F(x, y)dx + \int_b^y G(a, y)dy,$$

und zwar ist die gewählte Funktion u so bestimmt, daß sie in dem willkürlich gewählten Punkte $x = a$, $y = b$ verschwindet. Man erhält aber sogleich die allgemeinste Lösung der Aufgabe, wenn man noch eine willkürliche Konstante C hinzufügt, denn es gilt der

Satz. Jede andere Funktion U , für welche ebenfalls die Gleichung

$$dU = F(x, y)dx + G(x, y)dy$$

besteht, kann sich von u nur durch eine Konstante unterscheiden.

Beweis. Nach Voraussetzung ist

$$\frac{\partial U}{\partial x} = F(x, y) \quad \text{und} \quad \frac{\partial u}{\partial x} = F(x, y),$$

folglich können sich U und u nach Satz 2 auf Seite 3 nur durch einen Ausdruck voneinander unterscheiden, der von x unabhängig ist. Das könnte in diesem Falle noch eine Funktion $\varphi(y)$ von y allein sein. Danach wäre also

$$U = u + \varphi(y).$$

Nun ist aber nach Voraussetzung

$$\frac{\partial U}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial y} + \varphi'(y) = G(x, y) \quad \text{und} \quad \frac{\partial u}{\partial y} = G(x, y),$$

folglich muß $\varphi'(y)$ gleich Null und $\varphi(y)$ selbst eine Konstante sein. Die allgemeinste Lösung hat daher die Form (15a.)

$$u = P(x, y) + Q(a, y) + C.$$

Daraus ergibt sich auch, daß sich das Endresultat nur um eine Konstante ändern kann, wenn man in Gleichung (15.) die willkürlich gewählten Integrationsgrenzen a und b durch andere, a_1 und b_1 , ersetzt, oder mit anderen Worten, daß in dem Endresultat die Ausdrücke, welche noch a und b enthalten, mit der Integrations-Konstanten C vereinigt werden können. Man kann deshalb die konstanten Glieder, welche man aus $\int_b^a G(a, y) dy$ durch Einsetzen der unteren Grenze erhält, fortlassen, weil sie in der Integrations-Konstanten enthalten sind. Die Glieder, welche noch a enthalten, lassen sich so zusammenfassen, daß sie ebenfalls mit der Integrations-Konstanten vereinigt werden können.

In ähnlicher Weise, wie die Gleichungen (15.) und (15a.) hergeleitet worden sind, findet man auch die Lösung

$$(16.) \quad u = \int_b^y G(x, y) dy + \int_a^x F(x, b) dx + C,$$

welche sich nach dem eben bewiesenen Satze von der in Gleichung (15.) gegebenen Lösung nur durch den Wert der Konstanten C unterscheiden kann.

§ 96.

Übungs-Beispiele.

Aufgabe 1. Man soll u als Funktion von x und y bestimmen, wenn

$$(1.) \quad du = (3x^2 + 8xy)dx + (4x^2 + 3y^2)dy$$

gegeben ist.

Auflösung. Um zunächst zu untersuchen, ob die rechte Seite von Gleichung (1.) ein *vollständiges Differential* ist, bilde man

$$(2.) \quad \frac{\partial F(x, y)}{\partial y} = \frac{\partial(3x^2 + 8xy)}{\partial y} = 8x,$$

$$(3.) \quad \frac{\partial G(x, y)}{\partial x} = \frac{\partial(4x^2 + 3y^2)}{\partial x} = 8x.$$

Aus den Gleichungen (2.) und (3.) folgt, daß

$$(4.) \quad \frac{\partial F(x, y)}{\partial y} = \frac{\partial G(x, y)}{\partial x}$$

ist, daß also in diesem Falle $Fdx + Gdy$ ein *vollständiges Differential* ist. Man darf deshalb ohne weiteres das in § 95 angegebene Integrations-Verfahren anwenden und erhält

$$(5.) \quad \int_a^x F'(x, y) dx = \int_a^x (3x^2 + 8xy) dx = [x^3 + 4x^2y]_a^x \\ = x^3 + 4x^2y - a^3 - 4a^2y,$$

$$(6.) \quad \int_b^y G(a, y) dy = \int_b^y (4a^2 + 3y^2) dy = 4a^2y + y^3 - 4a^2b - b^3,$$

also

$$(7.) \quad u = x^3 + 4x^2y - a^3 - 4a^2y + 4a^2y + y^3 - 4a^2b - b^3,$$

wo sich in der Tat alle, die unteren Grenzen a und b enthaltenden Glieder $-a^3 - 4a^2b - b^3$ mit der Integrations-Konstanten C vereinigen lassen. Die allgemeine Lösung lautet daher:

$$(8.) \quad u = x^3 + 4x^2y + y^3 + C.$$

Aufgabe 2. Man soll u als Funktion von x und y bestimmen, wenn

$$(9.) \quad du = (20x^3 - 21x^2y + 2y)dx + (-7x^3 + 2x + 3)dy$$

gegeben ist.

Auflösung. Man kann zunächst durch Bildung von $\frac{\partial F}{\partial y}$ und $\frac{\partial G}{\partial x}$ zeigen, daß

$$(10.) \quad \frac{\partial F}{\partial y} = \frac{\partial G}{\partial x} = -21x^2 + 2$$

wird, und daß deshalb die rechte Seite in Gleichung (9.) ein *vollständiges Differential* ist. Dann erhält man

$$(11.) \int_a^x F(x, y) dx = \int_a^x (20x^3 - 21x^2y + 2y) dx = [5x^4 - 7x^3y + 2xy]_a^x \\ = 5x^4 - 7x^3y + 2xy - 5a^4 + 7a^3y - 2ay,$$

$$(12.) \int_b^y G(a, y) dy = \int_b^y (-7a^3 + 2a + 3) dy = -7a^3y + 2ay + 3y + C,$$

wobei die von der unteren Grenze b herrührenden konstanten Glieder mit der Integrations-Konstanten C vereinigt sind. Deshalb wird zunächst

$$(13.) \quad u = 5x^4 - 7x^3y + 2xy - 5a^4 + 3y + C,$$

oder, wenn man

$$(14.) \quad -5a^4 + C = C_1$$

setzt,

$$(15.) \quad u = 5x^4 - 7x^3y + 2xy + 3y + C_1.$$

Aufgabe 3. Man soll u als Funktion von x und y bestimmen, wenn

$$(16.) \quad du = (2Ax + By + C)dx + (Bx + 2Dy + E)dy$$

gegeben ist.

Auflösung. Hier ist

$$(17.) \quad \frac{\partial F}{\partial y} = B, \quad \frac{\partial G}{\partial x} = B, \quad \text{also} \quad \frac{\partial F}{\partial y} = \frac{\partial G}{\partial x},$$

folglich ist die rechte Seite von Gleichung (16.) ein *vollständiges Differential*; man erhält daher

$$(18.) \int_a^x F(x, y) dx = \int_a^x (2Ax + By + C) dx = [Ax^2 + Bxy + Cx]_a^x \\ = Ax^2 + Bxy + Cx - Aa^2 - Ba^2 - Ca,$$

$$(19.) \int_b^y G(a, y) dy = \int_b^y (Ba + 2Dy + E) dy \\ = Bay + Dy^2 + Ey + C_1.$$

Dies gibt

$$(20.) \quad u = Ax^2 + Bxy + Cx - Aa^2 + Dy^2 + Ey + C_1,$$

oder, wenn man $-Aa^2 + C_1$ mit C_2 bezeichnet,

$$(21.) \quad u = Ax^2 + Bxy + Dy^2 + Cx + Ey + C_2.$$

Aufgabe 4. Man soll u als Funktion von x und y bestimmen, wenn

$$(22.) \quad du = \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2}$$

gegeben ist.

Auflösung. Die Gleichung (22.) kann man auch in der Form

$$(22a.) \quad du = -\frac{ydx}{x^2 + y^2} + \frac{xdy}{x^2 + y^2}$$

schreiben, aus der man leichter erkennt, daß

$$(23.) \quad F = -\frac{y}{x^2 + y^2}, \quad G = \frac{x}{x^2 + y^2}$$

ist. Daraus folgt

$$(24.) \quad \frac{\partial F(x, y)}{\partial y} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2}, \quad \frac{\partial G(x, y)}{\partial x} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2}.$$

Da diese beiden Ausdrücke einander gleich sind, so ist die rechte Seite von Gleichung (22a.) ein *vollständiges Differential*; man erhält daher nach Formel Nr. 28 der Tabelle

$$(25.) \quad \int_a^x F(x, y) dx = -y \int_a^x \frac{dx}{y^2 + x^2} = -\left[\operatorname{arctg}\left(\frac{x}{y}\right) \right]_a^x \\ = -\operatorname{arctg}\left(\frac{x}{y}\right) + \operatorname{arctg}\left(\frac{a}{y}\right),$$

$$(26.) \quad \int_b^y G(a, y) dy = a \int_b^y \frac{dy}{a^2 + y^2} = \operatorname{arctg}\left(\frac{y}{a}\right) + C.$$

Dies gibt

$$(27.) \quad u = -\operatorname{arctg}\left(\frac{x}{y}\right) + \operatorname{arctg}\left(\frac{a}{y}\right) + \operatorname{arctg}\left(\frac{y}{a}\right) + C.$$

Die Summe der beiden mittleren Glieder ist aber konstant, denn setzt man

$$\operatorname{arctg}\left(\frac{a}{y}\right) = \alpha, \quad \text{also} \quad \frac{a}{y} = \operatorname{tg} \alpha,$$

so wird

$$\frac{y}{a} = \frac{1}{\operatorname{tg} \alpha} = \operatorname{ctg} \alpha = \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right),$$

$$(28.) \quad \operatorname{arctg}\left(\frac{y}{a}\right) = \frac{\pi}{2} - \alpha = \frac{\pi}{2} - \operatorname{arctg}\left(\frac{a}{y}\right),$$

oder

$$(28a.) \quad \operatorname{arctg}\left(\frac{a}{y}\right) + \operatorname{arctg}\left(\frac{y}{a}\right) = \frac{\pi}{2}.$$

Bezeichnet man also $\frac{\pi}{2} + C$ mit C_1 , so erhält man

$$(29.) \quad u = C_1 - \arctg\left(\frac{x}{y}\right).$$

Aufgabe 5. Man soll u als Funktion von x und y bestimmen, wenn

$$(30.) \quad du = \left(\frac{1}{x} - \frac{y^2}{(x-y)^2}\right)dx + \left(\frac{x^2}{(x-y)^2} - \frac{1}{y}\right)dy$$

gegeben ist.

Auflösung. Hier ist

$$(31.) \quad \frac{\partial F(x, y)}{\partial y} = \frac{\partial G(x, y)}{\partial x} = -\frac{2xy}{(x-y)^3},$$

folglich ist die rechte Seite von Gleichung (30.) ein *vollständiges Differential*; man erhält daher

$$(32.) \quad \int_a^x F(x, y)dx = \int_a^x \left(\frac{1}{x} - \frac{y^2}{(x-y)^2}\right)dx = \left[\ln x + \frac{y^2}{x-y}\right]_a^x$$

$$= \ln x + \frac{y^2}{x-y} - \ln a - \frac{y^2}{a-y},$$

$$(33.) \quad \int_b^y G(a, y)dy = \int_b^y \left(\frac{a^2}{(a-y)^2} - \frac{1}{y}\right)dy = \frac{a^2}{a-y} - \ln y + C.$$

Dies gibt

$$(34.) \quad u = \ln x + \frac{y^2}{x-y} - \ln a + \frac{a^2 - y^2}{a-y} - \ln y + C$$

$$= \ln\left(\frac{x}{y}\right) + \frac{y^2}{x-y} - \ln a + a + y + C,$$

oder, wenn man $-\ln a + a + C$ mit C_1 bezeichnet und

$$\frac{y^2}{x-y} + y = \frac{xy}{x-y}$$

einsetzt,

$$(35.) \quad u = \ln\left(\frac{x}{y}\right) + \frac{xy}{x-y} + C_1.$$

Aufgabe 6. Man soll u als Funktion von x und y bestimmen, wenn

(36.) $du = \left(\frac{2y^3}{x^4 - y^4} + y - 5 \right) dx + \left(-\frac{2xy^2}{x^4 - y^4} + x - 2y - 7 \right) dy$
gegeben ist.

Auflösung. Hier ist

$$(37.) \quad \frac{\partial F(x, y)}{\partial y} = \frac{\partial G(x, y)}{\partial x} = \frac{6x^4y^2 + 2y^6}{(x^4 - y^4)^2} + 1,$$

folglich ist die rechte Seite der Gleichung (36.) ein *vollständiges Differential*; man erhält daher

$$\begin{aligned} (38.) \quad \int_a^x F(x, y) dx &= \int_a^x \left(\frac{2y^3}{x^4 - y^4} + y - 5 \right) dx \\ &= \int_a^x \left(\frac{y}{x^2 - y^2} - \frac{y}{x^2 + y^2} \right) dx + [xy - 5x]_a^x \\ &= \left[\frac{1}{2} \ln \left(\frac{x-y}{x+y} \right) - \operatorname{arctg} \left(\frac{x}{y} \right) + xy - 5x \right]_a^x, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (39.) \quad \int_b^y G(a, y) dy &= \int_b^y \left(-\frac{2ay^2}{a^4 - y^4} + a - 2y - 7 \right) dy \\ &= \int_b^y \left(\frac{a}{y^2 - a^2} + \frac{a}{y^2 + a^2} \right) dy + ay - y^2 - 7y + C \\ &= \frac{1}{2} \ln \left(\frac{a-y}{a+y} \right) + \operatorname{arctg} \left(\frac{y}{a} \right) + ay - y^2 - 7y + C. \end{aligned}$$

Beachtet man, daß nach Gleichung (28a.)

$$\operatorname{arctg} \left(\frac{y}{a} \right) + \operatorname{arctg} \left(\frac{a}{y} \right) = \frac{\pi}{2}$$

ist, und bezeichnet man die Summe der konstanten Glieder mit C_1 , so erhält man

$$\begin{aligned} (40.) \quad u &= \frac{1}{2} \ln \left(\frac{x-y}{x+y} \right) - \operatorname{arctg} \left(\frac{x}{y} \right) + xy - 5x \\ &\quad - \frac{1}{2} \ln \left(\frac{a-y}{a+y} \right) + \operatorname{arctg} \left(\frac{a}{y} \right) - ay + 5a \\ &\quad + \frac{1}{2} \ln \left(\frac{a-y}{a+y} \right) + \operatorname{arctg} \left(\frac{y}{a} \right) + ay - y^2 - 7y + C \\ &= \frac{1}{2} \ln \left(\frac{x-y}{x+y} \right) - \operatorname{arctg} \left(\frac{x}{y} \right) + xy - 5x - y^2 - 7y + C_1. \end{aligned}$$

§ 97.

Vollständige Differentiale der Funktionen von drei Veränderlichen.

(Vergl. die Formel-Tabelle Nr. 266.)

Ist

(1.) $u = f(x, y, z)$

eine Funktion von drei voneinander unabhängigen Veränderlichen, die für die betrachteten Werte von x, y, z nebst ihren partiellen Ableitungen erster Ordnung stetig ist, so wird nach D.-R. (12. Auflage), Formel Nr. 231 der Tabelle

(2.)
$$du = \frac{\partial u}{\partial x} dx + \frac{\partial u}{\partial y} dy + \frac{\partial u}{\partial z} dz,$$

wobei nach Voraussetzung

(3.)
$$\frac{\partial u}{\partial x} = F(x, y, z), \quad \frac{\partial u}{\partial y} = G(x, y, z), \quad \frac{\partial u}{\partial z} = H(x, y, z)$$

stetige Funktionen von x, y, z sind. Dadurch geht Gleichung (2.) über in

(2a.)
$$du = Fdx + Gdy + Hdz,$$

wenn man der Kürze wegen F, G, H statt $F(x, y, z), G(x, y, z), H(x, y, z)$ schreibt.

Während in dem Vorstehenden die Gleichung (2a.) aus Gleichung (1.) abgeleitet ist, so könnte man sich umgekehrt auch die Aufgabe stellen: „Man soll u als Funktion der drei Veränderlichen x, y, z bestimmen, wenn du durch die Gleichung (2a.) gegeben ist, oder, was auf dasselbe hinauskommt, wenn $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial z}$ durch die Gleichungen (3.) gegeben sind.“

Dabei erkennt man aber wieder sogleich, daß die drei Funktionen F, G, H nicht willkürlich gegeben sein dürfen; sie müssen vielmehr gewissen Bedingungen genügen, damit sie die partiellen Ableitungen ein und derselben Funktion $u = f(x, y, z)$ sind. Wenn F, G, H selbst, und wenn außerdem auch die Funktionen $\frac{\partial F}{\partial y}, \frac{\partial F}{\partial z}, \frac{\partial G}{\partial x}, \frac{\partial G}{\partial z}, \frac{\partial H}{\partial x}, \frac{\partial H}{\partial y}$

für die betrachteten Werte der Veränderlichen stetig sind, so ergeben sich diese Bedingungen aus der Überlegung, daß nach D.-R. (12. Auflage), Formel Nr. 235 der Tabelle

$$(4.) \quad \frac{\partial\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)}{\partial y} = -\frac{\partial\left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)}{\partial x}, \quad \frac{\partial\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)}{\partial z} = \frac{\partial\left(\frac{\partial u}{\partial z}\right)}{\partial x}, \quad \frac{\partial\left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)}{\partial z} = \frac{\partial\left(\frac{\partial u}{\partial z}\right)}{\partial y}$$

wird, daß also mit Rücksicht auf die Gleichungen (3.)

$$(4a.) \quad \frac{\partial F}{\partial y} = \frac{\partial G}{\partial x}, \quad \frac{\partial F}{\partial z} = \frac{\partial H}{\partial x}, \quad \frac{\partial G}{\partial z} = \frac{\partial H}{\partial y}$$

sein muß. Diese Bedingungen sind *notwendig*, damit die rechte Seite von Gleichung (2a.) ein *vollständiges Differential* ist; sie sind aber auch, wie sogleich gezeigt werden soll, *hinreichend* dafür, daß es eine Funktion

$$(5.) \quad u = f(x, y, z)$$

gibt, deren vollständiges Differential mit

$$Fdx + Gdy + Hdz$$

übereinstimmt.

Beweis. Wie die Gleichung

$$(6.) \quad \frac{\partial u}{\partial x} = F(x, y, z)$$

aus Gleichung (5.) hervorgeht, indem man y und z als Konstante betrachtet und die Funktion u nach x *differentiiert*, so wird man es versuchen, aus Gleichung (6.) Gleichung (5.) dadurch herzuleiten, daß man y und z wieder als konstant ansieht und die Funktion $F(x, y, z)$ in bezug auf x *integriert*. Deshalb bilde man zunächst die Funktion

$$(7.) \quad P(x, y, z) = \int_a^x F(x, y, z) dx,$$

wobei die untere Grenze a eine ganz beliebige, von den Parametern y und z unabhängige Konstante ist. Aus Gleichung (7.) folgt dann nach den Formeln Nr. 187 und 188 der Tabelle und mit Rücksicht auf die Gleichungen (4a.)

$$(8.) \quad \frac{\partial P(x, y, z)}{\partial x} = F(x, y, z),$$

$$(9.) \quad \frac{\partial P(x, y, z)}{\partial y} = \int_a^x \frac{\partial F(x, y, z)}{\partial y} dx = \int_a^x \frac{\partial G(x, y, z)}{\partial x} dx \\ = [G(x, y, z)]_a^x = G(x, y, z) - G(a, y, z),$$

$$(10.) \quad \frac{\partial P(x, y, z)}{\partial z} = \int_a^x \frac{\partial F(x, y, z)}{\partial z} dx = \int_a^x \frac{\partial H(x, y, z)}{\partial x} dx \\ = [H(x, y, z)]_a^x = H(x, y, z) - H(a, y, z),$$

folglich ist

$$(11.) \quad dP(x, y, z) = F(x, y, z)dx + [G(x, y, z) - G(a, y, z)]dy \\ + [H(x, y, z) - H(a, y, z)]dz.$$

Setzt man jetzt

$$(12.) \quad Q(a, y, z) = \int_b^y G(a, y, z) dy,$$

wobei die untere Grenze b eine ganz beliebige, von dem Parameter z unabhängige Konstante ist, so wird nach den Formeln Nr. 187 und 188 der Tabelle

$$(13.) \quad \frac{\partial Q(a, y, z)}{\partial y} = G(a, y, z),$$

$$(14.) \quad \frac{\partial Q(a, y, z)}{\partial z} = \int_b^y \frac{\partial G(a, y, z)}{\partial z} dy = \int_b^y \frac{\partial H(a, y, z)}{\partial y} dy \\ = [H(a, y, z)]_b^y = H(a, y, z) - H(a, b, z).$$

Dies gibt

$$(15.) \quad dQ(a, y, z) = G(a, y, z)dy + [H(a, y, z) - H(a, b, z)]dz.$$

Schließlich sei

$$(16.) \quad R(a, b, z) = \int_c^z H(a, b, z) dz,$$

wobei die untere Grenze c eine beliebige Konstante ist, dann wird

$$(17.) \quad dR(a, b, z) = H(a, b, z)dz.$$

Dies gibt

$$(18.) \quad d[P(x, y, z) + Q(a, y, z) + R(a, b, z)] \\ = F(x, y, z)dx + G(x, y, z)dy + H(x, y, z)dz,$$

d. h. die gesuchte Funktion ist

$$(19.) \quad u = P(x, y, z) + Q(a, y, z) + R(a, b, z) \\ = \int_a^x F(x, y, z) dx + \int_b^y G(a, y, z) dy + \int_c^z H(a, b, z) dz,$$

und zwar ist die Funktion u so bestimmt, daß sie in dem willkürlich gewählten Punkte $x = a$, $y = b$, $z = c$ verschwindet. Man erhält aber sogleich die allgemeinste Lösung der Aufgabe, wenn man noch eine willkürliche Konstante C hinzufügt, denn es gilt der

Satz. Jede andere Funktion U , für welche ebenfalls die Gleichung

$$dU = Fdx + Gdy + Hdz$$

besteht, kann sich von u nur durch eine Integrationskonstante unterscheiden.

Beweis. Nach Voraussetzung ist

$$(20.) \quad \frac{\partial U}{\partial x} = F(x, y, z) \quad \text{und auch} \quad \frac{\partial u}{\partial x} = F(x, y, z),$$

folglich können sich U und u nach Satz 2 auf Seite 3 nur durch einen Ausdruck voneinander unterscheiden, der von x unabhängig ist. Das könnte in diesem Falle noch eine Funktion $\varphi(y, z)$ von y und z sein. Danach wäre also

$$(21.) \quad U = u + \varphi(y, z).$$

Nun ist aber nach Voraussetzung

$$(22.) \quad \frac{\partial U}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial \varphi(y, z)}{\partial y} = G(x, y, z) \quad \text{und auch} \quad \frac{\partial u}{\partial y} = G(x, y, z).$$

Deshalb muß $\frac{\partial \varphi(y, z)}{\partial y}$ gleich Null sein, d. h. $\varphi(y, z)$ kann nur eine Funktion der einzigen Veränderlichen z sein. Von z ist sie aber auch nicht abhängig, denn man kann in derselben Weise zeigen, daß $\frac{\partial \varphi(y, z)}{\partial z}$ gleich Null wird; d. h. $\varphi(y, z)$ ist eine Konstante. Die allgemeinste Lösung hat daher die Form

$$(19a.) \quad u = \int_a^x F(x, y, z) dx + \int_b^y G(a, y, z) dy + \int_c^z H(a, b, z) dz + C.$$

Daraus ergibt sich auch, daß sich das Endresultat nur um eine Konstante ändern kann, wenn man in Gleichung (19.) die Integrationsgrenzen a, b, c durch andere a_1, b_1, c_1 ersetzt, oder mit anderen Worten, daß die Ausdrücke, welche in dem Endresultat noch a, b und c enthalten, mit der Integrationskonstanten C vereinigt werden können. Man kann deshalb die konstanten Glieder, welche man aus

$\int_c^x H(a, b, z) dz$ durch Einsetzen der unteren Grenze erhält, fortlassen, weil sie in der Integrationskonstanten enthalten sind.

Man kann auch u auf die Form

$$(23.) \quad u = \int_b^y G(x, y, z) dy + \int_c^z H(x, b, z) dz + \int_a^x F(x, b, c) dx + C$$

bringen, d. h. es steht noch frei, zuerst in bezug auf y , dann in bezug auf z und zuletzt in bezug auf x zu integrieren. Auch jede andere Reihenfolge ist zulässig.

Man erkennt auch, wie sich die angegebene Methode auf Funktionen von n Veränderlichen übertragen läßt. Dabei kann die rechte Seite von

$$(24.) \quad du = F_1 dx_1 + F_2 dx_2 + \dots + F_n dx_n$$

nur dann ein *vollständiges Differential* einer Funktion

$$(25.) \quad u = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

sein, wenn die $\frac{n(n-1)}{2}$ Bedingungen

$$\frac{\partial F_\alpha}{\partial x_\beta} = \frac{\partial F_\beta}{\partial x_\alpha} \quad \text{für} \quad \begin{matrix} \alpha = 1, 2, 3, \dots, n, \\ \beta = 1, 2, 3, \dots, n \end{matrix}$$

befriedigt sind. Es wird dann

$$(26.) \quad u = \int_{a_1}^{x_1} F_1(x_1, x_2, \dots, x_n) dx_1 + \int_{a_2}^{x_2} F_2(a_1, x_2, \dots, x_n) dx_2 \\ + \int_{a_3}^{x_3} F_3(a_1, a_2, x_3, \dots, x_n) dx_3 + \dots \\ + \int_{a_n}^{x_n} F_n(a_1, a_2, \dots, a_{n-1}, x_n) dx_n + C.$$

§ 98.

Übungs - Beispiele.

Aufgabe 1. Man soll u als Funktion von x, y, z bestimmen, wenn

$$(1.) \quad du = \frac{A dx}{y} - \frac{Ax + Bz}{y^2} dy + \frac{B dz}{y}$$

gegeben ist.

Auflösung. In diesem Falle ist

$$(2.) \quad F = \frac{A}{y}, \quad G = -\frac{Ax + Bz}{y^2}, \quad H = \frac{B}{y},$$

also

$$(3.) \quad \frac{\partial F}{\partial y} = \frac{\partial G}{\partial x} = -\frac{A}{y^2}, \quad \frac{\partial F}{\partial z} = \frac{\partial H}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial G}{\partial z} = \frac{\partial H}{\partial y} = -\frac{B}{y^2}.$$

Die rechte Seite von Gleichung (1.) ist daher ein *vollständiges Differential*, und man erhält

$$(4.) \quad \int_a^x F(x, y, z) dz = \frac{A}{y} \int_a^x dx = \frac{A(x - a)}{y},$$

$$(5.) \quad \int_b^y G(a, y, z) dy = -\int_b^y \frac{Aa + Bz}{y^2} dy = (Aa + Bz) \left(\frac{1}{y} - \frac{1}{b} \right),$$

$$(6.) \quad \int_c^z H(a, b, z) dz = \int_c^z \frac{B dz}{b} = \frac{B}{b} (z - c) = \frac{Bz}{b} + C,$$

folglich wird

$$(7.) \quad u = \frac{Ax}{y} - \frac{Aa}{y} + \frac{Aa}{y} + \frac{Bz}{y} - \frac{Aa}{b} - \frac{Bz}{b} + \frac{Bz}{b} + C,$$

oder, wenn man $-\frac{Aa}{b} + C$ mit C_1 bezeichnet,

$$(8.) \quad u = \frac{Ax + Bz}{y} + C_1.$$

Aufgabe 2. Man soll u als Funktion von x, y, z bestimmen, wenn

$$(9.) \quad du = (y^3 + yz^2) dx + (3xy^2 + xz^2 + 3y^2z) dy + (4z^3 + 2xyz + y^3) dz$$

gegeben ist.

Auflösung. Hier ist

$$(10.) F = y^3 + yz^2, \quad G = 3xy^2 + xz^2 + 3y^2z, \quad H = 4z^3 + 2xyz + y^3, \\ \text{also}$$

$$(11.) \quad \frac{\partial F}{\partial y} = \frac{\partial G}{\partial x} = 3y^2 + z^2, \quad \frac{\partial F}{\partial z} = \frac{\partial H}{\partial x} = 2yz, \\ \frac{\partial G}{\partial z} = \frac{\partial H}{\partial y} = 2xz + 3y^2;$$

die rechte Seite von Gleichung (9.) ist daher ein *vollständiges Differential*, und man erhält

$$(12.) \int_a^x F(x, y, z) dx = \int_a^x (y^3 + yz^2) dx = y^3 x + yz^2 x - ay^3 - ayz^2,$$

$$(13.) \int_b^y G(a, y, z) dy = \int_b^y (3ay^2 + az^2 + 3y^2z) dy = [ay^3 + ayz^2 + y^3z]_b^y \\ = ay^3 + ayz^2 + y^3z - ab^3 - abz^2 - b^3z,$$

$$(14.) \int_c^z H(a, b, z) dz = \int_c^z (4z^3 + 2abz + b^3) dz = z^4 + abz^2 + b^3z + C.$$

Dies gibt, wenn man $-ab^3 + C$ mit C_1 bezeichnet,

$$(15.) \quad u = y^3x + yz^2x + y^3z - ab^3 + z^4 + C \\ = xy^3 + xyz^2 + y^3z + z^4 + C_1.$$

Aufgabe 3. Man soll u als Funktion von x , y und z bestimmen, wenn

$$(16.) \quad du = \left[\frac{x}{r(z+r)} - \frac{y}{\sqrt{z^2 - x^2y^2}} + \frac{1}{z} e^{\frac{x}{z}} \right] dx \\ + \left[\frac{y}{r(z+r)} - \frac{x}{\sqrt{z^2 - x^2y^2}} - \sin y \right] dy \\ + \left[\frac{1}{r} + \frac{xy}{z\sqrt{z^2 - x^2y^2}} - \frac{x}{z^2} e^{\frac{x}{z}} - \cos z \right] dz$$

gegeben ist, wobei

$$(17.) \quad r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

sein soll.

Auflösung. Hier ist

$$(18.) \quad \begin{cases} F = \frac{x}{r(z+r)} - \frac{y}{\sqrt{z^2 - x^2 y^2}} + \frac{1}{z} e^{\frac{x}{z}}, \\ G = \frac{y}{r(z+r)} - \frac{x}{\sqrt{z^2 - x^2 y^2}} - \sin y, \\ H = \frac{1}{r} + \frac{xy}{z\sqrt{z^2 - x^2 y^2}} - \frac{x}{z^2} e^{\frac{x}{z}} - \cos z; \end{cases}$$

folglich wird, wenn man beachtet, daß

$$(19.) \quad \frac{\partial r}{\partial x} = \frac{x}{r}, \quad \frac{\partial r}{\partial y} = \frac{y}{r}, \quad \frac{\partial r}{\partial z} = \frac{z}{r}$$

ist,

$$(20.) \quad \frac{\partial F}{\partial y} = -\frac{xy(z+2r)}{r^3(z+r)^2} - \frac{z^2}{(z^2 - x^2 y^2)\sqrt{z^2 - x^2 y^2}} = \frac{\partial G}{\partial x},$$

$$(21.) \quad \frac{\partial F}{\partial z} = -\frac{x}{r^3} + \frac{yz}{(z^2 - x^2 y^2)\sqrt{z^2 - x^2 y^2}} - \frac{x+z}{z^3} e^{\frac{x}{z}} = \frac{\partial H}{\partial x},$$

$$(22.) \quad \frac{\partial G}{\partial z} = -\frac{y}{r^3} + \frac{xz}{(z^2 - x^2 y^2)\sqrt{z^2 - x^2 y^2}} = \frac{\partial H}{\partial y}.$$

Die rechte Seite von Gleichung (16.) ist daher ein *vollständiges Differential*, und man erhält, wenn man der Kürze wegen

$$(23.) \quad \sqrt{a^2 + y^2 + z^2} = r_1 \quad \text{und} \quad \sqrt{a^2 + b^2 + z^2} = r_2$$

setzt,

$$\begin{aligned} (24.) \quad \int_a^x F(x, y, z) dx &= \int_a^x \left[\frac{x}{r(z+r)} - \frac{y}{\sqrt{z^2 - x^2 y^2}} + \frac{1}{z} e^{\frac{x}{z}} \right] dx \\ &= \left[\ln(z+r) - \arcsin\left(\frac{xy}{z}\right) + e^{\frac{x}{z}} \right]_a^x \\ &= \ln(z+r) - \ln(z+r_1) - \arcsin\left(\frac{xy}{z}\right) \\ &\quad + \arcsin\left(\frac{ay}{z}\right) + e^{\frac{x}{z}} - e^{\frac{a}{z}}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (25.) \quad \int_b^y G(a, y, z) dy &= \int_b^y \left(\frac{y}{r_1(z+r_1)} - \frac{a}{\sqrt{z^2 - a^2 y^2}} - \sin y \right) dy \\
 &= \left[\ln(z+r_1) - \arcsin\left(\frac{ay}{z}\right) + \cos y \right]_b^y \\
 &= \ln(z+r_1) - \ln(z+r_2) - \arcsin\left(\frac{ay}{z}\right) \\
 &\quad + \arcsin\left(\frac{ab}{z}\right) + \cos y - \cos b,
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (26.) \quad \int_c^z H(a, b, z) dz &= \int_c^z \left(\frac{1}{r_2} + \frac{ab}{z\sqrt{z^2 - a^2 b^2}} - \frac{a}{z^2} e^{\frac{a}{z}} - \cos z \right) dz \\
 &= \ln(z+r_2) - \arcsin\left(\frac{ab}{z}\right) + e^{\frac{a}{z}} - \sin z + C.
 \end{aligned}$$

Dies gibt

$$(27.) \quad u = \ln(z+r) - \arcsin\left(\frac{xy}{z}\right) + e^{\frac{x}{z}} + \cos y - \sin z + C_1.$$

XVII. Abschnitt.

Kurven-Integrale*).

§ 99.

Begriff des Kurven-Integrals.

(Vergl. die Formel-Tabelle Nr. 267.)

Ist der Ausdruck

$$(1.) \quad F(x, y)dx + G(x, y)dy$$

kein *vollständiges Differential*, so gibt es keine Funktion u der beiden *unabhängigen* Veränderlichen x und y , deren Differential der in (1.) gegebene Ausdruck ist. Anders gestaltet sich aber die Sache, wenn man diese Unabhängigkeit aufhebt, indem man durch die Gleichungen

$$(2.) \quad x = \varphi(t), \quad y = \psi(t)$$

eine Beziehung zwischen x und y herstellt. Unter der Voraussetzung, daß die Funktionen

$$\varphi(t), \psi(t), \varphi'(t), \psi'(t)$$


in dem Intervalle von $t = t_0$ bis $t = t'$ *eindeutig* und *stetig* sind, und daß auch die Funktionen $F(x, y)$ und $G(x, y)$ für die zugehörigen Werte von x und y *eindeutig* und *stetig* sind, wird der Ausdruck

$$(3.) \quad F(x, y)dx + G(x, y)dy = \{F[\varphi(t), \psi(t)]\varphi'(t) + G[\varphi(t), \psi(t)]\psi'(t)\}dt$$

das Differential einer Funktion der einzigen Veränderlichen t . Diese Funktion kann man durch Integration finden. Dabei entspricht den Gleichungen (2.) eine stetig verlaufende Kurve k (Fig. 162), die sich vom Punkte P_0 mit den Koordinaten

*) Der Anfänger darf diesen Abschnitt überschlagen.

Fig. 162.



$$x_0 = \varphi(t_0), \quad y_0 = \psi(t_0)$$

bis zum Punkte P' mit den Koordinaten

$$x' = \varphi(t'), \quad y' = \psi(t')$$

erstreckt. Setzt man bei Integration des Ausdruckes in Gleichung (3.) die Grenzen t_0 und t' ein, so nennt man

$$(4.) \quad \int_{t_0}^{t'} [F(x, y)dx + G(x, y)dy] \\ = \int_{t_0}^{t'} \{F[\varphi(t), \psi(t)]\varphi'(t) + G[\varphi(t), \psi(t)]\psi'(t)\} dt$$

„das längs der Kurve k vom Punkte P_0 bis zum Punkte P' erstreckte Kurven-Integral“ Dabei ist der Wert des Integrals nicht nur von dem Werte der Grenzen abhängig, sondern auch von dem Verlaufe der Kurve k .

Auch hier kann man das bestimmte Integral als den Grenzwert einer Summe erklären. Zu diesem Zwecke teile man das Intervall von t_0 bis t' durch die Werte t_1, t_2, \dots, t_{n-1} in n Teile, die nicht gleich zu sein brauchen, aber so beschaffen sind, daß sie sämtlich verschwindend klein werden, wenn n ins Unbegrenzte wächst. Dem Werte t_α sei auf der Kurve k der Punkt P_α mit den Koordinaten x_α, y_α zugeordnet (vergl. Fig. 162), und der Kürze wegen werde $F(x_\alpha, y_\alpha)$ mit F_α und $G(x_\alpha, y_\alpha)$ mit G_α bezeichnet. Dann bilde man die Summe

$$(5.) \quad S = [(x_1 - x_0)F_0 + (y_1 - y_0)G_0] + [(x_2 - x_1)F_1 + (y_2 - y_1)G_1] \\ + \dots + [(x' - x_{n-1})F_{n-1} + (y' - y_{n-1})G_{n-1}].$$

Die einzelnen Glieder dieser Summe sind nach den gemachten Voraussetzungen bestimmte, endliche Größen. Wenn man wie früher mit Θ und Θ_1 noch unbestimmte Größen zwischen 0 und $+1$ bezeichnet, so ergibt sich aus dem Mittelwertsatz der Differential-Rechnung

$$x_\alpha - x_{\alpha-1} = \varphi(t_\alpha) - \varphi(t_{\alpha-1}) = (t_\alpha - t_{\alpha-1})\varphi'(t_{\alpha-1} + \Theta(t_\alpha - t_{\alpha-1})),$$

oder, wenn man der Kürze wegen $t_\alpha - t_{\alpha-1}$ mit Δt bezeichnet,

$$(6.) \quad x_\alpha - x_{\alpha-1} = \varphi'(t_{\alpha-1} + \Theta \cdot \Delta t) \cdot \Delta t,$$

und in ähnlicher Weise

$$(7.) \quad y_\alpha - y_{\alpha-1} = \psi'(t_{\alpha-1} + \Theta_1 \cdot \Delta t) \cdot \Delta t.$$

Deshalb kann man Gleichung (5.) auf die Form

$$(8.) \quad S = \sum_{\alpha=1}^{\alpha=n} [F_{\alpha-1} \cdot \varphi'(t_{\alpha-1} + \Theta \cdot \Delta t) + G_{\alpha-1} \cdot \psi'(t_{\alpha-1} + \Theta_1 \cdot \Delta t)] \Delta t$$

bringen.

Da nach Voraussetzung die Funktionen $\varphi'(t)$ und $\psi'(t)$ in dem betrachteten Intervalle stetig sind, so kann man Δt so klein machen, daß

$$(9.) \quad |\varphi'(t + \Delta t) - \varphi'(t)| < \varepsilon \quad \text{und} \quad |\psi'(t + \Delta t) - \psi'(t)| < \varepsilon$$

werden, wobei ε eine positive, beliebig kleine GröÙe ist. Dann wird aber erst recht

$$(10.) \quad |\varphi'(t + \Theta \cdot \Delta t) - \varphi'(t)| < \varepsilon \quad \text{und} \quad |\psi'(t + \Theta_1 \cdot \Delta t) - \psi'(t)| < \varepsilon.$$

Setzt man jetzt noch

$$(11.) \quad S' = \sum_{\alpha=1}^{\alpha=n} [F_{\alpha-1} \cdot \varphi'(t_{\alpha-1}) + G_{\alpha-1} \cdot \psi'(t_{\alpha-1})] \Delta t,$$

so wird

$$(12.) \quad D = S - S' = \sum_{\alpha=1}^{\alpha=n} \{ F_{\alpha-1} [\varphi'(t_{\alpha-1} + \Theta \cdot \Delta t) - \varphi'(t_{\alpha-1})] \\ + G_{\alpha-1} [\psi'(t_{\alpha-1} + \Theta_1 \cdot \Delta t) - \psi'(t_{\alpha-1})] \} \Delta t.$$

Für den Wert von D findet man mit Rücksicht auf die Ungleichung (10.) für hinreichend kleine Werte von Δt

$$(13.) \quad |D| \leq \varepsilon \sum_{\alpha=1}^{\alpha=n} (|F_{\alpha-1}| + |G_{\alpha-1}|) \Delta t.$$

Bezeichnet man noch den größten Wert, den

$$|F[\varphi(t), \psi(t)]| + |G[\varphi(t), \psi(t)]|$$

annimmt, wenn t das Intervall von t_0 bis t' durchläuft, mit M , so wird

$$|D| < \varepsilon M \sum_{\alpha=1}^{\alpha=n} \Delta t = \varepsilon M (t' - t_0).$$

Da man ε beliebig klein machen kann, wenn man nur n hinreichend groß macht, so wird

$$(14.) \quad \lim_{n=\infty} |D| = 0, \quad \text{oder} \quad \lim_{n=\infty} S = \lim_{n=\infty} S',$$

also

$$(15.) \quad \lim_{n=\infty} S = \lim_{n=\infty} \sum_{\alpha=1}^{\alpha=n} [F_{\alpha-1} \cdot \varphi'(t_{\alpha-1}) + G_{\alpha-1} \cdot \psi'(t_{\alpha-1})] \Delta t \\ = \int_{t_0}^{t'} \{F[\varphi(t), \psi(t)]\varphi'(t) + G[\varphi(t), \psi(t)]\psi'(t)\} dt.$$

Der Wert dieses Integrals ändert sich nicht, wenn man durch die Gleichung

(16.) $t = f(\tau)$, die mit der Gleichung (16 a.) $\tau = g(t)$ gleichbedeutend sein möge, für die Darstellung der Kurve k statt des Parameters t einen anderen Parameter τ einführt. Dabei wird vorausgesetzt, daß die Funktionen $f(\tau)$ und $f'(\tau)$ für die betrachteten Werte von τ stetig sind, und daß

$$(17.) \quad g(t_0) = \tau_0, \quad g(t') = \tau'$$

wird. Die Gleichungen (2.) gehen dadurch über in

$$(18.) \quad x = \varphi(t) = \varphi[f(\tau)] = \Phi(\tau), \quad y = \psi(t) = \psi[f(\tau)] = \Psi(\tau).$$

Dies gibt dann

$$\frac{dx}{d\tau} = \frac{dx}{dt} \frac{dt}{d\tau} = \varphi'(t)f'(\tau) = \Phi'(\tau), \\ \frac{dy}{d\tau} = \frac{dy}{dt} \frac{dt}{d\tau} = \psi'(t)f'(\tau) = \Psi'(\tau),$$

folglich findet man aus Gleichung (15.)

$$(19.) \quad \lim_{n=\infty} S = \int_{\tau_0}^{\tau'} \{F[\Phi(\tau), \Psi(\tau)]\Phi'(\tau) + G[\Phi(\tau), \Psi(\tau)]\Psi'(\tau)\} f'(\tau) d\tau \\ = \int_{\tau_0}^{\tau'} \{F[\Phi(\tau), \Psi(\tau)]\Phi'(\tau) + G[\Phi(\tau), \Psi(\tau)]\Psi'(\tau)\} d\tau,$$

d. h. der Wert des Integrals ist nur abhängig von dem Verlaufe der Kurve k , nicht aber von der zufälligen Art der Parameterdarstellung.

Die Kurve k heißt dabei der „Integrationsweg“.

Um die Unabhängigkeit der Darstellung des Integrationsweges von der Wahl des Parameters hervorzuheben, schreibt man das Kurven-Integral in der Form

$$\int_k [F(x, y)dx + G(x, y)dy],$$

d. h. man läßt die Integrationsgrenzen t_0 und t' fort und schreibt k unter das Integralzeichen, um anzudeuten, daß sich das Kurven-Integral über die Kurve k erstreckt.

Führt man als Parameter die Bogenlänge s des Integrationsweges ein und errichtet in jedem Punkte des Integrationsweges eine Senkrechte auf der XY -Ebene, so entsteht ein Zylinder, der den Integrationsweg zur Leitkurve hat. Auf dem Mantel dieses Zylinders wird eine bestimmte Kurve aufgezeichnet, wenn man auf jeder Senkrechten den zugehörigen Wert von $F \frac{dx}{ds} + G \frac{dy}{ds}$ abträgt. Bei Abwicklung des Zylinders in eine Ebene entspricht dem Integrationswege eine Gerade, die man als X -Achse betrachten kann, und der Kurve auf dem Zylinder eine ebene Kurve. Das von dieser Kurve, der X -Achse und den beiden zu s_0 und s' gehörigen Ordinaten begrenzte Flächenstück ist dann der Wert des Kurven-Integrals

$$\int_k \left(F \frac{dx}{ds} + G \frac{dy}{ds} \right) ds.$$

Aus der Darstellung des Kurven-Integrals als Grenzwert einer Summe folgt unmittelbar, daß sein Wert das entgegengesetzte Zeichen annimmt, wenn man den Integrationsweg in entgegengesetzter Richtung durchläuft, denn dabei erhalten sämtliche Glieder der Summe das entgegengesetzte Zeichen.

Man kann den Begriff des Kurven-Integrals noch verallgemeinern. Der Integrationsweg k darf nämlich auch aus mehreren verschiedenartigen Kurven k_1, k_2, \dots, k_m zusammengesetzt sein. Gelten für diese m Kurven, die sich bezw. vom Punkte P_0 bis zum Punkte P_1 , vom Punkte P_1 bis zum Punkte P_2, \dots vom Punkte P_{m-1} bis zum Punkte P' erstrecken (vergl. Fig. 163), in den gemeinsamen Punkten P_1, P_2, \dots, P_{m-1} aber nicht dieselben Tangenten haben,

Fig. 163.



alle die Voraussetzungen, die vorhin über die Kurve k gemacht worden sind, so kann man die Kurven-Integrale

$$\int_{k_1} (Fdx + Gdy), \int_{k_2} (Fdx + Gdy), \dots \int_{k_m} (Fdx + Gdy)$$

bilden und nennt ihre Summe

$$\sum_{\alpha=1}^{a=m} \int_{k_\alpha} (Fdx + Gdy) = \int_k [F(x, y)dx + G(x, y)dy]$$


„das über die Kurve k erstreckte Kurven-Integral“, wobei man unter k den ganzen Kurvenzug $P_0P_1P_2P_3\dots P'$ versteht.

§ 100.

Darstellung eines Doppelintegrals durch ein Kurven-Integral.

(Vergl. die Formel-Tabelle Nr. 268.)

Der Integrationsweg sei jetzt eine *geschlossene* Linie, die auch aus verschiedenen Teilkurven $k_1, k_2, \dots k_m$ be-



stehen darf, aber sich nicht selbst schneiden möge. Außerdem soll vorausgesetzt werden, daß die zur Y -Achse parallel gezogenen Geraden den Integrationsweg höchstens in zwei Punkten P_1 und P_2 schneiden; und dasselbe gelte für die Geraden, die zur

X -Achse parallel gezogen sind. (Vergl. Fig. 164.) Die Berührungspunkte der Tangenten, die zur Y -Achse parallel sind und den Integrationsweg ganz einschließen, seien P_0

und P' mit den Koordinaten x_0, y_0 bzw. x', y' . Der Integrationsweg k werde im positiven Sinne durchlaufen, d. h. so, daß die eingeschlossene Fläche F auf der linken Seite liegt. Dabei ist es für den Wert des Kurven-Integrals über die geschlossene Kurve gleichgültig, an welche Stelle man den Anfang des Integrationsweges legt.

Die Funktionen $F(x, y)$ und $G(x, y)$ seien für alle Punkte des Integrationsweges und für alle Punkte in seinem Innern *eindeutig* und *stetig*; dann ist nach den Ausführungen in § 99

Fig. 165.





Fig. 166.



$$(1.) \quad \int_k [F(x, y)dx + G(x, y)dy] \\ = \lim \left[\sum_k F(x_a, y_a) \Delta x + \sum_k G(x_a, y_a) \Delta y \right].$$

Gehören hierbei zu $x_a = OQ_a$ die beiden Werte $y = y_1$ und $y = y_2$ (vergl. Fig. 165), so finden sich in der Summe auf der rechten Seite von Gleichung (1.) die beiden Glieder $+ F(x_a, y_1) \Delta x$ und $- F(x_a, y_2) \Delta x$, und zwar steht bei $F(x_a, y_1) \Delta x$ das *positive*, bei $F(x_a, y_2) \Delta x$ aber das *negative* Zeichen, weil Δx beim Punkte P_1 im positiven, beim Punkte P_2 aber im negativen Sinne durchlaufen wird. Deshalb ist

$$(2.) \quad \sum_k F(x_a, y_a) \Delta x = \sum_{x_a=x_0}^{x_a=x'} [F(x_a, y_1) - F(x_a, y_2)] \Delta x$$

und

$$(2a.) \quad \lim \sum_k F(x_\alpha, y_\alpha) \Delta x = \int_{x_0}^x [F(x, y_1) - F(x, y_2)] dx.$$

Gehören in ähnlicher Weise zu $y_\beta = OR_\beta$ (vergl. Fig. 166) die beiden Werte $x = x_1$ und $x = x_2$, und sind y_0 und y' die äußersten Werte von y , so finden sich in der Summe auf der rechten Seite von Gleichung (1.) die beiden Glieder $-G(x_1, y_\beta) \Delta y$ und $+G(x_2, y_\beta) \Delta y$, und zwar steht bei $G(x_1, y_\beta) \Delta y$ das *negative* und bei $G(x_2, y_\beta) \Delta y$ das *positive* Zeichen, weil Δy beim Punkte P_1 im negativen, beim Punkte P_2 aber im positiven Sinne durchlaufen wird. Dies gibt

$$(3.) \quad \sum_k G(x_\alpha, y_\alpha) \Delta y = \sum_{y_\beta=y_0}^{y_\beta=y'} [G(x_2, y_\beta) - G(x_1, y_\beta)] \Delta y$$

und

$$(3a.) \quad \lim \sum_k G(x_\alpha, y_\alpha) \Delta y = \int_{y_0}^{y'} [G(x_2, y) - G(x_1, y)] dy.$$

Deshalb ist das Kurven-Integral

$$(4.) \quad \int_k [F(x, y) dx + G(x, y) dy] = \int_{x_0}^x [F(x, y_1) - F(x, y_2)] dx + \int_{y_0}^{y'} [G(x_2, y) - G(x_1, y)] dy.$$

Damit vergleiche man das Doppelintegral

$$\iint_{(k)} \left(\frac{\partial G(x, y)}{\partial x} - \frac{\partial F(x, y)}{\partial y} \right) dx dy,$$

wobei das Zeichen (k) unter den beiden Integralzeichen andeutet, daß das Doppelintegral über die ganze von der Kurve k umschlossene Fläche erstreckt werden soll. Dann erhält man, wie man aus den Figuren 165 und 166 ohne weiteres ersieht,

$$(5.) \quad \iint_{(k)} \frac{\partial G(x, y)}{\partial x} dx dy = \int_{y_0}^{y'} dy \int_{x_1}^{x_2} \frac{\partial G(x, y)}{\partial x} dx \\ = \int_{y_0}^{y'} [G(x_2, y) - G(x_1, y)] dy$$

und

$$(6.) \quad \iint_{(K)} \frac{\partial F(x, y)}{\partial y} dx dy = \int_{x_0}^x dx \int_{y_1}^{y_2} \frac{\partial F(x, y)}{\partial y} dy \\ = \int_{x_0}^x [F(x, y_2) - F(x, y_1)] dx.$$

Dies gibt mit Rücksicht auf Gleichung (4.)

$$(7.) \quad \iint_{(K)} \left(\frac{\partial G(x, y)}{\partial x} - \frac{\partial F(x, y)}{\partial y} \right) dx dy \\ = \int_{x_0}^x [F(x, y_1) - F(x, y_2)] dx + \int_{y_0}^{y_1} [G(x_2, y) - G(x_1, y)] dy \\ = \int_K [F(x, y) dx + G(x, y) dy].$$

Beispiel. Es sei

$$(8.) \quad \frac{\partial G}{\partial x} = \frac{1}{2}, \quad \frac{\partial F}{\partial y} = -\frac{1}{2}, \quad \text{also } F(x, y) = -\frac{y}{2}, \quad G(x, y) = \frac{x}{2},$$

und die Fläche, über die sich das Doppelintegral erstrecken soll, sei eine Ellipse mit der Gleichung

$$(9.) \quad a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + a_{33} = 0$$

(vergl. Fig. 38 auf Seite 135), wobei

$$(10.) \quad c = \sqrt{a_{11}a_{22} - a_{12}^2} \quad \text{und} \quad a = \sqrt{-\frac{a_{22}a_{33}}{c^2}}$$

reelle Größen sein müssen, damit der Gleichung (9.) wirklich eine Ellipse entspricht. Das Doppelintegral

$$(11.) \quad J = \iint_{(K)} \left(\frac{\partial G(x, y)}{\partial x} - \frac{\partial F(x, y)}{\partial y} \right) dx dy = \iint_{(K)} dx dy$$

gibt dann den Flächeninhalt der Ellipse. Setzt man in diesem Falle

$$(12.) \quad x = -a \sin t, \quad a_{22}y = a(c \cos t + a_{12} \sin t),$$

so wird die Ellipse in positivem Sinne durchlaufen, wenn t alle Werte von 0 bis 2π durchläuft. Nun ist

$$(13.) \quad dx = -a \cos t dt, \quad dy = \frac{a}{a_{22}} (-c \sin t + a_{12} \cos t) dt,$$

also


$$(14.) \quad F(x, y)dx + G(x, y)dy = \frac{1}{2} (x dy - y dx) \\ = \frac{a^2}{2a_{22}} (c \sin^2 t + c \cos^2 t) dt = \frac{a^2 c}{2a_{22}} dt,$$

folglich wird

$$(15.) \quad J = \iint_{(k)} dx dy = \frac{a^2 c}{2a_{22}} \int_0^{2\pi} dt = \frac{2a^2 c \pi}{2a_{22}} = \frac{a^2 c^2 \pi}{a_{22} c} \\ = - \frac{a_{22} a_{33} \pi}{a_{22} c} = - \frac{a_{33} \pi}{\sqrt{a_{11} a_{22} - a_{12}^2}}.$$

Jetzt kann man die Voraussetzung, daß die Geraden, die zur Y -Achse parallel sind, und die Geraden, die zur X -Achse parallel sind, den Integrationsweg k höchstens zweimal schneiden, noch aufheben. Es gilt nämlich der Satz, daß Gleichung (7.) auch dann noch richtig bleibt, wenn der Integrationsweg k der vorstehenden Voraussetzung zwar nicht genügt, wenn man aber die von ihm eingeschlossene Fläche durch eine Hilfslinie l so in zwei Teile zerlegen kann, daß für die Umgrenzungen $k_1 + l$ und $k_2 - l$ der beiden Teile die Voraussetzung zutrifft. (Vergl. Fig. 167.)

Fig. 167.



Beweis. Da die Voraussetzungen für jeden der beiden Integrationswege $k_1 + l$ und $k_2 - l$ gelten, so findet man aus Gleichung (7.)

$$(16.) \quad \iint_{(k_1+l)} \left(\frac{\partial G(x, y)}{\partial x} - \frac{\partial F(x, y)}{\partial y} \right) dx dy \\ = \int_{k_1+l} [F(x, y)dx + G(x, y)dy]$$

und

$$(17.) \quad \iint_{(k_2-l)} \left(\frac{\partial G(x, y)}{\partial x} - \frac{\partial F(x, y)}{\partial y} \right) dx dy = \int_{k_2-l} [F(x, y)dx + G(x, y)dy].$$

Addiert man diese beiden Gleichungen, so tritt links das Doppelintegral, erstreckt über den ganzen von der Kurve k umschlossenen Bereich auf; bei der Summe der beiden Kurven-Integrale wird der hinzugefügte Teil l des Integrationsweges das eine Mal in der Richtung von A nach B und das andere Mal in der Richtung von B nach A durchlaufen. Diejenigen Teile der Kurven-Integrale, die über den Weg l erstreckt sind, heben sich deshalb fort, so daß man

$$\int_{k_1+l} (Fdx + Gdy) + \int_{k_2-l} (Fdx + Gdy) = \int_k (Fdx + Gdy)$$

erhält; folglich wird auch in diesem Falle

$$(18.) \iint_{(k)} \left(\frac{\partial G(x, y)}{\partial x} - \frac{\partial F(x, y)}{\partial y} \right) dx dy = \int_k [F(x, y)dx + G(x, y)dy].$$

Daraus ergibt sich, daß diese Gleichung sogar noch richtig bleibt, wenn man die von dem Integrationswege eingeschlossene Fläche durch eine endliche Anzahl von hinzugefügten Linien l_1, l_2, \dots, l_m so in Teilflächen zerlegen kann, daß die Umgrenzung jeder einzelnen Teilfläche den für k ursprünglich gestellten Voraussetzungen genügt.

Beispiel. Es sei wieder

$$(19.) \frac{\partial G}{\partial x} = \frac{1}{2}, \quad \frac{\partial F}{\partial y} = -\frac{1}{2}, \quad \text{also } F(x, y) = -\frac{y}{2}, \quad G(x, y) = \frac{x}{2},$$

und die Fläche, über die sich das Doppelintegral erstrecken soll, sei die Kardioid mit den Gleichungen

$$(20.) \quad x = a[2\cos t - \cos(2t)], \quad y = a[2\sin t - \sin(2t)],$$

(vergl. Fig. 41 auf Seite 140), dann gibt das Doppelintegral

$$(21.) \quad J = \iint_{(k)} \left(\frac{\partial G(x, y)}{\partial x} - \frac{\partial F(x, y)}{\partial y} \right) dx dy = \iint_{(k)} dx dy$$

den Flächeninhalt der Kardioid. Hier ist

$$(22.) \quad dx = 2a[-\sin t + \sin(2t)]dt, \quad dy = 2a[\cos t - \cos(2t)]dt,$$


also

$$(23.) \quad F(x, y)dx + G(x, y)dy = \frac{1}{2}(xdy - ydx) = 3a^2(1 - \cos t)dt.$$

Da nun die Kurve im positiven Sinne durchlaufen wird, wenn t alle Werte von 0 bis 2π durchläuft, so erhält man für den Flächeninhalt der Kardioiden

$$(24.) \quad J = \iint_{(k)} dx dy = 3a^2 \int_0^{2\pi} (1 - \cos t) dt = 3a^2 [t + \sin t]_0^{2\pi} = 6a^2\pi.$$

Fig. 168.



Die Gleichung (18.) bleibt sogar noch richtig, wenn die Umgrenzung k aus zwei oder mehr getrennten Stücken besteht (vergl. Fig. 168), nur müssen die verschiedenen Teile so durchlaufen werden, daß die begrenzte Fläche auf der linken Seite der Kurve liegt.

§ 101.

Kurven-Integrale von vollständigen Differentialen.

(Vergl. die Formel-Tabelle Nr. 269 und 270.)

Besteht zwischen den beiden Funktionen $F(x, y)$ und $G(x, y)$ die Beziehung

$$(1.) \quad \frac{\partial F(x, y)}{\partial y} = \frac{\partial G(x, y)}{\partial x}, \text{ oder } \frac{\partial G(x, y)}{\partial x} - \frac{\partial F(x, y)}{\partial y} = 0,$$

ist also $F(x, y)dx + G(x, y)dy$ ein *vollständiges Differential*, und gelten für den Integrationsweg k die Voraussetzungen des vorhergehenden Paragraphen, so folgt aus Formel Nr. 268 der Tabelle, nämlich aus der Gleichung

$$(2.) \quad \int_k [F(x, y)dx + G(x, y)dy] = \iint_{(k)} \left(\frac{\partial G(x, y)}{\partial x} - \frac{\partial F(x, y)}{\partial y} \right) dx dy,$$

daß in diesem Falle

$$(3.) \quad \int_k [F(x, y)dx + G(x, y)dy] = 0$$


ist. Diesem Ergebnis kann man noch eine andere Fassung

geben. Verbindet man nämlich den Punkt P_0 mit dem Punkte P' durch zwei verschiedene Kurven k_1 und k_2 , die sich nicht schneiden mögen (vergl. Fig. 169), so schließen sie ein Flächenstück ein, dessen Umgrenzung k aus den beiden Stücken k_1 und $-k_2$ besteht. Wenn nun die Funktionen

$$F(x, y), G(x, y) \text{ und } \frac{\partial F(x, y)}{\partial y} = \frac{\partial G(x, y)}{\partial x}$$

innerhalb dieses Flächenstückes und auf seiner Umgrenzung *eindeutig* und *stetig* sind, so ist nach Gleichung (3.)

Fig. 169.




$$\int_k (Fdx + Gdy) = \int_{k_1} (Fdx + Gdy) - \int_{k_2} (Fdx + Gdy) = 0,$$

folglich wird

$$(4.) \quad \int_{k_1} (Fdx + Gdy) = \int_{k_2} (Fdx + Gdy).$$

Diese Formel bleibt auch noch richtig, wenn sich die Integrationswege k_1 und k_2 in einer endlichen Anzahl von

Fig. 170.



Punkten P_1, P_2, \dots, P_m schneiden. Ist z. B. $m = 2$ (vergl. Fig 170), so sind die beiden Kurven-Integrale einander gleich von P_0 bis P_1 , von P_1 bis P_2 und von P_2 bis P' , folglich sind auch die Summen einander gleich, wenn nur die Funktionen F, G und $\frac{\partial F}{\partial y} = \frac{\partial G}{\partial x}$ in den eingeschlossenen Flächenstückes und auf den Integrationswegen k_1

und k_2 selbst *eindeutig* und *stetig* sind. Dies gibt den

Satz. Verbindet man die Punkte P_0 und P' miteinander durch zwei verschiedene Kurven k_1 und k_2 , und liegen diese Kurven mit den von ihnen eingeschlossenen Flächenstückes ganz innerhalb eines Bereiches A , in welchem die

Funktionen $F(x, y)$, $G(x, y)$, $\frac{\partial F(x, y)}{\partial y}$ und $\frac{\partial G(x, y)}{\partial x}$ eindeutig und stetig sind, und ist

$$\frac{\partial F(x, y)}{\partial y} = \frac{\partial G(x, y)}{\partial x},$$

so haben die beiden über k_1 und k_2 erstreckten Kurven-Integrale denselben Wert.


Von diesem Satze gilt auch die

Umkehrung. Sind die Funktionen $F(x, y)$, $G(x, y)$, $\frac{\partial F(x, y)}{\partial y}$ und $\frac{\partial G(x, y)}{\partial x}$ innerhalb eines Bereiches A eindeutig und stetig, und erhält man für das Kurven-Integral von einem beliebigen Punkte P_0 des Bereiches bis zu irgendeinem anderen Punkte P' des Bereiches denselben Wert, gleichviel welchen Integrationsweg man innerhalb des Bereiches wählt, so ist $F(x, y)dx + G(x, y)dy$ ein vollständiges Differential, d. h. es ist

$$\frac{\partial F(x, y)}{\partial y} = \frac{\partial G(x, y)}{\partial x}.$$

Beweis. Liegt das Rechteck $P_0UP'S$, dessen Seiten den Koordinaten-Achsen parallel sind, und dessen Um-

Fig. 171.



grenzung mit k bezeichnet werden möge, innerhalb des Bereiches A (vergl. Fig. 171), so hat nach Voraussetzung das Kurven-Integral $\int (Fdx + Gdy)$ denselben Wert, gleichviel ob man die gebrochene Linie P_0UP' oder die gebrochene Linie P_0SP' zum Integrationsweg macht. Deshalb ist

$$\int_k (Fdx + Gdy) = \iint_{(k)} \left(\frac{\partial G(x, y)}{\partial x} - \frac{\partial F(x, y)}{\partial y} \right) dx dy = 0,$$

oder

$$(5.) \quad \int_{x_0}^{x'} dx \int_{y_0}^{y'} \left(\frac{\partial G}{\partial x} - \frac{\partial F}{\partial y} \right) dy = 0.$$

Das Integral auf der linken Seite dieser Gleichung ist eine Funktion der Grenzen x_0 und x' . Dabei kann man x_0 als eine Konstante und x' als eine Veränderliche betrachten, wobei sich freilich x' nur innerhalb solcher Grenzen ändern darf, daß das zugehörige Rechteck $P_0UP'S$ innerhalb des Bereiches A bleibt. Nach Voraussetzung hat diese Funktion für alle Werte von x' den konstanten Wert Null, folglich muß auch ihre Ableitung nach x' gleich Null sein, d. h. es wird auch für $x = x'$

$$(6.) \quad \int_{x_0}^{x'} \left(\frac{\partial G}{\partial x} - \frac{\partial F}{\partial y} \right) dy = 0.$$

Das Integral auf der linken Seite dieser Gleichung ist eine Funktion der Grenzen y_0 und y' , wobei man wieder y' als die Veränderliche betrachten kann, die sich ebenfalls nur innerhalb solcher Grenzen ändern darf, daß das zugehörige Rechteck $P_0UP'S$ innerhalb des Bereiches A bleibt. Da diese Funktion von y' den konstanten Wert Null hat, so ist auch ihre Ableitung nach y' gleich Null, d. h. es ist für $y = y'$

$$(7.) \quad \frac{\partial G}{\partial x} - \frac{\partial F}{\partial y} = 0;$$

und zwar gilt diese Gleichung schließlich für alle Punkte des Bereiches A , da das Rechteck $P_0UP'S$ beliebig klein sein darf.

Da sonach für ein *vollständiges* Differential der Wert des daraus gebildeten Kurven-Integrals vom Integrationswege unabhängig ist, so ordnet dieses Kurven-Integral jedem Punkte P der Ebene mit den Koordinaten x und y einen ganz bestimmten Wert $u(x, y)$ zu. Durch ein vollständiges Differential ist deshalb eine Funktion u von x und y bestimmt, ein Ergebnis, das die Untersuchungen des vorigen Abschnittes bestätigt. Zur wirklichen Aufsuchung dieser Funktion u kann man nämlich den Integrationsweg so wählen, daß die Berechnung des Kurven-Integrals möglichst einfach wird. Verbindet man zu diesem Zwecke den Anfangspunkt A des Integrationsweges, dessen Koordinaten

a und b heißen mögen, mit dem Endpunkte P durch zwei aufeinander senkrecht stehende Gerade, indem man durch A eine Parallele k_1 zur Y -Achse und durch P eine Parallele k_2 zur X -Achse legt, so ist auf der ersten Geraden k_1 dx gleich Null, so daß man

$$\int_{k_1} (Fdx + Gdy) = \int_b^y G(a, y)dy$$

erhält. Auf dem zweiten Stück k_2 ist dy gleich Null, so daß man y bei der Integration als einen konstanten Parameter anzusehen hat und deshalb

$$\int_{k_2} (Fdx + Gdy) = \int_a^x F(x, y)dx$$

erhält; folglich wird in Übereinstimmung mit Formel Nr. 265 der Tabelle

$$u = \int_k (Fdx + Gdy) = \int_a^x F(x, y)dx + \int_b^y G(a, y)dy.$$

Wäre der Integrationsweg so gewählt worden, daß man durch den Anfangspunkt A eine Parallele zur X -Achse und durch den Punkt P eine Parallele zur Y -Achse gezogen hätte, so würde das Kurven-Integral zu dem Ausdruck

$$u = \int_b^y G(x, y)dy + \int_a^x F(x, b)dx$$

geführt haben, der ebenfalls mit Formel Nr. 265 der Tabelle übereinstimmt.

§ 102.

Funktionen einer komplexen Veränderlichen.

(Vergl. die Formel-Tabelle Nr. 271.)

In § 108 der Differential-Rechnung (12. Auflage) war gezeigt worden, wie man auch *rationale* Funktionen der komplexen Veränderlichen

$$(1.) \quad z = x + yi$$

bilden kann, und wie man jede solche Funktion $f(z)$, auch wenn die darin auftretenden Konstanten komplexe Größen sind, auf die Form

$$(2.) \quad f(z) = f(x + yi) = u(x, y) + iv(x, y) = u + vi$$

bringen kann, wobei $u = u(x, y)$ und $v = v(x, y)$ reelle rationale Funktionen der reellen Veränderlichen x und y sind.

Auch *irrational*e Funktionen von $z = x + yi$ kann man bilden, da es stets möglich ist, die n Werte der n^{ten} Wurzel aus einer komplexen GröÙe $r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$ anzugeben. Es war nämlich

$$(3.) \quad \sqrt[n]{r(\cos \varphi + i \sin \varphi)} = \sqrt[n]{r} \left[\cos \left(\frac{\varphi + 2h\pi}{n} \right) + i \sin \left(\frac{\varphi + 2h\pi}{n} \right) \right],$$

wobei man die n verschiedenen Werte der Wurzel erhält, wenn h die n Werte $0, 1, 2, \dots, n-1$ annimmt.

Durch Einführung konvergenter Reihen konnte man sogar *transzendente* Funktionen erklären.

Es war damals auch gezeigt worden, daß man solche Funktionen der *komplexen* Veränderlichen z nach denselben Regeln differenzieren kann, wie die Funktionen von *reellen* Veränderlichen. Setzt man nämlich

$$z_1 = x_1 + y_1 i,$$

so möge die Ableitung der Funktion $f(z)$ durch die Gleichung

$$(4.) \quad f'(z) = \frac{df(z)}{dz} = \lim_{z_1 \rightarrow z} \frac{f(z_1) - f(z)}{z_1 - z}$$

erklärt werden, wobei $\lim z_1 = z$, oder $\lim(x_1 + y_1 i) = x + yi$ bedeutet, daß

$$(5.) \quad \lim x_1 = x \quad \text{und} \quad \lim y_1 = y$$

wird. Hier sollen nur solche Funktionen $f(z)$ einer komplexen Veränderlichen z betrachtet werden, für welche der $f'(z)$ definierende Grenzwert für alle Arten des Grenzüberganges zu *demselben* Ausdruck führt. Insbesondere soll der Wert von $f'(z)$ unabhängig sein von der *Richtung* der Geraden, auf der sich der Punkt P_1 dem Punkte P nähert. Unter der Voraussetzung, daß man die betrachtete Funktion auf die Form

$$(6.) \quad f(z) = f(x + yi) = u + vi = u(x, y) + iv(x, y)$$

bringen kann, und daß sich die Ableitung von z wirklich bilden läßt, erhält man

$$\frac{\partial f(z)}{\partial x} = \frac{df(z)}{dz} \frac{\partial z}{\partial x} = f'(z), \quad \frac{\partial f(z)}{\partial y} = \frac{df(z)}{dz} \frac{\partial z}{\partial y} = f'(z)i,$$

folglich ist

$$\frac{\partial f(z)}{\partial x} + i \frac{\partial f(z)}{\partial y} = f'(z) - f'(z) = 0,$$

oder mit Rücksicht auf Gleichung (6.)

$$(7.) \quad \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x} + i \frac{\partial u}{\partial y} - \frac{\partial v}{\partial y} = 0.$$

Ist aber eine komplexe Größe gleich Null, so muß der reelle Teil und der Faktor des imaginären Teils, jeder für sich, gleich Null sein. Deshalb folgt aus Gleichung (7.)

$$(8.) \quad \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \quad \text{und} \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}.$$

Man nennt diese Gleichungen, denen der reelle Teil und der Faktor des imaginären Teiles genügen, die „*Cauchy-Riemannschen Gleichungen*“ und die Funktion $f(z)$ heißt dann eine „*monogene Funktion*“ der komplexen Veränderlichen $z = x + yi$ für alle Werte von x und y , für welche die Funktionen u , v , $\frac{\partial u}{\partial x}$, $\frac{\partial u}{\partial y}$, $\frac{\partial v}{\partial x}$ und $\frac{\partial v}{\partial y}$ eindeutig und stetig sind.

§ 103.

Kurven-Integrale komplexer Funktionen.

(Vergl. die Formel-Tabelle Nr. 272 bis 274.)

Es sei zunächst

$$(1.) \quad f(t) = u(t) + iv(t)$$

eine *komplexe Funktion* der *reellen Veränderlichen* t , dann hat das Integral

$$(2.) \quad \int_{t_0}^{t'} f(t) dt = \int_{t_0}^{t'} u(t) dt + i \int_{t_0}^{t'} v(t) dt$$

eine ganz bestimmte Bedeutung, wenn $u(t)$ und $v(t)$ in dem Intervalle von t_0 bis t' *eindeutig* und *stetig* sind. Jetzt sei aber

$$(3.) \quad f(z) = f(x + yi) = u + vi = u(x, y) + iv(x, y)$$

eine *komplexe* Funktion der *komplexen* Veränderlichen z , die innerhalb eines bestimmten Bereiches A monogen sein möge. Setzt man dann

$$(4.) \quad x = \varphi(t), \quad y = \psi(t),$$

so durchläuft der dem Werte z entsprechende Punkt P eine Kurve k vom Punkte P_0 bis zum Punkte P' , wenn t alle Werte von t_0 bis t' durchläuft. (Vergl. Fig. 162 auf Seite 586.) Dabei möge vorausgesetzt werden, daß die Funktionen $\varphi(t)$, $\psi(t)$, $\varphi'(t)$, $\psi'(t)$ innerhalb dieses Intervalles *eindeutig* und *stetig* sind, und daß

$$(5.) \quad z_0 = x_0 + y_0 i = \varphi(t_0) + i\psi(t_0),$$

$$(6.) \quad z' = x' + y' i = \varphi(t') + i\psi(t')$$

sei. Ferner möge vorausgesetzt werden, daß die Kurve k vom Punkte P_0 bis zum Punkte P' in dem Bereiche A liegt. Dann versteht man unter dem bestimmten Integrale

$\int_{z_0}^z f(z) dz$, erstreckt über die Kurve k , den Ausdruck

$$(7.) \quad \int_k [u(x, y) + iv(x, y)](dx + idy) \\ = \int_k [u(x, y)dx - v(x, y)dy] + i \int_k [u(x, y)dy + v(x, y)dx],$$

oder

$$(8.) \quad \int_{z_0}^z f(z) dz = \int_{t_0}^{t'} \{u[\varphi(t), \psi(t)]\varphi'(t) - v[\varphi(t), \psi(t)]\psi'(t)\} dt \\ + i \int_{t_0}^{t'} \{u[\varphi(t), \psi(t)]\psi'(t) + v[\varphi(t), \psi(t)]\varphi'(t)\} dt.$$

Man kann auch hier diese Erklärung auf den Fall übertragen, wo die Kurve k aus mehreren Stücken k_1, k_2, \dots, k_m zusammengesetzt ist. (Vergl. Fig. 163 auf Seite 589.)

Das so definierte „komplexe Integral“ ist von der Wahl der Kurve k unabhängig, denn die Ausdrücke

$$u(x, y)dx - v(x, y)dy \quad \text{und} \quad u(x, y)dy + v(x, y)dx$$

sind dabei *vollständige Differentiale*, denn es ist nach Voraussetzung

$$\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x} \quad \text{und} \quad \frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial x}.$$

Deshalb findet der in § 101 bewiesene Satz für jedes der beiden Integrale Anwendung. Das Ergebnis kann man zusammenfassen in den

Satz. Verbindet man die Punkte P_0 und P' miteinander durch zwei verschiedene Kurven k_1 und k_2 , und liegen diese Kurven mit den von ihnen eingeschlossenen Flächenstücken ganz innerhalb eines Bereiches A , in welchem die Funktion $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ mit den partiellen Ableitungen $\frac{\partial u}{\partial x}$, $\frac{\partial u}{\partial y}$, $\frac{\partial v}{\partial x}$, $\frac{\partial v}{\partial y}$ eindeutig und stetig ist, so haben die über k_1 und k_2 erstreckten Kurven-Integrale denselben Wert, d. h. es ist

$$(9.) \quad \int_{k_1} f(z) dz = \int_{k_2} f(z) dz.$$

Besteht der Integrationsweg aus einer geschlossenen Kurve k , so kann man die Kurve durch zwei beliebige Punkte P_0 und P' auf k in zwei Teile k_1 und $-k_2$ zerlegen und erhält aus Gleichung (9.) die Gleichung

$$(10.) \quad \int_k f(z) dz = \int_{k_1} f(z) dz - \int_{k_2} f(z) dz = 0.$$

Das gibt den

Satz. Liegt die geschlossene Kurve k mit allen von ihr eingeschlossenen Flächenstücken in dem Bereiche A , so ist das über die Kurve k erstreckte Integral von $f(z) dz$ gleich Null.

Anders verhält sich die Sache, wenn die Kurve k Punkte einschließt, für welche die Funktion $f(z)$ mehrdeutig oder unstetig wird. Es sei z. B.

$$(11.) \quad f(z) = \frac{1}{z} = \frac{1}{x + yi},$$

dann wird $f(z)$ unendlich für $x = 0$, $y = 0$. Nimmt man in diesem Falle für die Kurve k einen Kreis, der mit dem Halbmesser a um den Nullpunkt beschrieben wird, so setze man

$$(12.) \quad x = a \cos t, \quad y = a \sin t,$$


dann durchläuft der Punkt P den Kreis, wenn t alle Werte von 0 bis 2π durchläuft. Dies gibt

$$\begin{aligned}
 (13.) \quad \int_k f(z) dz &= \int_k \frac{dz}{z} = \int_0^{2\pi} \frac{a(-\sin t + i \cos t) dt}{a(\cos t + i \sin t)} \\
 &= \int_0^{2\pi} (-\sin t + i \cos t)(\cos t - i \sin t) dt = i \int_0^{2\pi} dt = 2\pi i.
 \end{aligned}$$

Denselben Wert des Integrals erhält man, wenn man den Kreis mit irgendeiner anderen Kurve k vertauscht, welche den Nullpunkt in demselben Sinne einmal umschließt.

Die Funktion $f(z)$ ist nämlich eindeutig und stetig in einem Kreisringe A , der von zwei Kreisen mit den Halbmessern a und b und dem gemeinsamen Mittelpunkte O begrenzt wird. (Vergl. Fig. 172.) Dabei kann man a so klein und b so groß machen, daß die geschlossene Kurve k ganz innerhalb des Kreisringes A liegt. Jetzt zer-

Fig. 172.



schneide man den Kreisring durch die Gerade BC , die z. B. mit der positiven Richtung der X -Achse zusammenfallen und die Kurve k im Punkte D treffen möge. Dadurch ist der Bereich A in einen einfach zusammenhängenden Bereich verwandelt. Betrachtet man dann den kleinen Kreis als den einen Integrationsweg k_1 und als zweiten Integrationsweg k_2 einen Kurvenzug, der aus der Geraden BD , der Kurve k und der Geraden DB besteht, so liegt zwischen den beiden Integrationswegen kein Punkt, für welchen die Funktion $\frac{1}{z}$ unstetig wird. Sie liefern deshalb beide denselben Wert des Integrals. Bei dem Integrationswege k_2 wird die Strecke BD das eine Mal im *positiven* und das andere Mal im *negativen* Sinne durchlaufen. Die zugehörigen Teile des Kurven-Integrals heben sich deshalb auf, so daß von dem Integrationswege k_2 nur die Kurve k übrig bleibt. Dies gibt also

$$(14.) \quad \int_k \frac{dz}{z} = 2\pi i.$$

Ebenso findet man

$$(15.) \quad \int_k \frac{dz}{z - z_0} = 2\pi i,$$

wenn der Integrationsweg k eine einfach geschlossene Kurve ist, die den Punkt

$$z_0 = x_0 + y_0 i$$

einmal umwindet. Zum Beweise braucht man nur

$$x - x_0 = a \cos t, \quad y - y_0 = a \sin t, \quad \text{also } z - z_0 = a(\cos t + i \sin t)$$

zu setzen; dann erhält man wieder

$$\int_k \frac{dz}{z - z_0} = \int_0^{2\pi} \frac{a(-\sin t + i \cos t) dt}{a(\cos t + i \sin t)} = i \int_0^{2\pi} dt = 2\pi i.$$

§ 104.

Der Satz von *Cauchy*.

(Vergl. die Formel-Tabelle Nr. 275.)

Die Funktion $f(z)$ sei in einem Bereiche A *eindeutig* und *stetig*, und z_0 sei irgendein Punkt in diesem Bereiche. Beschreibt man um diesen Punkt z_0 einen kleinen Kreis k_1 mit dem Halbmesser a und bezeichnet mit A' den Bereich, der von A übrig bleibt, wenn man diesen kleinen Kreis ausschließt, so ist die Funktion $\frac{f(z)}{z - z_0}$ in diesem Bereiche noch *eindeutig* und *stetig*. Liegt dann die geschlossene Kurve k , die den Punkt P_0 einmal umwindet, in diesem Bereiche A' , so kann man genau so wie im vorhergehenden Paragraphen zeigen, daß

$$(1.) \quad \int_k \frac{f(z) dz}{z - z_0} = \int_{k_1} \frac{f(z) dz}{z - z_0}$$

ist. Jetzt kann man den Halbmesser a des Kreises k_1 so klein machen, daß wegen der Stetigkeit der Funktion $f(z)$ der absolute Betrag von

$$(2.) \quad f(z) - f(z_0) = \xi + \eta i$$

kleiner bleibt als die beliebig kleine positive GröÙe ε , wenn der Punkt z mit den Koordinaten x, y den Kreis k_1 durchläuft. Dies gibt

$$(3.) \quad |f(z) - f(z_0)| = \sqrt{\xi^2 + \eta^2} < \varepsilon,$$

also

$$(4.) \quad \int_{k_1} \frac{f(z) dz}{z - z_0} = \int_{k_1} \frac{f(z_0) + \xi + \eta i}{z - z_0} dz = f(z_0) \int_{k_1} \frac{dz}{z - z_0} + \int_{k_1} \frac{(\xi + \eta i) dz}{z - z_0}.$$

Dabei ist nach Formel Nr. 274 der Tabelle

$$(5.) \quad \int_{k_1} \frac{dz}{z - z_0} = 2\pi i.$$

Ferner wird, wenn man wieder

$$(6.) \quad z = z_0 + a(\cos t + i \sin t) = z_0 + a e^{ti},$$

also

$$(7.) \quad dz = a i e^{ti} dt, \quad \frac{dz}{z - z_0} = i dt$$

setzt,

$$(8.) \quad \int_{k_1} \frac{(\xi + \eta i) dz}{z - z_0} = i \int_0^{2\pi} (\xi + \eta i) dt = \int_0^{2\pi} (i\xi - \eta) dt.$$

Da der absolute Betrag einer Summe kleiner ist als die Summe der absoluten Beträge, was auch für das Integral als Grenzwert einer Summe gültig bleibt, wenn man den Ausdruck $(i\xi - \eta)$ unter dem Integralzeichen durch seinen absoluten Betrag $\sqrt{\xi^2 + \eta^2}$ ersetzt, so wird

$$(9.) \quad \left| \int_k \frac{(\xi + \eta i) dz}{z - z_0} \right| = \left| \int_{k_1} \frac{(\xi + \eta i) dz}{z - z_0} \right| < \int_0^{2\pi} \sqrt{\xi^2 + \eta^2} dt < 2\varepsilon\pi.$$

Dabei nähert sich ε mit a zugleich dem Grenzwerte Null. Nun ist aber

$$(10.) \quad \int_k \frac{(\xi + \eta i) dz}{z - z_0} = \int_k \frac{f(z) dz}{z - z_0} - f(z_0) \cdot 2\pi i$$

von a unabhängig, folglich muß

$$(11.) \quad \int_k \frac{f(z)dz}{z-z_0} - f(z_0) \cdot 2\pi i = 0$$

sein, oder

$$(12.) \quad f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \int_k \frac{f(z)dz}{z-z_0}.$$

Dies gibt den

Satz. *Liegt der Punkt P_0 mit den Koordinaten x_0, y_0 in dem Bereiche A , in dem die Funktion $f(z)$ eindeutig und stetig ist, und ist k eine geschlossene Kurve innerhalb des Bereiches A , die den Punkt P_0 einmal im positiven Sinne umwindet, so ist*

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \int_k \frac{f(z)dz}{z-z_0}.$$

§ 105.

Verallgemeinerung des *Cauchyschen* Satzes.

(Vergl. die Formel-Tabelle Nr. 276.)

Jetzt sei wieder die Funktion $f(z)$ in dem Bereiche A , in dem auch die voneinander verschiedenen Punkte z_1, z_2, \dots, z_n liegen, *eindeutig und stetig*, und es sei

$$(1.) \quad F(z) = (z-z_1)(z-z_2)\dots(z-z_n),$$

dann wird nach den Regeln der Partialbruchzerlegung

$$(2.) \quad \frac{1}{F(z)} = \frac{A_1}{z-z_1} + \frac{A_2}{z-z_2} + \dots + \frac{A_n}{z-z_n},$$

wobei

$$(3.) \quad A_1 = \frac{1}{F'(z_1)}, \quad A_2 = \frac{1}{F'(z_2)}, \quad \dots \quad A_n = \frac{1}{F'(z_n)}$$

ist, folglich wird

$$(4.) \quad \frac{f(z)}{F(z)} = \frac{A_1 f(z)}{z-z_1} + \frac{A_2 f(z)}{z-z_2} + \dots + \frac{A_n f(z)}{z-z_n}.$$

Ist nun k eine geschlossene Kurve, welche im Bereiche A liegt und die Punkte z_1, z_2, \dots, z_n einmal im positiven Sinne umwindet, so wird nach dem *Cauchyschen* Satze (vergl. Formel Nr. 275 der Tabelle)

$$(5.) \quad \int_k \frac{f(z)dz}{F(z)} = 2\pi i \left[\frac{f(z_1)}{F'(z_1)} + \frac{f(z_2)}{F'(z_2)} + \dots + \frac{f(z_n)}{F'(z_n)} \right].$$

Man nennt dabei z_1, z_2, \dots, z_n die „*singulären Punkte*“ der Funktion $\frac{f(z)}{F(z)}$.

§ 106.

Übungs-Beispiele.

(Vergl. die Formel-Tabelle Nr. 277 bis 279.)

Aufgabe 1. $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{x^2 + x + 1} = ?$

Auflösung. Setzt man $x + \frac{1}{2} = t$, so wird nach Formel Nr. 28 der Tabelle

$$(1.) \int \frac{dx}{x^2 + x + 1} = \int \frac{dt}{t^2 + \frac{3}{4}} = \frac{2}{\sqrt{3}} \operatorname{arctg}\left(\frac{2t}{\sqrt{3}}\right) = \frac{2}{\sqrt{3}} \operatorname{arctg}\left(\frac{2x+1}{\sqrt{3}}\right),$$

also

$$(2.) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{x^2 + x + 1} = \frac{2}{\sqrt{3}} \left[\operatorname{arctg}\left(\frac{2x+1}{\sqrt{3}}\right) \right]_{-\infty}^{+\infty} = \frac{2}{\sqrt{3}} \left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} \right) = \frac{2\pi}{\sqrt{3}}.$$

Dasselbe Ergebnis kann man auch in folgender Weise finden. Bei der Funktion $\frac{1}{z^2 + z + 1}$ verschwindet der Nenner nur für die Werte


$$(3.) \quad z = z_1 = -\frac{1}{2} + \frac{i}{2}\sqrt{3}$$

$$\text{und } z = z_2 = -\frac{1}{2} - \frac{i}{2}\sqrt{3}.$$

Besteht also der Integrationsweg k aus dem Durchmesser AB eines Kreises, der mit dem Halbmesser a um den Nullpunkt beschrieben ist, und dem Halbkreise über AB auf der positiven Seite der X -Achse

(vergl. Fig. 173), so schließt k den singulären Punkt z_1 ein, wenn $a > 1$ ist. Nach Formel Nr. 276 der Tabelle wird dann

Fig. 173.



$$(4.) \quad \int_K \frac{dz}{z^2 + z + 1} = \frac{2\pi i}{F'(z_1)} = \frac{2\pi i}{2z_1 + 1} = \frac{2\pi i}{i\sqrt{3}} = \frac{2\pi}{\sqrt{3}}.$$

Setzt man jetzt

$$(5.) \quad z = ae^{ti}, \text{ also } dz = aie^{ti} dt,$$

so kann man das Kurven-Integral in die Summe zweier Integrale zerlegen, von denen das eine über den Kreisdurchmesser auf der reellen Achse, das andere über den Halbkreis erstreckt ist, und erhält aus Gleichung (4.)

$$(6.) \quad \int_K \frac{dz}{z^2 + z + 1} = \int_{-a}^{+a} \frac{dx}{x^2 + x + 1} + \int_0^\pi \frac{aie^{ti} dt}{a^2 e^{2ti} + ae^{ti} + 1} = \frac{2\pi}{\sqrt{3}}.$$

Nun ist

$$|aie^{ti}| = a, \quad |ae^{ti} - z_1| > a - 1, \quad |ae^{ti} - z_2| > a - 1,$$

also

$$(7.) \quad \left| \frac{aie^{ti}}{a^2 e^{2ti} + ae^{ti} + 1} \right| = \left| \frac{aie^{ti}}{(ae^{ti} - z_1)(ae^{ti} - z_2)} \right| < \frac{a}{(a-1)^2} = \frac{1}{a-2+\frac{1}{a}}.$$

Da der absolute Betrag einer Summe kleiner ist als die Summe der absoluten Beträge, so wird

$$(8.) \quad \left| \int_0^\pi \frac{aie^{ti} dt}{a^2 e^{2ti} + ae^{ti} + 1} \right| < \frac{1}{a-2+\frac{1}{a}} \int_0^\pi dt = \frac{\pi}{a-2+\frac{1}{a}}.$$

Wächst jetzt a ins Unbegrenzte, so wird $\lim_{a \rightarrow \infty} \frac{\pi}{a-2+\frac{1}{a}}$ gleich Null, folglich geht Gleichung (6.) über in

$$(9.) \quad \lim_{a \rightarrow \infty} \int_K \frac{dz}{z^2 + z + 1} = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{x^2 + x + 1} = \frac{2\pi}{\sqrt{3}}.$$

Dieser Wert stimmt mit dem in Gleichung (2.) gefundenen überein.

Aufgabe 2. $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2 dx}{x^4 + 1} = ?$

Auflösung. Die Funktion $z^4 + 1$ verschwindet für

$$(10.) \quad \begin{aligned} z = z_1 &= \frac{+1+i}{\sqrt{2}}, & z = z_2 &= \frac{-1+i}{\sqrt{2}}, \\ z = z_3 &= \frac{-1-i}{\sqrt{2}}, & z = z_4 &= \frac{+1-i}{\sqrt{2}}. \end{aligned}$$

Wendet man denselben Integrationsweg k an wie bei der vorhergehenden Aufgabe, so umschließt k für $a > 1$ die singulären Punkte z_1 und z_2 . Deshalb erhält man nach Formel Nr. 276 der Tabelle

$$(11.) \quad \int_k \frac{z^2 dz}{z^4 + 1} = 2\pi i \left[\frac{z_1^2}{F'(z_1)} + \frac{z_2^2}{F'(z_2)} \right] = 2\pi i \left(\frac{z_1^2}{4z_1^3} + \frac{z_2^2}{4z_2^3} \right) \\ = \frac{\pi i}{2} \left(\frac{1}{z_1} + \frac{1}{z_2} \right) = \frac{\pi i (z_1 + z_2)}{2z_1 z_2} = \frac{-\pi i \cdot 2i}{2\sqrt{2}} = \frac{\pi}{\sqrt{2}}.$$

Setzt man jetzt wieder $z = ae^{ti}$, also $dz = aie^{ti}dt$, so kann man das Kurven-Integral wieder in die Summe zweier Integrale zerlegen. Dadurch geht Gleichung (11.) über in

$$(12.) \quad \int_k \frac{z^2 dz}{z^4 + 1} = \int_{-a}^{+a} \frac{x^2 dx}{x^4 + 1} + \int_0^\pi \frac{a^3 i e^{3ti} dt}{a^4 e^{4ti} + 1} = \frac{\pi}{\sqrt{2}}.$$

Nun ist

$$(13.) \quad |a^3 i e^{3ti}| = a^3, \quad |a^4 e^{4ti} + 1| > a^4 - 1,$$

also

$$(14.) \quad \left| \frac{a^3 i e^{3ti}}{a^4 e^{4ti} + 1} \right| < \frac{a^3}{a^4 - 1} = \frac{1}{a - \frac{1}{a^3}} < \frac{1}{a - 1}.$$

Da der absolute Betrag einer Summe kleiner ist als die Summe der absoluten Beträge, so wird

$$(15.) \quad \left| \int_0^\pi \frac{a^3 i e^{3ti} dt}{a^4 e^{4ti} + 1} \right| < \int_0^\pi \frac{dt}{a - 1} = \frac{\pi}{a - 1}.$$

Wächst a ins Unbegrenzte, so wird $\lim_{a=\infty} \frac{\pi}{a-1} = 0$, folglich geht Gleichung (12.) über in

$$(16.) \quad \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2 dx}{x^4 + 1} = \frac{\pi}{\sqrt{2}}.$$

Aufgabe 3. $\int_0^{2\pi} \frac{dx}{1 + \cos \alpha \cos x} = ?$

Auflösung. Setzt man

$$(17.) \quad e^{xi} = z, \text{ also } e^{-xi} = \frac{1}{z}, \quad 2\cos x = \frac{z^2 + 1}{z}, \quad dx = \frac{dz}{zi},$$

so durchläuft $z = \cos x + i\sin x$ einen Kreis k , der mit dem Halbmesser 1 um den Punkt O beschrieben ist, im positiven Sinne, wenn x die Werte von 0 bis 2π durchläuft und es wird

$$(18.) \quad \int_0^{2\pi} \frac{2dx}{2 + 2\cos \alpha \cos x} = \int_k \frac{2dz}{zi \left(2 + \frac{z^2 + 1}{z} \cos \alpha \right)} \\ = \frac{2}{i} \int_k \frac{dz}{z^2 \cos \alpha + 2z + \cos \alpha},$$

wobei der Integrationsweg k der oben beschriebene Kreis ist. Der Nenner $z^2 \cos \alpha + 2z + \cos \alpha$ verschwindet für

$$(19.) \quad z = z_1 = \frac{-1 + \sin \alpha}{\cos \alpha} \quad \text{und} \quad z = z_2 = \frac{-1 - \sin \alpha}{\cos \alpha}.$$

Da unter der Voraussetzung, daß α zwischen 0 und $\frac{\pi}{2}$ liegt, $\frac{1 + \sin \alpha}{\cos \alpha} > 1$ ist, so ist $z_2 < -1$ und liegt deshalb *außerhalb* des Integrationsweges. Dagegen liegt

$$(20.) \quad z_1 = -\frac{1 - \sin \alpha}{\cos \alpha} = -\frac{\cos \alpha}{1 + \sin \alpha}$$

zwischen 0 und -1 , also *innerhalb* des Kreises k ; deshalb wird nach Formel Nr. 276 der Tabelle

$$(21.) \quad \int_0^{2\pi} \frac{dx}{1 + \cos \alpha \cos x} = \frac{2}{i} \int_k \frac{dz}{z^2 \cos \alpha + 2z + \cos \alpha} \\ = \frac{2}{i} \cdot 2\pi i \frac{1}{2z_1 \cos \alpha + 2} = \frac{2\pi}{\sin \alpha}.$$

§ 107.

Beweis des Hauptsatzes der Algebra.

Es sei $f(z)$ für alle endlichen Werte von z *eindeutig* und *stetig*, und k sei ein Kreis, der mit dem beliebig großen Halbmesser a um den Nullpunkt beschrieben ist; dann wird nach dem *Cauchyschen* Satze (vergl. Formel Nr. 275 der Tabelle)

$$(1.) \quad f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \int_k \frac{f(z) dz}{z - z_0}, \quad f(0) = \frac{1}{2\pi i} \int_k \frac{f(z) dz}{z},$$

wobei z_0 ein beliebiger Punkt im Innern von k ist. Dies gibt

$$(2.) \quad f(z_0) - f(0) = \frac{1}{2\pi i} \int_k \frac{z_0 f(z) dz}{z(z - z_0)}.$$

Nun sei G der größte Wert, den $|f(z)|$ annimmt, wenn z den Kreis k durchläuft; dann ist

$$|f(z)| \leq G, \quad |z| = a, \quad |z - z_0| \geq a - |z_0|,$$

also

$$(3.) \quad \left| \frac{z_0 f(z)}{z - z_0} \right| \leq \frac{|z_0| G}{a - |z_0|}.$$

Führt man in dem Integral den Kreisbogen t als Integrationsveränderliche ein, d. h. setzt man

$$z = ae^{it}, \quad \text{also} \quad \frac{dz}{z} = i dt,$$

so wird deshalb

$$(4.) \quad |f(z_0) - f(0)| < \frac{1}{2\pi} \frac{|z_0| G}{a - |z_0|} \int_0^{2\pi} dt = \frac{|z_0| G}{a - |z_0|}.$$

Macht man jetzt die Voraussetzung, daß der absolute Betrag von $f(z)$ nie größer wird als die endliche Größe G , wie groß man auch den Halbmesser a werden läßt, so wird

$$(5.) \quad \lim_{a \rightarrow \infty} |f(z_0) - f(0)| = 0, \quad \text{oder} \quad f(z_0) = f(0),$$

d. h. die Funktion $f(z)$ ist eine Konstante. Dies gibt den

Satz 1. *Ist die Funktion $f(z)$ eindeutig und stetig für alle endlichen Werte von z , und übersteigt ihr absoluter Be-*

trag niemals eine endliche Größe G , wie groß man auch den absoluten Betrag von z machen mag, so ist $f(z)$ eine Konstante.

Daraus folgt ein Beweis für den Hauptsatz der Algebra, daß es stets Werte von z gibt, für welche die ganze rationale Funktion n^{ten} Grades

$$(6.) \quad F(z) = az^n + a_1z^{n-1} + a_2z^{n-2} + \cdots + a_{n-1}z + a_n$$

verschwindet. Damit der Grad wirklich gleich n ist, werde vorausgesetzt, daß a von Null verschieden ist. Aus Gleichung (6.) folgt dann

$$(7.) \quad \frac{F(z)}{z^n} = a + \frac{a_1}{z} + \frac{a_2}{z^2} + \cdots + \frac{a_{n-1}}{z^{n-1}} + \frac{a_n}{z^n}.$$

Wächst der absolute Betrag von z ins Unbegrenzte, so wird also

$$(8.) \quad \lim_{|z|=\infty} \frac{F(z)}{z^n} = a, \quad \text{oder} \quad \lim_{|z|=\infty} \frac{1}{F(z)} = \lim_{|z|=\infty} \frac{1}{az^n} = 0.$$

Gäbe es keinen Wert von z im Endlichen, für den $F(z)$ verschwindet, so würde die Funktion $\frac{1}{F(z)}$ für alle endlichen Werte von z *eindeutig* und *endlich* sein, und sie würde nach Gleichung (8.) auch endlich bleiben, wenn der absolute Betrag von z ins Unbegrenzte wächst. Dann müßte aber $\frac{1}{F(z)}$ nach Satz 1 eine Konstante sein. Da dies ausgeschlossen ist, muß die Annahme falsch sein. Deshalb gilt der

Satz 2. *Es gibt stets einen Wert von z im Endlichen für den die ganze rationale Funktion n^{ten} Grades $F(z)$ verschwindet.*
